

LOUIS VIDAL

---

DICTIONNAIRE  
DE SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES

---

1934

OFFICE DE VULGARISATION  
PHARMACEUTIQUE  
PARIS

P11267 - 1934

LOUIS VIDAL

DICTIONNAIRE  
DE SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES



1934



Transfert  
P. 11267


2014

**EXCLU DU PRÊT**

OFFICE DE VULGARISATION  
PHARMACEUTIQUE

107, Rue Lafayette, PARIS (X<sup>e</sup>)

Tél. : Trudaine 41-05 et 06-84.







## AU CORPS MÉDICAL



Tout d'abord, nous com-  
mençons par des excuses.

L'Édition 1933 du  
*DICTIONNAIRE de SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES* a obtenu, dès sa  
parution, un si grand succès que, malgré un  
tirage à 18.000 exemplaires, il ne nous a pas  
été possible de satisfaire de nombreuses demandes  
et, qu'à notre grand regret, beaucoup de Méde-  
cins n'ont pu être servis. Nous leur demandons  
de ne pas nous en tenir rigueur.

Nous espérons, cette année,  
pouvoir donner satisfaction à tous, car nous  
avons fait un nouvel effort : de 18.000 nous  
avons porté le tirage de la XV<sup>e</sup> édition à  
20.000 exemplaires.

Conscients de vous rendre  
de réels services, soutenus par votre bienveil-  
lance, tous les ans nous cherchons à polir et à  
repolir notre ouvrage.

Le *DICTIONNAIRE de  
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES* 1934  
contient de nombreuses spécialités nouvelles. En  
outre, suivant vos conseils, nous avons remanié

de multiples textes et nous nous sommes efforcés d'obtenir des Fabricants l'insertion du prix de leurs produits.

Nous avons sélectionné ceux-ci de plus en plus pour vous permettre de prescrire dans votre clientèle d'assurés sociaux toutes les spécialités, sans craindre la moindre réaction administrative.

Les améliorations apportées dans la dernière édition, qui ont reçu une approbation quasi-unanime, ont été maintenues. Les classifications ont été revues, corrigées, mises à jour.

A la demande de nombreux Médecins, nous avons, dans la première partie, reporté au début de chaque page, auprès des têtes de chapitres, le numéro correspondant de la classification.

Nous remercions ici les nombreux Médecins qui ont bien voulu nous communiquer leurs suggestions et leurs avis éclairés. Nous tenons également à remercier les Fabricants qui nous ont apporté leur appui financier. Bien rares sont ceux qui se sont abstenus ; tous ont compris l'intérêt d'une œuvre dont nous sommes fiers et considèrent que l'insertion au *DICTIONNAIRE de SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES*, lien étroit entre le Laboratoire et le Praticien, est aujourd'hui une nécessité.



Nous ne pouvions pas être mieux récompensés de notre persévérance et de nos efforts.

Nous sommes persuadés que notre *DICTIONNAIRE de SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES*, doyen des ouvrages de documentation spécialisée, restera pour vous l'ami fidèle, à portée de votre main, et continuera, comme par le passé, à vous rendre les services journaliers, auxquels vous êtes accoutumé.

LOUIS VIDAL



## **NOTA**

**Les prix des spécialités  
pharmaceutiques  
donnés dans cet ouvrage  
sont ceux pratiqués en France.  
Ils varient  
pour chacun des autres pays.**



**CLASSIFICATION DES CHAPITRES**  
**par actions médicamenteuses**  
**et**  
**indications thérapeutiques.**

---





## I. — APPAREIL CIRCULATOIRE

### Thérapeutique générale

Antispasmodiques artériels.  
Diurétiques.  
Hémostatiques.  
Modérateurs cardiaques.  
Toni-cardiaques.  
Vaso-constricteurs artériels, hypertenseurs.  
Vaso-constricteurs veineux.  
Vaso-dilatateurs artériels, hypotenseurs.



### Thérapeutique spéciale

Anémies, chlorose.  
Angines de poitrine.  
Artério-sclérose et ses complications.  
Artérites, aortites, claudication intermittente.  
Arythmies.  
Cardiopathies aiguës.  
Eréthisme, tachycardie, palpitations.  
Gangrène, syndrome de Raynaud.  
Hémophilies.  
Hémorragies.  
Hémorroïdes, varices, phlébites.  
Hypertension.  
Hypotension.  
Insuffisances cardiaques, hyposystolie, asystolie.  
Leucémie, lymphadénie.  
Œdèmes périphériques.  
Purpura.  
Shock, accidents sériques.

## II. — APPAREIL DIGESTIF

### Thérapeutique générale

Alcalins, saturants.  
Antidiarrhéiques.  
Antiémétisants.  
Antiseptiques intestinaux, antifermentescibles.  
Antispasmodiques et sédatifs.  
Cholagogues.  
Eupeptiques, stomachiques.  
Laxatifs, purgatifs.  
Pansements gastriques.  
Stimulants de la sécrétion et de la motilité gastrique.  
Vaccinothérapie.

## **Thérapeutique spéciale**

Aérophagie, dilatation de l'estomac.  
Anaphylaxie alimentaire.  
Anorexie.  
Cholécystites, angiocholites.  
Cirrhoses.  
Congestions du foie, foie cardiaque.  
Constipation.  
Dysenteries, choléra.  
Dyspepsies.  
Entérites aiguës, diarrhées, coliques et fermentations intestinales.  
Entérites chroniques, appendicite chronique.  
Gastralgies.  
Gastro-entérites de l'enfance, diarrhées infantiles.  
Hématémèse, mélcœna.  
Hyperchlorhydrie.  
Hypochlorhydrie, hypopepsie, atonie gastrique.  
Ictères, cholémie.  
Infections intestinales.  
Insuffisance hépatique.  
Insuffisance pancréatique.  
Intoxications.  
Lithiase biliaire, coliques hépatiques.  
Rectites, fistules anales, fissures anales, prurit anal.  
Saturnisme, coliques de plomb.  
Sténoses du pylore.  
Stomatites, gingivites, muguet.  
Tuberculose intestinale.  
Ulcères de l'estomac et du duodénum.  
Vomissements.

## **III. — APPAREIL GÉNITO-URINAIRE**

### **Thérapeutique générale**

Alcalins.  
Antiseptiques gynécologiques.  
Antiseptiques urinaires externes.  
Antiseptiques urinaires internes.  
Balsamiques.  
Décongestifs pelviens.  
Dissolvants uriques.  
Diurétiques.  
Galactogènes.  
Hémostatiques utérins.  
Régulateurs des règles, sédatifs utéro-ovariens.  
Vaccins.



## **Thérapeutique spéciale**

Albuminuries, Azotémie, Urémie, Anurie.  
Allaitement, crevasses du sein.  
Blennorragie, orchite.  
Chancres mou.  
Cystites, prostatisme. ✍  
Eclampsie, vomissements incoercibles.  
Fibromes.  
Grossesse, accouchements, avortements.  
Hématuries.  
Impuissance, spermatorrhée. ✍  
Incontinence d'urine.  
Infection puerpérale.  
Insuffisances rénales, néphrites chroniques, néphrites  
aiguës.  
Lithiasé rénale, coliques néphrétiques.  
Mérites, leucorrhée.  
Puberté, menstruation, ménopause.  
Pyélonéphrites.  
Salpingo-ovarites.  
Syphilis rénale.  
Tuberculose rénale.

## **IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE**

### **Thérapeutique générale**

Antidyspnéiques.  
Antisepsiques des voies respiratoires.  
Antispasmodiques, sédatifs de la toux.  
Hémostatiques.  
Modificateurs sécrétoires, balsamiques.  
Modificateurs sécrétoires, expectorants.  
Révulsifs.  
Sérothérapie, vaccinothérapie.

### **Thérapeutique spéciale**

Adénopathie trachéo-bronchique.  
Asthme, asthme des foin.  
Bronchite fétide, gangrène pulmonaire, abcès du pou-  
mon.  
Congestions pulmonaires, pneumonie franche aiguë,  
bronchopneumonies.  
Coqueluche, toux spasmodiques.  
Emphysème pulmonaire, sclérose pulmonaire.  
Œdème aigu du poumon.  
Pleurésies.  
Trachéites, trachéo-bronchites aiguës, bronchites chro-  
niques.  
Tuberculose.

## **V. — CHIRURGIE — THÉRAPEUTIQUE EXTERNE**

### **Thérapeutique générale**

Anesthésiques.  
Antiseptiques externes comprimés.  
Antiseptiques externes liquides.  
Antiseptiques externes pommades.  
Antiseptiques externes poudres.  
Antiseptiques externes savons, ovules.  
Antiseptiques internes.  
Bains.  
Cataplasmes, révulsifs.  
Cicatrisants.  
Hémostatiques.  
Stérilisation.  
Vaccinothérapie.

### **Thérapeutique spéciale**

Adénites.  
Brûlures.  
Cicatrices vicieuses.  
Entorses, fractures, hydarthroses.  
Furoncles, furonculose, abcès, panaris, anthrax,  
phlegmons, piqûres d'insectes.  
Ostéites, ostéo-myélites.  
Pansements, plaies, fistules, ulcères.  
Tuberculoses osseuses.

## **VI. — DIÉTÉTIQUE**

## **VII. — INSTRUMENTATION — APPAREILS**

## **VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE**

### **Thérapeutique générale**

Accélérateurs de la nutrition.  
Dissolvants uriques, antigoutteux.  
Médicaments d'épargne.  
Produits vitaminés, irradiés.  
Régulateurs de la nutrition.

### **Thérapeutique spéciale**

Acétonémie.  
Alcalose.

Arthritisme.  
Asthénie, surmenage, convalescence.  
Athrepsie.  
Avitaminose.  
Carence calcique, carence phosphatée.  
Carence magnésienne.  
Diabète.  
Goutte.  
Obésité.  
Phosphaturie.  
Rachitisme, lymphatisme, troubles de croissance.  
Rhumatismes chroniques, algies rhumatismales, lumbago.

## **IX. — MALADIES DE LA PEAU**

### **Thérapeutique générale**

Antiprurigineux.  
Antiseptiques.  
Kératoplastiques.  
Vaccins.

### **Thérapeutique spéciale**

Acné.  
Alopécies.  
Crevasses, gerçures, engelures.  
Eczémas.  
Erythèmes, intertrigo.  
Herpès.  
Impétigo.  
Mycoses, sycosis.  
Phthiriase, teigne, gale.  
Pityriasis.  
Prurigo, dartres, prurits.  
Psoriasis.  
Pyodermites.  
Séborrhée.  
Tuberculose cutanée, lupus.  
Tumeurs de la peau, verrues.  
Ulcères variqueux.  
Urticaire.

## **X. — MALADIES INFECTIEUSES**

### **Thérapeutique générale**

Antipyrétiques.  
Antiseptiques externes.  
Antiseptiques internes.



Bactériophages.  
Bactériothérapie, ferments lactiques.  
Balnéothérapie.  
Chimiothérapie, colloïdes.  
Diaphorétiques.  
Sérums, vaccins.

### **Thérapeutique spéciale**

Colibacillose.  
Diphthérie.  
Erysipèle.  
Fièvres éruptives, lèpre.  
Grippe.  
Oreillons.  
Rhumatisme articulaire aigu.  
Rougeole.  
Septicémies.  
Tétanos.  
Typhoïdes et paratyphoïdes.  
Zona.

## **XI. — MALADIES PARASITAIRES**

Amibiase.  
Helminthiase.  
Maladie du sommeil.  
Mycoses.  
Paludisme.  
Parasites de l'intestin et des voies biliaires.

## **XII. — OPHTALMOLOGIE**

Anesthésiques locaux.  
Antiseptiques locaux.  
Bains d'yeux.  
Instillations, collyres.  
Pommades.  
Vaccins.

## **XIII. — OPOTHÉRAPIE**

## **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE**

### **Thérapeutique générale**

Analgésiques généraux.  
Analgésiques locaux.  
Antiseptiques.  
Gargarismes, collutoires, lavages.

Inhalations.  
Instillations, pulvérisations.  
Pommades.  
Poudres.  
Vaccins.  
Vaso-constricteurs, décongestifs.

### **Thérapeutique spéciale**

Angines aiguës.  
Angine de Vincent.  
Bourdonnements d'oreilles, surdité.  
Coryzas aigus et chroniques.  
Coryza spasmodique, rhume des foins.  
Epistaxis.  
Laryngites aiguës et chroniques.  
Laryngite striduleuse.  
Otites, mastoïdites.  
Ozène.  
Pharyngites aiguës.  
Rhino-pharyngites chroniques.  
Sinusites.  
Végétations adénoïdes, adénoïdites.

## **XV. — RADIOGRAPHIE**

## **XVI. — STOMATOLOGIE**

## **XVII. — SYPHILIS**

Préventifs.  
Traitement arsénical.  
Traitement bismuthique.  
Traitement ioduré.  
Traitement mercuriel.  
Traitement mixte.

## **XVIII. — SYSTÈME NERVEUX**

### **Thérapeutique générale**

Analgésiques externes.  
Analgésiques internes.  
Anesthésiques généraux.  
Anesthésiques locaux.  
Anesthésiques rachidiens.  
Antispasmodiques.  
Hypnotiques.  
Modificateurs du sympathique et du parasympathique.  
Neuro-toniques.  
Sédatifs.

## **Thérapeutique spéciale**

Algies, céphalées, migraines, névralgies, sciatiques, névrites.  
Congestion cérébrale, hémorragie cérébrale, ramollissement cérébral, hémiplégie.  
Encéphalite aiguë, séquelles d'encéphalite.  
Goitre exophtalmique.  
Hystérie, épilepsie, chorée.  
Insomnies, nervosisme.  
Méningite cérébro-spinale.  
Méningite tuberculeuse.  
Migraine ophtalmique.  
Neurasthénie, névrose d'angoisse.  
Paralysie agitante.  
Paralysies périphériques.  
Tabès.  
Tics, convulsions, délires.  
Troubles vago-sympathiques.

## **XIX. — TUBERCULOSE**

Amaigrissement.  
Antiseptiques généraux.  
Médications locales.  
Toniques, reminéralisants, recalcifants.  
Traitement spécifique.  
Traitement symptomatique : Anorexie.  
Traitement symptomatique : Diarrhée.  
Traitement symptomatique : Dyspnée.  
Traitement symptomatique : Expectoration.  
Traitement symptomatique : Fièvre.  
Traitement symptomatique : Hémoptysies.  
Traitement symptomatique : Sueurs.  
Traitement symptomatique : Toux.

## **XX. — TUMEURS — CANCER**

---

**TABLE**  
**par actions médicamenteuses**  
**et**  
**indications thérapeutiques**  
**des spécialités**  
**figurant**  
**dans cet ouvrage.**

---

*Abréviations* : { **T. G.** : Thérapeutique générale.  
                      { **T. S.** : Thérapeutique spéciale.

Le **Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques** doit son excellente réputation au soin apporté à sa rédaction. Sa composition est cependant si complexe qu'une erreur a pu s'y glisser. Il va sans dire que nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient en résulter.



# I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

## ANTISPASMODIQUES ARTÉRIELS

Acécoline.  
Acécoline camphre.  
Acécoline spartéine.  
Acécoline yohimbine.  
Acoégénol.  
Alepsal Genevrier.  
Aloysine.  
Amphotonyl.  
Ampoules de Spasmalgine  
Roche.  
Angioxyl.  
Antonal.  
Artérioveinine.  
Benzyanyl.  
Benzylol.  
Calmocardine.  
Capsules Bruel.  
Cardialgine Dubois.  
Cardiosthénine.  
Crataegus Gmet.  
Crinocardine.  
Détensyl.  
Disonyl  
Dragées Lumeval.  
Eupavéryl Pachaut.

### Gouttes antispasmodiques

Dausse.  
Gui Gmet.  
Hypotan.  
Iodaubépine.  
Iodotensyl Dubois.  
Natirose.  
Néospasmodyl Vély.  
Nucléocardyl.  
Orthogénol.  
Papavéryl.  
Paxène.  
Pragmoline.  
Pulmacardia.  
Pulsamone.  
Pyréthane.  
Rythmos-Leisyn.  
Spasmalone  
Spasmine Jolly.  
Spasmonéural.  
Spasmosédine.  
Spasnéural.  
Tensoryl-D.  
Théovérine Laleuf.  
Vagosédyl.  
Valériane Gmet.



## DIURÉTIQUES

Adoverne.  
Androstine.  
Benzo-iodhydrine.  
Cachets Spévin.  
Cafédrine.  
Calcional.  
Campho spartéine.  
Chophytol Rosa.  
Crinocardine.  
Cynhépatil.  
Cynurol Rosa.  
Détensyl.  
Digalène Roche.  
**Digibaine.**  
Digifoline Ciba.  
Digimialbaine.  
Digitaline cristallisée  
Mialhe Petit.  
Digitaline Invar.  
Digitaline Nativelle.  
Diurégan.  
Diurène.  
Diuréphédrine.  
Diurétique Gmet.  
Diurobromine.

Diurocalcine Gros.  
Diurocardine.  
Do-Sa-No-Sal.  
Dragées Lebrun toni-car-  
diaques.  
Eupnine Vernade.  
Extrait de Malt Français  
Déjardin.  
Gui Byla.  
Gui Gmet.  
Guipsine.  
Guitose.  
Iodoscilline Gabail.  
Lacto-sérum T. avril  
Lithinoformine.  
Métaformine  
Nephryl.  
Neptal  
Nucléocardyl.  
Organi-calcion simple.  
Orthogénol.  
Ozothine.  
Panbilline.  
Pneumogéine Renard.  
Poudre Danica.



## DIURÉTIQUES

Pulmocardine.	Théobromine Invar.
Rectopaniline.	Théobromose Dumesnil.
Rénion Vincardi.	Théobryl.
Rénocardine.	Théocalciode.
Rythmos-Leysin.	Théosalvose.
Saint Aré.	Théovérine Laleuf.
Santhéose.	Théoxanthine.
Scillarène Sandoz.	Tonicardine Gonnon.
Scillitrine.	Uriclarine.
Sclérosérol.	Urisanine.
Strophantine Catillon.	Urométhyl.
Strophantus Catillon.	Uromil.
Técarine.	Urosalyl.
Térébine.	Urosalyl Méthylé.
Théisine Dubat.	

## HÉMOSTATIQUES

Adrénaline Invar.	Hamamélis Gmet.
Adrénine.	Hémocalciopectine.
Adrénoïdes Béral.	Hémogénol Dausse.
Adrénoleine.	Hémopectal.
Albuol Leysin.	Hémoplasmine
Ampoules Boissy.	Hémosamine.
Ampoules de Pantopon	Hémostatique Goy.
Roche.	Hémostyl.
Anacamphre.	Hydrastis Gmet.
Anthéma.	Jabosulfène.
Arhémapectine Gallier	Lugocalcion.
Artérase.	Natirose.
Belhémine.	Organi-calcion simple.
Boricine Meissonnier.	Ozobiase.
Calcional.	Phymosteryl Leysin.
Calcium Sandoz.	Physocrisine.
Calci-sténine.	Pituilobine Byla.
Chloro-calcion.	Plasma de Quinton.
Clisémine Longuet.	Posterisan.
Coagulène Ciba.	Post-Hypophyse Choay.
Colloïl Leysin.	Rénaleptine.
Dragécalcion.	Sclérosérum.
Ergotine Lamante.	Sécarcocrine Roche.
Extrait Hamyd.	Séroma Rey.
Fornose.	Sérum Jousset.
Gastrocaol.	Silicyl.
Gui Byla.	Terozone.
Gui Gmet.	Tonicalcine.
Guipsine.	Toniveinin.
Guitose.	Vaso-neurina.
Gynergène Sandoz.	

## MODÉRATEURS CARDIAQUES

Alepsal.	Iodaubépine.
Amphosthène.	Néospasmodyl Vély.
Amphotonyl.	Neurinase.
Artério-veinine.	Neuridor.
Benzoflorine.	Opothérapie Carrion.
Calmocardine.	Passiflorine.
Cantéine Bouteille.	Passival.
Cardisédine.	Paxène.
Chloral bromuré Dubois.	Phosol.
Crataépine.	Phosphobrom.
Crataegus Gmet.	Pulmocardine.
Cuprémone simple et F.	Pulsamone.
Digalène Roche.	Quinicardine.
Digibaine.	Rythmos Leisyn.
Digifoline Ciba.	Sédarsan.
Digimialbaine.	Sédatuline.
Digitaline cristallisée	Sédobrol Roche.
Mialhe.	Sédosine.
Digitaline Invar.	Spasmalone.
Digitaline Nativelle.	Spasmine Jolly.
Dragées Lumeval	Spasmoneural.
Euphytose.	Spasmosédine.
Florhépatine.	Théobromose.
Freinospasmyl.	Valériane Byla.
Génésérine.	Valérinodor Malmanche.

## TONI-CARDIAQUES

Acécoline spartéinée.	Coramine Ciba.
Adoverne.	Crataépine.
Adrénaline Invar.	Crataegus Gmet.
Adrénine.	Créo-suppo-camphre.
Adrénoïdes Béral.	Crinocardine.
Alcamfétol.	Cuprémone simple et F.
Anacamphre.	Curoraisin.
Angitan.	Digalène Roche.
Antiasthmatique Domer-	Digibaine.
gue.	Digifoline Ciba.
Asthmo-Actine.	Digimialbaine.
Bain carbogazeux Wolo.	Digistabiline.
Biophorine.	Digitaline cristallisée Mialhe
Cafédrine.	Petit.
Camphodausse.	Digitaline Invar.
Campho-Spartéine Dubois.	Digitaline Nativelle.
Camphostyl Lacroix.	Disonyl.
Camphydryl Robin.	Diurène.
Cardialgine Dubois.	Diuréphédrine.
Cardibaine.	Diurocalcine Gros.
Cardion Vincardi.	Diurocardine.
Cardiosténine.	Dragées Lebrun toni-car-
Cardisédine.	diaques.
Carditone.	Edricamphre.
Collo-iode Dubois.	Ephédraféine Béral.
Composé Gmet.	Eupnine Vernade.

# I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

## TONI-CARDIAQUES

Féminadène.	Protensène Lejeune.
Génésérine.	Pulmacardia.
Génostrychnine.	Pulmocardine.
Globule Fumouze à l'iodure de potassium.	Quinoïdine Duriez.
Gmet (Extraits).	Renaleptine.
Goménol.	Renocardine.
Granules de Pantofort du D <sup>r</sup> Boveil.	Rythmos-Leisyn.
Gui Byla.	Rythmosystol.
Gui Gmet.	Santhéose.
Guipsine.	Scillarène Sandoz.
Guitose.	Scillitrine.
Humoro-stabiline.	Sérum Normet médical.
Intrait de strophantus.	Silguine.
Iodoscilline Gabail.	Solucamphre Delalande.
Ionyl.	Solucamphre Spartéiné De- lalande.
Kola granulée Astier.	Solution Normet médicale.
Kola Monayon.	Solution Normet chirurgi- cale.
Mialbaine.	Spasmine Jolly.
Natibaine.	Strophantine Catillon.
Orthogénol	Strophantus Catillon.
Ouabaine Arnaud	Strychnal Longuet.
Pavérinol Laleuf.	Strychnotonine.
Paxène.	Théobromose Dumesnil.
Phlébotonine.	Théosalvose.
Phosoforme.	Tonicardine Gonnon.
Phosol.	Veriane.
Phylla Dyn.	Visco-sérum.
Pituitobine Byla.	Yo-Androl.
Pneumogéine Renard.	Yo-Ginine.

## VASO-CONSTRICTEURS ARTÉRIELS HYPERTENSEURS

Adrénaline Invar.	Artérase.
Adrénine.	Campho-spartéine Dubois.
Adrénoïdes Béral.	Carditone.
Adréphédrine Béral.	Composé Gmet.
Aloysine.	Ephédrine naturelle Béral.
Androcalcion H.	Ergotine Lamante.
Androcalcion E.	Gardéphédrine.
Angitan.	Phylla Dyn.
Antonal.	Rénaleptine.
Anxiol.	Sanédrine.
Arsécrinol.	Sédotensyl.

## VASO-CONSTRICTEURS VEINEUX

Acésine Guillaumin.	Aphloïne Trouette-Perret.
Adrépatine.	Astasol.
Aesculase.	Bain Bagnor radio-actif.
Angitan.	Cantéine Bouteille.

# I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

## VASO-CONSTRICTEURS VEINEUX

Cupremone simple et F.	Intrait de marron d'Inde
Catamenyl.	Dausse.
Ergotine Lamante.	Iodamélis Logeais.
Eurectol.	Ménovarine.
Extrait Hamyd.	Mictasol.
Fluxine (Gouttes).	Phléboguïl.
Gouttes de Serû.	Phlébotonine.
Hanucito.	Rectosol.
Hamaméline Roya.	Salvenase Legoux.
Hamaméliode.	Sédacrine.
Hamamélis Gmet.	Silicyl.
Hamamélis Grandva.l.	Toniveinine.
Hémaxol.	Tot'Hamélis.
Hémodrome.	Triglandine.
Hémoductyl.	Veinalgol.
Hémoluol.	Veinogène.
Hémopausine.	Veinoposine.
Hémorroïdine (Gouttes).	Veinosérum.
Hirudinase.	Veinosine.
Indhaméline Lejeune pluri-	Veinotrope.
glandulaire.	Viscoveine.
Indhaméline Lejeune	
Simple.	

## VASO-DILATATEURS ARTÉRIELS HYPOTENSEURS

Acécoline.	Carboiodure Fraudin.
Acécoline camphre.	Cardisédine.
Acécoline spartéine.	Citralin.
Acécoline yohimbine.	Citrophos.
Acoégénol.	Collo-iodé Dubois.
Alepsal.	Cortiode.
Algatan.	Crataégine.
Allisatine Sandoz.	Crinocardine Laleuf.
Aloysine.	Cupremone simple et F.
Amphotonyl.	Curiode.
Ampoules Boissy.	Curiode arsénié.
Androcalcion E.	Détensyl.
Angioxyl.	Diasclérol.
Antonal.	Dicaliode.
Artérase.	Dioséine Prunier.
Artérion Vincardi.	Do-Sa-No-Sal.
Artério-Véinine.	Eniode Lefebvre.
Artoradine.	Eranol.
Athérolysine.	Eutensyl Grémy.
Bain carbogazeux Wolo.	Fucoiodine.
Banikol.	Globules Fumouze iodure
Benzo-iodhydrine.	de potassium.
Benzylanil.	Glycocarpine.
Benzylol.	Gouttes antispasmodiques
Blocs Vécór.	Dausse.
Cantéine Bouteille.	Gouttes hypotensives
Carboiodine.	Fraisse.

## I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

### VASO-DILATATEURS ARTÉRIELS HYPOTENSEURS

Gui Byla.  
Gui Gmet  
Guimelinde.  
Guipsine.  
Guitose.  
Hémoductyl.  
Hypersan  
Hypocholate.  
Hypophédrine.  
Hypotan.  
Infra-rouges.  
Iodalose Galbrun.  
Iodamélis Logeais.  
Iodassium.  
Iode organique Boissy  
Iodinjectol Jammes.  
Iodogénol Pépin.  
Iodo-Maisine Globules  
Iodone Robin.  
Iodonésyl.  
Iodonucléol.  
Iodosan.  
Iodoscilline Gabail.  
Iodotensyl Dubois.  
Iodo-Vitasine.  
Iodural Novat.  
Iodurase.  
Iodure Pachaut.  
Lipiodol Lafay.  
Lipiodine Ciba.  
Magiodyl.  
Micelliode.  
Natirose.  
Néo-Riodine.  
Néo-Séti.  
Nucléo-cardyl.  
Pépiodon.

Pneumogéine Renard.  
Poudre Danica.  
Protensène Lejeune  
Pulmacardia.  
Rhocya Dyn.  
Rhodazil.  
Riodine.  
Rythmos Leisyn.  
Saint-Aré.  
Santhéose.  
Scillitrine.  
Sclérosérol.  
Sédotensyl.  
Silguine.  
Silicyl.  
Silisode.  
Spasmine Jolly.  
Sulfarsiode.  
Théobromose Dumesnil.  
Tensoryl-D.  
Tétranitrol Roussel.  
Théoverine Laleuf.  
Tiodine Cognet.  
Toritanol Lamo.  
Trinitrine caféinée Dubois.  
Trinitrine-Papavérine Laleuf.  
Trinitrine Roussel.  
Trisodyl Rozet.  
Trynol.  
Ulcéosine.  
Uroïodine.  
Vagotonine.  
Valovarine.  
Vascurol.  
Verticurine.  
Viscum Zyma.

## I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

### ANÉMIES — CHLOROSE

Adrénaline Invar.  
Adrénine.  
Adrénoïdes Béral.

Adréphédrine Béral.  
Alexime.  
Antiphi.

## ANÉMIES — CHLOROSE

Arcica.  
 Ardogène.  
 Arrhénuclène Bergevin  
 Arsécrinol.  
 Arséniode Buriat.  
 Arsi-strychnal Longuet.  
 Arsycodile.  
 Arsylène Roche.  
 Ascoléine Rivier  
 Baumolacpinine..  
 Beef Lavoix.  
 Belhémène.  
 Benzylocalcium.  
 Biocalose.  
 Bionéol.  
 Biosine Le Perdriel.  
 Biotrignon.  
 Cacodyle Gonnon.  
 Cacodyline Jammes.  
 Calciline.  
 Calcoléol.  
 Carnine Lefranco.  
 Cérébro-Lipase.  
 Cérébroil Leisyn.  
 Cérébrosthénine Dalin.  
 Chlorhydrol Fouché.  
 Cimarsényl.  
 Colloïdogéninedu Dr Bayle.  
 Composé Gmet.  
 Comprimés Levure Mycéta.  
 Créagénol.  
 Crinocardine Laleuf.  
 Cytobiase.  
 Cyto-sérum Corbière  
 Diasténine Grémy.  
 Diastogène Dehaussy.  
 Diastogène F. Dehaussy.  
 Dragées ferro-ergotées Man-  
 net.  
 Dragées Hecquet.  
 Elixir Ducro.  
 Elixir Dussaud.  
 Elixir ferro-ergoté Man-  
 net.  
 Elixir Grez.  
 Endopancrine.  
 Exhépa.  
 Extrait de Malt français  
 Déjardin.  
 Fénucalcium.  
 Fénucine.

Fenugrène.  
 Fer intraveineux Fraisse.  
 Fer Larcade.  
 Fer ovarine Vitalis.  
 Ferrocodile et Ferricodile.  
 Ferrocol.  
 Ferrophytine Ciba.  
 Ferydal.  
 Fluodyle.  
 Fludiose.  
 Fondant mangano-ferreux.  
 Forxol.  
 Fosfomagnyl.  
 Fosfoxyl Carron.  
 Fosyls Carron.  
 Gaduamine  
 Gaduase  
 Gastrhema.  
 Gastricine.  
 Gaurol.  
 Génosthéniques.  
 Globexine.  
 Glyctone phosphatée Char-  
 rière.  
 Granions (Les).  
 Granoxyl.  
 Granulé Caresmel.  
 Granulés de Pantofort du  
 Dr Boveil.  
 Hectine.  
 Hémagénine Giraud.  
 Hémato-iodine.  
 Hémooantitoxine « Sofos ».  
 Hémocalcine.  
 Hémocyto-sérum Cor-  
 bière.  
 Hémofer.  
 Hémogénol Dausse.  
 Hémogenyl Godart.  
 Hémoglobine Deschiens.  
 Hémopaniline.  
 Hémophagostyl.  
 Hémoplasme Lumière.  
 Hémoplasmine du Dr Mo-  
 relli.  
 Hémostérine irradiée.  
 Hémotra « Roche ».  
 Hémostyl.  
 Hémotal.  
 Hémoviris.  
 Hépanème.

## ANÉMIES — CHLOROSE

Héparphos.  
 Heparfer.  
 Héparmone.  
 Hépatergol.  
 Hépathémo.  
 Hépatrol.  
 Hépatrol injectable.  
 Héracléol.  
 Hipposarcine Roy.  
 Huile de foie de morue  
     médicinale suractivée  
     Rhône-Poulenc.  
 I. A. M.  
 Iodure de fer inaltérable.  
 Ixium Buisson.  
 Jemalt Wander.  
 Lauriatol.  
 Lécithine Vacheron.  
 Lioncyl.  
 Lipocérébrine Chevreton.  
 Liposplénine du Dr Groc.  
 Magol Churchill.  
 Malt français Déjardin  
     (Extrait de).  
 Malt pailleté.  
 Malt Wander ou Gloma.  
 Mancobène.  
 Mangaine.  
 Mangano-Phosphal Ju-  
     lien.  
 Mangarsenic.  
 Mangratines.  
 Marinol.  
 Marrucol.  
 Minergil.  
 Morrhualène Gautier.  
 Morrhuéline Jungken  
 Morrhuéline Jungken vi-  
     taminée.  
 Morrhuxine.  
 Morsine.  
 Morubiase.  
 Moruxase.  
 Mures du Dr Robert  
     Jacques.  
 Musculosine Byla.  
 Néarsite.  
 Néo-Arsycodile.  
 Néo-Calcline.  
 Néo-Neurosine Prunier.  
 Néo-Rhomnol.  
 Nergine Heudebert.

Nervocithine Tissot.  
 Neuroplasma Fort.  
 Neuroplasma massif.  
 Neurotrophol Byla.  
 Nucléasine.  
 Nucléigène.  
 Nuclergol.  
 Cénophos.  
 Opocalcium du Dr Guer-  
     sant.  
 Opocalcium irradié du  
     Dr Guersant.  
 Opochol.  
 Opoferine vitaminée.  
 Oponuclyl irradié Trouette-  
     Perret.  
 Opophos.  
 Oposynergines.  
 Opothérapie du Dr Fraysse.  
 Opothérapie Fournier.  
 Organi-calcion simple et  
     endocrinien.  
 Orthozomine.  
 Ostéoglandulol.  
 Panbiline.  
 Pancrinol du Dr Debat.  
 Panostyl.  
 Panstomase.  
 Panxylon.  
 Pepto-fer Jallet.  
 Peptonate de fer Robin.  
 Peptone Vassal.  
 Percalcine.  
 Persodine Lumière.  
 Phagosthyl.  
 Phagosthyl Mangané.  
 Phosbiose.  
 Phoscamine.  
 Phosma.  
 Phosoforme.  
 Phosol.  
 Phospharsol.  
 Phosphates Pinard.  
 Phospho-Fluor Beynet.  
 Phospholéose Demasles.  
 Phosphopinal Juin.  
 Phostyl.  
 Phylla Dyn.  
 Phytine Ciba.  
 Phytogénine Byla.  
 Phyto-Lécithine.  
 Phytomarine.

## ANÉMIES — CHLOROSE

Phytosplénol Plé.	Strychnal Longuet.
Plasma de Quinton.	Strychnarsitol Robin.
Plurion Couturieux.	Strychnotonine.
Pneumo-Lipase.	Sulfureux Pouillet.
Procalcyl.	Suppotonic.
Prosthénase Galbrun.	Syphonéol.
Quina Baron.	Taburol.
Quinarsol antianémique.	Tannurgyl du Dr Letan-
Quinéine.	neur.
Quinovarine Optima.	Terpoxyl interne.
Quinquina Gmet.	Thiocol Roche.
Réalphène Buisson.	Thorix.
Reconstituant Mary.	Tonigène.
Rénaleptine.	Tonikéine Chevreton.
Sanas.	Tonique Gonnon.
Sanguil.	Tonique Roche.
Sels du Jura.	Tonucyl.
Sérifer Laurençon.	Tonudol.
Sérogyné.	Total Tonic.
Séroma Rey.	Tréphonyl
Sérum Neuropsychique.	Ultra-Violets.
Sirop de Lovel.	Uvéphorine.
Sirop du Dr Reinwiller au	Vanadarsine Guillaumin.
phosphate de chaux géla-	Végéphos.
tineux.	Vin de Baudon.
Sirop Roche au Thiocol.	Vin de Bugeaud.
Solution Bardet.	Vin de Carnéose.
Solution Normet chirurgi-	Vin « Lux Gaillac » mous-
cale.	seux.
Solution Normet médicale.	Vin de Vial.
Spectrol.	Viosten.
Splénarmone.	Vloxyt Mouneyrat.
Splénomanganol.	Visco-sérum.
Splényl.	Vitamyl.
Stérogyl.	Vitène.
Sthénoléine	Zimbyl.
Sthénoxal.	Zohol.
Stomarol.	Zomine.
Stovafer.	Zymatine irradiée.

## ANGINE DE POITRINE

Acécoline.	Artérion Vincardi.
Aérocid.	Artério Veinine.
Alepsal Génévrier.	Artoradine.
Amphotonyl.	Asthmo-actine.
Ampoules Boissy.	Asthmolysin.
Ampoules de Spasmalgine	Athérolysine.
Roche.	Belladéal « Sandoz ».
Angioxyl.	Bellafoline Sandoz.
Antonal.	Benzoflorine Julien.
Artérase.	Benzo iodhydrique.



# I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

## ANGINE DE POITRINE

Benzyanyl.	Natirose.
Benzylol.	Néospasmodyl Vely.
Cafédrine.	Nucléocardyl.
Calmocardine.	Orthogénol.
Capsules Bruel.	Ouabaine Arnaud.
Carboiodine.	Pansolanée.
Cardiosthénine.	Papavéryl.
Cardisédine.	Paxène.
Cibalgine.	Pilules V. E. Doumer.
Citralin.	Pragmoline.
Comitiol.	Pulmocardine.
Cortiode.	RévuIsoplasme
Cratægus Gmet.	Rhocya Dyn.
Crinocardine.	Rythmos Leisyn.
Cuprémone simple et F.	Scillitrine.
Curiode.	Sédoneurol Dehaussy.
Curiode Arsénié.	Sédotensyl.
Dépuriodé du Dr Roger	Silicyl.
Weber.	Sillisode.
Détensyl.	Spasmalgine Roche.
Dialacétine Ciba.	Spasmalone.
Dicaliode.	Spasmine Jolly.
Digitaline Nativelle.	Spasmoneural.
Disonyl.	Spasmosédine.
Endopancrine.	Spasneurol.
Eupavéryl Pachaut.	Tensoryl-D.
Euphytose.	Tétranitrol Roussel.
Eupnine Vernade.	Théobromose Dumesnil.
Florhépatine.	Théosalvose barbiturique.
Fuciodine.	Théoverine Laleul.
Génomorphine.	Tiodine Cognet.
Glycocarpine.	Tonicardine Gonnon.
Gui Gmet.	Toritanol Lamo.
Iloglandol « Roche ».	Trinitrine caféinée Dubois.
Iodaubépine.	Trinitrine Papavérine Laleul.
Iode organique Boissy.	Trinitrine Roussel.
Iodogénol Pépin.	Trisodyl Rozet.
Iodotensyl Dubois.	Verticurine.
Lipiodine Ciba.	
Mésothorium Rhemda.	

## ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

(Voir : *Système nerveux central.*)

Absuric.	Amino-sel Byla.
Acécoline.	Amphotonyl.
Acoégenol.	Ampoules Boissy.
Alcamfétol.	Angioxyl.
Algatan.	Anti-urique de Contrexé-
Allisatine Sandoz.	ville.
Aloysine.	Antonal.

## ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

(Voir : *Système nerveux central.*)

Artérase.	Gui Byla.
Artérion Vincardi.	Gui Gmet.
Artério Veinine.	Guimeline.
Artoradine.	Guipsine.
Athérolysine.	Guitose.
Bain carbogazeux Wolo.	Hamacitro.
Banikol.	Hamaméliode.
Benzobromine	Hémofluidol.
Benzo-iodhydrine.	Hirudinase.
Benzyanyl.	Hypotan.
Bi-Citrol Marinier.	Iloglandol « Roche ».
Blocs Vécot.	Iodalose Galbrun.
Carboiodine.	Iodamelis Logeais.
Carboiodure Fraudin.	Iodassium.
Carbolactyl Billié.	Iodaubépine.
Cardiosthénine.	Iode organique Boissy.
Chloral bromuré Dubois.	Iodinectol Jammes.
Citrocarbène.	Iodogénol Pépin.
Collo-Iode Dubois	Iodo-Maisine Globules.
Cortiode.	Iodométine.
Cratægus Gmet.	Iodone Robin.
Crinocardine Laleuf.	Iodonésyl.
Cuprémone simple et F.	Iodonucléol.
Curiode.	Iodosan.
Curiode arsénic.	Iodoscilline Gabail.
Dépuratif Rob Lechaux.	Iodotensyl Dubois.
Dépuriodé du D <sup>r</sup> Roger	Iodo-Vitasine.
Weber.	Iodural Novat.
Détensyl.	Iodurase.
Diasclérol.	Iodure Pachaut.
Diathermine.	Ionyl.
Dicaliode.	Lipiodol Lafay.
Dioséine Prunier.	Lipoiodine Ciba.
Diurène.	Lithinoformine.
Diurétique Gmet.	Magiodyl.
Diurocalcine Gros.	Mésothine.
Endopancrine.	Mésothorium Rhemda.
Eniode Lefebvre.	Micelliodé.
Eranol.	Morrhualène Gautier.
Eupnine Vernade.	Néo-Riodine.
Eutensyl Grémy.	Néo-Séti.
Fosfomagnyl.	Œnophos.
Fucoiodine.	Opothérapie Bouty.
Globules Fumouze à	Opothérapie du D <sup>r</sup> Frayse.
l'iodure de potassium.	Orthogénol.
Glycocarpin.	Panbiline.
Gouttes hypotensives	Papavéryl.
Fraisse.	Pépiodon.

# I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

## ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

(Voir : Système nerveux central.)

Phosoforme.	Solvuric
Pipérazine Midy.	Spasmine Jolly.
Progaster.	Strophantine Catillon.
Protensène Lejeune.	Strychnotonine.
Pulmocardine.	Sulfarsiode.
Rectopanbiline.	Tensoryl-D.
Rénion Vincardi.	Théisine Dubat.
Rénocardine.	Théobromine Invar.
Rhocya Dyn.	Théobromose Dumesnil
Riodine.	Théobryl Roche.
Rythmos Leisyn.	Théosalvose.
Salsanos.	Théoverine Laleuf.
Santhéose.	Théoxantine.
Sclérosérol.	Tiodine Cognet.
Sédotensyl.	Tonicardine Gonnon.
Seignets' fruits.	Triglandine.
Sel hépatique U. N. Arque- vaux.	Trisodyl Rozet.
Sérogyne.	Trynol.
Silguine.	Ulcéosine.
Silicyl.	Uroïodine.
Silisode.	Urométhyl.
Sirop iodotannique Guiller- mond.	Uromil.
Solution Normet scléroly- tique.	Vascurol.
	Verticurine
	Viscum Zyma.

## ARTÉRITES — AORTITES CLAUDICATION INTERMITTENTE

Acécoline.	Citrosodine Longuet.
Alepsal Génévrier.	Collo-Iode Dubois.
Algatan.	Cratægus Gmet.
Angioxyl.	Crinocardine Laleuf.
Antonal.	Cuprémone simple et F.
Artérase.	Dépuriode du Dr Roger Weber.
Artérion Vincardi.	Diathermie.
Artério-Veinine.	Dicaliode.
Artoradine.	Endopancrine.
Athérollysine.	Enlode Lefebvre.
Bain carbogazeux Wolo.	Épicral.
Banikol.	Eranol.
Benzobromine.	Eupavéryl Pachaut.
Benzo-iodhydrique.	Eutensyl Grémy.
Benzyanyl.	Formocitrine.
Bi-citrol.	Fucoïodine.
Capsules Bruel.	Globules Fumouze à l'iodure de potassium.
Carboiodine.	Glycocarpline.
Carboiodure Fraudin.	
Cardi-sédine.	

# **I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.**

## **ARTÉRITES — AORTITES CLAUDICATION INTERMITTENTE**

Gui Gmet.  
Hamacitro.  
Hémofluidol.  
Hirudinase.  
Hoglandol « Roche ».  
Iodalose Galbrun.  
Iodaubépine.  
Iode organique Bolssy.  
Iodogénol Pépin.  
Iodo-Maisine Globules.  
Iodone Robin.  
Iodonucléol.  
Iodoscilline Gabail.  
Iodotensyl Dubois.  
Iodo-Vitasine.  
Lipiodol Lafay.  
Lipolodine Ciba.  
Magiodyl.  
Micelliodé.  
Natirose.  
Néo-riodine.

Orthogénol.  
Pépiodon.  
Pragmoline.  
Pulmacardia.  
Rhocya Dyn.  
Rythmos Leysn.  
Sclérosérol.  
Silicyl.  
Sillsode.  
Spasmoneural.  
Spasneuro.  
Tiodine Cognet.  
Toritanol Lamo.  
Triglandine.  
Trinitrine-Papavérine La-  
leuf.  
Trinitrine Roussel.  
Trisodyl Rozet.  
Trynol.  
Verticurine.

## **ARYTHMIES**

Adoverne.  
Anacamphre.  
Anaclasine Ranson.  
Benzoflorine Julien.  
Calmocardine.  
Camphodausse.  
Campho-Spartéine Dubois.  
Camphostyl Lacroix.  
Camphydryl Robin.  
Cardialgine Dubois.  
Cardibaïne.  
Cardiosthénine.  
Cardi-sédine.  
Coramine Ciba.  
Crataegine.  
Crataegus Gmet.  
Crinocardine Laleuf.  
Digalène Roche.  
Digibaïne.  
Digifoline Ciba.  
Digimialbaïne.  
Digistabilline.  
Digitaline cristallisée  
Mialhe-Petit.  
Digitaline Invar.

Digitaline Nativelle.  
Diurène.  
Diurocardine.  
Dragées Lebrun toni-car-  
diaques.  
Dragées Lumeval.  
Génostrychnine.  
Humoro-stabilline.  
Mialbaïne.  
Natibaïne.  
Orthogénol.  
Ouabaine Arnaud.  
Pavérinol Laleuf.  
Quinocardine.  
Quinoïdine Duriez.  
Rénocardine.  
Rythmos Leysn.  
Rythmosystol.  
Solucamphre Delalande.  
Spasmine Jolly.  
Strophantine Catillon.  
Strophantus Catillon.  
Strychnal Longuet.  
Théobromose Dumesnil.  
Vaso-Neurine.

## CARDIOPATHIES AIGÜES

Adoverne.	Gui Byla.
Adrénaline Invar.	Gui Gmet.
Adrénine.	Guipsine.
Adrénoïdes Béral.	Guifose.
Anacamphre.	Immuno-vaccin anti-rhu-
Cafédrine.	matismal.
Camphodausse.	Intrait de Strophantus.
Campho-Spartéine Dubois.	Natibaïne.
Camphostyl Lacroix.	Orthogénol.
Camphydryl Robin.	Ouabaïne Arnaud.
Cardialgine Dubois.	Pavérinol Laleuf.
Cardibaïne.	Pneumogéine Renard.
Cardiosthénine.	Pulmocardine.
Coramine Ciba.	Rénaleptine.
Crinocardine Laleuf.	Rénocardine.
Digalène Roche.	Rythmos Leisyn.
Digibaïne.	Scillarène Sandoz.
Digifoline Ciba.	Sédobrol Roche.
Digimialbaïne.	Solucamphre Delalande.
Digitaline cristallisée	Solucamphre Spartéiné De-
Mialhe Petit.	lalande.
Digitaline Invar.	Strophantine Catillon.
Digitaline Nativelle.	Strophantus Catillon.
Diurène.	Strychnal Longuet.
Diuréphédrine.	Théisine Dubat.
Diurétique Gmet.	Théobromine Invar.
Diurocalcine Gros.	Théobromose Dumesnil.
Dragées Lebrun toni-car-	Théobryl Roche.
diaques.	Théosalvose.
Eupnine Vernade.	Théoxantine.
Génostrychnine.	Tonicardine Gonnon.

## ÉRÉTHISME — TACHYCARDIE PALPITATIONS

(Voir : Modérateurs-cardiaques,  
Système nerveux central : Sédatifs.)

Adrénoïdes Béral.	Cardiosthénine.
Alepsal Génévrier.	Cardisédine.
Amphosthène.	Cibalgine.
Amphotonyl.	Crataegine.
Anaclasine Ranson.	Crataegus Gmet.
Anxiol.	Crinocardine Laleuf.
Bellafoline Sandoz.	Dial Ciba.
Benzollorine Julien.	Dialacétine Ciba.
Blocs Vécot.	Digalène Roche.
Bromovose.	Digibaïne.
Calmocardine.	Digifoline Ciba.
Campho-spartéine Dubois.	Digimialbaïne.
Cantéine Bouteille.	Digitaline cristallisée
Capsules Bruel.	Mialhe Petit.
Cardialgine Dubois.	Digitaline Invar.

## ÉRÉTHISME — TACHYCARDIE PALPITATIONS

(Voir : Modérateurs cardiaques,  
Système nerveux central : Sédatifs.)

Digitaline Nativelle.  
Disonyl.  
Diurocardine.  
Dragées Lumeval.  
Ephédraféine Béral.  
Euphytose.  
Florhépatine.  
Freinospasmyl.  
Génésérine.  
Gynergène Sandoz.  
Humoro-stabiline.  
Immuno-vacin anti-rhumatismal.  
Natibaïne.  
Néospasmodyl Vély.  
Neurinase.  
Neuridor.  
Ouabaïne Arnaud.  
Pansolanée.  
Paradol.  
Passiflorine.  
Passival.  
Paxène.  
Phosol.  
Phosphobrom.  
Phyoscyamine.

Pulmocardine.  
Pulsamone.  
Quinicardine.  
Rénocardine.  
Rythmos Leisyn.  
Rythmosystol.  
Sédarsan.  
Sédatuline.  
Sédobrol Roche.  
Sédosine.  
Somnicones Béral.  
Spasme Jolly.  
Spasmalone.  
Spasmoneural.  
Spasmosédine.  
Sympathyl.  
Tensoryl-D.  
Théobromose Dumesnil.  
Valériane Byla.  
Valérinodor Malmanche.  
Valovarine.  
Vaso-Neurine.  
Vérianne.  
Véronidia Buisson.  
Viostène.

83218

## GANGRÈNES, SYNDROME DE RAYNAUD

Acécoline.  
Alepsal.  
Androstine.  
Glycocarpine.  
Kérafline.  
Muronès du Dr Robert  
Jacques.

Orthogénol.  
Pragmoline.  
Spasmoneural.  
Térébine.  
Tiodine Cognet.

## HÉMOPHILIE

(Voir : Hémostatiques.)

Calcional.  
Coagulène Ciba.  
Colloïdogénine du Dr Bayle.  
Dragécalcion.  
Hématoéthéroïdine.  
Hémocalciopectine.  
Hémogénol Dausse.  
Hémopectal.  
Hémosamine.  
Hémostatique Goy.  
Hémostra « Roche ».

Hémostyl.  
Lugocalcion.  
Opochol.  
Opoferrine vitaminée.  
Phylla Dyn.  
Plasma de Quinton.  
Serogyne.  
Séroma Rey.  
Solution Normet médicale.  
Spectrol.  
Splénarmone.

## HÉMORRAGIES

(Voir : Hémostatiques.)

### HÉMORROÏDES, VARICES, PHLÉBITES

Acésine Guillaumin.	Hamaméliode.
Adrépatine.	Hamamélis Gmet.
Aesculase.	Hamamélis Grandval.
Airoglyce.	Hémaxol.
Angitan.	Hémodrome.
Anoïde.	Hémoductyl.
Antirrhoïde.	Hémoluol.
Anusol Mialhe.	Hémopausine.
Aphloïne Trouette-Perret.	Hémorroïdine (gouttes).
Aristargol.	Hémorroïdine (pommade).
Arterase.	Hémorroïdine (supposi- toires).
Arterio-Veine.	Hirudinase
Astasol.	Hydrastis Gmet.
Bain Bagnor Radio-actif.	Indhaméline Lejeune plu- riglandulaire.
Bain Salvia.	Indhaméline Lejeune simple.
Baume Aroma.	Insulanol.
Baume Suelta.	Intrait de marron d'Inde Dausse.
Bi-Citrol Marinier.	Iodamélis Logeais.
Catéine Bouteille.	Iodex.
Catemenyl.	Iodométine.
Cipromarol.	Kérafline.
Citrosodine Longuet.	Lacpinine.
Complextraits.	Ménatol.
Crayons antifissure Do- mergue.	Ménovarine.
Crème résolutive du D <sup>r</sup> Rap.	Mictasol.
Créosoforme Lambiotte.	Néo-Collargol.
Cuprémone simple et F.	Nestosyl.
Dermofagine.	Oléo-Mel.
Diathermie.	Onction Leisyn.
Dioséine Prunier.	Onguent Fréval.
Do-Sa-No-Sal.	Opochol.
Ergotine Lamante.	Ouataplasme du D <sup>r</sup> Lan- glebert.
Esculéol.	Ozothine.
Eugynol Grandval.	Paralaxol Tulivet.
Eurectol.	Parlax.
Extrait Hamyd.	Percainal Ciba.
Flusan.	Phléboguil.
Fluveinose Mauchant.	Phlébotonine.
Fluxine (gouttes).	Phosoforme.
Formocitrine.	Pommade Logeais.
Fucoiodine.	Pommade Midy.
Glyco-Thymoline.	Pommade au Nestosyl.
Goménol.	Postérisan.
Gouttes de Sérû.	
Guimelinde.	
Haimacitrô.	
Hamaméline Roya.	

# I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

## HÉMORROÏDES, VARICES, PHLÉBITES

Poudre Mass plastique.	Suppositoires Pepet.
Proveinase Midy.	Tablettes Zéva.
Rectagine.	Toniveinine.
Rectoline.	Tot'Hamélis.
Rectosol.	Triglandine.
Rectopaniline.	Ulcéobalnéine.
Rénovol.	Ulcéosine.
Salantale.	Varisclérine.
Salvénase Legoux.	Vascurol.
Scérosérum.	Veinalgol.
Sédacrine.	Veinogène.
Sel hépatique U. N. Arque- vaux.	Veinoposine.
Suppo-Gynals.	Veinosérum.
Suppositoires à l'Esculéal.	Veinosine.
Suppositoires au Nestosyl.	Veinotrope.
Suppositoires Gonnon.	Velpeau (Bande de crêpe).
Suppositoires Logeais.	Verticurine.
Suppositoires Midy.	Viscoveine.
	Zymatine.

## HYPERTENSION

Acécoline.	Cardialgine Dubois.
Acécoline camphre.	Cardiosthénine.
Acécoline spartéine.	Cardisédine.
Acécoline yohimbine.	Chloral bromuré Dubois.
Acoégénol.	Chlorumagène.
Agozymase.	Citralin.
Alcamfétol.	Citrofluyl.
Algatan.	Citrophos.
Allisatine Sandoz.	Collo-Iode Dubois.
Aloysine.	Cortiode.
Amphotonyl.	Crataegus Gmet.
Androcalcion E.	Crinocardine Laleuf.
Angioxyl.	Cuprémone simple et F.
Antonal.	Curiode.
Artérase.	Curiode arsénié.
Artérion Vincardi.	Dépuratif Rob Lechaux.
Artério-Veinine.	Dépuride du Dr Roger
Arthrilax.	Weber.
Artoradine.	Détensyl.
Athérolysine.	Diasclérol.
Bain carbogazeux Wolo.	Dicaliode.
Banikol.	Digitaline Nativelle.
Benzo-iodhydrique.	Dioséine Prunier.
Benzyanyl.	Diurène.
Benzylol.	Diurétique Gmet.
Bi-Citrol Marinier.	Diurocalcine Gros.
Blocs Vécot.	Do-Sa-No-Sal.
Cachets Spévin.	Eniode Lefebvre.
Carboiodine.	Epieral.
Carboiodure Fraudin	Eranol.
Carbolactyl.	Eufosyl Vély.



## HYPERTENSION

Eutensyl Grémy.	Néo-Séti.
Fluvéinose Mauchant.	Normatensol Bouret.
Formocitrine.	Nucléocardyl.
Freinospasmyl.	Orthogénol.
Fucoïodine.	Ouabaine Arnaud.
Globules Fumouze à l'iodure de potassium.	Papavéryl.
Glycocarpine.	Pépiodon.
Gouttes antispasmodiques	Phlébotonine.
Dausse.	Phosoforme.
Gouttes hypotensives	Pneumogéine Renard.
Fraïsse.	Poudre Danica.
Granions (Les).	Pragmoline.
Gui Byla.	Protensène Lejeune.
Gui Gmet.	Pulmacardia.
Guimelinde.	Rectopanbiline.
Guipsine.	Rénion Vincardi.
Guitose.	Rénocardine.
Hamacitro.	Rhocya Dyn.
Hémoductyl.	Rhodazil.
Hémofluidol.	Riodine.
Hypersan.	Rythmos Leisyn.
Hypocholeate.	Saint-A:é
Hypotan.	Salsanos.
Immunovaccin.	Santhéose.
Iodalose Galbrun.	Scillitrine.
Iodamélis Logeais.	Sclérosérol.
Iodassium.	Sédotensyl.
Iode organique Boissy.	Seignet' fruits.
Iodinjectol Jammes.	Serogyne.
Iodogénol Pépin.	Silguine.
Iodométine.	Silicyl.
Iodo-Maisine globules.	Silisode
Iodone Robin.	Sodogatrol.
Iodonésyl.	Solution Normet scléroly- tique.
Iodonucléol.	Spasmine Jolly.
Iodosan.	Spasmosédine.
Iodoscilline Gabail.	Sulfarsiode.
Iodotensyl Dubois.	Tétranitrol Roussel.
Iodo-Vitasine.	Théobromose Dumesnil.
Iodural Novat.	Théobryl Roche.
Iodurase.	Théosalvose.
Iodure Pachaut.	Théoverine Laleuf.
Lipiodol Lafay.	Tiodine Cognet.
Lipoiodine Ciba.	Toritanol Lamo.
Lithino-formine.	Tot Hamélis.
Magiodyl.	Trisodyl Rozet.
Mésothine.	Trynol.
Mésothorium Rheinda.	Ulcéosine.
Micelliode.	Uroiode.
Natibaine.	Vagosédyl.
Natirose.	Vagotonine.
Néo-Riodine.	Valénal Novalis.

## HYPERTENSION

Valovarine.  
Vascurol.

Verticurine.  
Viscum Zyma.

## HYPOTENSION

Adrénaline Invar.  
Adrénine.  
Adrénoïdes Béral.  
Adréphédrine Béral.  
Anacamphre.  
Angitan.  
Anxiol.  
Arsécrinol.  
Biophorine.  
Camphodausse.  
Carditone.  
Chlorumagène.  
Dragées Lumeval.  
Edricamphre.  
Éphédrine naturelle Béral.

Gardéphédrine.  
Néo-Rhomnol.  
Opoferrine vitaminée.  
Orthogénol.  
Phylla Dyn.  
Rénaleptine.  
Sanédrine.  
Solucamphre Delalande.  
Solucamphre sparteum De-  
lalande.  
Solution Normet médicale.  
Strychnotonine.  
Tensoryl-D.  
Visco-Sérum.

## INSUFFISANCES CARDIAQUES HYPOSYSTOLIE — ASYSTOLIE

Acécoline spartéinée.  
Actiphos.  
Adoverne.  
Adrénaline Invar.  
Adrénine.  
Adrénoïdes Béral.  
Adréphédrine Béral.  
Alcamfétol.  
Amphotonyl.  
Anacamphre.  
Angitan.  
Bain carbogazeux Wolo.  
Cafédrine.  
Camphodausse.  
Campho-Spartéine Dubois  
Camphostyl Lacroix.  
Camphydryl Robin.  
Cardialgine Dubois.  
Cardibaine.  
Cardion Vincardi.  
Cardiosthénine.  
Carditone.  
Composé Gmet.  
Coramine Ciba.  
Créo-suppo-camphre.  
Crino-cardine Laleuf.  
Digalène Roche.

Digibaïne.  
Digicarbaine.  
Digitoline Ciba.  
Digimialbaine.  
Digistabiline.  
Digitaline cristallisée Pe-  
tit-Mialhe.  
Digitaline Invar.  
Digitaline Nativelle.  
Diurène.  
Diuréphédrine.  
Diurétique Gmet.  
Diurocalcine Gros.  
Dragées Lebrun toni-car-  
diaques.  
Endopancrine.  
Ephédraphéine Béral.  
Eupnine Vernade.  
Génostrychnine.  
Immuno-vaccin anti-rhu-  
matismal.  
Intrait de Strophantus.  
Kola granulée Astier.  
Kola Monavon.  
Mialbaine.  
Natibaïne.  
Nucléocardyl.

# I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

## INSUFFISANCES CARDIAQUES HYPOSYSTOLIE — ASYSTOLIE

Orthogénol.  
Ouabaine Arnaud.  
Pavérinol Laleuf.  
Phlébotonine.  
Phosol.  
Phylla Dynn.  
Pituilobine Byla.  
Pneumogéine Renard.  
Protensène Lejeune.  
Pulmo-cardine.  
Quinoidine Duriez.  
Rénaleptine.  
Rénocardine.  
Rythmos Leisyn.  
Santhéose.  
Scillarène Sandoz.  
Sécacornine Roche.

Solucamphre Delalande.  
Solucamphre Spartéiné Delalande.  
Solution Normet médicale.  
Spasmine Jolly.  
Strophantine Catillon.  
Strophantus Catillon.  
Técarine.  
Théisine Dubat.  
Théobromine Invar.  
Théobromose Dumesnil.  
Théobryl Roche.  
Théocalciode.  
Théosalvose.  
Théoxantine.  
Tonicardine Gonnon.  
Visco-sérum.

## LEUCÉMIE — LYMPHADÉNIE

Cérébroil Leisyn.  
Globexine.  
Hémo-phagostyl.  
Hémostra « Roche ».  
Hémostyl.  
Iodométine.  
Ixiuim Buisson.  
Liposplénine.  
Murones du Dr Robert Jacques.  
Néoarsite.

Néo-Arsycodile.  
Néo-Calciline.  
Opoferrine vitaminée  
Phosoforme.  
Quinquina Gmet.  
Terpoxyl interne.  
Thorix.  
Tonigène.  
Tréphonyl.  
Vanadarsine Guillaumin.  
Zimbyl.

## OEDÈMES PÉRIPHÉRIQUES

Adoverne.  
Amino-sel Byla.  
Angitan.  
Artérase.  
Artoradine.  
Cafédrine.  
Camphodausse.  
Campho-Spartéine Dubois.  
Camphostyl Lacroix.  
Camphydryl Robin.  
Canol.  
Collo-Iode Dubois.  
Coramine.  
Crème résolutive du Dr Rap  
Crino-cardine Laleuf.  
Digalène Roche.  
Digibaine.

Digifoline Ciba.  
Digimialbaine.  
Digitaline cristallisée  
Mialhe Petit.  
Digitaline Invar.  
Digitaline Nativelle.  
Diurégan.  
Diurène.  
Diuréphédrine.  
Diurétique Gmet.  
Diurobromine.  
Diurocalcine Gros.  
Diurocardine.  
Dragécalcion.  
Dragées Lebrun toni-cardiaques.

## **I. — APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.**

### **OEDÈMES PÉRIPHÉRIQUES**

Eupnine Vernace.	Rénocardine
Féminadène,	Rythmos Leisyn.
Globules Fumouze à l'iodure de potassium.	Saint-Aré.
Infra-rouges.	Santhéose.
Iodométine.	Strophantine Catillon.
Kola granulée Astier	Strophantus Catillon.
Kola Monavon.	Técarine.
Néphryl.	Théobromose Dumesnil.
Neptal.	Théobryl Roche.
Nucléo-cardyl.	Théocalciode.
Orthogénol.	Théosalvose.
Pneumogénie.	Théovérine Laleuf.
Poudre Danica.	Théoxantine.
	Tonicardine Gonnou.

### **PURPURA**

(Voir : Hémostatiques.)

### **SHOCK — ACCIDENTS SÉRIQUES**

Adréphédrine Béral.	Euphoryl.
Anacamphre.	Euphysol.
Anaclasine.	Hémosamine.
Anéo Leisyn.	Humoro-stabiline.
Angitan.	Jabosulfène.
Calcional.	Lobéline Bruneau.
Calci-Sténine.	Nestosyl.
Calcium Sandoz.	Organi-calcion simple.
Campho Spartéine Dubois.	Pancréastase Defresne granulée.
Camphydryl Robin.	Pommade au Nestosyl.
Chloro-Calcion.	Solucamphre Delalande.
Chloro-magnésion.	Solucamphre spartéiné Delalande.
Coramine Ciba.	Solution Normet chirurgicale.
Dragécalcion.	Terpoxyl interne.
Edricamphre.	Visco-sérum.
Ephédraféine Béral.	
Emgé Lumière.	
Ephédrine naturelle Béral.	

## **II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.**

### **ALCALINS — SATURANTS**

Alcalinose.	Anthraxeptol.
Algosédine.	Arthrilaax.
Alsodine.	Azym.
Alucol Wander.	Benzocarbène.
Anacidase.	Bis-Ka-Ma,

## ALCALINS — SATURANTS

Bismusodine.	Hépatofomine.
Bismuth Desleaux.	Hépatosodine.
Bismuth Tulasne.	Isotonyl Bouret.
Bradigastrine Ducloy.	Kaobrol.
Calcomagnésie.	Lait de Magnésie Phillips.
Calmag-Na.	Mucobismuthine.
Carbonate de bismuth. —	Orthogastrine.
Tablettes Perroud.	Pangestyl Narty.
Carbonésie.	Poudre Danica.
Chéralys (comprimés).	Poudre Paterson.
Citropaine du Dr Fontal.	Poudre Stom.
Citrophos.	Propeptase.
Citrosodine Longuet.	Radiogastrol.
Colloil Leisyn.	Sédogastrine.
Comprimés Vichy-État.	Sel d'Ewald.
Digestif Harvey.	Sel de Hunt.
Doloma.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Gastrépatine.	Stomaxine.
Gastrocalcine.	Stoméol Vichy.
Gastrocaol.	Stomophile.
Gastroclean.	Tablettes Perroud.
Gastronaldine.	Zymatine.
Gastropeptyl.	Zymogastrine Kervan.
Gastro-Sodine.	

## ANTIDIARRHÉIQUES

Acolitol.	Chlorhydrol.
Allisatine Sandoz.	Dragécalcion.
Aloysine.	Entérocarbine Lagoutte.
Alucol Wander.	Elixir Godfrin.
Alunozal.	Entérargol.
Amibiasine.	Entérobyl.
Amidal.	Entéro-Antigènes.
Amiphène Carron.	Entérocarbine Lagoutte.
Ampho-Vaccins Intestinal	Entérofagos.
Ronchèse.	Entéro vaclydun.
Anthraccalcine.	Facmine Longuet.
Atural.	Formocarbine.
Bioentérase.	Gélotanin.
Biolactyl Fournier.	Gmet (Extraits).
Bismuth (crème de) du	Hopogan.
Dr Quenneville.	Kerlactine.
Bismuth Desleaux.	Marrubiase
Bismuth Tulasne.	Nertose.
Bulgarine Thépenier.	Nigérine.
Calcigénol Pinard.	Oxyléine.
Calcional.	Pancarbo Hardy.
Carbofixine Longuet.	Panstomase.
Carbophos.	Panlabyl.
Casaldyl.	Phosphate Pinard
Cephœmétine.	Rhizotanin Chapotot.
Chéralys (comprimés).	

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

### ANTIDIARRHÉIQUES

Sodogastrol Lagoutte.  
Stupho.

Térébine.  
Zymatine.

### ANTIÉMÉTISANTS

Atural.  
Bi-Citrol.  
Bradygastrine.  
Cétrarose Gigon.  
Citrosodine Longuet.  
Digestonic.

Lichénose Ducloy.  
Nigérine.  
Surparine.  
Vin Raimoa.  
Zymogastrine Kervan.

### ANTISEPTIQUES INTESTINAUX ANTIFERMENTESCIBLES

Acatar.  
Acolitol.  
Agarase.  
Agozymase.  
Allisatine Sandoz.  
Alucol Wander.  
Alunozal.  
Amibiasine.  
Amidal.  
Amiphène Carron.  
Ampho-vaccin intestinal  
Ronchèse.  
Anacidase.  
Aniodol.  
Anthracalcine.  
Anthrasedtol.  
Argion.  
Arthrilax.  
Azym.  
Bacté-phages.  
Benzocarbine.  
Bensomine.  
Biferment lactique stable  
L. P. F.  
Binoxal.  
Bioentérase.  
Biolactyl Fournier.  
Bis-Ka-Ma.  
Bismusodine.  
Bismuth (Crème de) du  
Dr Quesneville.  
Bismuth-Desleaux.  
Bismuth Tulasne.  
Boldobyl.  
Boldo Gmet.  
Boldoïne Eparvier.  
Boldolactic Lagoutte.

Boldorhéine.  
Bolène.  
Bulgarine Thépenier.  
Cachets Spévin.  
Carbocaloïdes.  
Carbargyre.  
Carbofixine Longuet.  
Carbolactyl bilié.  
Carbolactyl simple.  
Carbolin Midy.  
Carbomucil.  
Carbonate de bismuth. —  
Tablettes Perroud.  
Carbonésie.  
Carbophos.  
Carbos.  
Carbosanis.  
Casaldyl.  
Céthocal du Dr Lemay.  
Céphoémétine.  
Charbon Fraudin.  
Charbon Tissot.  
Chéralys (comprimés).  
Chloramine Freyssinge.  
Chlorobacilline.  
Chlorobyl.  
Cholagol.  
Choléine lactique.  
Choléfluine.  
Choléolactol Daguin.  
Citrobacilline.  
Citrocarbène.  
Colloïl Leisyn.  
Combrosmol.  
Comprimés Galac.  
Crésentyl.  
Cryptargol Lumière.

## ANTISEPTIQUES INTESTINAUX ANTIFERMENTESCIBLES

Digastrine.	Laxopeptine Girard.
Elixir Grez.	Levuro Maltine Déjardin
Elkin (dragées, granules).	Microlyse.
Entérargol.	Néo-Collargol.
Entériode.	Nigérine Vincent.
Entéro-Antigènes.	Novolactol Daguin.
Entérobyl.	Oxyléine.
Entéro-carbine Lagoutte.	Ozothine.
Entérofagos.	Panbiline.
Entérohépatine.	Pancarbo Hardy.
Entéro-vaclydun.	Pangestyl Narty.
Entéroxin.	Pancrébile.
Eugastrol.	Panlabyl.
Euglyma.	Paralactine Byla.
Euphoryl.	Passicarbone.
Evobiline.	Poudre Paterson.
Exonérol.	Progaster
Facmine Longuet.	Radiogas trol
Formocarbine.	Rectopanbiline.
Formocarbos.	Régyl.
Galabactéine.	Rhizotanin Chapotot.
Gambéol.	Salvébyl.
Gastéose.	Sanluol.
Gastiasc.	Sodogastrol.
Gastro-carbone.	Stomaxines.
Gastroclean.	Stomophile.
Glyco-Lactimase.	Stomoxygène.
Glyco-Thymoline.	Sulfobyl.
Goménol.	Sulfoidol Robin.
Hépatofomine.	Sulfureux Pouillet.
Hopogan Bocquillon.	Tapo.
Iodure d'amidon Lumière.	Térébine.
Jecofluy.	Terpoxyl interne.
Kénol.	Triseptine.
Kerlactine.	Ur-Clar.
Koumyl.	Uribiline.
Lac-Ser.	Urisanine.
Lactaris.	Urométhyl.
Lacticholéine Tulivet.	Urosalyl. — Urosalyl mé-
Lactimase.	thylé.
Lactobacilline.	Uvargol.
Lactochol.	Wismuthane Vély.
Lactolaxine Fyda.	Yaourtine.
Lacto-Sérum Lavril.	Zymatine Lescène.
Laminarol.	

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

### ANTISPASMODIQUES ET SÉDATIFS

Acolitol.	Gouttes antispasmodiques
Aérophagyl.	Dausse.
Algosédine.	Kaobrol.
Amibiasine.	Magistère de bismuth Fouché.
Amphotonyl.	Narcyl.
Ampoules de Pantopon Roche.	Novatropine.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Pancarbo Hardy.
Bellafoline Sandoz.	Pansolanée.
Benzylol.	Papavéryl.
Bismuth (Crème de) du Dr Quesneville.	Paradol.
Bismuth Desléaux.	Paratyroné.
Bismuth Tulasne.	Pavéron Dausse.
Boldoine Éparvier.	Physiocyamine.
Broseyl.	Polypeptine.
Calcomagnésie.	Poudre Danica.
Calmag-Na.	Poudre Paterson.
Capsules Bruel.	Poudre Stom.
Carbatropine.	Pulmocardine.
Cétrarose Gigon.	Pulsamone.
Chloridia.	Scuriforme.
Citrophos.	Sédarsan.
Codérax.	Sédatuline.
Colloid Leisyn.	Sédobrol Roche.
Condurango Gmet.	Sédogastrine.
Crataegus Gmet.	Sédosine.
Dialacétine Ciba.	Sirop Teyssède.
Digastrine.	Somnicones Béral.
Digestonic.	Spasmacol.
Dragécalcion.	Spasmalgine Roche.
Euphoryl.	Spasmalone.
Florhépatine.	Spasmine Jolly.
Freinospasmyl.	Spasneurol.
Gastrocarbone.	Stomaxines.
Gastronaldine.	Stomobrol.
Gastro-Sodine.	Suppoalgos Lagoutte.
Gastrozymase.	Suppositoires Pyrax.
Génatropine.	Surparine.
Genhyoscyamine.	Vagosédyl.
Génomorphine	Valériane Gmet.
Gmet (Extraits).	Valérium Paul Thibault.
	Vériane.
	Zaryl.

### CHOLAGOGUES

Acatar.	Anégrine.
Adipolysine.	Anthraxseptol.
Agobyl.	Arthrila.
Agocholine.	Arvensyl.
Agozymase.	Bensamine.
Amibiasine.	Bi-Citrol Marinier.
Anaclasine.	Biléyl Fournier.



## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

### CHOLAGOGUES

Biliase Raby.  
Biliboldo.  
Bilifluine.  
Biliogastrine Chevillon.  
Bioentérase.  
Biolax.  
Bisalicylate.  
Boldine Houdé.  
Boldo Gmet.  
Boldobyl.  
Boldoïne Eparvier  
Boldolactic Lagoutte.  
Boldorhéine.  
Boldo Verne.  
Boléase Monal.  
Cachets Pachaut.  
Calmaby.  
Canol.  
Caparlem.  
Capsules Bardet.  
Carbolactyl bilié.  
Cascarine Leprince.  
Catalyl Mg.  
Chloro-Magnésion.  
Chlormagnésium Fisch.  
Chlorumagène.  
Cholécystine.  
Choléfluine.  
Choléine Camus.  
Choléine lactique.  
Choléo-Combretol boldi-  
nisé.  
Choléokinase.  
Choléolactol Daguin.  
Choléopeptine.  
Cholépan Longuet.  
Chophytol Rosa.  
Citralin.  
Citrocarbine.  
Citropaine du Dr Fontal.  
Citrosodène Longuet.  
Colloïl Leisyn.  
Combrosamol.  
Comprimés Vichy-État.  
Crinocardine.  
Crypthiol.  
Cuscutine Foulon.  
Cynhepatil.  
Delbiase.  
Dolophos.  
Élixir Spark.  
Elkin (dragées, granules).

Entéro-Antigènes.  
Entérobvl Dehaussy.  
Euglyma.  
Euonymine Paul Thibault.  
Evobiline.  
Evonyl.  
Félamine Sandoz.  
Fluobyl.  
Fluocholine.  
Fluokol.  
Formocitrine.  
Fosfomagnyl.  
Fucosine.  
Gambéol.  
Gastiase.  
Gastéose.  
Gastroclean.  
Gastro-Sodine.  
Gouttes Magalo.  
Grains d'Évian.  
Grains de Vals.  
Granules Edges.  
Héparbiline.  
Hépatie Efa du Dr Leca-  
cheux.  
Hépatobyl.  
Hépatodiase.  
Hépatofomine.  
Hépatomanganol.  
Hépatosodine.  
Hépatozyl Caldo.  
Hexafel.  
Jecofluy.  
Jécol.  
Kénol.  
Kinéchol.  
Kodos.  
Labylix.  
Lac-Ser.  
Lacticholéine Tulivet.  
Lactobyl.  
Lacto-Sérum Lavril.  
Laminarol.  
Laxatifs Miraton Châtel-  
Guyon.  
Laxocholéine Tulivet.  
Lénicure Vichy.  
Magnésium Hardy.  
Magnésio-tubes Robinet.  
Magsalyl Mg.  
Movébil.  
Néotrophène.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

### CHOLAGOGUES

Oléocidase.	Protidyne dragées.
Oléoformine Corbière.	Pyurol.
Olriricin.	Romarantyl Trouette Perret.
Olivéol.	Romarène.
Opobyl.	Saint-Aré.
Opochol.	Salsanos.
Opothérapie Choay.	Salvébyl.
Opothérapie du D <sup>r</sup> Fraysse.	Sel hépatique U. N. Arquevaux.
Orthogastrine.	Sélunie.
Orthogénol.	Stomoxygène.
Oxyléine.	Sulfobyl.
Panbiline.	Thiocitran.
Pancrébile.	Tonicalcine.
Panlabyl.	Toniveinine.
Panstomase.	Triseptine.
Paradoline.	Uribiline.
Peptalmine magnésinée.	Urol.
Piûles du D <sup>r</sup> Debouzy.	Urométhyl.
Plasma de Quinton.	Vichy-purgati.
Polypeptonal.	Vulcase.
Précikase.	Zymatine Lescène.
Progaster.	
Prométhine	

### EUPEPTIQUES — STOMACHIQUES

Agozymase.	Choléo-Combretol boldinisé.
Alcasodine.	Citrocarbine.
Amunine.	Citropaïne du D <sup>r</sup> Fontal.
Amylodiastase Thépenier.	Citrophos.
Anaclasine Ranson.	Citrosodine Longuet.
Anapeptone Vassal.	Colloil Leisyn.
Anthraccalcine.	Complexextraits.
Appetyl.	Comprimés Roche de Thiocol.
Atural.	Condurango Gmet.
Azym.	Diasto-pepsine Richepin.
Beef Lavoix	Digestif Harvey.
Bi-Citrol Marinier.	Doloma.
Biliogastrine Chevillon.	Dolophos.
Biophorine.	Dyspeptine Hepp.
Biophylactine Mg.	Élixir Bonjean.
Boldobyl.	Élixir Ducro.
Boldoïne Éparvier.	Élixir Dussaud.
Cachets Roche de Thiocol.	Élixir Grez.
Calcozymase.	Élixir Spark.
Calmaby.	Elkin (dragées, granules).
Carbocitrol	Emgé Lumière.
Carbolactyl bilié.	Enzypan.
Carbolactyl simple.	Eugastrol.
Carypaïne.	Eupeptique Monavon.
Charbon Tissot	
Chéralys (comprimés).	

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

### EUPEPTIQUES — STOMACHIQUES

Extrait de Malt français	Peptone Vassal.
Déjardin.	Peptosthénine Choay.
Fénucine.	Philogastrine.
Formocitrine.	Phosoforme.
Gastroclean.	Pluribiase.
Gastropeptyl.	Polypeptine
Gastro-Sodine.	Poudre Paterson.
Gastrozymase.	Propeptase.
Gmet (Extraits).	Proxytol.
Hépatodiase.	Quassia Kina Rabot.
Hépaxine.	Quassine Houdé.
Jecofluyl.	Quinquina Gmet.
Lqgaphos.	Réalphène Buisson.
Maltéa Moser cristallisée.	Reconstituant Mary.
Malt français Déjardin	Romarantyl.
(Extrait de).	Romarène.
Maltosan.	Salsanos.
Malt pailleté.	Selunio.
Malt Wander ou Gloma.	Sirop Roche au Thiocol.
Mangaine.	Stoméol.
Marinol.	Strychnotonine.
Mésogastrine.	Sulfobyl.
Novolactol Daguin.	Tachygastrine Ducloy.
Pancréane.	Thiocol Roche.
Pancréastase Defresne granulée.	Tonax.
Pancréatose Idon.	Uvé (gouttes).
Pangestyl Narty.	Vanadarsine Guillaumin.
Panstormase.	Vin de Chassaing.
Papaine Trouette-Perret.	Viosten.
Peptodiase.	Zymatine.
	Zymogastrine Kervan.

### LAXATIFS — PURGATIFS

Adipolysine.	Boldobyl.
Agarase.	Boldorhéine.
Agarol.	Boldo Verne.
Agocholine.	Boléase Monal.
Agozymase.	Bolène.
Aloïne Houdé.	Cachets Pachaut.
Anthraxeptol.	Carbatropine.
Arthrilaix.	Carbolactyl billé.
Arvensyl.	Carbolin Midy.
Biléyl Fournier.	Cascara Midy.
Biliase Raby.	Cascarine Leprince.
Biliboldo.	Catalyl Mg.
Bilifluine.	Cellu-Son.
Biliogastrine Chevallon.	Chloro-Magnésion.
Biolaix.	Cholagol.
Bis-Ka-Ma.	Choléine Camus.
Boldine Houdé.	Choléine lactique.
Boldo Gmet.	

## LAXATIFS — PURGATIFS

Choléo-Combrétol boldi- nisé.	Lientine Grémy.
Choléokinase.	Limonade Citrose Vichy.
Cholepan Longuet.	Limonade Godfrin.
Citralin.	Lin Tarin.
Comprimés de Pantolaxine du D <sup>r</sup> Boveil.	Listose Vicario. /
Coprex.	Loraga.
Coréine.	Magnélax.
Cristolax Wander.	Mucilaxine.
Curoraisin.	Mucinum.
Cuscutine Foulon.	Mucyllium.
Elkin (dragées, granules).	Néo-laxatif Chapotot.
Entéro-mucine.	Néotrophène.
Évolaxine.	Normacol.
Évonyl.	Normalarine.
Exobol.	Nujol.
Exonérol.	Oléo-Mel.
Fluobyl.	Olliricin Hardy.
Fucosine.	Opobyl.
Gélor.	Opocho.
Grains d'Évian.	Opovaculine.
Grains de Vals.	Orthogénol.
Granules Edges.	Panbiline.
Hépatobyl.	Pancrébile.
Hépatosodine.	Paragélose.
Hépatozyl Caldo.	Paralaxol Tulivet.
Hexafel.	Parlax.
Hormobiline.	Parolagar.
Huilaxine.	Pasta Palm.
Huile Crolas.	Péristaltine Ciba.
Hydrastis Gmet.	Physioscyamine.
Innerclean.	Pilules du D <sup>r</sup> Debouzy.
Iodo-scilline Gabail.	Poudre laxative de Vichy.
Isacène Roche.	Poudre Rocher laxative.
Ispaghul.	Precikase.
Kénol.	Prostigmine Roche.
Kinéchol.	Prunine Sentini.
Kodos.	Puragar.
Labylox.	Purganol Daguin.
Lactobyl.	Purgos.
Lactolaxine Fyda.	Rectopanbiline.
Lacto-Sérum Lavril.	Régyl.
Lait de Magnésie Philipps.	Romarène.
Laminarol.	Saint-Aré.
Lansoyl.	Salvebyl.
Laxamalt.	Seignet' fruits.
Laxatifs Miraton Châtel- Guyon.	Sel hépatique U. N. Arque- vaux.
Laxocholéine Tulivet.	Sirop de la Maternité.
Laxogélose Tulivet.	Sirop Sentini.
Laxopeptine Girard.	Sonagar.
	Sonamel.
	Sonène.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

### LAXATIFS — PURGATIFS

Stomaxines.	Uribiline.
Stomoxygène.	Varilaxine.
Tamar Indien Grillon.	Vasolaxine.
Tamarine.	Vichy purgatif.
Taxol.	Vulcase.
Thaolaxine.	Yaourtine.
Thiocitran Thévenot.	Zymatine Lescène.

### PANSEMENTS GASTRIQUES

Antinéase.	Kaolinase.
Biomucine.	Magistère de Bismuth Fouché.
Bismuth (Crème de) du D <sup>r</sup> Quesneville.	Mucobismuthine.
Bismuth-Desleaux.	Nertose.
Bismuth Tulasne.	Neutralcaol.
Calmaby.	Nigérine.
Calmag-Na.	Pangastrol.
Carbonate de bismuth.	Passicarbonate.
Carbosanis.	Poudre Danica.
Charbon Fraudin.	Poudre Paterson.
Colloïd Leisyn.	Sel d'Ewald.
Doloma.	Sel de Hunt.
Formocarbène.	Stal-Kosal.
Castrocaol.	Stomaxines.
Gastroclean.	Stoméol.
Gastropansement du D <sup>r</sup> Zizine.	Stomobrol.
Gastrozymase.	Tablettes Perrond.
Gélogastrine Licardy.	Wismuthane Vély.
Gélo-Pansements gastro-intestinaux.	Zymatine.

### STIMULANTS DE LA SÉCRÉTION ET DE LA MOTILITÉ GASTRIQUE

Acécoline.	Digastrine.
Adipolysine.	Elixir Ducro.
Adrénaline Invar.	Elixir Grez.
Adrénine.	Elixir du D <sup>r</sup> Mialhe.
Agozymase.	Elixir eupeptique Tizy.
Alcalinose.	Elkin (dragées, granules).
Allisatine Sandoz.	Emgé Lumière.
Alsodine.	Extrait de Malt français Déjardin.
Amibiasine.	Fosfoxyll Carron.
Billogastrine.	Gastrepatine.
Boldoïne Éparvier.	Gastricine du D <sup>r</sup> E. Duhourcau.
Chlorhydrol.	Gastronaldine.
Chloridia.	Gastrozymase.
Choléfluine.	
Cholepan Longuet.	
Chophytol Rosa.	

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. G.

### STIMULANTS DE LA SÉCRÉTION ET DE LA MOTILITÉ GASTRIQUE

Génésérine	Phylla Dyn.
Granulés de Pantofort du	Polyferments
D <sup>r</sup> Boveil.	Polypeptine.
Hépatosodine.	Propeptase.
Ionyl.	Régyl.
Isotonyl Bouret.	Rénaleptine.
Labylox.	Romarène.
Laxopeptine Giraud.	Sel d'Ewald.
Logaphos.	Sodogastrol.
Malt français Déjardin (Ex-	Stomarol.
trait de).	Strychnal Longuet.
Orthogastrine.	Strychnotonine.
Pancrébile.	Tachygastrine Ducloy.
Pangestyl Narty.	Térébine.
Peptodiase.	Tridigestine Dalloz.
Peptone Vassal.	Zymatine.
Phosoforme.	

### VACCINOTHÉRAPIE

Ampho-Vaccins Ronchèse.	Immunizols Grémy.
Antigénines.	Immuno-vaccin.
Bacillactine Nutricia.	Institut Pasteur Vaccins.
Bilivaccin.	Lysaxins L. M. L.
Bilivaccin anticolibacil-	Probios.
laire.	Vaccinothérapie atoxique
Colitique.	Cépède.
Entéro Antigènes.	Vaccin Ivago de Golden-
Entérofagos.	berg.
Entérovaclydun.	Vaccins Ronchèse (Am-
Entéroxin Leclerc.	pho-vaccins)

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### AÉROPHAGIE — DILATATION DE L'ESTOMAC

Adipolysine.	Biolax.
Aerophagyl.	Bismusodine.
Alcalinose.	Bismuth (Crème de) du
Alsodine.	D <sup>r</sup> Quesneville.
Amphotonyl.	Bismuth (Crème de) Chl.
Anthracalcine.	magnésienne du D <sup>r</sup> Ques-
Anthrseptol.	neville.
Appétyl.	Bismuth Desleaux.
Azym.	Bismuth Tulasne.
Benzocarbène.	Blocs Vécór.
Bi-Citrol Marinier.	Bolcitol.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### AÉROPHAGIE — DILATATION DE L'ESTOMAC

Calcomagnésie.  
Calmag-Na.  
Carbocitrol.  
Carbomucil.  
Carbonate de Bismuth.  
Tablettes Perroud.  
Carbonésie.  
Carbophos.  
Carbosanis.  
Charbon Fraudin.  
Charbon Tissot.  
Chéralys (Comprimés).  
Chloridia.  
Citrocarbène.  
Citrofluyl.  
Citropaïne du Dr Fontal.  
Colloïd Leysin.  
Comprimés Vichy-État.  
Digastrine.  
Digestif Harvey.  
Digestonic.  
Dyspeptine Hepp.  
Élixir eupeptique Tisy.  
Élixir Grez.  
Élixir Spark.  
Eupeptique Monavon.  
Féminadène.  
Formocarbène.  
Formocarbos.  
Freinospasmyl.  
Gastrocalcine.  
Gastrocaol.  
Gastrocarbène.  
Gastropeptyl.  
Gastrozymase.  
Hépatodiase.  
Hépatosodine.  
Ionyl.

Isotonyl Bouret.  
Kaobrol.  
Laxopeptine.  
Magistère de Bismuth Fou-  
ché.  
Mésogastrine.  
Neutralcaol.  
Nigérine.  
Pancarbo Hardy.  
Pancréatose Idon.  
Pangastrol.  
Pangestyl Narty.  
Paradol.  
Passicarbène.  
Peptodiase.  
Peptone Vassal.  
Philogastrine.  
Phosphobrom.  
Phosoforme.  
Physioscyamine.  
Polyferments Laleuf.  
Poudre Paterson.  
Propeptase.  
Pulsamone.  
Régyl.  
Sédatuline.  
Sel d'Ewald.  
Sel de Hunt.  
Sodolactine.  
Spasmine Jolly.  
Splénocarbène.  
Stal-Kosal.  
Stomaxines.  
Stoméol.  
Stomobrol.  
Stomophile.  
Vagosédyl.  
Wismuthane Vély.

### ANAPHYLAXIE ALIMENTAIRE

Anaclasine Ranson.  
Anapeptone Vassal.  
Atural.  
Biophylactine M. G.  
Boldo Gmét.  
Calcozymase.  
Carbolactyl bilie.  
Chlormagnésium.  
Chloro-magnésion.  
Cholagol.  
Choléfluine.  
Colloïd Leysin.

Digastrine.  
Dragécalcion.  
Dragées Elkin.  
Élixir Grez.  
Emgé Lumière.  
Entéro-Antigènes.  
Ephédrine naturelle Béral.  
Euphoryl.  
Evobiline.  
Fluokol.  
Formocarbène.  
Formocarbos.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### ANAPHYLAXIE ALIMENTAIRE

Gastrozymase.  
Granules Edges.  
Humoro-stabilline.  
Hyposulfène.  
Jecofluyl.  
Lansoyl.  
Mucyllium.  
Organi-calcion simple.  
Pancréastase Defresne granulée.  
Peptalmine.

Peptalmine magnésinée.  
Peptogil A et L.  
Peptonal.  
Peptone Vassal.  
Phylactone Byla.  
Polypeptonal.  
Prézymase.  
Protiodyne (dragées).  
Thiocitrane Thévenot.  
Triseptine.

### ANOREXIE

Amunine.  
Appétyl.  
Ardogène.  
Arséocrinol.  
Arséniode.  
Arsycodile.  
Arsylène Roche.  
Ascoléine Rivier.  
Beef Lavoix.  
Biocalcose.  
Bionéol.  
Biophylactine M. G.  
Biotrigon.  
Boldo Gmet.  
Boldoine Eparvier.  
Boldo-Verne.  
Calmaby.  
Carnine Lefrancq.  
Cérébroil Leisyn.  
Chlormagnésium.  
Chloro-magnésion.  
Cholepan Longuet.  
Clupeyl.  
Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle.  
Composé Gmet.  
Condurango Gmet.  
Cytobiase.  
Cytosérum Carbière.  
Dyspeptine Hepp.  
Elixir Ducro.  
Elixir Dussaud.  
Elixir Eupeptique Tisy.  
Elixir Grez.  
Elixir Spark.  
Euphoryl.  
Fenucalcium.  
Fénucine.  
Fénugrène.  
Ferydal.  
Fosfoxyll.  
Gaduamine.

Gaduase.  
Gaiarsol.  
Gastrhéma.  
Gmet (Extraits).  
Hémoviris.  
Héparbiline.  
Hopogan.  
Hormocline.  
I. A. M.  
Insuline buccale Fernet.  
Jecofluyl.  
Liposplénine.  
Logaphos.  
Mangano-phosphal.  
Marimine.  
Marinol.  
Morisland.  
Néoarsite.  
Néo-Arsycodile.  
Nucléigène.  
Ozobiase.  
Pancrinol du D<sup>r</sup> Debat.  
Panstomase.  
Peptodiase.  
Peptone Vassal.  
Percalcine.  
Persodine Lumière.  
Phosoforine.  
Phylla Dyn.  
Phytine Ciba.  
Phytosplénol Plé.  
Plasma de Quinton.  
Quassia-Kina Rabot.  
Quassine Houdé.  
Quinquina Gmet.  
Réalphène Buisson.  
Reconstituant Mary.  
Sanas.  
Sérogyné.  
Sirop Roche au Thiocol.



### ANOREXIE

Solution Bardet.	Total-Tonic.
Stomobrol.	Uvé (gouttes).
Stovafer.	Vanadarsine Guillaumin.
Strychnotonine.	Vichy-purgatif.
Sulfocol Godart.	Vin de Vial.
Tachygastrine Ducloy.	Viosten.
Terpoxyl interne.	Vitamyl.
Tonax.	Zimbyl.
Tonikéine Chevreton.	Zymatine irradiée.
Tonuclyl.	

### CHOLÉCYSTITES — ANGIOCHOLITES

Adipolysine.	Combrosmol.
Agobyl.	Cynhepatil.
Agozymase.	Delbiase.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Disolurane Vély.
Anaclasine.	Entéro-Antigènes.
Anthrseptol.	Entérobyl Dehaussy.
Arvensyl.	Entérofagos.
Baldisedan.	Entérovaclydun.
Bensamine.	Eugastrol.
Benzobromine.	Euonymine Paul Thibault.
Bi-Citrol Marinier.	Evobiline.
Bikréol.	Évonyl.
Biliogastrine.	Félamine Sandoz.
Binoxol.	Fluobyl.
Bilivaccin anticolibacil- laire.	Fluocholine.
Biolax.	Fluokol.
Boldo Gmet.	Formocarbine.
Boldoïne Éparvier	Formocarbos.
Boldorhéine.	Formocitrine.
Boldo Verne.	Gastroclean.
Boldobyl.	Gouttes Halogènes du Dr Bern.
Boldolactic Lagoutte.	Granions.
Boléase Monal.	Hamacitro.
Bolène.	Héparbiline.
Bucmine.	Hépatie Efa du Dr Leca- cheux.
Bulgarine-Thépenier.	Hépatoformine.
Calmaby.	Hépatosodine.
Canol.	Hexotal.
Caparlem.	Immuno-vaccin.
Capsules Bardet.	Iodhéma.
Carbolactyl bilie.	Jecofluy.
Chlormagnésium.	Jécol.
Chloro-magnésion.	Kénol.
Cholécystine.	Labyfax.
Choléine lactique.	Lacto-Sérum Lavril.
Choléo-Combretol boldi- nisé.	Lénicure Vichy.
Choléokinase.	Lithinoformine.
Cholepan Longuet.	Lysaxins LM. L.
Chophytol Rosa.	Mésothine.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### CHOLÉCYSTITES — ANGIOCHOLITES

Microlyse.  
Mucyllium.  
Oléocidase.  
Oléoformine Corbière.  
Olivéol.  
Opobyl.  
Opochol.  
Orthogénoi.  
Oxyléine.  
Panbiline.  
Pancrébile.  
Pangestyl Narty.  
Panlabyl.  
Panstomase.  
Peptalmine magnésinée.  
Peptone Vassal.  
Pilules du D<sup>r</sup> Debouzy.  
Polyformine  
Précikase.  
Probios.  
Protidyne dragées.  
Pyoformine.  
Pyrelaine Collas.  
Pyurol.

Radiotropine.  
Romarantyl.  
Romarène.  
Saint-Aré.  
Salvébyl.  
Sodothiol.  
Thiocitran Thévenot.  
Triseptine.  
Ultraformine.  
Uraseptine Rogier.  
Uribiline.  
Urisanin.  
Urobuccol Malmanche.  
Uroformine Gobey.  
Urol.  
Urométhyl.  
Urométine Lambiotte.  
Urosalyl. — Urosalyl méthylé.  
Urosan Dufayard.  
Vaccins Ronchèse (ampho-vaccins).  
Vulcase.

### CIRRHOSES

Actiphos.  
Adipolysine.  
Agocholine.  
Anégrine.  
Arvensyl.  
Bi-Citrol Marinier.  
Bikréol.  
Biléyl Fournier.  
Billase Raby.  
Biliboldo.  
Bilifluine.  
Biliogastrine Chevallon.  
Boldine Houdé.  
Boldo Gmet.  
Boldobyl.  
Boldolactic Lagoutte.  
Boldorhéine.  
Boldo Verne.  
Boléase Monal.  
Calcium Sandoz.  
Canol.  
Capsules Bardet.  
Carbolactyl bilie.  
Chlormagnésium.  
Chloro-magnésion.  
Cholécystine.  
Choléine lactique.

Choléo-Combretol boldinisé.  
Choléokinase.  
Cholépan Longuet.  
Chophytol Rosa.  
Cynhepatil.  
Dépuriode du D<sup>r</sup> Roger Weber.  
Diurobromine.  
Diurocardine.  
Dragécalcion.  
Endopancrine.  
Entérobyl Dehaussy.  
Euonymine Paul Thibault.  
Evobiline.  
Fluobyl.  
Fosfomagnyl.  
Hépatobyl.  
Hépatozyl Caldo.  
Hépatoc Efa du D<sup>r</sup> Lecaheux.  
Hépatomanganol.  
Jécofluy.  
Kinéchol.  
Lacto-Sérum Lavril.  
Lénicure Vichy.  
Magnésium Hardy.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### CIRRHOSSES

Magnéso-tubes Robinet.  
Movebil.  
Néphryl.  
Oléoformine Corbière.  
Oli véol.  
Opochol.  
Opothérapie Bouty  
Organi-calcion simple.  
Orthogénol.  
Panbiline.  
Pancrébile.  
Panstomase.  
Paradol.

Precikase.  
Pyurol.  
Rénocardine.  
Romarène.  
Salvébyl.  
Sodogastrol.  
Sodothiol.  
Técarine.  
Théobromose Dumesnil.  
Tiodine Cognet.  
Urol.  
Urométhyl.

### CONGESTIONS DU FOIE — FOIE CARDIAQUE

Adipolysine.  
Agarase.  
Agocholine.  
Agozymase.  
Alcasodine.  
Aloïne Houdé.  
Anacidase.  
Angitan.  
Anégrine.  
Arthrilax.  
Arvensyl.  
Bi-Citrol Marinier.  
Bikréol.  
Biléyl Fournier.  
Biliase Raby.  
Biliboldo.  
Bilifluine.  
Biliogastrine Chevillon.  
Biolax.  
Boldine Houdé.  
Boldo Gmet.  
Boldoine Éparvier.  
Boldobyl.  
Boldolactac Lagoutte.  
Boldorhéine.  
Boldo Verne.  
Boléase Monal.  
Bolène.  
Bucmine.  
Canol.  
Caparlem.  
Capsules Bardet.  
Carbocitrol.  
Carbolactyl simple.  
Carbolactyl bilié.  
Cascarine Leprince.  
Catalyl Mg.  
Chéralys (comprimés).

Chlormagnésium Fisch.  
Chloro-magnésion.  
Cholagol.  
Cholé cystine.  
Cholefluine.  
Choléine Camus.  
Choléine lactique.  
Choléo-Combretol boldi-  
nisé.  
Choléokinase.  
Choléolactol Daguin.  
Choléopeptine.  
Chophytol Rosa.  
Citrosodine Longuet.  
Combrosmol.  
Comprimés Vichy-État.  
Crinocardine.  
Crypthiol.  
Curoraisin.  
Cuscutine Foulon.  
Cynhepatil.  
Diathermie.  
Digifoline.  
Diurène.  
Diurétique Gmet.  
Dolophos.  
Élixir Spark.  
Elkin (dragées, granules).  
Endopancrine.  
Entéro Antigènes.  
Entérobil Dehaussy.  
Euonymine Paul Thibault.  
Evobiline.  
Évonyl.  
Fluobyl.  
Fluocholine.  
Fluokol.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### CONGESTIONS DU FOIE — FOIE CARDIAQUE

Formôcarbos.  
Fosfomagnyl.  
Gambéol.  
Gastrépatine.  
Gastroclean.  
Gastronaldine.  
Gastro-Sodine.  
Gouttes Magalo.  
Grains de Vals.  
Grains d'Évian.  
Granules Edges.  
Gravural.  
Héparbiline.  
Hénato-Byl  
Hépatodiase.  
Hépatofomine.  
Hépatosodine.  
Hépatozyl Caldo.  
Hepaxine.  
Hexafel.  
Huile Crolas.  
Hydrastis Gmet.  
Immuno-vaccin.  
Jécofluyt Hardy.  
Jécol.  
Kinechol.  
Kodos.  
Lactolaxine Fydau.  
Lacto-Sérum Lavril  
Lénicure Vichy.  
Magnésium Hardy.  
Magnéso-tubes Robinet.  
Magsalyl Mg.

Movehil.  
Olliricin Hardy.  
Opobyl.  
Opochol.  
Opothérapie Carrion.  
Orthogénol.  
Panbiline.  
Pancrébile.  
Pangestyl Narty.  
Paradol.  
Peptalmine magnésinée.  
Peptane Vassal.  
Pilules du Dr Debouzy.  
Polypeptonal.  
Précikase.  
Progaster.  
Prométhine.  
Pyurol.  
Romarantyl Trouette-  
Perret.  
Romarène.  
Saint-Aré.  
Salsanos.  
Sélunic.  
Toniveinine.  
Triseptine.  
Uribiline.  
Urol.  
Urométhyl.  
Vichy-Purgatif.  
Vulcase.  
Zymatine.

### CONSTIPATION

Adipolysine.  
Agarase.  
Agarol.  
Agocholine.  
Agozymase.  
Aloïne Houdé.  
Amidal.  
Anusol Mialhe.  
Arthrilax.  
Arvensyl.  
Benzylol.  
Bi-Citrol Marinier  
Biférent lactique stable  
L. P. F.  
Bikréol.  
Biléyl Fournier.

Biliase Raby.  
Biliboldo.  
Bilifluine.  
Biliogastrine Chevillon.  
Bilivaccin anticolibacillaire.  
Billabstine laxative.  
Bis-Ka-Ma.  
Bolcitol.  
Boldine Houdé.  
Boldobyl.  
Boldo Gmet.  
Boldoine Éparvier.  
Boldorhéine.  
Boldo Verne.  
Boléase Monal.  
Bolène.

## CONSTIPATION

Bulgarine Thépenier.	Exobol.
Byliérine.	Exonérol.
Cachets Pachaut.	Facmine Longuet.
Carbalcaloïdes.	Félamine Sandoz.
Carbatropine.	Fluobyl.
Carbolactyl bilié.	Fluokol.
Carbolin Midy.	Fucosine.
Cascara Midy.	Gambéol.
Cascarine Leprince.	Gastéose.
Catalyl Mg.	Gastiase.
Cellu-Son.	Gastroclean.
Céréales Bébé Favrichon.	Gélor.
Céréales granulées Favrichon.	Grains d'Évian.
Chlormagnésium.	Grains de Vals.
Chloro-magnésion.	Granulés Edges.
Cholagol.	Gravural.
Choléine Camus.	Hépatol Manganol.
Choléine lactique.	Hépatosodine.
Choléo-Combretol boldinisé.	Hépatozyl Caldo.
Choléokinase.	Hexafel.
Choléolactol Daguin.	Hormobiline.
Cholepan Longuet.	Huilaïne.
Chlorumagène.	Huile Crolas.
Citropeptol.	Hydrastis Ginet.
Citrophos.	Innerclean.
Comprimés de Pantolaxine du Dr Boveil.	Iodoscilline Gabail.
Coprex.	Isacène Roche.
Coréine.	Ispaghul.
Cristolax Wander.	Kénol.
Curoraisin.	Kinéchol.
Cuscutine Foulon.	Kodos.
Delbiase.	Labyfax.
Digastrine.	Lactimase.
Digestonic.	Lactobyl.
Doloma.	Lactolaxine Fydaul.
Élixir Dussaud.	Lacto-sérum Lavril.
Élixir Spark.	Lait de magnésie Phillips.
Elkin (dragées, granules).	Laminarol.
Emgé Lumière.	Lansoyl.
Entéro-antigènes.	Laxamalt.
Entérobyl Dehaussy.	Laxatifs Miraton Châtel-Guyon.
Entérofagos.	Laxocholéine Tulivet.
Entéro-mucine.	Laxogélose Tulivet.
Enzypan.	Laxopeptine.
Euonymine Paul Thibault.	Lénicure Vichy.
Euphoryl.	Lientine Grémy.
Eurectol.	Limonade Citrose Vichy.
Evobiline.	Limonade Godfrin.
Evolaxinc.	Lin-Tarin.
Évonyl.	Listose Vicario.
	Loraga.
	Magnelax.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### CONSTIPATION

Magnésium Hardy.	Prunine Sentini.
Magnéso-Tubes Robinet.	Puragar.
Médicoferment.	Purganol Daguin.
Mucicarbos.	Purgolaxine.
Mucilaxine.	Purgos.
Mucinum.	Pyurol.
Mucyllium.	Rectopanbiline.
Néolaxatif Chapotot.	Romarène.
Néotrophène.	Saint-Aré.
Normacol.	Salvé.
Normalarine (paillettes et longuets).	Salvébyl.
Nujol.	Sel hépatique U. N. Arque- vaux.
Oléo-Mel.	Selunio.
Olriricin Hardy.	Sirop de la Maternité.
Opobyl.	Sirop Sentini.
Opochlorine.	Sonagar.
Opochol.	Sonamel.
Opovaculine.	Sonène.
Orthogénol.	Stal-Kosal.
Panbiline.	Stomaxines.
Pancrébile.	Stomoxygène.
Papavéryl.	Sulfohyl.
Paradol.	Suppositoires Chaumet.
Paragélose.	Suppositoires Gonnon.
Paralaxol.	Suppositoires Pachaut.
Parlax.	Suppositoires Pepet.
Parolagar.	Tamar Indien Grillon.
Pasta-Palm.	Tamarine.
Péristaltine Ciba.	Taxol.
Phosoforme.	Thaolaxine.
Physioscyamine.	Thiocitran Thévenot.
Pilules du Dr Debouzy.	Uribiline.
Pituilobine Byla.	Vacuoline.
Plasma de Quinton.	Varillaxine.
Poudre Danica.	Vasolaxine.
Poudre laxative de Vichy.	Vichy-Purgatil.
Poudre Rocher laxative.	Vulcase.
Précikase.	Yaourtine.
Probios.	Zymatine Lescène.
Prostigmine Roche.	

### DYSENTERIES — CHOLÉRA

Absuric.	Aniodol.
Acolitol.	Argion.
Alucol Wander.	Bacté-phages.
Alunozal.	Biferment lactique stable.
Amibiasine.	Bilivaccin.
Amidal.	Bioentérase.
Amiphène Carron.	Biolactyl Fournier.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Bismuth Desleaux.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### DYSENTERIES — CHOLÉRA

Bismuth Tulasne.	Kerlactine.
Bulgarine Thépenier.	Koumyl.
Carbalcaloïdès.	Lactaris.
Carbolactyl simple.	Lactimase.
Carbonate de bismuth. Ta-	Lactobacilline.
bettes Perrond.	Lactochol.
Cephoémétine.	Lait Mont Blanc.
Charbon Fraudin.	Larosan Roche.
Charbon Tissot.	Leucoseptyl.
Chloramine Freyssinge.	Levure B. 17
Chlorobacilline.	Ludin.
Chlorobyl.	Malarsan.
Comprimés Galac.	Marrubiase.
Crésentyl.	Nigerine.
Cryptargol Lumière.	Oxyléine.
Élixir Bonjean.	Panbiline.
Élixir Godfrin.	Pancarbo Hardy.
Entéragol.	Panlabyl.
Entéro-antigènes.	Passicarbonate.
Entérofagos.	Pâte Spécia.
Entérohépatine.	Phosoforme.
Entéro-lactique.	Physiosthénine.
Entéroxin Leclerc.	Plasma de Quinton.
Facmine Longuet.	Probios.
Formocarbène.	Rectopanbiline.
Gastrocaol.	Stupho.
Glyco-Lactimase.	Tapo.
Glyco-Thymoline.	Térébine.
Hépatiformine.	Téparsol.
Hopogan.	Triseptine.
Institut Pasteur Sérums.	Ultra-Levure.
Institut Pasteur Vaccins.	Yaourtine.
Iodure d'amidon Lumière.	

### DYSPEPSIES

Adrénaline Invar.	Biliogastrine Chevallon.
Adrénine.	Biomucine.
Agocholine.	Biophylactine M. G.
Agozymase.	Bismuth Desleaux.
Alcalinose.	Bismuth (Crème de) chl.
Alcasodiné.	magnésienne du D <sup>r</sup> Ques-
Algosédine.	neville.
Allisatine Sandoz.	Bismuth Tulasne.
Alsodine.	Bolcitol.
Amylodiasse Thépenier.	Boldoine Eparvier.
Anacidase.	Boldolactic Lagoutte.
Anthraccalcine.	Calcozymase.
Appétyl.	Calmaby.
Arthrilax.	Calmag-Na.
Azym.	Carbocitol.
Babeurre « La Faye ».	Carbonate de Bismuth. Ta-
Bi-Citrol Marinier.	blettes Perrond.
Bikréol.	Carbonésie.

## DYSPEPSIES

Carbos.	Fluobyl.
Carbosanis.	Formocarbine.
Carypaine.	Formocarbos.
Cétrarose Gigon.	Gastéose.
Charbon Fraudin.	Gastias.
Charbon Tissot.	Gastrépatine.
Chéralys (comprimés).	Gastricine du D <sup>r</sup> E. Duhour-
Chlorhydrol.	cau.
Chloridia.	Gastrocalcine.
Choléine Camus.	Gastrocaol.
Citralin.	Gastroclean.
Citrocarbène.	Gastronaldine.
Citrofluyl.	Gastropansement du D <sup>r</sup> Zi-
Citropaine du D <sup>r</sup> Fontal.	zine.
Citropeptol.	Gastropeptyl.
Citrophos.	Gastro-Sodine.
Citrosodine Longuet.	Gastrozymase.
Colloil Léysin.	Gélo-pansements gastro-
Complextraits.	intestinaux.
Comprimés Vichy-État.	Génatropine.
Condurango Gmet.	Génésérine.
Crème de Bismuth Chl.	Glycothymoline.
magnésienne du D <sup>r</sup> Ques-	Gmet (Extraits).
neville.	Gouttes Magalo.
Crème de Bismuth du D <sup>r</sup>	Grains de Vals.
Quesneville.	Grains d'Évian.
Dias.	Hamacitro.
Diasto-pepsine Richepin.	Hépatodiase.
Digastrine.	Hopogan Bocquillon.
Digestif Harvey.	Iodure d'amidon Lumière.
Digestonic.	Ionyl.
Doloma.	Isotonyl Bouret.
Dolophos.	Ispaghul.
Dryco.	Kaobrol.
Dyspeptine Hepp.	Kinéchol.
Élixir Bonjean.	Kymosine Rogier.
Élixir Ducro.	Lait de Magnésie Phillipps.
Élixir du D <sup>r</sup> Mialhe.	Lait Mont Blanc.
Élixir Dussaud.	Larosan Roche.
Élixir eupeptique Tisy.	Levure fraîche Myceta.
Élixir Grez.	Maltéa Moser cristallisée.
Élixir Spark.	Malt français Déjardin
Elkin (dragées, granules).	(Extrait de).
Emgé Lumière.	Maltosan.
Entéro-Antigènes.	Malt pailleté.
Enzypan.	Malt Wander ou Gloma.
Eugastrol.	Mangaine.
Eupeptique Monavon.	Médicoferment.
Extrait de Malt français	Mésogastrine.
Déjardin.	Mucicarbos.
Farine maltée Favrichon.	Mucobismuthine.
Ferment pur de raisin.	Nigérine Vincent.





## DYSPEPSIES

Novatropine.	Radiogastrol.
Novolactol Daguin.	Rectopanbiline.
Cenophos.	Régyl.
Opobyl.	Rénaleptine.
Opothérapie Bouty.	Romarène.
Orthogastrine.	Salsanos.
Orthogénol.	Salvébyl.
Panbiline.	Sédarsan.
Pancréanne.	Sédobrol Roche.
Pancréastase Defresne granulée.	Sédogastrine.
Pancréatose Idon.	Sel de Hunt.
Pancrébile.	Sel d'Ewald.
Pangastrol.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Pangestyl Narty.	Selunio.
Papaine Trouette-Perret.	Sirop Roche au Thiocol.
Paradol.	Sodogastrol.
Passicarbone.	Sodolactine.
Peptalmine.	Spasmacol.
Peptalmine magnésinée.	Staphylase du Dr Doyen
Peptodiase.	Stomarol.
Peptogil A et L.	Stomaxine.
Peptonal.	Stoméol Vichy.
Peptone Vassal.	Stomobrol.
Peptosthénine Choay.	Stomophile.
Philogastrine.	Stemoxigène.
Phoscamine.	Sulfobyl.
Phosoforme.	Tablettes Perroud.
Physioscyamine.	Tachygastrine Ducloy.
Phytomarine.	Tapo.
Pluribiase.	Thiocitran Thévenot.
Polyferments Laleuf.	Thiocol Roche.
Polypeptine.	Tonax.
Polypeptonal.	Tridigestine Dalloz.
Poudre Bellada.	Vichy-purgatif
Poudre Paterson.	Vin de Chassaing.
Poudre Stom.	Vitamyl.
Propeptase.	Vitaminol.
Protiodyne.	Yaourtine.
Proxytol.	Zymatine.
Quassine Houdé.	Zymogastrine.

## ENTÉRITES AIGÜES — DIARRHÉES COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

Acolitol.	Alsodine.
Agarase.	Alucol Wander.
Alcalinose.	Alunozal.
Algosédine.	Amibiasine.
Allisatine Sandoz.	Amidal.
Aloysine.	Amiphène Carron.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### ENTÉRITES AIGÜES — DIARRHÉES COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

Ampho-Vaccin intestinal	Chloramine Freyssinge.
Ronchèse.	Chlorhydrol.
Amunine.	Chlorobacilline.
Amylodiastase Thépenier.	Chlorobyl.
Anaclasine Ranson.	Cholagol.
Anapeptone Vassal.	Citrocarbine.
Aniodol.	Citropaine du D <sup>r</sup> Fontal.
Anthracalcine.	Citropeptol.
Anthrarseptol.	Colloil Leisyn.
Antigénines.	Comprimés Galac.
Argion.	Coréine.
Arthrila.	Cryptargol Lumière.
Atural.	Digastrine.
Azym.	Dragécalcion.
Bacté-phages.	Dragées Elkin.
Bellafole Sandoz	Doloma.
Bensomine.	Dryco.
Benzytol.	Dyspeptine Hepp.
Biferment lactique stable.	Élixir Bonjean.
Bikréol.	Élixir Dussaud.
Binoxol.	Élixir eupeptique Tisy.
Bioentérase.	Élixir Godfrin.
Biolactyl Fournier.	Élixir Grez.
Bis-Ka-Ma.	Élixir Spark.
Bismuth (Crème de) du	Emgé Lumière.
D <sup>r</sup> Quesneville.	Entéragol.
Bismuth Desleaux.	Entériode.
Bismuth Tulasne.	Entéro-Antigènes.
Boldobyl.	Entérobil Dehaussy.
Boldoine Éparvier.	Entéro-carbine Lagoutte.
Bulgarine Thépenier.	Entérofagos.
Cachets Roche de Thiocol.	Entérohépatine.
Carbargyre.	Entéromucine.
Carbofixine Longuet.	Entérovaclidun.
Carbolactyl bilié.	Entéroxin Leclerc.
Carbolactyl simple.	Eugastrol.
Carbolin Midy.	Exonérol.
Carbomucil.	Facmine Longuet.
Carbonate de bismuth. —	Formocarbine.
Tablettes Perroud.	Formocarbos.
Carbonésie.	Gastéose.
Carbophos.	Gastrépatine.
Carbos.	Gastrocaol.
Carbosanis.	Gastrocarbhone.
Carypaine.	Gastroclean.
Casaldyl.	Gastrozymase.
Cephœmétine.	Gélo-pansements gastro-in-
Charbon Fraudin.	testinaux.
Charbon Tissot.	Gélotanin.
Chéralys (comprimés).	

## ENTÉRITES AIGÜES — DIARRHÉES COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

Génatropine.	Pancréatose Idon.
Glyco-Lactimase.	Pancrèhile.
Glyco-Thymoline.	Pangastrol.
Goménol.	Pangestyl Narty.
Gouttes Daynoc.	Panlabyt.
Hépatofomine.	Panstomase.
Hexafel.	Paradol.
Hopogan Bocquillon.	Paralactine Byla.
Infra-rouges.	Passicarbonate.
Iodure d'amidon Lumière.	Peptogil A et L.
Kaolinase.	Peptone Vassal.
Kerlactine.	Phosoforme.
Koumyl.	Plasma de Quinton.
Labyfax.	Polypeptine.
Lac-Ser.	Poudre Paterson.
Lactaris.	Poudre Stom.
Lacticholéine Tulivet.	Probios.
Lactimase.	Radiogastrol.
Lactobacilline.	Rectopanbiline.
Lactochol.	Régyl.
Lactolaxine Fydau.	Rhizotanin Chapotot.
Lacto-Sérum Lavril.	Sanluol.
Lait de magnésie Philipps.	Sel d'Ewald.
Lait Mont Blanc.	Septicémine Cortial.
Lansoyl.	Sirop Teyssèdre.
Larosan Roche.	Sodogastrol.
Levure B. 17.	Spasmalgine Roche.
Levuro-Maltine Déjardin.	Spasmalone.
Magistère de Bismuth Fouché.	Stomaxine.
Magnelax.	Stomobrol.
Marrubiase.	Stovarsol.
Médicoferment.	Stupho.
Mucicarbos.	Surparine.
Mucobismuthine.	Tablettes Perroud.
Mucyllium.	Tapo.
Néo-physio.	Thoroxyl.
Nertose.	Trilues.
Nigérine Vincent.	Triseptine.
Novolactol Daguin.	Ultra-Levure.
Ouataplasme du Dr Langlebert.	Uribiline.
Oxyléine.	Uvargol.
Ozothine.	Vaccin Ronchèse (ampho-vaccins).
Panbiline.	Vaccinothérapie atoxique
Pansolanée.	Cépède.
Pancarbo Hardy.	Yaourtine.
	Zymatine.

## ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

Acolitol.	Bulgarine Thépenier.
Adipolysine.	Calcium Sandoz.
Agarase.	Carbocalcoïdes,
Alcalinose.	Carbargyre.
Alcasodine.	Carbatropine.
Allisatine Sandoz.	Carbofixine Longuet.
Alucol Wander.	Carbolactyl simple.
Alunozal.	Carbolactyl bilié.
Amibiasine.	Carbolin Midy.
Amidal.	Carbonate de bismuth
Amphène Carron.	Perroud.
Ampho-vaccin intestinal	Carbonésie.
Ronchèse.	Carbophos.
Amylodiastase Thépenier.	Carbos.
Anacidase.	Carbosanis.
Anapeptone Vassal.	Casaldyl
Aniodol.	Céphœmétine.
Anthracalcine.	Charbon Fraudin.
Anthrseptol.	Charbon Tissot.
Antigénines.	Chéralys (comprimés).
Anxiol.	Chloramine Freyssinge.
Argion.	Chlorhydrol.
Arthrilax.	Chlorobacilline.
Atural.	Chlorobyl.
Babeurre « La Faye ».	Chloro-Calcion.
Bacté-phages.	Chlorumagène.
Bellafoline Sandoz.	Cholagol.
Benzocarbène.	Cholé cystine.
Bifermement lactique stable.	Choléine Camus.
Bikréol.	Choléine lactique.
Biléyl Fournier.	Choléo-Combretol boldinisé.
Biliase Raby.	Cholélise.
Biliboldo.	Choléokinase.
Bilifluine.	Choléo-lactol Daguin.
Biliogastrine Chevillon.	Citrocarbène.
Bilivaccin anticolibacil-	Citropaine du Dr Fontal.
laire.	Colitique.
Biolactyl Fournier.	Colloil Leisyn.
Bis-Ka-Ma.	Comprimés Galac.
Bismusodine.	Comprimés Vichy-État.
Bismuth (Crème de) du	Coprex.
Dr Quesneville.	Coréine.
Bismuth magnésienne	Crème de bismuth Chl. ma-
(Crème de) du Dr Ques-	gnésienne du Dr Quesne-
neville.	ville.
Bismuth Desleaux.	Crème de bismuth magné-
Bismuth Tulasne.	sienne du Dr Quesneville.
Bolcitol.	Crésentyl.
Boldobyl.	Cryptargol Lumière
Boléase Monal.	Delbiase.
Bolène.	

## ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

Diasés.	Infra-rouges.
Diasto-pepsine Richepin.	Iodure d'amidon Lumière.
Diathermie.	Jécol.
Digastrine.	Kaolinase.
Digestif Harvey.	Kerlactine.
Doloma.	Koumyl.
Dolophos.	Laby lax.
Dyspeptine Hepp.	Lac-Ser.
Élixir Godfrin.	Lactaris.
Élixir Grez.	Lacticholéine Tulivet.
Élixir Spark.	Lactimase.
Entériode.	Lactobacilline.
Entéro-fagos.	Lactochol.
Entéro-antigènes.	Lactolaxine Fyda.
Entéro-carbine Lagoutte.	Lacto-Sérum Lavril.
Entérohépatine.	Lait Mont-Blanc.
Entéro-mucine.	Laminarol.
Entéro-vaclydun.	Lansoyl.
Entéroxin.	Laxamalt.
Enzypan.	Laxatifs Miraton Châtel-Guyon.
Eugastrol.	Laxocholéine Tulivet.
Évolaxine.	Levure B. 17.
Exonérol.	Lientine Grémy.
Extrait de malt français Déjardin.	Lin-Tarin.
Facmine Longuet.	Listose Vicario.
Ferment pur de raisin	Lysaxins L. M. L.
Formine Adrian.	Maltea Moser cristallisée.
Formocarbine.	Malt pailleté.
Formocarbos.	Malt Wander ou Gloma.
Galabactéine.	Marrubiasé.
Gastrépatine.	Médico-ferment.
Gastroclean.	Microlyse.
Gélo-panséments gastro-intestinaux.	Mucicarbos.
Génatropine.	Mucobismuthine.
Génomorphine.	Mucyllium.
Glyco-lactimase.	Mucilaxine.
Glyco-Thymoline.	Néo-Collargol.
Goménol.	Néo-physio.
Gouttes Daynoc.	Nertose.
Granules Edges.	Nigérine Vincent.
Hépat-Byl.	Normacol.
Hépatodiase.	Normalarine.
Hépatofomine.	Novatropine.
Hépatozyl Caldo.	Novolactol Daguin.
Hexafel.	Oliricin Hardy.
Hopogan Bocquillon.	Opobyl.
Hormobiline.	Opochol.
Huile Crolas.	Orthogastrine.
Immunizols Grémy.	Oxyléine.
Immuno-vaccin.	Panbiline.
	Pancarbo Hardy.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

Pancréanne.	Spasmacol.
Panlabyl.	Spasmalgine Roche.
Pansolanée.	Stal-Kosal.
Panstomase.	Staphylase du Dr Doyen
Papavéryl.	Stomaxines.
Paradol.	Stomobrol.
Paralactine Byla.	Stomoxygène.
Paralaxol Tulivet.	Sulf-Y.
Parlax.	Tablettes Perroud.
Passicarbonate.	Tapo.
Peptalmine.	Taxol.
Peptalmine magnésée.	Térozone.
Peptogil A et L.	Tonikéine Chevretin.
Peptone Vassal.	Tréparsol.
Phytomarine.	Tridynol.
Pilules du Dr Debouzy.	Triluès.
Plasma de Quinton.	Triseptine.
Polyferments Laleuf.	Ultra-Levure.
Polypeptine.	Uribiline.
Poudre Paterson.	Uvargol.
Probios.	Vaccins Ronchèse (ampho- vaccins).
Progaster.	Vaccinothérapie atoxique
Protidyne dragées.	Cépède.
Proxylol.	Vasolaxine.
Réalphène Buisson.	Vichy-Purgatif.
Rectopanbiline.	Vulcase.
Romarène.	Wismuthane Vély.
Sel d'Ewald.	Yaourtine.
Selunic.	Zymatine.
Sodogastrol.	

### GASTRALGIES

Alcasodine.	Carbonésie.
Algosédine.	Cétrarose Gigon.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Charbon Tissot.
Arthrilax.	Chloridia.
Bellafoline Sandoz.	Citralin.
Bi-Citrol Marinier.	Citrofluyl.
Bikréol.	Citrosodine Longuet.
Biomucine.	Codérax.
Bismuth (Crème de) du Dr Quesneville.	Colloïd Leisyn.
Bismuth-Desleaux.	Complextraits.
Bismuth Tulasne.	Comprimés Vichy-État.
Calcomagnésie.	Condurango Gmet.
Calmaby.	Diasés.
Calmag-Na.	Diathermie.
Carbonate de Bismuth (ta- blettes Perroud).	Digastrine.
	Digestif Harvey.
	Doloma.
	Élixir Eupeptique Tisy.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### GASTRALGIES

Élixir Grez.	Paradol.
Eugastrol.	Pansolanée.
Eupeptique Monavon.	Peptone Vassal.
Florhépatine.	Physioscyamine.
Gastéose.	Polypeptine.
Gastiasé.	Poudre Danica.
Gastrocaol.	Poudre Paterson.
Gastronaldine.	Poudre Stom.
Gastropansement du Dr Zizine.	Radiogastrol.
Gastropeptyl.	Régyl.
Gastro-Sodine.	Salsanos.
Gastrozymase.	Sédatuline.
Gélogastrine Licardy.	Sédobrol Roche.
Génatropine.	Sédogastrine.
Gmet (Extraits).	Sel d'Ewald.
Hopogan.	Sel de Hunt.
Kaobrol.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Kaolinase.	Sodogastrol.
Lait de magnésie Phillips.	Spasmacol.
Magistère de Bismuth Fouché.	Spasmalone.
Mésogastrine.	Stal-Kosal.
Mucobismuthine.	Stomaxines.
Nésal.	Stoméol Vichy.
Orthogastrine.	Stomobrol.
Pancarbo Hardy.	Stomophile.
Pancréatose Idon.	Tablettes Perroud.
	Wismuthane Vély.
	Zymatine.

### GASTRO-ENTÉRITES DE L'ENFANCE DIARRHÉES INFANTILES

Acolitol.	Bismuth (Crème de) du Dr Quesneville.
Alunozal.	Bismuth Desleaux.
Amibiasine.	Bismuth Tulasne.
Amidal.	Blédine Jacquemaître.
Amiphène.	Bulgarine Thépenier.
Ampho-vaccin intestinal Ronchèse.	Carbolactyl simple.
Amylodiastase Thépenier.	Carbos.
Aniodol.	Calcoléol.
Antigénines.	Carypaine.
Arthrilaix.	Casaldyl.
Atural.	Céréales Bébé Favrichon.
Azym.	Chlormagnésium.
Babeurre La Faye.	Chloro-magnésion.
Babeurre Nutricia.	Citrosodine Longuet.
Bacillactine Nutricia.	Comprimés Galac.
Bacté-phages.	Cryptargol Lumière.
Bi-citrol.	Diasés.
Bifermement lactique stable.	Diasto-pepsine Richepin.
Bioentérase.	Dryco.
Biolactyl Fournier.	Dyspeptine Hepp.
	Élixir Bonjean.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### GASTRO-ENTÉRITES DE L'ENFANCE DIARRHÉES INFANTILES

Elixir Grez.	Malléa Moser cristallisée.
Entériode.	Maltosan.
Entéro-Antigènes.	Marrubiase.
Entérofagos.	Néo-physio.
Entérolactine.	Novolactol Daguin.
Entéro-mucine.	Nutro.
Entéro-vaclydun.	Oxyléine.
Entéroxin Leclerc.	Panbiline.
Fantyl Manseau.	Papaine Trouette-Perret.
Formocarbine.	Paralactine Byla.
Gastrozymase.	Peptogil A et L.
Gélogastrine Licardy.	Phosphate Pinard.
Gélotanin.	Peptone Vassal.
Glyco-lactimase.	Plasma de Quinton.
Gmet (Extraits).	Poudre Paterson.
Goménol.	Probios.
Gouttes Daynoc.	Proxytol.
Hopogan Bocquillon.	Rectopanbiline.
Kymosine.	Sel de Hunt.
Lab Lacto Ferment.	Sodolactine.
Lac-Ser.	Stupho.
Lactaris.	Suppositoires Pyrax.
Lacticholéine Tulivet.	Tachygastrine.
Lactimase.	Thoroxyl.
Lactochol.	Triluès.
Lacto-Sérum Lavril.	Triseptine.
Lait C. G.	Ultra-Levure.
Lait Mont-Blanc.	Uvargol.
Larosan Roche.	Yaourtine.
Laxoseptine Girard.	Zymatine Lescène.
Leucoseptyl.	Zymogastrine Kervan.
Levure B. 17.	

### HÉMATÉMÈSE — MELÆNA

(Voir: Appareil circulatoire: Hémostatiques).

### HYPERCHLORHYDRIE

Alcalinose.	Bi-Citrol Marinier.
Alcasodine.	Biomucine.
Algosédine.	Bis-Ka-Ma.
Alsodine.	Bismusodine.
Alucol Wander.	Bismuth (Crème de) du D <sup>r</sup> Quesneville.
Anacidase.	Bismuth-Desleaux.
Anthracalcine.	Bismuth-Tulasne.
Antinéase.	Bradygastrine Ducloy.
Azym.	Calcomagnésie.
Benzocarbine.	



## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### HYPERCHLORHYDRIE

Calmag-Na.	Magistère de Bismuth Fouché.
Carbonate de bismuth.	Mésogastrine.
Carbonésie.	Muco-bismuthine.
Carbophos.	Neutralcaol.
Carbos.	Nigerine.
Carbosanis.	Novatropine.
Charbon Fraudin.	Orthogastrine.
Charbon Tissot.	Panbiline.
Chéralys (comprimés).	Pancarbo Hardy.
Citropaine du D <sup>r</sup> Fontal.	Pangastrol.
Citrophos.	Pangestyl Narty.
Citrosodine Longuet.	Passicarbonate.
Colloil Leisyn.	Phillogastrine.
Comprimés Vichy-État.	Phylla Dyn.
Digestif Harvey.	Physioscyamine.
Digestonic.	Polypeptine.
Doloma.	Poudre Danica.
Dolophos.	Poudre Paterson.
Gastrépatine.	Poudre Stom.
Gastrocaol.	Propeptase.
Gastrocalcine.	Radiogastrol.
Gastrocarbone.	Régyl.
Gastroclean.	Salsanos.
Gastronaldine.	Sédogastrine.
Gastropansement du D <sup>r</sup> Zizine.	Sel d'Ewald.
Gastropeptyl.	Sel de Hunt.
Gastro-Sodine.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Gastrozymase.	Sodogastrol.
Gélogastrine Licardy.	Sodolactine.
Gélo-pansements gastro-intestinaux.	Stal-Kosai.
Génatropine.	Stomaxines.
Hépatosodine.	Stoméol Vichy.
Hopogan.	Stomobrol.
Ionyl.	Stomophile.
Isotonyl Bouret.	Tablettes Perroud.
Kaobrol.	Wismuthane Vély.
Kaolinase.	Zymatine Lescène.
Lait de magnésie Phillips.	Zymogastrine Kervé.

### HYPOCHLORHYDRIE — HYPOPEPSIE ATONIE GASTRIQUE

Acécoline.	Bi-Citrol Marinier.
Agozymase.	BiolaX
Aicalinose.	Boldoïne Éparvier.
Allisatine Sandoz.	Boldo-Verne.
Alsodine.	Calcomagnésie.
Appetyl.	Carbocitrol.
Azym.	Chlorhydrol.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### HYPOCHLORHYDRIE — HYPOPEPSIE ATONIE GASTRIQUE

Chloridia.	Orthogénol.
Digastrine.	Pancréastase Defresne granulée.
Dragées Elkin.	Pangestyl Narty.
Dyspeptine Hepp.	Panstomase.
Élixir Bonjean.	Papaine Trouette-Perret.
Élixir Ducro.	Peptodiase.
Élixir du D <sup>r</sup> Mialhe.	Peptosthénine Choay.
Élixir Dussaud.	Persodine Lumière.
Élixir Grez.	Phosoforme.
Élixir Spark.	Phylla Dynn.
Enzypan.	Pluribiase.
Eupeptique Monavon.	Polyferments.
Gastricine du D <sup>r</sup> E. Duhourcau.	Propeptase.
Gastrocalcine.	Quassine Houdé.
Gastronaldine.	Sel d'Ewald.
Gastrozymase.	Sel de Hunt.
Génésérine.	Selunic.
Hépatosodine.	Sodolactine.
Ionyl.	Stomarol.
Isotonyl Bouret.	Stomaxines.
Ispaghul.	Strychnal Longuet.
Laby lax.	Sulfobyl.
Logaphos.	Tachygastrine Ducloy.
Mésogastrine.	Vicéliase.
Œnophos.	Vin de Chassaing.

### ICTÈRES — CHOLÉMIE

Adipolysine.	Boldoine Éparvier.
Adrénoïdes Béral.	Boldorhéine.
Agarase.	Boldo Verne.
Agobyl.	Boléase Monal.
Agocholone.	Bolène.
Alcasodine.	Bucmine.
Anaclasine.	Bulgarine.
Anégrine.	Cachets Pachaut.
Arthrilax.	Calinaby.
Arvensyl.	Canol.
Babeurre « La Faye ».	Caparlem.
Bensamine.	Capsules Bardet.
Bi-Citrol Marinier.	Carbolactyl simple.
Biléyl Fournier.	Carbolactyl bilié.
Biliase Raby.	Cascarine Leprince.
Biliboldo.	Catalyl Mg.
Bilifluine.	Chlormagnésium Fisch.
Biliogastrine Chevillon.	Chloro-magnésion.
Bolcitol.	Cholagol.
Boldine Houdé.	Cholécystine.
Boldobyl.	Choléfluine.
Boldo Gmet.	Choléline Camus.
Boldolactic Lagoutte.	Choléline lactique.

## ICTÈRES — CHOLÉMIE

Choléo-Combretol boldinisé.	Laxocholéine Tulivet.
Choléokinase.	Magnésium Hardy.
Choléo-Lactol Daguin.	Magnésio-tubes Robinet.
Choléopeptine.	Magsalyl Mg.
Chophytol Rosa.	Malt pailleté.
Citropaine du Dr Fontal.	Movebil.
Comprimés Vichy-État.	Normalarine.
Crinocardine.	Oléocidase.
Crypthiol.	Oléoformine Corbière.
Curoraisin.	Olivéol.
Cynhépatil.	Oliricin Hardy.
Dépuriodé du Dr Roger Weber.	Opobyl.
Endopancrine.	Opochol.
Entérobyl Dehaussy.	Opothérapie Bouty.
Entérolactine.	Opothérapie du Dr Fraysse.
Euglyma.	Orthogénol.
Euonymine Paul Thibault.	Panbiline.
Evobiline.	Pancrébile.
Félamine Sandoz.	Pangestyl Narty.
Florhépatine.	Paradol.
Fluobyl.	Passicarbone.
Fluocholine.	Pilules du Dr Debouzy.
Fluokol.	Précikase.
Formocitrine.	Progaster.
Fosfomagnyl.	Prométhine.
Gambéol.	Pyrelaine Collas.
Gastrépatine.	Pyurol.
Gastro-Sodine.	Radiotropine.
Glyco-lactimase.	Rectopanbiline.
Gouttes Magalo.	RévuIsoplasme.
Hépatomanganol.	Romarantyl Trouette-Perret.
Héparbiline.	Romarène.
Hépatie Efa du Dr Leca- cheux.	Saint-Aré.
Hépatobyl.	Salvébyl.
Hépatodiase.	Selunic.
Hépatiformine.	Sodothiol.
Hépatosodine.	Thiocitran.
Hépatozyl Caldo.	Tonicalcine.
Hormobiline.	Toniveinine.
Huile Crolas.	Triseptine.
Hyposulfène.	Ulcéosine.
Ispaghul.	Uribiline.
Kinéchol.	Urométhyl.
Lac-Ser.	Vichy-Purgatif.
Lacticholéine Tulivet.	Vulcase.
Lacto-Sérum Lavril.	Yaourtine.
	Zymatine Lescène.

## INFECTIONS INTESTINALES

Acolitol.	Galabactéine.
Amibiasine.	Gambéol.
Amidal.	Gastéose.
Amiphène Carron.	Gastiase.
Ampho-Vaccin intestinal	Gastrocarbone.
Ronchèse.	Gastroclean.
Anacidase.	Glyco-Lactimase.
Aniodol.	Goménol.
Anthracalcine.	Gouttes Halogènes du
Argion.	D <sup>r</sup> Bern.
Arthrila.	Hépatofomine.
Arvensyl.	Hopogan Bocquillon.
Bensamine.	Immunizols Grémy.
Bifermant lactique stable.	Iodure d'amidon Lumière.
Binoxol.	Kerlactine.
Bismuth Desleaux.	Koumyl.
Bismuth (crème de) du	Labyfax.
D <sup>r</sup> Quesneville.	Lac-Ser.
Bismuth Tulasne.	Lactaris.
Boldoine Éparvier.	Lacticholéine Tulivet.
Bolène.	Lactimase.
Cachets Spévin.	Lactobacilline.
Calmaby.	Lactochol.
Carbofixine Longuet.	Lacto-Sérum Lavril.
Carbolactyl bilié.	Laminarol.
Carbargyre.	Laxopeptine Girard.
Carbonate de bismuth.	Leucoseptyl.
Carbophos.	Levurol Maltine Déjardin.
Casaldyl.	Microlyse.
Céthocal du D <sup>r</sup> Lemay.	Mucicarbos.
Charbon Fraudin.	Néo-Physio.
Charbon Tissot.	Nigérine Vincent.
Chloramine Freyssingé.	Oléo-Mel.
Chlorobacilline.	Oxyléine.
Chlorobyl.	Ozothine.
Cholagol.	Panbiline.
Choléol-Lactol Daguin.	Pancarbo Hardy.
Citrocarbine.	Pancrébile.
Colitique.	Pangestyl Narty.
Colloil Leisyn.	Panlaby.
Comprimés Galac.	Passicarbone.
Crésentyl.	Poudre Paterson.
Cryptargol Lumière.	Probios.
Dias.	Progaster.
Digastrine.	Rectopanbiline.
Emgé Lumière.	Salvébyl.
Entéro-Antigènes.	Sodogastról.
Entérofagos.	Stomaxines.
Entéro-vaclydun.	Stomoxygène.
Entéroxin Leclerc.	Sulfobyl.
Facmine Longuet.	Sulfo-thiorine.
Formocarbine.	Sulf-Y.
Formocarbos.	Tablettes Perroud.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### INFECTIONS INTESTINALES

Terpoxyl interne.  
Triseptine.  
Ultraformine.  
Ultra-Levure.  
Uraseptine Rogier.  
Ur-Clar.  
Uribiline.  
Urisanine.  
Urol.  
Urométine Lambiotte.

Urosalyl. — Urosalyl méthylé.  
Uvargol.  
Vaccins Ronchèse (Ampho-vaccins).  
Végétol.  
Wismuthane Vély.  
Yaourtine.  
Zymatine.

### INSUFFISANCE HÉPATIQUE

Adipolysine.  
Agarase.  
Agobyl.  
Agocholine.  
Alcasodine.  
Ampho-vaccin intestinal  
Ronchèse.  
Anaclasine Ranson.  
Anégrine.  
Arvensyl.  
Babeurre « La Faye ».  
Bi-Citrol Marinier.  
Bikréol.  
Biléyl Fournier.  
Biliase Raby.  
Biliboldo.  
Bilifluine.  
Billogastrine Chevillon.  
Biolax.  
Boldine Houdé.  
Boldo Gmet.  
Boldobyl.  
Boldoïne Éparvier.  
Boldorhéine.  
Boldo Verne.  
Boléase Monal.  
Bolène.  
Bucmine.  
Cachets Pachaut.  
Calcozymase.  
Canol.  
Caparlem.  
Capsules Bardet.  
Carbocitrol.  
Carbolactyl bilié.  
Carbolactyl simple.  
Cascarine Leprince.  
Catalyl Mg.  
Chéralys (comprimés).  
Chlorhydrol

Chlormagnésium Fisch.  
Chloro-Magnésion.  
Chlorumagène.  
Cholagol.  
Cholécystine.  
Choléfluine.  
Choléine Camus.  
Choléine lactique.  
Choléo-Combretol boldi-nisé.  
Choléokinase.  
Choléo-Lactol Daguin.  
Cholepan Longuet.  
Cholergine.  
Chophytol Rosa.  
Citralin.  
Citrocarbène.  
Citrofluyl.  
Citropaine du Dr Fontal.  
Citrophos.  
Citrosodine Longuet.  
Comprimés Vichy-État.  
Crinocardine.  
Cryphtiol.  
Cynhépatil.  
Diasto-pepsine Richepin.  
Diurène.  
Dolophos.  
Élixir Spark.  
Elkin (dragées, granules).  
Emgé Lumière.  
Entéro-antigènes.  
Enzypan.  
Euglyna.  
Euonymine Paul Thibault.  
Euphoryl.  
Evobiline.  
Évonyl.  
Félamine Sandoz.  
Florhépatine.

## INSUFFISANCE HÉPATIQUE

Fluobyl.	Oléoformine Corbière.
Fluocholine.	Olricin Hardy.
Fluokol.	Olivéol.
Formocarbos.	Opobyl.
Formocitrine.	Opochol.
Fosfomagnyl.	Opothérapie Bouty.
Gambéol.	Opothérapie Carrion.
Gastéose.	Opothérapie Choay.
Gastiase.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Fraysse.
Gastrépatine.	Orthogastrine.
Gastroclean.	Orthogénol.
Gastro-Sodine.	Panbiline.
Glyco-Lactimase.	Pancréatose Idon.
Gouttes Halogènes du D <sup>r</sup> Bern.	Pancrébile.
Gouttes Magalo.	Pancrinol du D <sup>r</sup> Debat.
Grains de Vals.	Pangestyl Narty.
Grains d'Évian.	Panlabyl.
Granules Edges.	Panstomase.
Héparbiline.	Paradol.
Hépto-Byl.	Peptalmine magnésinée.
Hépatodiase.	Peptogil A et L.
Héptoformine.	Peptosthénine Choay.
Hépto manganol.	Phosoforme.
Héptosodine.	Pilules du D <sup>r</sup> Debouzy.
Héptozyll Caldo.	Plasma de Quinton.
Hépatrol.	Polyferments Laleuf.
Hépatrol injectable	Polypeptonal.
Hexafel.	Précikase.
Hormobiline.	Progaster.
Jécol.	Prométhine.
Kénol.	Protidyne dragées.
Kinéchol.	Proxytol.
Labyllax.	Pyurol.
Lac-Ser.	Rectopanbiline.
Lacticholéine Tulivet.	Romarantyl Trouette-Péret.
Lactobyl.	Romarène.
Lactochol.	Saint-Aré.
Lactolaxine Fyda.	Salsanos.
Lacto-Sérum Lavril.	Salvé.
Lait de magnésie Phillips.	Salvébyl.
Laminarol.	Sanoquinol.
Laxatifs Miraton Châtel-Guyon.	Sel hépatique U. N. Arquevaux.
Laxocholéine Tulivet.	Selunio.
Lénicure Vichy.	Sodothiol.
Levure fraîche Mycéta.	Sonamel.
Magnésium Hardy.	Spléno-magnésium.
Magnésio-tubes Robinet.	Stomaxines.
Magnol Churchill.	Stomoxygène.
Magsalyl Mg.	Sulfobyl.
Movebil.	Tapo.
Néotrophène.	Thiocitrane Thévenot.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### INSUFFISANCE HÉPATIQUE

Tonicalcine.	Vaccins Ronchèse (am-
Tonivéinine.	pho-vaccins).
Triseptine.	Vichy-Purgatif.
Ulcéosine.	Vulcase.
Uribiline.	Yaourtine.
Urol.	Zymatine Lesçène.
Urométhyl.	Zymogastrine Kervan.

### INSUFFISANCE PANCRÉATIQUE

(Voir : *Maladies de la nutrition : Diabète.*)

Bikréol.	Elkin (dragées, granulés).
Carbolactyl bilité.	Enzypan.
Carbolactyl simple.	Gambéol.
Calcozymase.	Opothérapie Carrion.
Choléokinase.	Opothérapie Choay.
Choléo-Lactol Daguin.	Pancrébile.
Cholepan Longuet.	Peptosthénine Choay.
Diasto-Pepsine Richepin.	Polyferments Laleuf.
Élixir Dussaud.	

### INTOXICATIONS

Acolitol.	Cynhépatil.
Alcasodine.	Delcaine Roques.
Ampho-vaccins Ronchèse	Dépuriodé du D <sup>r</sup> Weber.
Anaclasine Ranson.	Digastrine.
Aniodol.	Elkin (dragées, granulés)
Arvensyl.	Entéro-antigènes.
Azym.	Entérocabine Lagoutte.
Biferment lactique stable.	Entérolactine.
Biolactyl Fournier.	Entéro-vaclydun.
Boldobyl.	Ephédrine naturelle Béral.
Biolax.	Euphoryl.
Boldo Gmet.	Evobiline.
Cachets Spévin.	Fluokol.
Canol.	Formocarbine.
Carbargyre.	Gambéol.
Carboxixine Longuet.	Gélo-Pansements gastro-
Carbolactyl bilité.	intestinaux.
Carbolactyl simple.	Genhyoscyamine.
Carbonésie.	Génomorphine.
Carbos.	Genostrychine.
Carbosanis.	Hopogan.
Charbon Fraudin.	Hyposulfène.
Charbon Tissot.	Lichénose Ducloy.
Cholagol.	Marrubiase.
Choléfluine.	Métaformine.
Chophytol Rosa.	Movébil.
Colloïl Lelsyn.	Naiodine.
Collubleu.	Neurinase.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### INTOXICATIONS

Nertose.	Régyl.
Nigérine Vincent.	Rhizotanin Chapotot.
Novolactol Daguin.	Rhocya Dyn.
Opoferrine Vitamlnée.	Salvébyl.
Orthogastrine.	Sirop minéral sulfureux
Oxy-injecteur du Dr Fla-	Crosnier.
lip.	Somnicones Béral.
Oxyléine.	Somnothyrl.
Panbiline.	Soporalose.
Pancarbo Hardy.	Strychnotonine.
Panstomase.	Sulfothiorine.
Passicarbonate.	Triseptine.
Précikase.	Urol.
Radiogastrol.	Urométhyl.
Rectopanbiline.	Yaourtine.

### LITHIASÉ BILIAIRE — COLIQUES HÉPATIQUES

Acatar.	Chlormagnésium Fisch.
Adipolysine.	Chloro-magnésion.
Agocholine.	Cholagol.
Algosédine.	Cholécystine.
Ampoules de Pantopon	Choléfluine.
Roche.	Choléine Camus.
Ampoules de Spasmalgine	Choléine lactique.
Roche.	Choléo-Combretol boldi-
Anaclasine.	nisé.
Anthrasedtol.	Choléopeptine.
Baldisédan.	Chophytol Rosa.
Baume Adol.	Cibalgine.
Baume Aroma.	Citralin.
Baume Bengué.	Comprimés Vichy-État.
Bensamine.	Combrosmol.
Benzylol.	Crypthiol.
Biléyl Fournier.	Cynhépatil.
Biliase Raby.	Dialyl.
Biliboldo.	Diasclérol.
Bilifluine.	Diathermie.
Biliogastrine Chevallon.	Élixir Spark.
Boldine Houdé.	Entérobil Dehaussy.
Boldo Gmet.	Euonymine Paul Thibault.
Boldobyl.	Euphytol
Boldoïne Éparvier.	Evobiline.
Boldorhéine.	Évonyl.
Boldo Verne.	Félamine Sandoz.
Boléase Monal.	Florhépatine.
Bucmine.	Fluobyl.
Canol.	Fluokol.
Caparlem.	Formocarbine.
Capsules Bardet.	Formocitrine.
Capsules Bruel.	Génomorphine.
Carbolactyl bilie.	Héparbiline.



## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### LITHIASÉ BILIAIRE — COLIQUES HÉPATIQUES

Hépatie Efa du D <sup>r</sup> Leca- cheux.	Rectopanbilinc.
Hépatiformine.	RévuIsoplasme.
Hépatomanganol.	Rhodazil.
Hépatosodine.	Romarantyl.
Hépatozyl Caldo.	Romarène.
Hexafel.	Saint-Aré.
Hexotal.	Salsanos.
Hyposulfène.	Salvébyl.
Infra-rouges.	Sédatuline Christiaens.
Kinéchol.	Sel hépatique U. N. Arque- vaux.
LabyIax.	Sel de Lithine effervescent.
Lacto-Sérum Lavril.	Seotral Leisyn.
Laxocholéine Tulivet.	Sodothiol.
Lénicure Vichy.	Spasmalgine Roche.
Lysarthrol.	Spasmalone.
Mésotiline.	Spasmaxine.
Oléocidase.	Spicanol.
Oléoformine Corbière.	SuppooIgos Lagoutte.
Olivéol.	Térozone.
Opobyl.	Thiocitran Thévenot.
Opochol.	Triseptine.
Opothérapie Bouty.	Uralysol.
Orthogénol.	Uraseptine Rogier.
Panbilinc.	Urobuccol Malmanche.
Pancrébille.	Uroformine Gobey.
Pangestyl Narty.	Urométhyl.
Papavéryl.	Urométine Lambiotte.
Paradol.	Urophile.
Phosoforme.	Urosalyl. — Urosalyl mé- thylé.
Pilules du D <sup>r</sup> Debouzy.	Urozéa.
Pipérazine Midy	Véralgine.
Potion Adol.	Vulcase.
Prométhine.	
PyréIaine Collas.	

### RECTITES — FISTULES ANALES FISSURES ANALES — PRURIT ANAL

Acésine Guillaumin.	Glyco-Thymoline.
Adrépatine.	Goménol.
Antipiol.	Ektogan.
Anusol Mialhe.	Hémorroïdine Pommade.
Baume Suelta.	Hémorroïdine supposi- toires.
Cratægus Gmet.	Hirudinase.
Crayons Antifissure Do- mergue.	Iodex.
Créosoforme Lambiotte.	Lynévol.
Dermodulcis Lagoutte.	Mictasol.
Dermo-Stalys du D <sup>r</sup> Wa- gon.	Mucyllium.
Diathermie.	Néo-Collargol.
Entéro-Antigènes.	Nestosyl.
Eurectol.	Oléo Mel.
	Onction Leisyn.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### RECTITES — FISTULES ANALES FISSURES ANALES — PRURIT ANAL

Percaïnal Ciba.	Suppo-Gynals.
Pommade au Nestosyl.	Suppositoires au Nestosyl.
Pommade Logeais.	Suppositoires Logeais.
Postérisan.	Térébine.
Pyo-Amphogel Ronchèse.	Terpoxyl externe.
Rectagine.	Triseptine.
Rhagadine Bracquemond.	Végétol.
Salantale.	

### SATURNISME — COLIQUES DE PLOMB

Acécoline.	Opoferrine vitaminée.
Azufrol.	Panstomase.
Collubleu.	Rhocya Dyn.
Dépuriode du D <sup>r</sup> Roger Weber.	Sulfureux Pouillet.
	Sulphium.

### STÉNOSES DU PYLORE

Alcalinose.	Digastrine.
Alsodine.	Elixir Grez.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Gastrocarbonyl.
Benzylol.	Gastropansement du D <sup>r</sup> Zizine.
Bismusodine.	Génatropine.
Bismuth (Crème de) du D <sup>r</sup> Quesneville.	Gastropeptyl.
Bismuth-Desleaux.	Papavéryl.
Bismuth Tulasne.	Peptone Vassal.
Bradigastrine Ducloy.	Poudre Paterson.
Calmag-Na.	Sel d'Ewald.
Capsules Bruel.	Sodolactine.
Carbonésie.	Stal-Kosal.
Colloil Leisyn.	Wismuthane Vély.
	Zymatine.

### STOMATITES — GINGIVITES — MUGUET

(Voir : *Maladies Parasitaires.*)

Ampho-Tablettes Ronchèse.	Glyco-M.
Bacillactine Nutricia.	Glyco-Thymoline.
Bulgarine Thépenier.	Gosiérine Dalloz.
Colarsénol.	Gouttes Daynoc.
Collubleu.	Inolène.
Collutoire V. F. Doumer.	Mésosome.
Fluosalyl Beaugourdon.	Néol.
Galform Lambiotte.	Nestosyl.
Galliodine.	Pastilles M. B. G.
	Pharyngaseptyl.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### STOMATITES — GINGIVITES — MUQUET

(Voir : *Maladies Parasitaires.*)

Probios.  
Pulvéol.  
Salychlore Laville.  
Sanogyl.  
Sanoram.  
Saubarsinol  
Sephydine.  
Septolan.

Solution huileuse au Nes-  
tosyl.  
Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.  
Staphylo-coccine Fraquet.  
Stovaine.  
Terpoxyl externe.  
Tripyoryl.  
Ultra-violets.

### TUBERCULOSE INTESTINALE

Acatar.  
Acolitol.  
Alucol.  
Alunozal.  
Amibiasine.  
Amidal.  
Amiphène Carron.  
Bulgarine Thépenier.  
Carbolactyl simple.  
Carbophos.  
Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle  
Créoformine.  
Créositoires.  
Dragécalcion.  
Elixir Grez.  
Formocarbine  
Gmet (Extraits).

Goménol.  
Hormocline.  
Kerlactine.  
Lait Mont Blanc.  
Muronos du D<sup>r</sup> Robert  
Jacques.  
Ozobiase.  
Ozothine.  
Peptone Vassal.  
Phymo-stéryl Leisyn.  
Pilules V. E. Doumer.  
Stupho.  
Sulf-Y.  
Triseptine.  
Ultra-violet.  
Zimbyl.

### ULCÈRES DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM

Alcalinose.  
Alucol Wander.  
Angtoxyl  
Anthracalcine.  
Antinéase.  
Biomucine.  
Bis-Ka-Ma.  
Bismusodine.  
Bismuth Desleaux.  
Bismuth (Crème de) du  
D<sup>r</sup> Quesneville.  
Bismuth (Crème de) chl-  
magnésienne du D<sup>r</sup> Ques-  
neville.  
Bismuth Tulasne.  
Bradylgastrine Ducloy.  
Calmaby.  
Calmag-Na  
Carbonate de Bismuth. —

Tablettes Perroud.  
Carbosanis.  
Chéralys (Comprimés).  
Colloil Leisyn.  
Condurango Gmet.  
Digestonic.  
Doloma.  
Eugastrol.  
Gastrocaol  
Gastronaldine.  
Gastropansement du D<sup>r</sup> Zi-  
zine.  
Gélogastrine Licardy.  
Génomorphine.  
Hémopectal.  
Kaolinase.  
Larosán Roche.  
Mucobismuthine.  
Neutralcaol.

## II. — APPAREIL DIGESTIF. T. S.

### ULCÈRES DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM

Nigérine.	Sel de Hunt.
Oxyléine.	Sodolactine.
Pangastrol.	Stal-Kosal.
Passicarbonate.	Stomaxines.
Peptone Vassal	Stoméol.
Phytomarine	Stomobrol.
Poudre Danica.	Stomophile.
Poudre Paterson.	Surparine.
Radiogastrol.	Tablettes Perroud.
Scuroforme.	Wismuthane Vély.
Sédogastrine.	Zymatine Lescène.
Sel d'Ewald.	

### VOMISSEMENTS

Alcasodine.	Jecofluyt Hardy.
Atural.	Kinéchol.
Azym.	Lait Mont Blanc.
Bi-Citrol Marinier.	Laxopeptine Girard.
Biophyllactine M. G.	Lichénose Ducloy.
Bismuth Desleaux.	Paradol.
Bismuth Tulasne.	Paratyrone.
Bradygastrine Ducloy.	Peptogil A. et L.
Carypaine.	Phosoforme.
Cétrarose Gigon.	Plasma de Quinton.
Choléopeptine.	Poudre Paterson.
Citrofluyt.	Régyl.
Citropaine du D <sup>r</sup> Fontal.	Sel d'Ewald.
Citrophos.	Sel de Hunt.
Citrosodine Longuet.	Sirop Teyssède.
Colloil Leisyn.	Sodolactine.
Digestonic.	Somnicones Béral.
Dryco.	Surparine.
Élixir Bonjean.	Vin « Lux » Gaillac mous-
Élixir Eupeptique Tisy.	seux.
Élixir Grez.	Vin Raimoa Tonic.
Euphoryl.	Zymatine Lescène.
Génatropine.	Zymogastrine Kervan.

### ALCALINS

Anthraseptol.	Poudre Danica.
Comprimé, Vichy-État.	Sélaumon.
Doloma.	Zymatine.

### ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES

Airoglyce.	Arlstargol.
Anexol.	Aseptopoudre.
Aniodol.	Aseptone.
Argycuprol.	Aseptovules.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

#### ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES

Boricine Meissonnier.	Métacuprol.
Borostyrol Schlatter	Métricine.
Céthocal du D <sup>r</sup> Lemay.	Métritols.
Chlocci.	Microlyse.
Chloraseptine Optima.	Natrosyl.
Clonazone Daufresne.	Néo-Collargol.
Coaltar Saponiné Le Bœuf.	Néol.
Comprimés d'Alibour.	Néothorium Millot.
Comprimés Guillaumin.	Noviode.
Comprimés vaginaux Leisyn.	Oléovules.
Créosoforme Lambiotte.	Ovules Chaumel.
Cryptargol Lumière.	Ovules au terpoxy.
Dismine Favrot.	Poudre Chaumel.
Ektogan Bocquillon.	Salubrine Phénix.
Eranol.	Sanoformine.
Eugaline.	Savons Mollard.
Évine.	Séphydine.
Glucolactol.	Septolan.
Glyco M.	Sérébé du D <sup>r</sup> Blaizot.
Glyco-Thymoline.	Sétirtem comprimés.
Gobérol.	Spyrolides.
Goménol.	Sulfarsénol.
Gynéco-vaclydun.	Sulfureux Pouillet.
Hydralin.	Sunoxol.
Inolène.	Térébine.
Iodex.	Terpoxy externe.
Iodosan.	Tochlorine.
Lactoferment Lavril.	Uvargol.
Lacto-Sérum Lavril.	Végétol externe.
Lacpinine.	Vioforme Ciba (et Ovules au Vioforme).
Laurénol médicinal.	Vitargyl.
Lusoforme.	
Mésosome.	

#### ANTISEPTIQUES URINAIRES EXTERNES

Adrépatine.	Gonacrine.
Airoglyce.	Gynéco-vaclydun.
Anexol.	Hermophényl Lumière.
Aniodol.	Iodex.
Argycuprol.	Lacto-Sérum Lavril.
Asepto-poudre.	Microlyse.
Bacté-phages.	Oléovules.
Boricine Meissonnier.	Rethragine.
Chlocci.	Santal Monal.
Clonazone Daufresne.	Séphydine.
Comprimés Guillaumin.	Sérébé du D <sup>r</sup> Blaizot.
Cryptargol Lumière.	Terpoxy externe.
Évine.	Tochlorine.
Flavurof.	Végétol externe.
Glyco-Thymoline.	Vioforme.
Goménol.	Vitargyl.

### **III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.**

#### **ANTISEPTIQUES URINAIRES INTERNES**

Absuric..	Lacto-Sérum Lavril.
Acatar.	Lithino-formine.
Amibiasine.	Métaformine.
Ampho-vaccin urinaire Ron- chèse.	Microlyse.
Aniodol	Mictasol.
Anthracalcine.	Mictophile Richer.
Anthraseptol.	Mictoseptol.
Antigonol.	Mictualine.
Argion.	Oxyléine.
Arhéol.	Paradol.
Aseptone.	Phaguryl.
Bacté-phages.	Pilules V. E. Doumer.
Baldisedan.	Progone.
Bensamine.	Pyri-Pyridium.
Benzobromine.	Pyurol.
Biliogastrine Chevillon.	Radiotropine.
Binoxol.	Santal Midy.
Blennopiat.	Solvuric.
Bucmine.	Sulfarsénol.
Canol.	Térébine.
Caparlem.	Terpine Gonnon.
Capsules Bardet.	Terpine granulée Baron.
Chloraseptine Optima.	Terpoxyl interne.
Cynurol Rosa.	Triseptine.
Dismine Favrot.	Ultraformine.
Disolurane Vély.	Uraseptine Rogier.
Diurocystine.	Ur-Clar.
Élatine Bouin.	Uribiline.
Elgine Julien.	Uriclarine.
Eumictine.	Urisanine.
Fokiényl.	Urobuccol Malmanche.
Formocarbine.	Uroformine Gobey.
Formocitrine.	Uroiodine.
Fosyls Carron.	Urol.
Goménol.	Urométhyl.
Hépatiformine.	Urométine Lambiotte.
Héxorcène.	Uromil.
Hexotal.	Urophile.
Iodhema.	Urosalyl-Urosalyl méthylé.
Kaviase.	Urosan Dufayard.
	Uvargol.

#### **BALSAMIQUES**

Acatar.	Capsules Bardet.
Antigonol.	Eumictine.
Arhéol.	Fokiényl.
Baldisedan.	Gmet (Extraits).
Blagny (gouttes et dragées).	Goménol.
Blennopiat	Kaviase.
Boldo Gmet.	Progone.
Bucmine.	Santal Midy.
Caparlem.	Térébine.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

#### BALSAMIQUES

Terpine Gonnon.  
Terpine granulée Baron.  
Terpoxyl interne.

Urisanine.  
Urol.

#### DÉCONGESTIFS PELVIENS

Adrépatine.  
Aesculase.  
Agomensine Ciba.  
Angitan.  
Antifluor.  
Cuprémone simple et « F ».  
Cynuroi Rosa.  
Do-Sa-No-Sal.  
Extrait Hamyd.  
Fluxine (gouttes).  
Fucoïdine.  
Hamamélis Gmet.  
Hamamélis Grandval.  
Hémaxol.  
Hémoluol.  
Hémopausine.  
Hexotal.  
Hydrastis Gmet.  
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.  
Indhaméline Lejeune simple.  
Ivago de Goldenberg-Vaccin « M ».

Ivago-coli (buvable).  
Magnésosvules.  
Ménatol.  
Ménovarine.  
Mensuosédyl.  
Mictasol.  
Mictualine.  
Oléovule.  
Opothérapie Choay.  
Ovules Chaumel.  
Ovule intime.  
Ovule-vaccin Ivago de Goldenberg.  
Paradol.  
Prostatols Beauxis Lavigne.  
Québralgine Fouché.  
Sels du Jura.  
Suppositoires au Nestosyl.  
Tampol Roche.  
Terozone.  
Tot'Hamélis.  
Ur-Clar.  
Veinalgol.

#### DISSOLVANTS URIQUES

Absuric.  
Antisciatique P Chambon.  
Anti-urique de Contrexéville.  
Atoquinol Ciba.  
Bensamine.  
Biliogastrine Chevallon.  
Citratin.  
Cynuroi Rosa.  
Dialyl.  
Diasclérol.  
Euphysol.  
Héxotal.  
Kodos.  
Lithinoformine.  
Mésothine.  
Métaformine.  
Nitroyl Lelsyn injectable.

Orthogénol.  
Paradol.  
Phosoforme.  
Pipérazine Midy.  
Radiotropinc.  
Sanoquinol Ciba.  
Sel hépatique U. N. Arques.  
Solvuric.  
Térozone.  
Triseptine.  
Uralysol.  
Uraseptine Rogier.  
Urazine.  
Uriclarine.  
Urifluine.  
Urisanine.  
Urobuccol Malmanche.  
Uroclase.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

#### DISSOLVANTS URIQUES

Uroformine Gobey.  
Uroiodine.  
Urométhyl.  
Urométine Lambiotte.  
Uromil.

Urophile.  
Urosan Dufayard.  
Urozea.  
Viophan.

#### DIURÉTIQUES

Adoverne.  
Antonal.  
Benzo-iodhydrine.  
Biliogastrine Chevillon.  
Boldo Gmet.  
Cachets Spévin.  
Cafédrine.  
Calcional.  
Calcium Sandoz.  
Calci-Sténine.  
Canol.  
Chloro-calcium.  
Curoraisin.  
Cynurol Rosa.  
Dismine Favrot.  
Disolurane Vély.  
Diurégan.  
Diuréphédrine.  
Diurène.  
Diurétique Gmet.  
Diurobromine.  
Diurocalcine Gros.  
Diurocardine.  
Do-Sa-No-Sal.  
Élatine Bouin.  
Evobiline.  
Fluobyl  
Foklényl.  
Gmet (Extraits).  
Gui Byla.  
Gui Gmet.  
Guipsine.  
Guitose.  
Hamamélis Gmet.  
Hepatoformine.  
Iodoscilline.  
Kodos.  
Lacto-Sérum Layril.  
Lithinoformine.  
Lysarthrol.

Métaformine.  
Mictophile Richer.  
Néphryl.  
Neptal.  
Opocrinase.  
Orthogénol.  
Ozobiase.  
Ozothine.  
Paradol.  
Phosoforme.  
Pneumogéine Renard.  
Poudre Danica.  
Pulmacardia.  
Pyurol.  
Renion Vincardi.  
Rénocardine.  
Rythmos Leisyn.  
Sanoquinol.  
Santhéose.  
Scillarène Sandoz.  
Sclérosérol.  
Técarine.  
Théisine Dubat.  
Théobromine Invar.  
Théobromose Dumesnil.  
Théobryl Roche.  
Théocalciode.  
Théosalvose.  
Théovérine Laleu.  
Théoxantine.  
Tonicardine Gonnon.  
Uriclarine.  
Urisanine.  
Urobuccol Malmanche.  
Uroiodine.  
Urol.  
Urométhyl.  
Uromil.  
Urosalyl.  
Zymatiue.



### **III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.**

#### **GALACTOGÈNES**

Biotrignon.	Malt français Déjardin
Extrait de Malt français	(Extrait de).
Déjardin.	Malt pailleté.
Fantine.	Maltosan.
Farine maltée Favrichon.	Malt Wander ou Gloma.
Farine de Malt Heudebert.	Maltéa Moser cristallisée.
Fosfoxyll Carron.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Frayssé.
Galactogil.	Phosoforme.
Lactagol.	Phytine Ciba.
	Sérogène.

#### **HÉMOSTATIQUES UTÉRINS**

Arhémapectine.	Hamamélis Gmet.
Calcional.	Hémaxol.
Calcium Sandoz.	Hémocalciopectine.
Chloro-calcion.	Hémogénol Dausse.
Clisemine Longuet.	Hémopausine.
Coagulène Ciba.	Hémopectal.
Dragécalcion.	Hémosamine.
Dragées ferro-ergotées Man-	Hémostatique Goy.
net.	Hémostyl.
Élixir ferro-ergoté Man-	Hydrastis Gmet.
net.	Lugocalcion.
Ergotine Lamante.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Frayssé.
Eugynol Grandval.	Pituilobine Byla.
Extrait Hamyd.	Post-Hypophyse Choay.
Fluxine (gouttes).	Sécarcornine Roche.
Gynergène Sandoz.	Tot'Hamélis.

#### **RÉGULATEURS DES RÈGLES SÉDATIFS UTÉRO-OVARIENS**

Aesculase.	Capsules Joret et Homolle.
Agomensine Ciba.	Catemenyl.
Aigue d'or.	Cérébrine Fournier.
Algocratine.	Chloral bromuré du D <sup>r</sup> Du-
Algosédine.	bois.
Ampolases.	Credone.
Ampoules de spasmalgine	Cuprémone simple et « F ».
Roche.	Curatine Brunet.
Androstine Ciba.	Curogène.
Antélobine.	Demalgon.
Antidouleur Barbessou.	Diathermie.
Anxiol.	Dioséine Prunier.
Apholine Trouette-Perret.	Eugynol Grandval.
Asciatine.	Extrait Hamyd.
Basedowine.	Féminadène.
Benzylcalcium.	Fer Ovarine Vitalis.
Benzylol.	Ferydal.
Cachets du D <sup>r</sup> Bovell.	Florhépazine.
Canténe.	Flusan.
Capsules Bruel.	Fluxine (gouttes).

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

#### RÉGULATEURS DES RÈGLES SÉDATIFS UTÉRO-OVARIENS

Foiestrine Grémy.	Mictasol.
Follicormone buccale Hinglais.	Miroxyl.
Folliculine Choay.	Néospasmodyl Vély.
Folliculine Crinex.	Nestosyl.
Folliculine Roussel.	Cestrobro.
Gmet (Extraits).	Orthogénol.
Grains céphalgifuges.	Ovules Chaumel.
Gynocalcion.	Paradol.
Gynœstryl:	Phosphobrom.
Hamamélis Gmet.	Phytomensyl.
Hamamélis Grandval.	Pyréthane.
Hémagène Tailleur.	Québralgine Fouché.
Hémaxol.	Rénovol.
Hémodrome.	Sérogène.
Hémoductyl.	Sistomensine Ciba.
Hémoluol.	Spasmalgine Roche.
Hémopausine.	Spasmalone.
Hémophiline Planche.	Spasmoneurol.
Hémosamine.	Stopral.
Hirudinase.	Suppoalgos.
Holovarine.	Suppo-Gynals.
Hormovarine Byla.	Suppositoires au Nestosyl.
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.	Surparine.
Indhaméline Lejeune simple.	Tablettes Zéva.
Infra-rouges.	Térozone.
Irénine Gonnon.	Toniveinine.
Ménatol.	Triglandine.
Ménosédine.	Veinalgol.
Ménovarine.	Veinogène.
Mensuosédyl.	Veinoposine.
	Veinosine.
	Véralgine.
	Viscoveine.

#### VACCINS

Ampho-Vaccins Ronchèse.	Immunizols Grémy.
Antigénines.	Institut Pasteur Vaccins.
Antipiol.	Lysaxins L. M. L.
Antivirus.	Néo-Dmégon.
Bilivaccin-anticolibacillaire.	Néo-Physio — Physiosthé-
Blennosine Fornet.	nine
Colitique.	Osmo-vaccin Bréant.
Coli-Vaclydun.	Probios.
Dmelcos.	Propidon.
Entéro-antigènes.	Rhéantine Lumière.
Entérofagos.	Salantale.
Gonagone.	Vaccinothérapie atoxique
Gono-vaclydun.	Cépède.
Gynéco-vaclydun.	Vaccins Bruschettini.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

#### VACCINS

Vaccins atoxiques stabilisés.	Vaccins intra-dermiques et Gelées Vaccins Ivago de L. Goldenberg.
Vaccins bactériens I. O. D.	Vaccins pansements Virultra.
Vaccins Ronchèse. — Ampho-vaccins.	Vaclydun.
Vaccins Sténé.	

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### ALBUMINURIES — AZOTÉMIE — URÉMIE ANURIE

Albuol Leisyn.	Neptal.
Amino-sel Byla.	Opocrinases.
Benzobromine.	Organl-calcion simple.
Benzolodhydriane.	Orthogénol.
Blocs Vécor.	Paradol.
Cachets Spévin.	Pepto-Kola Robin.
Cafédrine.	Phosoforme.
Calcional.	Pneumogéine Renard.
Calci-Sténine.	Poudre Danica.
Calcium Sandoz.	Quinuryl.
Canol.	Rénion Vincardi.
Cardiosthénine.	Rénocardine.
Chloro-Calcion.	Santhéose.
Cynurol Rosa.	Scillarène Sandoz.
Dépuride du Dr Roger Weber.	Sclérosérol.
Diurétique Gmet.	Sels de Lithine efferves-cents.
Diurobromine.	Silicyl.
Diurocalcine Gros.	Tapo.
Diurocardine.	Técarine.
Dragécalcion.	Théisine Dubat.
Eupnine Vernade.	Théobromine Invar.
Evobiline.	Théobromose Dumésnil.
Fluobyl.	Théobryl Roche.
Gui Byla.	Théocalciode.
Gui Gmet.	Théosalvose.
Guipsine.	Théoverine Laleuf.
Guitose.	Théoxantine.
Hépatofomine.	Tonicalcine.
Inorénol.	Trinitine-Papavérine Laleuf.
Iodoscilline.	Urol.
Lacto-Sérum Lavril.	Urométhyl.
Lichénose Ducloy.	Viscum Zyma.
Lugocalcion.	
Néphryl.	

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### ALLAITEMENT — CREVASSES DU SEIN

Adrénocalcine.	Malt français Déjardin
Antiphlogistine.	(Extrait de).
Antipiol.	Malt pailleté.
Arcica.	Mancobène.
Babeurre « La Faye ».	Méta-Titane.
Baume Delacour.	Minergil.
Baume de la Maternité.	Morisland.
Baume du D <sup>r</sup> Baissade.	Nestogène.
Beef Lavoix.	Nestosyl.
Benzylocalcium.	Nucléigène.
Biotrignon.	Onction Leisyn.
Borostyrol Schlatter.	Opocalcium du D <sup>r</sup> Guer-
Calci-Sténine.	sant.
Calcium Sandoz	Opocalcium irradié du
Céréossine Dehaussy	D <sup>r</sup> Guersant.
Colloïdogénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Opocobalt.
Chloro-Calcion.	Opodermyl.
Crescol Buisson.	Organi-calcion simple et
Dermodulcis.	endocrinien.
Diadermine.	Percainal Ciba.
Dohyfral.	Phosphates du D <sup>r</sup> Pi-
Dragécalcion.	nard.
Ektogan.	Phosphate Vital de Jac-
Extrait de Malt français	quemaire.
Déjardin.	Phospho-Fluor Beynet.
Fenucalcium.	Phytine Ciba.
Fenucine.	Phystosplénol Plé.
Ferydal.	Polyminéral Fort.
Fluoganèse.	Pommade au Nestosyl.
Fosfoxyl Carron.	Pommade Logeais.
Gaduamine.	Pommade Noelline.
Galactogil.	Procalcyl.
Gastrhéma.	Prodynase.
Génosthéniques.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Glandocalcyl.	Quina Baron.
Gluphosol.	Rhagadine Bracquemond.
Glycérophosphate Dalloz.	Rozoderme.
Glycérophosphate Robin.	Sénophile.
Glyctone phosphatée Char-	Sérogène.
rière.	Splénomanganol.
Hémofer.	Sthénoxal.
Hémoglobine Deschiens.	Sur-bi-cal.
Hémostérine.	Tégéol.
Holos.	Terpoxyl externe.
Holovarine.	Tonigène.
Inotyol.	Tricalcine.
Iodex.	Ultravitamine 4.
Kymosine Rogier.	Uvéphorine.
Lactagol.	Uvéstérol.
Limol Churchill.	Valovarine.
Liposplénine.	Végéphos.
Lugocalcion.	Vin de Baudon.
Lynévol.	Vitaminol.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### ALLAITEMENT — CREVASSES DU SEIN

Vitastérol.  
Vitène.  
Vivoléol.

Zomine.  
Zymatine irradiée.

#### BLENNORRAGIE — ORCHITE

Absuric.  
Acatar.  
Airoglyce.  
Anexol.  
Aniodol.  
Antifluor.  
Antigonol  
Antiphlogistine.  
Antipiol.  
Argycuprol.  
Arhéol.  
Baldisedan.  
Baume Adol.  
Baume Aroma.  
Baume Iki.  
Bensamine.  
Blennopiat.  
Blennosine Fornet.  
Buccurol.  
Bucmine.  
Comprimés Guillaumin.  
Comprimés vaginaux Leisyn.  
Cryptargol Lumière.  
Cynurol Rosa.  
Diurocystine.  
Elgine Julien.  
Endodermol.  
Eumictine.  
Evine.  
Flavurool.  
Fokiényl.  
Fosyls Carron.  
Gonacrine.  
Gonagone.  
Gono-vaclydun.  
Gynéco-vaclydun.  
Hermophényl Lumière.  
Héxorcène.  
Hexotal  
Institut Pasteur Vaccins.  
Iodex.  
Ivago de Goldenberg vaccin « G ».  
Ixiun Buisson.  
Kaviase.  
Kérafline.

Métaformine.  
Mictasol.  
Microlyse.  
Mictophile Richer.  
Mictoseptol.  
Mictualine.  
Néo-Dmégon.  
Néo-Physio.  
Nestosyl.  
Oléovules.  
Onguent Fréval.  
Osmo-vaccin Bréant.  
Ovules au Nestosyl.  
Ovules Roche.  
Oxyléine.  
Paradol.  
Phaguryl.  
Pilules V. E. Doumer.  
Progone.  
Prostatols Beauxis Lagrave.  
Pyri-Pyridium.  
Rectagine.  
Rethragine.  
Rhéantine Lumière.  
Salantale.  
Santal Midy.  
Santal Monal.  
Séphydine.  
Sérélbé du D<sup>r</sup> Blaizot.  
Solution huileuse au Nestosyl.  
Sulfarsénol.  
Térozone.  
Terpoxyl externe.  
Ur-Clar.  
Uriclarine.  
Urisanine.  
Urobuccol Malmanche.  
Uroformine Gobey.  
Urométhyl.  
Urométine Lambiotte.  
Urosalyl. — Urosalyl méthylé.  
Urosan Dufayard.  
Vaccin Demonchy.  
Vaccinothérapie atoxique  
Cépède.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### BLENNORRAGIE — ORCHITE

Vaccins atoxiques stabi- lisés.	Vaccins pansements Viru- tra.
Vaccins bactériens I. O. D.	Vaclydun.
Vaccins Bruschetti.	Végétol externe.
Vaccins Intra-dermiques et Gelées Vaccins Ivago de L. Goldenberg.	Vitargyl. Zimbyl.

#### CHANCRE MOU

Antipiol.	Nitium Buisson.
Dmelcos.	Séphydine.
Gonagone.	Vioforme Ciba (et ovules au Vioforme).
Hexotal.	

#### CYSTITES — PROSTATISME

Absuric.	Elatine Bouin.
Acatar.	Elgine Julien.
Adrépatine.	Entérofagos.
Airoglyce.	Eumictine.
Alcamfétol.	Extrait Hamyd.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Flavuro.
Anexol.	Fckiényl.
Aniodol.	Formocarbène.
Anthracalcine.	Formocitrine.
Anusol Mialhe.	Glyco-Thymoline.
Arhéol.	Goménol.
Bacté-phages.	Gonagone.
Baldisedan.	Gono-Vaclydun.
Bensamine.	Guipsine.
Bilivaccin anticolibacil- laire.	Guitose.
Binoxol.	Gynéco-vaclydun.
Biolactyl Fournier.	Hamamélis Gmet.
Blennopiat.	Hamamélis Grandval.
Blennosine Fornet.	Hémypnal Ciba.
Buccurol.	Hermophényl Lumière.
Bucmine.	Héxorcène.
Calmant Meunier.	Hexotal.
Canol.	Immunizols Grémy.
Caparlem.	Ivago de Goldenberg vac- cin « U ».
Capsules Bardet.	Ivago coli buvable.
Catalyl Mg.	Kalmigraine.
Chloraseptine Optima.	Kaviase.
Chlormagnésium.	Lacto-Sérum Lavril.
Chloro-magnésion.	Lysaxins L. M. L.
Colitique.	Magnésium Hardy.
Comprimés Guillaumin.	Magnésio-tubes Robinet.
Cryptargol Lumière.	Mésothine.
Cynurol Rosa.	Métaformine.
Dismine Favrot.	Microlysine.
Diurocystine.	Mictasol.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### CYSTITES — PROSTATISME

Mictophile Richer.	Terpine Gonnon.
Mictoseptol.	Terpine granulée Baron.
Mictualine.	Tot'Hamélis.
Néo-Collargol.	Triseptine.
Nestosyl.	Uralysol.
Orthogénol.	Uraseptine Rogier.
Osmo-vaccin Bréant.	Ur-Clar.
Paradol.	Uribiline.
Phaguryl.	Uriclarine.
Pilules V. E. Doumer.	Urisanine.
Pneumo-Lipase.	Urobuccol Malmanche.
Pommade Logeais.	Uroformine Gobey.
Probios.	Uroiode.
Progone.	Urol.
Prostaphile Leisyn.	Urométhyl.
Prostatols Beauxis Lagrave.	Urométine Lambiotte.
Pyri-Pyridium.	Uromil.
Pyurol.	Urophile.
Radiotropine.	Urosalyl. — Urosalyl mé-
Rectagine.	thylé.
Rectopanbiline.	Urosan Dufayard.
Rethragine.	Uvargol.
Santal Midy.	Vaccins Bruschettini.
Santal Monal.	Vaccins Ronchèse (am-
Sérélbé du Dr Blaizot.	pho-vaccins).
Solution huileuse au Nes-	Vaccins intra-dermiques et
tosyl.	gelées-vaccins Ivago de
Solvuric.	L. Goldenberg.
Suppo-Gynals.	Vaclydun.
Suppositoire Logeais.	Végétol externe.
Suppositoires au Nestosyl.	Zimbyl.
Terozone.	

#### ÉCLAMPSIE

##### VOMISSEMENTS INCOERCIBLES

Adrénoldes Béral.	Insuline buccale Fernet.
Agomensine.	Lacto-Sérum Lavril.
Alsodine.	Lichénase Ducloy.
Belladéal Sandoz.	Panbiline.
Bromiase.	Phosoforme.
Canol.	Phosphobrom.
Cétrarose Gigon.	Plasma de Quinton.
Cratoegus Gmet.	Rectopanbiline.
Elixir Grez.	Sel d'Ewald.
Elixir du Dr Mialhe.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Folliculine Roussel.	Sérogyné.
Gouttes antispasmodiques	Somnicones Béral.
Dausse.	Somnifène Roche.
Gravidostyl.	Surparine.
Gui Byla.	Valérium Paul Thibault.
Gui Gmet.	Vériane.
Guipsine.	Vin Raimoa Tonic.
Guitose.	Zymatine.
Gynœstryl.	

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### FIBROMES

Anéo Leisyn.  
Backérine.  
Bain Carré.  
C. 40.  
Complextraits.  
Ergotine Lamante.  
Évine.  
Extrait Hamyd.  
Fluxine (gouttes).  
Fuciodine.  
Gloxines.  
Gynergène Sandoz.  
Hamamélis Gmet.  
Hamamélis Grandval.  
Hémaxol.

Hémostyl.  
Hydrastis Gmet.  
Iodalose Galbrun.  
Leucagine.  
Micelliodé.  
Opothérapie du D<sup>r</sup> Fraysse.  
Orthogénol.  
Oxydothyridine Paris.  
Pépiodon Henry.  
Péricols du D<sup>r</sup> Legros.  
Plombyl.  
Sels du Jura.  
Thorix.  
Tot' Hamélis.

#### GROSSESSE — ACCOUCHEMENTS AVORTEMENTS

Adrénocalcine.  
Ampho-vaccins Ronchèse.  
Ampoules de Spasmalgine  
Roche.  
Aminine.  
Anexol.  
Aniodol.  
Antipiol.  
Antivirus.  
Arcica.  
Arhémapectine.  
Arsécrinol.  
Beef Lavoix.  
Belhémène.  
Benzylocalcium.  
Biotrigon.  
Boricine Meissonnier.  
Calciline.  
Calci-Sténine.  
Calcium Sandoz.  
Calcoléol.  
Cérébro-Lipase.  
Céréossine Dehaussy  
simple.  
Céréossine irradiée.  
Chloraseptine Optima.  
Chloro-Calcion.  
Clonazone Daufresne.  
Colloïdiginine du D<sup>r</sup> Bayle.  
Comprimés Guillaumin.  
Curogène.  
Cynurof Rosa.  
Dohyfral.  
Dragécalcion.

Dragées ferro-ergotées Man-  
net.  
Ektogan Bocquillon.  
Élixir Ducro.  
Élixir du D<sup>r</sup> Mialhe.  
Élixir ferro-ergoté Man-  
net.  
Ergotine Lamante.  
Évine.  
Fenucalcium.  
Fénucine.  
Ferydal.  
Fixase.  
Fixase irradiée.  
Fluoganèse.  
Fosfoxyl Carron.  
Gastrhéma.  
Génosthéniques.  
Glandocalcyl.  
Globexine.  
Gluphosol.  
Glycérophosphate Dalloz.  
Glycérophosphate Robin.  
Glyco-Thymoline.  
Glyctone phosphatée Char-  
rière.  
Hamamélis Gmet.  
Hémagène Tailleur.  
Hémofer.  
Hémoglobine Deschiens.  
Hémopectal.  
Hémo-plasmine du D<sup>r</sup> Mo-  
relli.  
Hémosamine.



### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### GROSSESSE — ACCOUCHEMENTS AVORTEMENTS

Hémypnal Ciba	Quina Baron.
Holos.	Rectopanbiline.
Holovarine	Salubrine Phénix.
Ivago-Coli buvable.	Sécacornine Roche.
Lauréol médicinal.	Sédol.
Lichénose Ducloy.	Séphydine.
Liposplénine du D <sup>r</sup> Gioc.	Sérogyné.
Lugocalcion.	Sirop du D <sup>r</sup> Reinwiller au phosphate de chaux.
Lusoforme.	Spasmine Jolly.
Mancobène.	Spasmalgine Roche.
Mésosome.	Spasmalone.
Méta-Vaccin.	Splénomanganol.
Minersil	Spyrolides.
Morisland.	Stérogyl.
Nestosyl.	Sthénoxal.
Noviode.	Stillargol.
Nucléigène.	Sur-Bi-Cal.
Œnophos.	Térébine.
Oléo-Mel.	Térozone.
Opocalcium du D <sup>r</sup> Guer- sant.	Terpoxyl externe.
Opocalcium irradié du D <sup>r</sup> Guersant.	Terpoxyl interne.
Opocobalt.	Tonigène.
Opothérapie Fournier	Tonique Gonnon.
Organi-calcion simple et endocrinien.	Tricalcine.
Ovules au terpoxyl.	Uvéphorine.
Phosoforme.	Uvestérol.
Phosphates du D <sup>r</sup> Pinard.	Vaccins Ronchèse (ampho- vaccins.)
Phosphate Vital de Jac- quemaire.	Vagosédyl.
Phospho-Fluor Beynet	Valovarine
Phylla Dyn.	Végéphos.
Physocrisine.	Velpeau (Bande).
Phytine Ciba.	Vin de Bauou.
Phyto-Lécithine.	Viosten.
Phytosphénol Plé.	Vitaminol.
Pituilobine Byla.	Vitastérol.
Plasma de Quinton.	Vitène.
Polyminéral Fort.	Vitergomine.
Post Hypophyse Choay.	Vivoléol.
Prodynase.	Zimbyl.
Pyréthane.	Zominc.
	Zymatine irradiée.

#### HÉMATURIES

(Voir : Appareil circulatoire, Hémostatiques.)

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### IMPUISSANCE — SPERMATORRHÉE

Alexime.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Frayssé.
Ampolases.	Orex.
Androcalcion H.	Orthogénol.
Androstine Ciba.	Ozothine.
Cérébroil Leisyn.	Phosoforme.
Diasténine Grémy.	Phospharsol.
Eufosfyl « Vély ».	Sécacornine Roche.
Fosfoxyl Carron.	Sérodausse antitoxisényl.
Fosyls Carron.	Sérogène.
Globules Romon.	Strychnal Longuet.
Granules de Pantofort du	Triglandine.
D <sup>r</sup> Boveil.	Triglandol.
Hemoviris.	Viradène.
Nésal.	Yo-Androl.
Œnophos.	Yohimbine Vicario.
Oposynergines.	

#### INCONTINENCE D'URINE

Benzylo.	Métaformine.
Borosodine Lumière.	Mictasol.
Cynurol Rosa.	Phosoforme.
Dragées ferro-ergotées Man-	Plasma de Quinton.
net.	Sécacornine Roche.
Élixir ferro-ergoté Man-	Sirop Lecœur.
net.	Spasmine Jolly.
Ephédromel.	Strychnotonine.
Épicral.	Tonigène.
Ergotine Lamante.	Uromethyl.
Ethyl-Pneumine Lersam.	Urosalyl. — Urosalyl mé-
Féminadène.	thylé.
Fosfoxyl Carron.	Vagosédyl.
Ionyl.	

#### INFECTION PUERPÉRALE

Ampho-vaccins Ronchèse.	Septicémine Cortial.
Aniodol.	Solucamphre Delalande.
Antigénines.	Sulfarsénol.
Antipiol.	Térébine.
Antivirus.	Térozone.
Cynurol Rosa.	Terpoxyl interne.
Eucalyptine Lebrun.	Ultraformine.
Goménol.	Vaccinothérapie atoxique
Liposeptine.	Cépède.
Néo-Physio.	Vaccins Bruschettini.
Nucléatol.	Vaccins bactériens I. O. D.
Oléovules.	Vaccins pansements Virul-
Physiosthénine.	tra.
Probios.	Vaccins Ronchèse (ampho-
Protiodyne	vaccins).
Pyoformine.	Vaclydun. — Staphylo-
Quinquina Gmet.	Vaclydun.
Séphydine.	Zimbyl.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### INSUFFISANCE RÉNALE NÉPHRITES CHRONIQUES NÉPHRITES AIGÜES

Absuric.	Lugocalcion.
Acatar.	Mictasol.
Adoverne.	Néphryl.
Agozymase.	Normatensol Bouret.
Albuol Leisyn.	Opocrinase.
Anthracalcine.	Opothérapie Bouty.
Antonal.	Orthogénol.
Benzo-iodhydrine.	Paradol.
Cachets Spévin.	Phosoforme.
Cafédrine.	Pneumogéine Renard.
Calci-Sténine.	Poudre Danica.
Calcium Sandoz.	Pulmacardia.
Canol.	Pyurol.
Chloro-Calcion.	Radiotropine.
Citralin.	Rénion Vincardi.
Cynurol Rosa.	Rénocardine.
Dépuriodé du Dr Roger	Santal Midy.
Weber.	Santal Monal.
Détensyl.	Scillarène Sandoz.
Diathermie.	Sclérosérol.
Diurène.	Silguine.
Diurétique Gmet.	Silcyl.
Diurobromine.	Técarine.
Diurocalcine Gros.	Theisine Dubat.
Diurocardine.	Théobromine Invar.
Dragécalcion.	Théobromose Dumesnil.
Entérofagos.	Théobryl Roche.
Euglyma.	Théocalciode.
Eutensyl Grémy.	Théosalvose.
Fluobyl.	Théovérine Laleuf.
Gastéose.	Théoxantine.
Gastronaldine.	Tonicardine Gonnon.
Guitose.	Uribiline.
Gui Byla.	Urisanine.
Gui Gmet.	Urol.
Guipsine.	Urométhyl.
Hépatofomine.	Urosalyl. — Urosalyl méthylé.
Inorenol.	Zimbyl.
Iodaubépine.	
Lacto-sérum Lavril.	

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### LITHIASÉ RÉNALE COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Absuric.	Papavéryl.
Aigue d'Or.	Paradol.
Ampoules de Pantopon Roche.	Phosoforme.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Pipérazine Midy.
Anthraseptol.	Potion Adol.
Anti-urique de Contrexéville.	Pyrélaïne Collas.
Baume Adol.	Pyréthane.
Baume Aroma.	Pyurol.
Baume Bengué.	Radiotropine.
Bensamine.	Rhodazil.
Benzytol.	Salsanos.
Biliogastrine Chevillon.	Sanoquinol.
Buccurol.	Santal Midy.
Canol.	Santal Monal.
Caparlem.	Sel hépatique U. N. Arquevaux.
Capsules Bardet.	Sels de Lithine effervescents.
Capsules Bruel.	Sodothiol.
Cholagol.	Solvuric.
Cibalgine.	Spasmalgine Roche.
Crypthiol.	Spicanol.
Cynurol Rosa.	Suppositoires au Nestosyl.
Dialyl.	Suppoalgos.
Diasclérol.	Surparine.
Diathermie.	Théocalciode.
Dismine Favrot.	Théosalvose.
Disolurane Vély.	Théoxanthine.
Diurétique Gmet.	Triseptine.
Élatine Bouin.	Uralysol.
Elgine Julien.	Uraseptine Rogier.
Euphysol.	Urazine.
Florhépatine.	Uribiline.
Formocitrine.	Uriclarine.
Génomorphine.	Uriluine.
Hépatiformine.	Urisanine.
Hexotal.	Urobuccol Malmanche.
Infra-rouges.	Uroclase.
Iodoscilline.	Uroformine Gobey.
Kodos.	Uroïodine.
Lacto-Sérum Lavril.	Urométhyl.
Lithinoformine.	Urométine Lambiotte.
Lysarthrol.	Uromil.
Mésothine.	Urophile.
Métaformine.	Urosalyl.
Mictoseptol.	Urosalyl méthylé.
Nestosyl.	Urosan Dufayard.
Nitroïl-Leisyn injectable.	Urozea.
Orthogénol.	Véralgine.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### MÉTRITES — LEUCORRHÉE

Absuric.	Hamamélis Gmet.
Agomensine Jiba.	Hamamélis Grandval.
Aïroglyce.	Hémaxol.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Hémostyl.
Anexol.	Hydralin.
Aniodol.	Immunizols Grémy.
Antifluor	Indhaméline Lejeune plu-
Antigénines.	riglandulaire.
Antipiol.	Indhaméline Lejeune sim-
Argycuprol.	ple.
Aristargol.	Inolène.
Asepto-poudre.	Iodex.
Aseptone.	Iodosan.
Aseptovules.	Iodure de fer inaltérable
Bacté-Phages.	de Blancard.
Bain Carré.	Ivago de Goldenberg vac-
Biolactyl Fournier.	cin « M ».
Boricine Meissonnier.	Kaviase.
Borostyrol Schlatter.	Lacpinine.
Céthocal du Dr Lemay.	Lacto-Sérum Lavril.
Chlocci.	Laurenol Médicinal.
Chloraseptine Optima.	Leucagine.
Clonazone Daufresne.	Lusoforme.
Coaltar Saponiné Le Beul.	Lysaxins L. M. L.
Complextraits.	Magnésovules.
Comprimés d'Alibour.	Mésosome.
Comprimés Guillaumin.	Métacuprol.
Comprimés vaginaux Lei-	Métricine.
syn.	Métritols.
Créosomeforme Lambiotte.	Mictasol.
Cryptargol Lumière.	Microlyse.
Cynurol Rosa.	Natrosyl.
Diathermie.	Néo-Collargol.
Eklogan Bocquillon.	Néol.
Élixir ferro-ergoté Mannet.	Néothorium Millot.
Entéro-antigènes.	Nestosyl.
Ergotine Lamante.	Nitium Buisson.
Eugaline.	Oléovules.
Évine.	Opothérapie du Dr Frayssé.
Extrait Hamyd.	Osmo-vaccin Bréant.
Flavuroil.	Ovules Chaumel.
Fluxine (gouttes).	Ovule intima.
Fosyls Carron	Ovules au nestosyl.
Gelée-vaccin Ivago gyné-	Ovules Rhemda radio-
cologique.	actifs.
Glucolactol.	Ovules Roche.
Glyco-M.	Ovules au Terpoxyl.
Glyco-Thymoline.	Ovules-vaccins Ivago de
Gobérol.	Goldenberg.
Goménol.	Phosoforme.
Gonagone.	Pilules Hélieniennes Naud.
Gono-vaclydun.	Pituitobine Byla.
Gynéco-vaclydun.	Poudre Chaumel

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### MÉTRITES — LEUCORRHÉE

Probios.  
Progone.  
Propidon.  
Rectagine.  
Salantale.  
Salubrine Phénix.  
Sanoformine.  
Sanoram.  
Sécacornine Roche.  
Sels du Jura.  
Sephydine.  
Septolan.  
Sérébé du Dr Blaizot.  
Sétirém comprimés.  
Spyrolides.  
Strychnotonine.  
Sunoxol.  
Suppo-Gynals.  
Tampol Roche.

Térébine.  
Térozone.  
Terpoxyl externe.  
Uribiline.  
Urométhyl.  
Uvargol.  
Vaccins intra-dermiques et  
gelées vaccins Ivago de  
M. L. Goldenberg.  
Vaccins pansements Virul-  
tra.  
Vaccins Sténé.  
Vacydun.  
Végétol externe  
Vioforme Ciba (ovules au  
Vioforme).  
Vitargyl.  
Zimbyl.

#### PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

Aesculase.  
Agomensine Ciba.  
Aigue d'Or.  
Algocratine.  
Algosédine.  
Amphotonyl.  
Ampolases  
Ampoules Boissy d'iodure  
de potassium.  
Ampoules de Spasmalgine  
Roche.  
Androstine Ciba.  
Angioxyl.  
Antélobine.  
Antidouleur Barbessou.  
Antifluor.  
Antonal.  
Anxiol.  
Aphloïne Trouette-Perret.  
Arhémapectine Gallier.  
Artérase.  
Artério-Veinine.  
Asciatine.  
Basedowine.  
Benzylocalcium.  
Benzylol.  
Bionéol.  
Broseyl.  
Bursol.  
Calmant Meunier.  
Cantéine Bouteille.

Capsules Joret et Homolle.  
Cataményl.  
Cérébrine Fournier.  
Chloral bromuré du Dr Du-  
bois.  
Collo-iode Dubois.  
Crataegine.  
Crataegus Gmet.  
Credone Dehaussy.  
Cuprémone simple et « F ».  
Curatine Brunet.  
Curogène.  
Demalgon.  
Dépuriode du Dr Roger  
Weber.  
Détensyl.  
Dioséine Prunier.  
Do-Sa-No-Sal.  
Dragées ferro-ergotées  
Mannet.  
Élixir ferro-ergoté Man-  
net.  
Endopancrine.  
Entéro-antigènes.  
Ergotine Lamante.  
Eugynol Grandval.  
Euphytose.  
Extrait Hamyd.  
Extrait de malt français  
Déjardin.  
Féminadène.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

Fer ovarine Vitalis.	Iodone Robin.
Florhépatine.	Iodonucléol.
Flusan.	Iodotensyl Dubois.
Fluveinose Mauchant.	Iodo-vitasine.
Fluxine (gouttes).	Iodural Novat.
Folestrine Grémy.	Iodurase.
Follicormone buccale Hinglais.	Iodure de fer inaltérable de Blancard.
Folliculine Choay.	Iodure Pachaut.
Folliculine Crinex.	Irénine Gonnon.
Folliculine Roussel.	Kalmigraine.
Follilobine.	Lachésine.
Fosfoxyl Carron.	Lipiodol Lafay.
Fucolodine.	Lipiodine Ciba.
Globules Fumouze à l'Iodure de potassium.	Lugocalcion.
Glycocarpine.	Magiodyl.
Gmet (Extraits).	Magnésium Hardy.
Gouttes de Serû.	Magnésio-tubes Robinet.
Gouttes Nican.	Magol Churchill.
Grains céphalgifuges.	Mangratinés.
Gui Byla.	Ménatol.
Gui Gmét.	Ménosédine.
Guipsine.	Ménovarine.
Guitose.	Mensuosédyl.
Gynocalcion.	Mictasol.
Gynœstryl.	Miroxyl.
Hamaméline Roy.	Néalgyl Bottu.
Hamaméliode.	Néo-Riodine.
Hamamélis Gmet.	Néospasmodyl Vély.
Hamamélis Grandval.	Nésal.
Hémagène Tailleur.	Nestosyl.
Hémaxol.	Neurinase.
Hémocalcine.	Ocréine Grémy.
Hémodrome.	Œstrobrol.
Hémoductyl.	Opoferine Vitaminée.
Hémoluol.	Opothérapie Bouty.
Hémopausine.	Opothérapie Byla associée.
Hémophiline Planche.	Opothérapie Choay.
Hémosamine.	Opothérapie du Dr Frayssé.
Hexaranol.	Orex.
Hirudinase.	Orthogénol.
Holovarine.	Ovarine Optima.
Hormovarine Byla.	Ovaro-thyroidine Optima.
Hydrastis Gmet.	Ovules Chaumel.
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.	Ovules au Nestosyl.
Indhaméline Lejeune simple.	Ovules au Terpoxyl.
Iodamélis Logeais.	Oxydovarine Paris.
Iodassium.	Ozothine.
Iode organique Boissy.	Panglandine Couturieux.
Iodogénol Pépin.	Papavéryl.
Iodo-Maisine Globules.	Paradol.
	Paxène.
	Phléboguil.
	Phlébotonine.

### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

Phosoforme.	Sulfarsiode.
Phosphobrom.	Suppoalgos.
Phyto-Lécithine.	Strychnotonine.
Phytomensyl.	Suppo-Gynals.
Poudre Danica.	Suppositoires au Nestosyl.
Protonic.	Surparine.
Proveinase Midy.	Sympathyl.
Pulsamone.	Tablettes Hova.
Pyréthane.	Tablettes Zéva.
Québralgine Fouché.	Terpoxyl interne.
Quinovarine Optima.	Théinol.
Quinquina Gmet.	Tonigène.
Rénovol.	Toniveinine.
Rhocya Dyn.	Tot'Hamélis.
Rhodazil.	Triglandine.
Riodine.	Triglandol.
Sanédrine.	Vagosédyl.
Sécacorniné Roche.	Valériane Byla.
Sédarsan.	Valovarine.
Sédotensyl.	Valovosan.
Sels du Jura.	Vascurol.
Séneçol.	Veinalgol.
Sérodausse ovarien.	Veinogène.
Sérogyne.	Veinoposine.
Silguine.	Veinosérum.
Sistex.	Veinosine.
Sistomensine Ciba.	Veinotrope.
Spasmalgine Roche.	Véralgine.
Spas Malone.	Verticurine.
Spasmine Jolly.	Viosten.
Spasmoneurol.	Viradène.
Spicanol.	Viscoveine.
Stopral.	Vitacrines.

#### PYÉLONÉPHRITES

Absuric.	Buccurol.
Acatar.	Bucmine.
Amibiasine.	Canol.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Caparlem.
Aniodol.	Capsules Bardet.
Anthraccalcine.	Cholagol.
Anthrasedtol.	Colitique.
Antigénines.	Coli-Vaclydun.
Argion.	Cynurol Rosa.
Arhéol.	Dismine Favret.
Bacté-phages.	Disolurane Vély.
Baldisedan.	Élatine Bouin.
Bensamine.	Elgine Julien.
Benzobromine.	Entérofagos.
Bilivaccin anticollibacillaire.	Eumictine.
Binoxol.	Flavurool.



### III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

#### PYÉLONÉPHRITES

Fokiényl.	Quinquina Gmet.
Formocarbène.	Radiotropine.
Formocitrine.	Santal Midy.
Gonagone.	Santal Monal.
Hépatiformine.	Septicémine Cortial.
Héxorène.	Solvuric.
Hexotal.	Térébine.
Immunizols Grémy.	Terpine granulée Baron.
Iodhema.	Terpoxy externe.
Ivago-Coli buvable.	Théocalciodé.
Ivago de Goldenberg vaccin « U ».	Triseptine.
Lacto-sérum Lavril.	Ultraformine.
Lithinoformine.	Urseptine Rogier.
Lysaxins L. M. L.	Ur-Clar.
Mésothine.	Uribiline.
Métaformine.	Uriclarine.
Microlyse.	Urisanine.
Mictasol.	Urobuccol Malmanche.
Mictophile Richer.	Uroformine Gobey.
Mictoseptol.	Uroiodine.
Mictualine.	Urol.
Mucobismuthine.	Urométhyl.
Osmo vaccin Bréant.	Urométine Lambiotte.
Oxylène.	Uromil.
Paradol.	Urosalyl. — Urosalyl méthylé.
Pilules V. E. Doumer.	Urosan Dufayard.
Pneumo-Lipase.	Uvargol.
Probios.	Vaccins Bruschetti.
Pyoformine.	Vaccins Ronchèse. — Ampho-vaccins.
Pyrelaine Collas.	Vaclydun.
Pyri-Pyridium.	Zimbyl.
Pyurol.	

#### SALPINGO-OVARITES

Ampho-vaccins Ronchèse.	Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.
Antifluor.	Indhaméline Lejeune simple.
Antipiol.	Ivago de Goldenberg vaccin « M ».
Aristargol.	Kaviase.
Aseptone.	Lysaxins L. M. L.
Aseptovules.	Magnésovules.
Diathermie.	Mésiforme.
Evine.	Métricine.
Extrait Hamyd.	Microlyse.
Glésol.	Mictasol.
Glucolactol.	Nestosyl.
Glyco-Thymoline.	Osmo vaccin Bréant.
Goménol.	Ovules Chaumel.
Gynéco-vaclydun.	
Hamamélis Gmet.	
Hémaxol.	
Immunizols Grémy.	

### **III. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.**

#### **SALPINGO-OVARITES**

Ovules halogènes du D <sup>r</sup> Bern.	Sétirtem comprimés.
Ovules intima.	Spyrolides.
Ovules au terpoxy.	Tampol Roche.
Ovules vaccins Ivago de Goldenberg.	Térébine.
Oxyléine.	Térozone.
Physiosthénine.	Terpoxy externe.
Pituilobine Byla.	Themsaline.
Progone.	Tridynol.
Propidon.	Uvargol
Rectagine.	Vaccins Bruschetti.
Salantale.	Vaccins Ivago.
Sanoformine.	Vaccins pansements Virul- tra.
Sels du Jura.	Vaccins Sténé.
Sephydine.	Végétol externe.
Septométrol Vély.	Vioforme Ciba (et ovules)
Sérébé du D <sup>r</sup> Blaizot.	Zimbyl.

#### **SYPHILIS RÉNALE**

(Voir : Syphilis.)

#### **TUBERCULOSE RÉNALE**

(Voir : Tuberculose.)

### **IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.**

#### **ANTIDYSPNÉIQUES**

Acécoline-camphre.	Avistyl.
Adoverne.	Benzoquinol.
Adrénaline Invar.	Cafédrine.
Adrénine.	Campho-spartéine Dubois.
Alepsal Genévrier.	Codobromyl.
Alzine.	Coramine Ciba.
Ampoules Boissy.	Crataegus Gmet.
Ampoules de Pantopon Roche.	Cytophédrine.
Anaclasine Ranson.	Détensyl.
Anapeptone Vassal.	Diuréphédrine.
Angitan.	Élixir Thiogaiacolé Arque- vaux.
Antiasmatiche Domergue.	Éphédrasme.
Antiasthme Bengalais.	Éphédrine naturelle Béral.
Antiasthmine Dehaussy.	Éphédrocamphe.
Anxiol.	Éphédromel Béral.
Asthmaphédrine.	Éphéiodine Béral.
Asthmo-Actine.	Éphétropine Béral.
Asthmolysin.	Euphysol.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

### ANTIDYSPNÉIQUES

Eupnine Vernade.	Phusasminé.
Eupnogénol.	Pneumogéine Renard
Eusomnine Bélières.	Poudre Escouffaire.
Freinospasmyl.	Poudre et cigarettes Zani.
Frénasma.	Pulmacardia.
Gardéphédrine.	Pulmocardine.
Génomorphine.	Pulmodion.
Gouttes Eryl.	Pulmogrog.
Hémogényl Godart.	Renaleptine.
Humoro-stabiline.	Révuksoplasmé.
Hypophédrine.	Rythmos Letsyn.
Iodéine Montagu.	Salyptol.
Iodo-salva Evesque.	Sanex inhalant.
Kipsol.	Sérum antiasthmatique de
Murones du Dr Robert	Heckel.
Jacques.	Spasmoneural.
Oxy-injecteur du Dr Fia-	Tercodal.
lip.	Terpoxyl interne.
Papavéryl.	Théocalciodé.
Pecthional.	Tiodine Cognet.
Pectoforme.	Valériane Gmet.
Peptone Vassal.	Zaryl.

### ANTISEPTIQUES DES VOIES RESPIRATOIRES

Alcamfetol.	Créo-suppo-camphre.
Allisatine Sandoz.	Élixir thiogalacolé U. N.
Aloysine.	Arquevaux.
Amborhinol.	Emgé Lumière.
Anaquinine Lescène.	Ethyl Pneumine « Lersam ».
Aniodol.	Eucalyptine Lebrun.
Antiasthmatique Do-	Fornose.
mergue.	Galacamphre.
Antiphymique Vadam.	Galarsol.
Arcanan.	Gatercodéine Domergue.
Azufrol.	Goménol.
Balmiga.	Gouttes Daynoc.
Balsamol Lescène.	Gouttes Eryl.
Benzoquinol.	Holaseptine.
Boréol.	H yol.
Bronchoderminé.	Inhalation Lancosme.
Bronchoseptol Lauriat.	Inhalol.
Cachets Kapytan.	Inhalone.
Cachets Roche de Thiocol.	Inhalo-Sel.
Capsules Dartois.	Inhaloxyl.
Capsules Nogués.	Iodex.
Chlorinol.	Marrucol.
Codobromyl.	Murones du Dr Robert
Codocol.	Jacques.
Comprimés Roche de Thio-	Opocalcium du Dr Guer-
col.	sant.
Créosote soluble Vacheron.	Oxymenthol Perraudin.
Créositoires.	Ozothine.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

### ANTISEPTIQUES DES VOIES RESPIRATOIRES

Pecthional.  
Pectoforme Godart.  
Perles Taphosote.  
Perubore.  
Phosote Lambiotte.  
Pneumostyl Daguin.  
Pulmacardia.  
Pulmoserum.  
Pulvéol.  
Réstyl.  
Révulsif Milko.  
Révulsif Proci pha.  
Rhinadrol.  
Rosalyl A et B.  
Sanex Inhalant.  
Septolan.  
Sirop de créosote Vacheron.  
Sirop de Gaiarsol.  
Sirop de Glycérophosphates  
Vacheron.

Sirop Famel.  
Sirop Gribell.  
Sirop Mireille.  
Sirop Roche au Thiocol.  
Sirop Viano.  
Solution Pautauberge.  
Stillargol.  
Sulfo-thiorine.  
Sulphium.  
Térébine.  
Terpine granulée Baron.  
Terpoxyl externe.  
Terpoxyl interne.  
Touranyl.  
Tubérol.  
Vaccin Ronchèse Ampho-  
vaccins.  
Vacludun.  
Zaryl.

### ANTISPASMODIQUES — SÉDATIFS DE LA TOUX

Acobella.  
Aethone.  
Alepsal Genevrier.  
Amphostène.  
Amphotonyl.  
Ampoules Spasmalgine  
Roche.  
Anaquintine Lescène.  
Antiasthmatique Domergue  
Anxiol.  
Aquintol Petit-Mialhe.  
Asthmaphédrine.  
Avistyl.  
Balsamol Lescène.  
Bellafoline Sandoz.  
Benzoquinol.  
Benzyanyl.  
Benzylol.  
Blagny (gouttes et dragées).  
Bronchoforme.  
Bronchoseptol Lauriat.  
Broncosol.  
Cachets Kapytan.  
Cachets « Roche » de Thio-  
col.  
Cafédrine.  
Capsules Bruel.  
Capsules et sirop Préga.  
Capsules Noguès.  
Chloral bromuré du Dr Du-

bois.  
Codérax.  
Codobromyl.  
Codocol.  
Codoforme.  
Comprimés « Roche » de  
Thiocol.  
Créoformine.  
Créositoires.  
Créo-suppo-campbre.  
Élatine Bouin.  
Élixir thiogaiacolé Arque-  
vaux.  
Éphédrine naturelle Béral.  
Éphédromel Béral.  
Éphéiodine Béral.  
Éphétropine Béral.  
Eucalyptine Le Brun.  
Eupavéryl Pachaut.  
Euphon.  
Frénasma.  
Germose.  
Glottyl.  
Gouttes antispasmodiques  
Dausse.  
Gouttes Blagny.  
Gouttes Eryl.  
Gouttes Malone.  
Gouttes Leconte.  
Gouttes Narkay.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

### ANTISPASMODIQUES — SÉDATIFS DE LA TOUX

Gouttes Nican.	Pulmoverne.
Gouttes Pilka.	Quinthéryl.
Granulés des Vosges.	RévuIsoplasme.
Guéthural.	Rosalyl A et B.
Hergénol.	Salypsol Narty.
Hypophédrine.	Sédogrippine.
Infangyl Carlier.	Sédosine.
Iodéine Montagu.	Septolan.
Iodosalva Evesque.	Sirop Brahma.
Iodotensyl.	Sirop de Castanol.
Kipsol.	Sirop Famel.
Kluchol Remeaud.	Sirop de Gaïarsol.
Lucodal.	Sirop Gribell.
Miroxyl.	Sirop Mireille.
Murones du Dr Robert	Sirop Nogués.
Jacques.	Sirop Vacheron au gaïaco.
Narcyl.	Sirop Viano.
Néopulmine.	Spasmonéural.
Papavéryl.	Spasnéurol.
Pâte Mireille.	Sulfocol Godard.
Pecthional.	Surparine.
Pectobiol.	Tercodal.
Pectoforme Godart.	Terkal Monal.
Phosphogaïacol Mary.	Thiosote.
Pilules bronchotoniques	Thio-terpine Dalin.
Arco.	Touranyl.
Pneumogénol.	Tubérol.
Primulyse.	Valériflore.
Pulmocardine.	Valérinodor Malmanche.
Pulmodion.	Valérobromine Legrand.
Pulmogrog.	Valthène.
Pulmosérum.	Zaryl.

### HÉMOSTATIQUES

(Voir : Appareil circulatoire.)

### MODIFICATEURS SÉCRÉTOIRES BALSAMIQUES

Açatar.	Créosal Dubois.
Alcamfétol.	Créositoires.
Avistyl.	Créosote soluble Vacheron.
Balsamol.	Créo-suppo-camphre.
Blagny (gouttes et dra-	Élatine Bouin.
gées).	Eucalyptine Lebrun.
Bronchitol.	Goménol.
Broncosol.	Gouttes Eryl.
Cachets Roche de Thiocol.	Gouttes livoniennes de
Capsules Dartois.	Trouette-Perret.
Capsules Nogués.	Murones du Dr Robert
Comprimés Roche de Thio-	Jacques.
col.	Pectoforme Godart.

## **IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.**

### **MODIFICATEURS SÉCRÉTOIRES BALSAMIQUES**

Perles Taphosote.  
Phosote Lamblotte.  
Phosphogaiacol Mary.  
Pulmacardia.  
Pulmocardine.  
Pulmodion.  
Pulmosérum.  
Pulmoverne.  
Réstyl.  
Rosalyl A et B.  
Salyptol Narty.  
Sirop de Gaïarsol.

Sirop de Glycérophosphates  
Vacheron.  
Sirop Famel.  
Sirop Gribell.  
Sirop Mireille.  
Sirop Vacheron au gaïaco.  
Térébine.  
Terkal Monal.  
Terpine Gonnon.  
Thiocol Roche.  
Thiosote.  
Thio-Terpine Dalin.

### **MODIFICATEURS SÉCRÉTOIRES EXPECTORANTS**

Avistyl.  
Balsamol.  
Bronchoseptol Lauriat.  
Cachets Kapytan.  
Codobromyl.  
Codocol.  
Créositoires.  
Glottyl.  
Marrubène.  
Miroxyl.  
Muronos du Dr Robert  
Jacques.  
Pectobiol.  
Pectoforme Godard.

Phymo-stéryl Leisyn.  
Réstyl.  
Rosalyl.  
Septolan.  
Sirop de Gaïarsol.  
Solution Pautauberge.  
Sulfocol Godard.  
Sulfo-thiorine.  
Sulfureux Pouillet.  
Sulphium.  
Tercodal.  
Térébine.  
Touranyl.

### **RÉVULSIFS**

(Voir Chirurgie : Révulsifs.)

### **SÉROTHÉRAPIE — VACCINOTHÉRAPIE**

Ampho-vaccins Ronchèse.  
Avistyl.  
Broncho-Vaclydun.  
Entéro-Antigènes.  
Immunizols Grémy.  
Immuno-vaccin broncho-  
pulmonaire.  
Institut Pasteur Sérums.  
Institut Pasteur Vaccins.  
Néo-Dmétys.  
Probios.  
Protidyne injectable.  
Vaccin anti-asthmatique du  
professeur Minet

Vaccin anti-pneumonique  
du professeur Minet.  
Vaccin de Weill et Dufourt.  
Vaccinothérapie atoxique  
Cépède.  
Vaccins atoxiques stabi-  
lisés.  
Vaccins bactériens I. O. D.  
Vaccin Ivago de Golden-  
ber.  
Vaccins pansements Viral-  
tra.  
Vaccins Ronchèse. — Am-  
pho-vaccins  
Vaclydun.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### ADÉNOPATHIE TRACHÉO-BRONCHIQUE

Adrénargol.	Iodogénol Pépin.
Arséniode.	Iodo-Maisine Globules.
Banikol.	Iodométine.
Baume Iki.	Iodonésyl.
Bronchitol.	Iodo-vitasine.
Bronchoderminé.	Lipiodol Lafay.
Brôncosol.	Lipiodine Ciba.
Capsules et sirop Préga.	Liposplénine.
Codobromyl.	Mancobène.
Collo-iode Dubois.	Marimine.
Colloïdogénine du Dr	Marinol.
Bayle.	Micelliode.
Créositoire infantile.	Miroxyl.
Curiode.	Morisland irradié.
Curiode arsénie.	Morrhualène Gautier.
Cytobiase.	Morrhuétine Jungken et
Cyto-Manganol Corbière.	Morrhuétine Jungken vi-
Dicaliode.	taminée.
Énergine iodée de Berck.	Morruxine.
Éniode Lefebvre.	Morubiase.
Entéro-antigènes.	Moruxase.
Éranol.	Murones du Dr Robert
Eucalyptiné.	Jacques.
Fludiöse.	Narcyl.
Fucoglycine du Dr Gressy.	Opocobalt.
Gaduamine.	Pépiodon.
Gaduase.	Phosphogaiacol Mary.
Germose.	Phospholéose Demasles.
Glottyl.	Plasma de Quinton.
Gmet (Extraits).	Quinquina Gmet.
Gouttes Malone.	Résyl.
Gouttes Narkay.	Rhocya Dyn.
Gouttes Nican.	Riodine.
Gouttes Pilka.	Salyptol Narty.
Hémagénine Giraud.	Sanas.
Hémato-iodine.	Sirop Brâhima.
Hémogényl Godart.	Sirop de glycérophosphates
Hulle de foie de morue	Vacheron.
médicinale suractivée	Sirop Gribell.
Rhône-Poulenc.	Sirop Mireille.
Huile iodée Finikoff.	Sirop Tinardon.
I. A. M.	Stérogyl.
Infanyl Carlier.	Sulfarsiode.
Iodalose Galbrun.	Sulfureux Pouillet
Iodarsenic Guiraud ou	Tanno-Calciné.
gouttes Paidophiles.	Ultra-violet.
Iodassium.	Uroïdine.
Iodex.	Vin Girard.
Iodocalcium.	Viosten.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### ASTHME — ASTHME DES FOINS

Adrénaline Invar.	Carboiodure Fraudin.
Adrénine.	Céthocal du D <sup>r</sup> Lemay.
Adréphédrine Béral.	Cinalose.
Alcanfétol.	Collo-iodé Dubois.
Aérocid.	Comprimés Roche de Thio-
Alepsal Genevrier.	col.
Algatan.	Créo-suppo-camphre.
Alzine.	Curiodé.
Amborhinol.	Curiodé arsénié.
Amphostène.	Cytophédrine.
Amphotonyl.	Dépuriodé du D <sup>r</sup> Roger
Ampho-vaccins Ronchèse.	Weber.
Ampoules Boissy iodure de	Désensibilysine.
potassium.	Dicaliodé.
Ampoules de Pantopon	Diuréphédrine.
Roche.	Dragécalcion.
Anaclasine Ranson.	Élatine Bouin.
Anapeptone Vassal.	Élixir thiogalacolé Arque-
Anaquinine.	vaux.
Angitan.	Éniode Lefebvre.
Antiasthmatique Domergue	Entéro-antigènes.
Antiasthme Bengalais.	Éphédrasmine.
Anti-asthme Dehaussy.	Éphédrine naturelle Béral.
Anxiol.	Éphédrocainphre.
Arséniode Buriat.	Éphédromel Béral.
Artoradine.	Éphéiodine Béral.
Asthmo-Actine.	Éphétropine Béral.
Asthmaphédrine.	Épholéine.
Asthmolysin.	Éranol.
Avistyl.	Ergotine Lamante.
Azigol Thévenot.	Essoforme.
Balsamol Lescène.	Eupavéryl Pachaut.
Belladénal Sandoz.	Euphysol.
Bellafoline Sandoz.	Eupnine Vernade.
Benzoquinol.	Eupnogénol.
Benzyanyl.	Freinix Buisson.
Benzylo.	Freinospasmyl.
Biophylactine M. G.	Frénasma.
Blagny (dragées).	Fucoiodine.
Boldo Gmet.	Gaduase.
Bronchitol.	Gardéphédrine.
Bronchodermine.	Génomorphine.
Bronchoforme.	Germose.
Broncosol.	Globules Fumouze iodure
Cachets Kapytan.	de potassium.
Cachets Roche de Thiocol.	Glycocarpine.
Cachets Spévin.	Gouttes antispasmodiques
Cacodyle Gonnon.	Dausse.
Cafédrine.	Gouttes Blagny.
Calcozymase.	Gouttes Narkay.
Caparlem.	Gouttes Nican.
Capsules Bardet.	Gouttes Pilka.
Cabsules et sirop Préga.	Hectine.
Carpoiodine.	Héparbiline.



## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### ASTHME — ASTHME DES FOINS

Hergénol.	Peptalmine.
Humoro stabiline.	Peptone Vassal.
Hypophédrine.	Phosoforme.
I. A. M.	Phusamine.
Immunizols Grémy.	Pneumogéine Renard.
Iodalose Galbrun.	Pneumogénol
Iodamélis Logeais.	Pneumo-Lipase.
Iodassium.	Polyodure Gonnon.
Iodaubépine.	Polypeptonal.
Iodéine Montagu.	Poudre Escoufflaire.
Iode organique Boissy.	Poudre et Cigarettes Zani.
Iodogénol Pépin.	Primulyse.
Iodo-Maisine globules.	Probios.
Iodométine.	Protiodyne.
Iodone Robin.	Protiodyne dragées.
Iodonésyl.	Pulmacardia.
Iodonucléol.	Pulmocardine.
Iodosalva Evesque.	Pulvéol.
Iodotensyl.	Pyréthane.
Iodo-Vitasine.	Quinthéryl.
Iodural Novat.	Rénaleptine.
Iodurase.	Révulsif liquide Boudin.
Iodure Pachaut.	Révulsoplasme.
Ivago de Goldenberg Vac- cin « A ».	Rhocya Dyn.
Jabosulfène.	Rhodazil.
Kluchol Remeaud.	Riodine.
Kodos.	Sanédrine.
Lipiodol Lafay.	Sanex-Inhalant.
Lipiodine Ciba.	Sédoneurol Dehaussy.
Magiodyl.	Sérum antiasthmatique de Heckel.
Mangarsenic.	Sirop iodotannique Guil- lermond.
Marrucol.	Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Micellode.	Sirop Mireille.
Miroxyl.	Sirop Noguès.
Murones du D <sup>r</sup> Robert Jacques.	Solucampbre éphédriné.
Nalodine Logeais.	Spasmonéural.
Natirose.	Spasneurol.
Néopancarpine.	Stovédrine.
Néo-Physio.	Sulfarsiode.
Néopulmine.	Sulfo-thiorine.
Néo-Riodine.	Sulfureux Pouillet.
Opothérapie Byla associée.	Surparine.
Opothérapie Fournier.	Sympathyl.
Organicalcion simple.	Syncrines Choay.
Oxy-injecteur du D <sup>r</sup> Fialip.	Tercodal.
Oxymenthol Perraudin.	Térozone.
Ozothine.	Terpoxyl externe.
Papavéryl.	Terpoxyl interne.
Paratone Léo.	Théocalciode.
Pecthional.	Thio-Terpine Dalin.
Pectobiol.	Tiodine Cognet.
Pépiodon.	

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### ASTHME — ASTHME DES FOINS

Triglandine.	Vaccinothérapie atoxique
Triglandol.	Cépède.
Trinitrine-Papavérine La- leuf.	Vacco Ivago de Golden- berg (antiasthmatique).
Ultra-violet.	Vaccins Ronchèse. — Am- pho-vaccins.
Uribiline.	Vagosédyl.
Uroiodine.	Valthène.
Vaccin antiasthmatique du professeur Minet.	Vioxyl Mouneyrat.
	Zaryl.

### BRONCHITE FÉTIDE GANGRÈNE PULMONAIRE ABCÈS DU POUMON

Acatar.	Murones du D <sup>r</sup> Robert
Alcamfétol.	Jacques.
Allisatine « Sandoz ».	Mycolysine du D <sup>r</sup> Doyen.
Aloysine.	Néo-physio.
Blagny.	Ozothine.
Bronchodermine.	Phosoforme.
Bronchoseptol Lauriat.	Résy.
Créositoire infantile.	Septolan.
Eucalyptine Le Brun.	Sirop de gairarsol.
Gaïacamphre.	Sulfo-thiorine.
Goménol.	Sulphium.
Immuno-vaccin broncho- pulmonaire.	Terpoxyl interne.
	Tubérol.
	Zimbyl.

### CONGESTIONS PULMONAIRES PNEUMONIE FRANCHE AIGUE BRONCHO-PNEUMONIES

Alcamfétol.	Cacodyle Gonnon.
Ampho-vaccin pulmonaire Ronchèse.	Cadior.
Anacamphre.	Camphodausse.
Antiphlogistine.	Campho-Spartéine Dubois.
Antiphymique Vadam.	Camphostyl Lacroix.
Avistyl.	Camphydryl Robin.
Balsamol Lescène.	Carboiodine.
Benzobromine.	Cinalose.
Bi-Citrol.	Citralin.
Bronchitol.	Citrofluyl.
Bronchodermine.	Citrophos.
Bronchoseptol Lauriat.	Citrosodine Longuet.
Broncho-Vaclydun.	Codobromyl.
Broncosol.	Comprimés Roche de Thio- col.
Cachets Kapytan.	Coramine.
Cachets Roche de Thiocol.	Créositoires.

## **IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.**

### **CONGESTIONS PULMONAIRES PNEUMONIE AIGÜE BRONCHO-PNEUMONIES**

Créosote soluble Vacheron.	Pulmoverne.
Créo-suppo-camphre.	Pyoformine.
DiénoI.	Quinquina Gmet.
Diurétique Gmet.	Résyl.
Elbon Ciba.	Révulsif liquide Boudin.
Elixir Ducro.	Révulsif Milko.
Erцерhinol.	Révulsif Procipha.
Éthyl pneumine Lersam.	Révulsoplasme.
Eucalyptine Le Brun.	Salyptol Narty.
Frénasma.	Sécacornine Roche
Gaiacamphre.	Sédoneurol Dehaussy.
Germose.	Septicémine Cortial.
Goménol.	Sirop Famel.
Gouttes Blagny.	Sirop de Gaïarsol.
Gouttes Pilka.	Sirop Gribell.
Hamacitro.	Sirop Mireille.
Holaseptine.	Sirop Noguès.
Immuno-vaccin broncho- pulmonaire.	Sirop Roche au Thiocol.
Institut Pasteur Sérums.	Sirop Vacheron au Gaïa- col.
Institut Pasteur Vaccins.	Sirop Viano.
Iodex.	Solucamphre Delalande.
Ivago de Goldenberg vac- cin « A ».	Spicanol.
Lantol.	Staphylase du Dr Doyen.
Leucoseptyl.	Sthénoléine.
Lobéline Bruneau.	Sulfocol Godart.
Lobéline Sandoz.	Térébine.
Lugocalcion.	Terkal Monal.
Marrucol.	Térozone.
Murones du Dr Robert Jacques.	Terpoxyl interne.
Mycolysine du Dr Doyen.	Thiocol Roche.
Myothermine.	Thiosote.
Néo-Physio.	Thio-Terpine Dalin.
Nucléocardyl.	Touranyl.
Oxy-injecteur du Dr Fia- lip.	Tubérol.
Papier Iodogène Fymonnet.	Vaccin anti-pneumonique du professeur Minet.
Pecthional.	Vaccin de Weill et Dufourt.
Pectoforme Godart.	Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Pectobiol.	Vaccins bactériens I. O. D.
Phosoforme.	Vaccin Ivago de Golden- berg.
Phosote Lambiotte.	Vaccins Ronchèse (ampho- vaccins).
Polycautére.	Vaclydun.
Polyvaline du Dr Bayle.	Vaso-Neurine.
Prévalidine.	Vésicatoire rose Beslier.
Probios.	Zimbyl.
Protiodyne.	
Pulmosérum.	

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### COQUELUCHE — TOUX SPASMODIQUES

Acobella.  
Adrénaline Invar.  
Adrénergol.  
Adrénine.  
Aethone.  
Amphosthène.  
Ampoules Boissy.  
Anaquintine.  
Antiasthmatique Domergue  
Aquintol Petit Mialhe.  
Avistyl.  
Balsamol Lescène.  
Bellafoline Sandoz.  
Benzoquinol.  
Benzyanil.  
Benzylol.  
Blagny (gouttes, dragées).  
Bronchitol.  
Bronchodermine.  
Bronchoforme.  
Bronchoseptol.  
Cachets Roche de Thiocol.  
Cafédrine.  
Capsules et sirop Préga.  
Capsules Küchmier au Mé-  
captoi.  
Céthocal du D<sup>r</sup> Demay.  
Chloral bromuré du D<sup>r</sup> Du-  
bois.  
Cocaine Midy.  
Codérax.  
Codobromyl.  
Codocol.  
Codoforme.  
Comprimés Roche de thio-  
col.  
Coramine Ciba.  
Créoformine.  
Curiode.  
Curiode arsenié.  
Dicaliode.  
Dragécalcion.  
Elixir thiogaiacolè Arque-  
vaux.  
Éphédromel Béral.  
Ergotine Lamante.  
Eucalyptine Lebrun.  
Eupavéryl Pachaut.  
Euphon.  
Fornose.  
Frenasma.  
Gatercodéine.  
Germose.  
Glottyl.

Glycocarpine.  
Goménol.  
Gouttes antispasmodiques  
Dausse.  
Gouttes Blagny.  
Gouttes Daynoc.  
Gouttes Eryl.  
Gouttes Leconte.  
Gouttes Malone.  
Gouttes Narkay.  
Gouttes Nican.  
Gouttes Pilka.  
Hergénol.  
Holaseptine.  
Hyol.  
Infangyl Carlier.  
Inhalone.  
Iodo-Salva Evesque.  
Kipsol.  
Kluchol Remeaud.  
Lucodal.  
Miroxyl.  
Murones du D<sup>r</sup> Robert  
Jacques.  
Narcyl.  
Néo-Dmétys.  
Néopancarpine.  
Neurocalcium.  
Papavéryl.  
Paroxyl.  
Pecthional.  
Pectoforme Godart.  
Poudre Escouffaire.  
Poudre et Cigarettes Zanl.  
Prévalidine.  
Pulmodion.  
Pulmogrog.  
Pulmoverne.  
Pulvéol.  
Pyréthane.  
Quinino phytine Ciba.  
Quinthéryl.  
Rénaleptine.  
Révulsif Milko.  
Révulsif Procipha.  
Révulsoplasme.  
Rosalyl A et B.  
Salyptol Narty.  
Sanex-Inhalant.  
Sédoneurol Dehaussy.  
Sédosine.  
Sirop Brahma.  
Sirop Castanol.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### COQUELUCHE — TOUX SPASMODIQUES

Sirop de glycérophosphates Vacheron.	Térébinte.
Sirop Famel.	Terpine granulée Baron.
Sirop Gribell.	Thiocol Roche.
Sirop Mireille.	Thio-Terpine Dalin.
Sirop Noguès.	Touranyl.
Sirop Roche au Thiocol.	Tubérol.
Sirop Vacheron au Gaïacol.	Ultra-violet.
Sirop Viano.	Vaccinothérapie atoxique
Soderséine.	Cépède.
Solution Pautauberge.	Vaccins atoxiques stabi-
Spasneuro.	lisés.
Sulfocol Godart.	Vaccins bactériens I. O. D.
Sulfoxyl.	Valérinodor Malmanche.
Sulfureux Pouillet.	Valérobromine Legrand.
Sulfuryl Monal.	Valthène.
Suppositoires Pyrax.	Véganine.
Tercodal.	Zaryl.

### EMPHYSÈME PULMONAIRE SCLÉROSE PULMONAIRE

Aérocid.	Désensibilysine.
Algatan.	Dicaliode.
Alzine.	Diuréphédrine.
Ampoules Boissy.	Élatine Bouin.
Antiasthmatique Dommargue.	Élixir thiogaïacolé Arque-
Antiasthme Bengalais.	vaux.
Anti-Asthmine.	Eniode Lefebvre.
Anxiol.	Entéro-Antigènes.
Arséniodide Buriat.	Epholéine.
Asthmo-Actine.	Éphéiodine Béral.
Avistyl.	Éphétropine Béral.
Benzo iodhydrique.	Éranol.
Benzoquinol.	Eucalyptine Lebrun.
Cachets Kapytan.	Euphysol.
Cafédrine.	Eupnine Vernadé.
Capsules Küchner au Mécapitol.	Eupnogénol.
Carboiodine.	Fondant iodotannique
Carboiodure Fraudin.	Dausse.
Céthocal du Dr Lemay.	Freinospasmyl.
Cinalose.	Frénasma.
Collo-Iode Dubois.	Fucoxodine.
Coramine Ciba.	Gardéphédrine.
Cortiodé.	Globules Fumouze iodure
Créo-suppo-campbre.	de potassium.
Curiodé.	Gouttes Blagny.
Curiodé arsenié.	Gouttes Narkay.
Cytophédrine.	Humoro stabiline.
Dépuriodé du Dr Roger Weber.	Hypophédrine.
	Inhalation Lancosme.
	Iodalose Galbrun.
	Iodamélis Logeais.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### EMPHYSÈME PULMONAIRE SCLÉROSE PULMONAIRE

Iodassium.	Pneumogénol.
Iodaubépine.	Pneumo-Lipase.
Iodéine Montagu.	Prévalidine.
Iode organique Boissy.	Pulmacardia.
Iodogénol Pépin.	Pulmocardine.
Iodo-Maisine (Globules.)	Pulmosérum.
Iodométine.	Quinthéryl.
Iodone Robin.	Révuksif liquide Boudin.
Iodonésyl.	Révuksoplasme.
Iodonucléol.	Rhocya Dyn.
Iodo-Salva Evesque.	Riodine.
Iodo-Vitasine.	Rythmos Leisyn.
Iodural Novat.	Sirop Gribell.
Iodurase.	Sirop iodotannique Guil-
Iodure Pachaut.	lermond.
Kodos.	Sirop minéral sulfureux
Lipiodol Lafay.	Crosnier.
Lipoiodine Ciba.	Sirop Mircille.
Magiodyl.	Sirop Noguès.
Mangarsenic.	Sulfarsiode.
Micelliode.	Sulfo-thiorine.
Miroxyl.	Sulfureux Pouillet.
Murones du D <sup>r</sup> Robert	Tércodal.
Jacques.	Térozone.
Nafiodine Logeais.	Terpine Gonnon.
Néo-Physio.	Terpine granulée Baron.
Néo-Riodine.	Théocalciode,
Opotonine.	Tiodine Cognet.
Oxy-injecteur du D <sup>r</sup> Fialip.	Touranyl.
Oxymenthol Perraudin.	Uroiodine.
Pépiodon.	Vaccin antiasthmatique du
Phosoforme.	professeur Minet.
Phusasmine.	Zaryl.
Pneumogéine Renard.	

### ŒDÈME AIGU DU POUMON

Acécoline-camphre.	Natibaïne.
Adoverne.	Natirose.
Ampoules Boissy.	Ouabaine Arnaud.
Avistyl.	Révuksoplasme.
Coramine Ciba.	Tétranitrol Roussel.
Digitaline Nativelle.	Trinitrine caféinée Dubois.
Diurétique Gmet.	Zimbyl.

### PLEURÉSIES

Antiphlogistine.	Baume Aroma
Antiphymique Vadam.	Baume Bengué
Avistyl.	Bi-citrol.
Balsamol Lescène.	Bronchodermine.
Baume Adol.	Calcium Sandoz.

## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### PLEURÉSIES

Chloro-Calcion.	Neptal.
Cinalose.	Organi-calcion simple.
Colloïdégénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Oxy-injecteur du D <sup>r</sup> Fialip.
Créositoires	Papier Iodogène Eymon-
Diurétique Gmet.	net.
Dragécalcion.	Pneumo-Lipase.
Eucalyptine Lebrun.	Polycautére.
Gaduase.	Quinquina Gmet.
Goménol.	Révulsif liquide Boudin.
Iodex.	Révulsif Milko.
Lipodéterpénol.	Révulsif Procipha.
Marrucol.	Révulsoplasme.
Murones du D <sup>r</sup> Robert	Sirop de Gaïarsol.
Jacques.	Spicanol.
Myoral.	Sthénoléine.
Myothermine.	Térozone.
Néo-Physio — Physiosthé-	Vésicatoire Rose Beslier.
nine.	Zimbyl.

### TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGUËS, — BRONCHITES CHRONIQUES

Acatar.	Bronchitol.
Acobella.	Bronchodermine.
Aethone.	Bronchoforme.
Alcamfétol.	Bronchoseptol Lauriat.
Algatan.	Broncho-Vaclydun.
Allisatine Sandoz.	Broncosol.
Aloysine.	Cachets Kapytan.
Alzine.	Cachets « Roche » de Thiocol.
Ambörhinol.	Cacodyl Gonnon.
Ampho-tablettes Ronchèse.	Cadior.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Cafédrine.
Amphostène.	Capsules Dartois.
Anaquinine Lescène.	Capsules Küchner au Mé-
Aniodol.	captol.
Antiasthme Bengalais.	Capsules et sirop Préga.
Anti-Asthmine.	Capsules Noguès.
Antiphlogistine.	Carboiodure Fraudin.
Antiphymique Vadam.	Castanol.
Arcanan.	Céthocal du D <sup>r</sup> Lemay.
Ascoléine Rivier.	Cinalose.
Asthmaphédrine.	Cinéyl.
Asthmo-Actine.	Codérax.
Avistyl.	Codobromyl.
Azufrol.	Codocol.
Balmiga.	Codoforme.
Balsamol Lescène.	Colloïdégénine du D <sup>r</sup> Bayle.
Banikol.	Comprimés « Roche » de
Benzoquinol.	Thiocol.
Blagny (gouttes, dragées).	Cortiode.
Boréol.	Coryphédrine.

# IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

## TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES — BRONCHITES CHRONIQUES

Créoformine.		Huile de foie de morue mé-
Créosal Dubois.		dicinalesuractivée Rhône-
Créositoire infantile.		Poulenc.
Créosote soluble Vacheron.		Hyol.
Créo-suppo-camphre.		Hypophédrine.
Curiode.		I. A. M.
Curiode arsenié.		Immunizols Grémy.
Dépuriode du Dr Roger		Immuno-vaccin broncho-
Weber.		pulmonaire.
Dicaliode.		Infangyl Carlier.
Diuréphédrine.		Inhalation Lancosme.
Dragécalcion.		Inhalol.
Élatine Bouin.		Inhalone.
Elbon Ciba.		Inhalo-Sei.
Élixir thio-gaïacolé	Ar-	Inhaloxyl.
quevaux.		Iodalose Galbrun.
Éniode Lefebvre.		Iodamelis Logeais.
Éphédromel Béral.		Iodarsenic Guiraud ou
Éphéiodine Béral.		Gouttes Païdophiles.
Eranol.		Iodassium.
Ercérhinol.		Iodéine Montagu.
Eucalyptine Lebrun.		Iodex.
Euphon.		Iodorganique Boissy.
Euphysol.		Iodogénol Pépin.
Eupnine Vernade.		Iodo-Maisine Globules.
Eupnogénol.		Iodométine.
Fondant iodotannique		Iodone Robin.
Dausse.		Iodonésyl.
Fornose.		Iodonucléol.
Gaduase.		Iodo-Salva Evesque.
Gaiacamphre.		Iodosan.
Gardéphédrine.		Iodo-Vitasine.
Germose.		Iodural Novat.
Gernal.		Iodurase.
Glottyl.		Iodure Pachaut.
Glyco-Thymoline.		Kissol.
Goménol.		Léniforme.
Gouttes Blagny.		Limol Churchill.
Gouttes Daynoc.		Lipiodol Lafay.
Gouttes Eryl.		Lipiodine Ciba.
Gouttes Leconte.		Lucodal.
Gouttes Livoniennes	de	Magiodyl.
Trouette-Perret.		Malt Wander ou Gloma.
Gouttes Nican.		Mangarsenic.
Gouttes Pilka.		Marinol.
Granulés des Vosges.		Marrubène.
Guéthural.		Méthylarsinate Bouty.
Guttoléol.		Micelliode.
Hémogényl Godart.		Miroxyl.
Hergénol.		Morisland.
Histogénol.		Morrhuxine.
Holaseptine.		Morrubiase.



## IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

### TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES — BRONCHITES CHRONIQUES

Moruxase.	RévuIsoplasme.
Murones du D <sup>r</sup> Robert Jacques.	Rhino-Liposeptine.
Myothermine.	Rhocya Dyn.
Narcyl.	Riodine.
Nasobore.	Rosalyl A et B.
Néo-Physio	Salypsol Narty.
Néopulmine.	Sanex-Inhalant.
Néo-Riodine.	Sédogrippine.
Nucléigène.	Sédorl inol.
Nucléophorine.	Septolan.
Opocalcium du D <sup>r</sup> Guer-sant.	Sirop antiphlogistique de Briant.
Opocobalt.	Sirop Brahma.
Opotonine.	Sirop de créosote Vacheron.
Oxymenthol Perraudin.	Sirop de Gaiarsol.
Ozothine.	Sirop de glycérophosphates Vacheron.
Papier iodogène Eymonnet.	Sirop Famel.
Pâte Mireille.	Sirop Gribell.
Pecthional.	Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Pectobiol.	Sirop Mireille.
Pectoforme Godart.	Sirop Noguès.
Pépidon.	Sirop Roche au Thiocol.
Perles Taphosote.	Sirop Vacheron au Gaiacol.
Perubore.	Sirop Viano.
Pharyngaseptyl.	Sodothiol.
Phosote Lambiotte.	Solution Pautauberge.
Phosphogaiacol Mary.	Staphylase du D <sup>r</sup> Doyen.
Phusasmine.	Stillargol.
Phytomarine.	Sulfa.
Pneumogéine Renard.	Sulfarsiode.
Pneumogénol.	Sulfocol Godart.
Pneumo-Lipase.	Sulfocol Robin.
Pneumoseptyl Daguin.	Sulfo-Thiorine.
Polyiodure Gonnon.	Sulfoxyl.
Poudre Esconhaire.	Sulfureux Pouillet.
Poudre et Cigarettes Zani.	Sulfuryl Monal.
Prévalidine.	Sulf Y.
Primulyse.	Sulphium.
Probios.	Tercodal.
Pulmacardia.	Térébine.
Pulmocardine.	Terkal Monal.
Pulmodion.	Térozone.
Pulmogrog.	Terpine Gonnon.
Pulmosérum.	Terpine granuléc Baron.
Pulmoverne.	Thiocol Roche.
Pulvéol.	Thiorine.
Quinthéryl.	Thiosote.
Résyl.	Thio-Terpine Dalin.
RévuIsif liquide Boudin.	Thymo-menthol eupnique Belhomme.
RévuIsif Milko.	
RévuIsif Procipha.	

## **IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.**

### **TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES — BRONCHITES CHRONIQUES**

Tiodine Cognet.	Vaccin de Weill et Du-
Total-Tonic.	fourt.
Touranyl.	Vaccins Ronchèse-Am-
Tubérol.	pho-Vaccins.
Uribiline.	Vaclydun.
Vaccin anti-asthmatique du	Vésicatoire rose Beslier.
professeur Minet.	Zaryl.
	Zimbyl.

## **V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.**

### **ANESTHÉSIIQUES**

(Voir : *Système nerveux central.*)

Allocaïne Lumière.	Ovules au Nestosyl.
Chloréthyle Bengué.	Panthésine Sandoz.
Deicaine Roques.	Percaïnal.
Onguent Fréval.	

### **ANTISEPTIQUES EXTERNES — COMPRIMÉS**

Aloysine.	Comprimés d'Alibour.
Anexol.	Comprimés Guillaumin.
Aniodol.	Métacuprol.
Chlocci.	Noviode.
Chloraseptine optima.	Sanoram.
Clonazone Daufresne,	

### **ANTISEPTIQUES EXTERNES — LIQUIDES**

Alibourine.	Goménol.
Ampho-vaccins panse-	Gouttes Daynoc.
ments Ronchèse.	Hermophényl Lumière.
Anaquantine.	Holaseptine.
Anexol.	Inolène.
Aniodol.	Iodex.
Bacté-phages.	Laurenol Médicinal.
Biolactyl Fournier.	Lusoforme.
Boricine Meissonnier.	Néol.
Borostyrol Schlatter.	Pennès (Produits).
Camphydryl Robin.	Pyroléol Edet.
Coaltar saponiné Le Beuf.	Salubrine Phénix.
Collubleu.	Séphydine.
Entéroxin Leclerc.	Septolan.
Glyco-Thymoline.	Stannoxyd.

## V. — CHIRURGIE

### THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

#### ANTISEPTIQUES EXTERNES — LIQUIDES

Stillargol.	Thigénol Roche.
Sunalcot.	Tochlorine.
Sunoxol.	Végétol (externe).
Térébine.	Vinaigre de Pennès.
Terpoxyl externe.	

#### ANTISEPTIQUES EXTERNES — POMMADES

Acécolex.	Iodure d'Amidon Lumière.
Alibourine.	Lynevol.
Baume du Dr Baissade.	Méta-Titane.
Baume Sélénia.	Méta-Vaccin.
Borostyrol Schlatter.	Néo-Collargol.
Créosoforme Lambiotte.	Onction Leisyn.
Dermo-rhinistol.	Ormatol.
Dermo-Stalys du Dr Wa-	Pommade au Nestosyl.
gon.	Pyoamphogel Ronchèse.
Détergine du Dr Bourdeau.	Rozoderme.
Ektogan Bocquillon.	Stannoxy!
Gelée-vaccin Ivago (anti-	Stéramine.
pyogène).	Tégéol.
Goménol.	Uvéoline.
Iodex.	Vioforme Ciba.
Iodo-Maisine (pommade).	

#### ANTISEPTIQUES EXTERNES — POUDRES

Anexol.	Ektogan Bocquillon.
Aniodol.	Évine.
Biolactyl Fournier.	Iodure d'Amidon Lumière.
Boricine Meissonnier.	Poudre Chaumel.
Bulgarine Thépenier.	Septométrol Vély.
Clonazone Daufresne.	Vioforme Ciba (et ovules
Créosoforme Lambiotte.	au Vioforme).

#### ANTISEPTIQUES EXTERNES SAVONS — OVULES

Aniodol.	Evine.
Comprimés vaginaux Lei-	Goménol.
syn.	Savon Mollard.
Créositoires.	Végétol.
Créosoforme Lambiotte.	Vioforme végétal.
Ektogan Bocquillon.	

#### ANTISEPTIQUES INTERNES

Acatar.	Bensamine.
Amiphène.	Bulgarine Thépenier.
Ampho-vaccin Ronchèse.	Carbolactyl billé.
Bacté-phages.	Carbolactyl simple.

# V. — CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

## ANTISEPTIQUES INTERNES

Créositoires.	Murones du D <sup>r</sup> Robert
Cynurol Rosa.	Jacques.
Entérofagos.	Oxyléine.
Eranol.	Stanion.
Eucalyptine.	Stannoxyd.
Glesol.	Staphylocide Audras.
Goménol.	Staphylothanol.
Gouttes Daynoc.	Terpoxyl interne.
Hopogan.	Themsaline.
Leucoseptyl.	Uraseptine.
Levuro-maltine Déjardin.	Urométhyl.
Métaformine.	Urosalyl.
	V. A. V.

## BAINS

Bain Bagnor Radio-actif.	Ozothine.
Bain Carré.	Pennès (produits).
Bain Salvia.	Salvenase Legoux.
Boricine Meissonnier.	Sulfureux Pouillet.
Lacpinine.	Ulcéobalnéine.

## CATAPLASMES — RÉVULSIFS

Cataplasme du D <sup>r</sup> Lelièvre.	Papier Iodogène Eymonnet.
Fango Fisch et C <sup>ie</sup> .	Révulsif liquide Boudin.
Myothermine.	Révulsif Milko.
Noviode.	Révulsif Procipha.
Ouataplasme du D <sup>r</sup> Langlebert.	Révulsoplasme.
	Sinaplasme.
	Térébine.

## CICATRISANTS

Acécolex.	Opodermyl.
Albuplast Vigier.	Ormatol
Antiplol.	Pommade Raimoa.
Baume Selenia.	Pommade V. E. Doumer.
Cimarsényl.	Poudre et pommade d'insuline Phyloze.
Coaltar saponiné Le Beuf	Pyroléol Edot.
Créosoforme Lambiotte.	Rozoderme.
Dermoradol.	Séphydine.
Dermorhinistol.	Septolan.
Détergine.	Tégéol.
Eczéda.	Térébine.
Goménol.	Terpoxyl externe.
Insuline Byla.	Ulcérophile Nosan.
Insuline Phylose.	Végétol externe.
Lactoferment Lavril.	Vioforme Ciha (et ovules au Vioforme).
Léotamine.	Vulnérine du D <sup>r</sup> Bergen.
Lynevol.	
Méta-Titane.	
Onction Leisyn.	

## V. — CHIRURGIE

### THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

---

#### HÉMOSTATIQUES

(Voir : Appareil circulatoire.)

#### STÉRILISATION

(Voir : Antiseptiques externes.)

#### VACCINOTHÉRAPIE

Ampho-vaccins Ronchèse.	Salantale.
Anthraxone Fornet.	Stalysine.
Antigénines.	Staphylagone.
Antipiol.	Staphylo-Vaclydun.
Antivirus.	Vaccinothérapie atoxique
Arapal.	Cépède.
Immunizols Grémy.	Vaccins Bruschetti.
Immuno-vaccin broncho-	Vaccins atoxiques stabilisés
pulmonaire.	Vaccins bactériens I. O. D.
Institut Pasteur (Vaccins).	Vaccins Ivago de Golden-
Levurine extractive.	berg.
Lysaxins L. M. L.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Osmo-vaccins Bréant.	pho-vaccins.
Probios.	Vaccins Sténé.
Propidex.	Vaccins Pansements Virul-
Propidon.	tra.
Pyo-Amphogel Ronchèse.	Vaclyderm.
Pyo-Vaclydun.	Vaclydun.
Pyo-Vaclydun Pansement.	V. A. V.

---

## V. — CHIRURGIE

### THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

---

#### ADÉNITES

Banikol.	Dragécalcion.
Baume Iki.	Énergine iodée de Berck.
Colloïdogénine du Dr	Eniode Lefebvre.
Bayle.	Éranol.
Curiodé.	Fludiose.
Curiodé Arsénié.	Gaduamine.
Cytobiase.	Galliodine.
Cyto-Manganol Corbière.	Glandocalcyl.
Dépuriodé du Dr Roger	Hémato-iodine.
Weber.	Hormocline.
Dicaliodé.	Huile iodée Finikoff.

## V. — CHIRURGIE

### THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

#### ADÉNITES

Infra-rouges.	Phospholéose Demasles.
Iodarsenic Guiraud ou	Polyiodure Gonnon.
Gouttes Paidophiles.	Poudre Mass plastique.
Iodaseptine Cortial.	Quinquina Gmet.
Iodex.	Rob Lechaux.
Iodocalcium.	Sirop Girard.
Iodo-Maisine Pommade.	Sirop iodotannique Guiller-
Iodométine.	mond.
Iodonésyl.	Stanion.
Iodonucléol.	Stannoxyd.
Lipiodine.	Staphylocide.
Lipovita.	Staphylostanol.
Marimine.	Stérogyl.
Marinol.	Tanno-Calcine.
Morisland.	Ultra-violet.
Onguent Fréval.	Uroiodine.
Opocobalt.	V. A. V.
Panxylon.	Vin Girard.

#### BRULURES

Acécocex.	Méta-Titane.
Antipiol.	Méta-Vaccin.
Arapal.	Néo-Collargol.
Baume Daynoc.	Néol.
Belhemine.	Nestosyl.
Boricine Meissonnier.	Onction Leisyn.
Borostyrol Schlatter.	Opodermyl.
Cataplasme du Dr Lelièvre.	Ormatol.
Coaltar saponiné Le Bœuf.	Ouataplasme du Dr Lan-
Créosoforme Lambiotte.	glebert.
Dermatyol Godart.	Ozothine.
Dermoradol	Percaïnal Ciba.
Dermorhinistol.	Pommade au Nestosyl.
Détergine.	Pommade Bertol-Vichy.
Diadermine.	Pommade Raimoa.
Eczéda.	Pommade V. E. Doumer.
Ektogan Bocquillon	Poudre Mass plastique.
Gelée vaccin Ivago (anti-	Probios.
pyogène).	Propidex.
Gélicurine.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Glyco-Thymoline.	Pyroléol Edet.
Goménol.	Quinquina Gmet.
Immunizols Gremy.	Rhagadine Bracquemond.
Inotyol.	Rozoderme.
Insulanol.	Sanoram.
Iodex.	Scuroforme.
Kérafline.	Sénophile.
Lauréol Médicinal.	Solution huileuse au Nes-
Lynévol.	tosyl.
Lyzacrème L. M. L.	Stéramine.
Métacuprol.	Tégéol.

# V. — CHIRURGIE

## THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

### BRULURES

Terpoxyl externe.	Vaccins pansements Virultra.
Thigénol Roche.	Végétol.
Tulle gras Lumière.	Véralgine.
Tulle rose Beslier.	Vioforme Ciba.
Ulcérophile Nosan.	Vulnérine du D <sup>r</sup> Bergen.

### CICATRICES VICIEUSES

Chéloïdine.	Térébine.
Ektogan.	Iodine Cognet.
Onction Leisyn.	

### ENTORSES, FRACTURES, HYDARTHROSES

Baume Adol.	Opocalcium du D <sup>r</sup> Guersant.
Baume Aroma.	Opocalcium irradié du D <sup>r</sup> Guersant.
Baume Bengué.	Organi-calcion simple et endocrinien.
Baume du D <sup>r</sup> Serin de Gaillac.	Parathyrocalcine Moncour.
Benzylocalcium.	Percalcine.
Biosine Le Perdriel.	Phosphates du D <sup>r</sup> Pinard.
Cataplasme du D <sup>r</sup> Le-hèvre.	Phosphate Vital de Jacquemaire.
Cellona.	Phospho-Fluor Beynet.
Céréossine.	Phyto Splénol Pié.
Crème résolutive du D <sup>r</sup> Rap.	Pommade au Nestosyl.
Curiodé.	Poudre Mass plastique.
Curiodé arsenié.	Prodynase.
Dohyfral.	Pyo-Vaclydun.
Dragécalcion.	Silicyl.
Fortossan irradié.	Spicanol.
Fosfoxyl Carron.	Stérogyl.
Gaurol.	Sylcase.
Génomorphine.	Térébine.
Glandocalcyl.	Tricalcine.
Gluphosol.	Uvéphorine.
Hémostérine.	Végéphos.
Holos.	Végétol.
Iodex.	Vésicatoire rose Beslier.
Kéraffine.	Vitastérol.
Mancobène.	Vitergomine.
Morisland.	Vivoléol.
Nestosyl.	
Nucléigène.	
Onction Leisyn.	

# V. — CHIRURGIE

## THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

### FURONCLES — FURONCULOSE — ANTHRAX ABCÈS — PANARIS — PHLEGMONS PIQURES D'INSECTES

- |  |  |
|--|--|
| <p>             Albuplast Vigier.<br/>             Alibourine.<br/>             Allergantyl.<br/>             Ampho-vaccins Ronchèsé.<br/>             Anasetol.<br/>             Anexol.<br/>             Aniodol.<br/>             Anthraxone Fornet.<br/>             Antifurunculoux Domergue.<br/>             Antigéhines.<br/>             Antiphlogistine.<br/>             Antiptiol.<br/>             Antivirus.<br/>             Arapal.<br/>             Aseptoradol.<br/>             Bacté-phages.<br/>             Baume du D<sup>r</sup> Baissade.<br/>             Boricine Meissonnier.<br/>             Borostyrol Schlatter.<br/>             Bulgarine Thépenier.<br/>             Cataplasme du D<sup>r</sup> L. lièvre.<br/>             Chloraseptine Optima.<br/>             Coaltar saponiné Le Beuf.<br/>             Comprimés d'Alibour.<br/>             Comprimés Guillaumin.<br/>             Comprimés Levure Mycéta.<br/>             Dépuriode du D<sup>r</sup> Roger Weber.<br/>             Dermostalys du D<sup>r</sup> Wagon.<br/>             Élastoplaste.<br/>             Emplâtres Rogé Cavailès.<br/>             Entéro-Antigènes.<br/>             Évolaxine.<br/>             Facmine Longuet.<br/>             Ferment pur de Raisin.<br/>             Fosyls Carron.<br/>             Furunculase.<br/>             Ganderma.<br/>             Gelée-vaccin Ivago.<br/>             Glésol.<br/>             Glyco-thymoline.<br/>             Goménol.<br/>             Gouttes Daynoc.<br/>             Hermophényl Lumière.<br/>             Immunizols Grémy.<br/>             Inolène.<br/>             Inosepta.<br/>             Institut Pasteur. — Vaccins.<br/>             Iodex.         </p> | <p>             Iodo-Maisine (pommade).<br/>             Ivago de Goldenberg Vaccin « D ».<br/>             Ivago gelée-vaccins.<br/>             Ivago-sta buvable.<br/>             Levure B. 17.<br/>             Levure fraîche Mycéta.<br/>             Levurine extractive.<br/>             Levuro-Maltine Déjardin.<br/>             Lipodéterpénol.<br/>             Lysacrème L. M. L.<br/>             Lysaxins L. M. L.<br/>             Médicoferment.<br/>             Métacuprol.<br/>             Méta-Vaccin.<br/>             Mycolysine du D<sup>r</sup> Doyen.<br/>             Néo-physio.<br/>             Nestosyl.<br/>             Onguent Fréval.<br/>             Osmo-vaccin Bréant.<br/>             Ouataplasme du D<sup>r</sup> Langlebert.<br/>             Physiosthénine. — Néo-Physio.<br/>             Polyiodure Gonnon.<br/>             Pommade au Nestosyl.<br/>             Probios.<br/>             Propidex.<br/>             Propidon.<br/>             Protiodyne.<br/>             Pyo-Amphogel Ronchèsé.<br/>             Pyo-Vaclydun.<br/>             Quinquina Gmet.<br/>             Salantale.<br/>             Séphydine.<br/>             Septicémine Cortial.<br/>             Septolan.<br/>             Spicanol.<br/>             Stalysine.<br/>             Stanion.<br/>             Stannobardane.<br/>             Stannoxyl.<br/>             Staphylagone.<br/>             Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.<br/>             Staphylocide Audrès.<br/>             Staphylo-Coccine Fraquet.<br/>             Staphylothanol.<br/>             Staphylo-Vaclydun.<br/>             Sulfodermol Flahaut.         </p> |
|--|--|



# V. — CHIRURGIE

## THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

### FURONCLES — FURONCULOSE — ANTHRAX ABCÈS — PANARIS — PHLEGMONS PIQURES D'INSECTES

Sulfureux Pouillet.	Vaccins atoxiques stabilisés.
Tapo.	Vaccins Bactériens I. O. D.
Tégéol.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Térébine.	pho-Vaccins.
Terpoxy externe.	Vaccins Sténé.
Themsaline.	Vaccins intra-dermiques et
Thiophyl.	gelées-vaccins Ivago de
Triseptine.	L. Goldenberg.
Tulle Rose Beslier.	Vaccins pansements Virul-
Ultra-Levure.	tra.
Ultra-violet.	Vaclyderm.
Uvéoline.	Vaclydun.
Vaccinothérapie atoxique	Végétol externe.
Cépède.	
Vaccins Bruschetti.	

### OSTÉITES — OSTÉO-MYÉLITES

Ampho-Vaccins Ronchèse.	Staphylagone.
Antipiol.	Staphylase du D <sup>r</sup> Doyen.
Bacté-phages.	Staphylo-coccine Fraquet.
Benzylocalcium.	Staphylothanol.
Calciline.	Sylcase.
Colloïdogénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Térébine.
Dicaliodé.	Terpoxy externe.
Eranol.	Uvéphorine.
Fosfoxy Carron.	Vaccinothérapie atoxique
Furonculase.	Cépède.
Gluphosol.	Vaccins Bruschetti.
Immunizols Grémy.	Vaccins bactériens I. O. D.
Institut Pasteur Vaccins.	Vaccins pansements Virul-
Iodo-Maisine Pommade.	tra.
Lipodéterpénol.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Liposeptine.	pho-Vaccins.
Phospho-Fluor Beynet.	Vaccins intra-dermiques et
Quinquina Gmet.	gelées-vaccins Ivago de
Séphydine.	L. Goldenberg.
Septicémine Cortial.	Vaclydun.
	V. A. V.

### PANSEMENTS — PLAIES — FISTULES ULCÈRES

Acécoclex.	Anexol.
Albuplast Vigier.	Aniodol.
Alibourine.	Antigénines.
Aloysine (pommade).	Antiphlogistine.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Antipiol.

# V. — CHIRURGIE

## THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

### PANSEMENTS — PLAIES — FISTULES ULCÈRES

Antivirus.	Ivago de Goldenberg Vaccin « P ».
Arapal.	Lactoferment Lavril.
Bactérophages.	Lactosérum Lavril.
Baume Daynoc.	Lauréol médicinal.
Baume Sélénia.	Léotamine.
Belhémène.	Ludin.
Biolactyl Fournier.	Lusoforme.
Boricine Meissonnier.	Lynévol.
Borostyrol Schlatter.	Lyzacréme L. M. L.
Bulgarine Thépenier.	Méta-Titane.
Camphydryl Robin.	Méta-Vaccin.
Cataplasme du Dr Le- lièvre.	Néo-Collargol.
Chlocci.	Néol.
Chloraseptine Optima.	Nestosyl.
Clonazone Daufresne.	Nitium Buisson.
Coaltar saponiné Le Beuf.	Noviode.
Comprimés d'Alibour.	Onction Leisyn.
Comprimés Guillaumin.	Opodermyl.
Créosoforme Lambiotte.	Ormatol.
Dermodulcis.	Ouataplasme du Dr Lan- glebert.
Dermatyl Godart.	Pommade au Nestosyl.
Dermoradol.	Pommade Fornet.
Dermorhinistol.	Pommade Raimoa.
Dermostalys du Dr Wa- gon.	Pommade V. E. Doumer.
Détergine du Dr Bourdeau.	Poudre Chaumel.
Ektogan Bocquillon.	Poudre et pommade d'In- suline Phyloze.
Élastoplast.	Poudre Mass plastique.
Emplâtres Rogé Cavaillès.	Probios.
Eranol.	Propidex.
Francoplaste.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Gelée vaccin Ivago (anti- pyogène).	Pyo-Vaclydun.
Glyco-Thymoline.	Pyo-Vaclydun Pansement.
Goménol.	Pyroléol Édet.
Gouttes Daynoc.	Rhagadine Bracquemond.
Hémostyl.	Rozoderme.
Hermophényl Lumière.	Salasényl (poudre).
Holaseptine.	Salubrine Phénix.
Infra-rouges.	Sanoram.
Inolène.	Scuroforme.
Inosepta.	Séphydine.
Inotyol.	Septolan.
Insulanol.	Solution huileuse au Nes- tosyl.
Insuline Byla.	Stéranin.
Insuline Phylose.	Stillargol.
Iodex.	Sunaleol.
Iodocalcium.	Sunoxol.
Iodure d'amidon Lumière.	Tégéol.
Ivago-pyo (buvable).	

## V. — CHIRURGIE

### THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

#### PANSEMENTS — PLAIES — FISTULES ULCÈRES

Térébinte.	Iivéoline.
Térozone.	Vaccins pansements Virultra.
Terpoxyl externe.	Vaccins Sténé.
Themsaline.	Végétol externe.
Tochlorine.	Veinotrope.
Tulle gras Lumière.	Velpeau (Bande).
Tulle rose Beslier.	Vioforme Ciba (et ovules au Vioforme).
Ulcéoplaque. — Ulcéobande.	Vulnérine du Dr Bergen.
Ulcéosine.	
Ulcérophile Nosan.	

#### TUBERCULOSES OSSEUSES

(Voir : Tuberculose.)

## VI. — DIÉTÉTIQUE

Adral.	Farine Mont-Blanc.
Aliment Tinardon.	Farines de Régime Bloch.
Amino-sel Byla.	Farines maltées Favrichon.
Atural.	Forcival.
Babeurre Guigoz.	Galactogil.
Babeurre « La Faye ».	Globépal.
Babeurre « Nutricia ».	Kymosine Rogier.
Beef Lavoix.	Lab-Lacto Ferment Mialhe.
Bemax.	Lacto-sérum Lavril.
Blédine Jacquemaire.	Lait Gallia.
Carottase.	Lait Guigoz.
Carypaine.	Lait Sec C. G.
Céréales Bébé Favrichon.	Lait Mont Blanc.
Céréales granulées Favrichon.	Laits Dardelé.
Céréaline Tulivet.	Levuro-Maltine Déjardin.
Chocolate Milk C. G.	Malt paillété.
Curoraisin.	Maltéa Moser cristallisé.
Decorpa.	Maltosan.
Diabétalim.	Malt Wander ou Gloma.
Diasés.	Nergine.
Dryco.	Nestogène Nestlé.
Elédon.	Orthozomine.
Élixir Dussaud.	Pain essentiel.
Èvine (Thé)	Pain Massé « Sana ».
Extrait de malt français Déjardin.	Pain Redeuil.
Farines de Malt Heudebert.	Pains spéciaux Heudebert.

## VI. — DIÉTÉTIQUE

---

Peptalac.  
Phosphogène Favrichon.  
Sinaqua nutricia.  
Tonymalt Mont Blanc.  
Ultrapao Laurençon.

Veguva.  
Vitagermine.  
Vitaminol.  
Yaourtine.  
Zomine.

## VII. — INSTRUMENTATION — APPAREILS

---

Albuplast Vigier.  
Boules Quies.  
Cellona.  
Compressif Beslier.  
Diathermie.  
Dosurine (trousses).  
Hypnos.  
Gobillettes.

Inhalo-Bol.  
Infra-Rouges.  
Optiplaste.  
Oxy-injecteur du D<sup>r</sup> Fialip.  
Polycautère.  
Poudre Mass plastique.  
Ultra-Violets.  
Velpeau (Bandes de crêpe).

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

---

### ACCÉLÉRATEURS DE LA NUTRITION

Actiphos.  
Adipolysine.  
Algatan.  
Aliment Tinardon.  
Ampoules névrosthéniques  
Dausse.  
Androcacion.  
Androstine Ciba.  
Antasthène.  
Antiphi.  
Anturique de Contrexé-  
ville.  
Ardogène.  
Arrhénuclène Bergevin.  
Arsécrinol.  
Arséniode Buriat.  
Arsi-strychnal Longuet.  
Arsycodile.  
Arsylène Roche.  
Arthrillax.  
Arvensyl.  
Bemax.  
Biogénol Demasles.  
Bionéol.

Biotrignon.  
Boldoine Éparvier.  
Cachets Spévin.  
Cacodyle Gonnon.  
Cacodyline Jammes.  
Calcigénol.  
Cérébroil Leisyn.  
Chlorhydrol Fouché.  
Chophytol Rosa.  
Cimarsényl.  
Citralin.  
Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle.  
Créagénol.  
Créosal Dubois.  
Crinocardine.  
Curiode arsenié.  
Cyto-Manganol Corbière.  
Cytopan.  
Diasténine Grémy.  
Diastogène Dehaussy.  
Diastogène F. Dehaussy.  
Disthène.  
Doloma injectable.  
Elixir Ducro.



# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

## ACCÉLÉRATEURS DE LA NUTRITION

Elixir Grez.  
Endodermol.  
Énergine iodée de Berck.  
Extrait de Malt français  
Déjardin.  
Fénucine.  
Fenugrène.  
Ferropol.  
Fludiose.  
Fluoganése.  
Fondant mangano-ferreux.  
Forxol.  
Fosfomagnyl.  
Fosfoxyll Carron.  
Fosyls Carron.  
Gaduase.  
Glandex phoscalcique.  
Gouttes arsénosthéniques  
Dausse.  
Granulés Caresmel.  
Granules de Pantofort du  
Dr Boveil.  
Hémagénine Giraud.  
Hémo-Cyto-Sérum Cor-  
bière.  
Hémogényl.  
Hémostérine irradiée.  
Hémovirus.  
Hépatomanganol.  
Huile de foie de morue  
Rhône-Poulenc.  
I. A. M.  
Insuline Léo.  
Iodarsenic Guiraud ou  
gouttes Paidophiles.  
Iodocalcium.  
Iodométine.  
Ionyl.  
Kodos.  
Lécithine Vacheron.  
Lipovita.  
Logaphos.  
Malt français Déjardin (Ex-  
trait de).  
Malt Wander ou Gloma.  
Maltéa Moser cristallisée.  
Mancobène.  
Manganésia.  
Mangano-phosphat Julien.  
Mangarsenic.  
Mangratinés.  
Mariopol.

Méthylarsinates Bouty.  
Morisland.  
Morrhualène Gautier.  
Morrhuétine Jungken.  
Morrhuétine Jungken vita-  
minée.  
Morrhuxine.  
Morsine.  
Moruxase.  
Murones du Dr Robert  
Jacques.  
Néoarsite.  
Néo-Arsycodile.  
Néo-Rhomnol.  
Néosaliode Gabail.  
Nervocithine Tissot.  
Neuroplasma Fort.  
Neuroplasma Massif.  
Neurotrophol Byla.  
Nucléarsitol Robin.  
Nucléasine.  
Nucléigène.  
Nucléophorène.  
Nuclergol.  
Cénophos.  
Opophos.  
Opothérapie Choay.  
Oxyol Leisyn.  
Panbiline.  
Panostyl.  
Panstomase.  
Panvita.  
Paradol.  
Peptone Vassal.  
Percacine.  
Phosbiosé.  
Phosma.  
Phosoforme.  
Phosol.  
Phospharsol.  
Phosphate Pinard.  
Phospholéose Demasles.  
Phylla Dyn.  
Phytomarine.  
Phytosplénol Plé.  
Phytine Ciba.  
Procalcyl.  
Prodynase.  
Progaster.  
Quinoïdine.  
Quinquina Gmet.  
Reconstituant Mary.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

## ACCÉLÉRATEURS DE LA NUTRITION

Rectopanbiline.	Surrasthénine.
Réparateur Thuau.	Syphonéol.
Rhizotantin Chapotot.	Tannurgyl du Dr Letan-
Sanguil.	neur.
Serifer Laurençon.	Térozone.
Sérogène.	Tonax.
Sérum névrosthénique	Tonigène.
Fraisse.	Tonudol.
Sirop Girard.	Uvéphorine.
Splényl.	Vanadarsine Guillaumin.
Sthénoléine.	Vin Girard.
Sthénoxal.	Vin de Vial.
Strychnal Longuet.	Viosten.
Strychnarsitol Robin.	Vioxyl Mouneyrat.
Suppotonic Lagoutte.	Viradène.

## DISSOLVANTS URIQUES ANTI-GOUTTEUX

Absuric.	Fosfoxyl Carron.
Algophagine.	Gmet (Extraits).
Algorol.	Kétophan.
Ampoules Reipar.	Kodos.
Anégrine.	Léophani.
Antalgol Dalloz.	Mésosithine.
Antialgos Christiaens.	Métaformine.
Antisciatique P. Chambon.	Métophan.
Antiurique de Contrexé-	Néosaliode.
ville.	Nitroyl Leisyn.
Arthrilax.	Novacétine Prunier.
Ascéine.	Orthogénol.
Atomine.	Panbiline.
Atophan Cruet.	Phosoforme.
Atophanyl.	Pipérazine Midy.
Atoquinol Ciba.	Radiotropine.
Banikol.	Rhocya Dyn.
Benzoiodydrine.	Salsanos.
Biliogastrine Chevallon.	Salysérum.
Bisalicylate.	Sambul.
Cachets Van-Sol.	Sanoquinol Ciba.
Capsules Bardet.	Sel hépatique U. N. Arque-
Citralin.	vaux.
Colchi-Sal-Midy.	Sels de Lithine effervescents.
Crypthiol.	Séotral Leisyn.
Cynurol Rosa.	Solvuric.
Dialyl.	Térozone
Diasclérol.	Théocalciode.
Disolurane Vély.	Triseptine.
Diurétique Gmet.	Ulmacétyl.
Dolysine.	Uralysol.
Euphysol.	Uraseptine.

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

### DISSOLVANTS URIQUES — ANTI-GOUTTEUX

Urazine.	Urométine Lambiotte.
Urifluine.	Uromil.
Urisanine.	Urophényl.
Urobuccol Malmanche.	Urophile.
Uroclase.	Urozan Dufayard.
Uroformine Gobey.	Urozéa.
Uroiodine.	Viophan.
Urométhyl.	

### MÉDICAMENTS D'ÉPARGNE

Antidiabétique Monavon.	Glykolaine Robin.
Biophorine Girard.	Gmet (Extraits).
Biotrigon.	Insuline « Léo ».
Cérébroil Leisyn.	Kola granulée Astier.
Complexextraits.	Kola Monavon.
Composé Gmet.	Morsine.
Diastogène Dehaussy.	Nuclergol.
Diastogène F. Dehaussy.	Pepto-Kola-Robin.
Disthène.	Phosoforme.
Elixir Ducro.	Sthénoléine.
Extrait de malt Déjardin.	Suppositoires Lagoutte.
Fondant de Cola Dausse.	Vin de Vial.

### PRODUITS VITAMINÉS — PRODUITS IRRADIÉS

Amunine.	Malt Français Déjardin
Amylodiastase Thépenier.	(Extrait de).
Ascoléine Rivier.	Malt Wander ou Gloma.
Bémax.	Marimine.
Benzylcalcium.	Minergil.
Blédine Jacquemaire.	Morisland irradié.
Calcoléol.	Morrhuéline Jungken.
Carottase.	Morrhuéline Jungken vita-
Cytobiase.	minée.
Dias.	Morubiase.
Dohyfral.	Nucléasine.
Dryco.	Nucléigène.
Ergorone.	Opocalcium irradié du
Extrait de Malt français	D <sup>r</sup> Guersant.
Déjardin.	Opoferine vitaminée.
Fixase irradiée.	Oponuclyl irradié Trouette-
Fortossan irradié.	Perret.
Gaduamine.	Organi-calcion endocrinien
Hémostérine irradiée.	Pangaduine.
Huile de foie de morue mé-	Panvita.
dicalesuractivée Rhône-	Phosphates du D <sup>r</sup> Pinard.
Poulenc.	Phylla Dyn.
Irrastérine.	Phytine Ciba.
Jécofluy.	Polyminéral Fort.
Levuro Maltine Déjardin.	Provitol.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

## PRODUITS VITAMINÉS — PRODUITS IRRADIÉS

Sanas.  
Splénomanganol.  
Splényl.  
Stérogyl.  
Ultravitamine 4.  
Uvé (gouttes).  
Uvéphorine.  
Uvéstérol.  
Véguva.  
Vigostérol.  
Vin « Lux Gaillac moussoux ».

Viosten.  
Vitacalcine Moncour.  
Vitadone.  
Vitaminol.  
Vitamorrhüine.  
Vitamyl.  
Vitastérol.  
Vitène.  
Vivoléol.  
Zomine.  
Zymatine irradiée.



## RÉGULATEURS DE LA NUTRITION

Adipolysine.  
Adral.  
Alexine.  
Algorol.  
Antisciatique P. Chambon.  
Arsécrinol.  
Artoradine.  
Bemax.  
Bikréol.  
Boldoine Éparvier.  
Cachets Spévin.  
Calmaby.  
Chloro-magnésion.  
Chlormagnésium.  
Cérébroil Leisyn.  
Chlorure d'ammonium Bréant.  
Cholépan Longuet.  
Chophytol Rosa.  
Colloïdine Laleuf.  
Colloïdogénine du Dr Bayle.  
Colloïde Dubois.  
Crinex.  
Curiode.  
Curiode arsenié.  
Dicaliode.  
Élixir Grez.  
Endodermol.  
Eniode Lefebvre.  
Éranol.  
Euglyma.  
Euphysol.  
Extrait de Malt français Déjardin.  
Fondant iodotannique.  
Fosfomagnyl.

Fosfoxyll Carron.  
Fucoïodine.  
Fucus Gmet.  
Glandex phoscalcique.  
Globules Fumouze  
l'Iodure de potassium.  
Hémocalcine.  
Hormocrinol.  
Iodalse Galbrun.  
Iodassium.  
Iodaubépine.  
Iode organique Boissy.  
Iodinfectol Jammes.  
Iodogénol Pépin.  
Iodomaisine Globules.  
Iodométine.  
Iodone Robin.  
Iodonucléol.  
Iodo-Vitasine.  
Ionyl.  
Kodos.  
Lipiodol Lafay.  
Lipiodine Ciba.  
Magiodyl.  
Magnésium Hardy.  
Magnésio-Tubes Robinet.  
Malt français Déjardin  
(Extrait de).  
Micelliodine.  
Néo-Riodine.  
Œnophos.  
Opophos.  
Opothérapie Bouty.  
Orthogénol.  
Panostyl.  
Pépiodon Henry.



## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

---

### RÉGULATEURS DE LA NUTRITION

Phosoforme.  
Plasma de Quinton.  
Poudre Danica.  
Réparateur Tuau.  
Rhocya Dyn.  
Riodine.  
Syphonéol.  
Tanno-Calcline.

Tannurgyl du Dr Letan-  
neur.  
Théocalcide.  
Thyroidine.  
Tonigène.  
Triglandine.  
Triglandol  
Viosten.  
Zymatine Irradiée.

---

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

---

### ACÉTONÉMIE

Comprimés Vichy-État.  
Insuline-Buccale Fernet.  
Juglane.

Oxyol Leisyn.  
Phosoforme.  
Salvé.

### ALCALOSE

Actiphos.  
Chlorure d'ammonium  
Bréant.  
Génacide.  
Ionyl.  
Œnophos.

Oxyol Leisyn.  
Phosoforme.  
Saint-Aré.  
Uroclase.  
Véguya.

### ARTHRITISME

Absuric.  
Adipolysine.  
Alcamfétol.  
Algophagine.  
Algorol.  
Ampoules Boissy iodure de  
potassium.  
Anaclasine Ranson.  
Antisciaticque P. Chambon.  
Anti-urique de Contrexé-  
ville.  
Arséniode Buriat.  
Arthrilax.  
Artoradine.  
Arvensyl.

Atophan Cruet.  
Atoquinol Ciba.  
Azufrol.  
Bain carbogazeux Wolo.  
Bain Carré.  
Bain Salvia.  
Banikol.  
Baumolacpinine.  
Benzobromine.  
Bi-Citrol Marinier.  
Biliogastrine Chevillon.  
Biolax.  
Bisalicylate.  
Bolcitol.  
Boldo Gmet.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

## ARTHRITISME

Cachets Spévin.	Iodonucléol.
Calcozymase.	Iodo-Vitasine.
Calmaby.	Ionyl.
Caparlem.	Jecofluyl.
Capsules Bardet.	Kodos.
Carboiodure Fraudin.	Levure fraîche Mycéta.
Céthocal du D <sup>r</sup> Lemay.	Lipiodol Lafay.
Choléine lactique.	Lipoiodine Ciba.
Citralin.	Litharsyne.
Citrophos.	Lysarthrol.
Collo-iodé Dubois.	Magiodyl.
Comprimés Vichy-État.	Magnésium Hardy.
Curiodé.	Magnéso-Tubes Robinet.
Curiodé arsenié.	Malt français Déjardin
Cynurol Rosa.	(Extrait de).
Dépuratif Rob Lechaux.	Médicoferment.
Dépuriodé du D <sup>r</sup> Roger	Mésothorium Rhemda.
Weber.	Métaformine.
Dialyl.	Micelliode.
Diasclérol.	Morisland.
Diathermie.	Myoden.
Disolurane Vély.	Néo-Riodine.
Dolophos.	Néosaliode.
Dolysine.	Néo-Séti.
Elgine Julien.	Novaceline Prunier.
Endodermol.	Nitroyl Lelsyn.
Éniode Lefebvre.	Opochol.
Éranol.	Opothérapie Bouty.
Euphysol	Orthogénol.
Extrait de Malt français	Ozothine.
Déjardin.	Panbil.
Fondant iodotannique	Paradolne.
Dausse.	Pépiodon Henry.
Fosfoxyl Carron.	Phosoforme.
Globules Fumouze à l'iodure	Pipérazine Midy.
de potassium.	Progaster.
Gmet (Extraits).	Pyrelaine Collas.
Héxotal.	Radiotropine.
Immunovaccin antirhumat-	Rectopaniline.
ismal.	Rhocya Dyn.
Infra-rouge.	Riodine.
Iodalose Galbrun.	Romarène.
Iodassium.	Salsanos.
Iode organique Boissy.	Salysérum.
Iodex.	Sanoquinol Ciba.
Iodinjectol Jammes.	Sel hépatique U. N. Arque-
Iodogénol Pépin.	vaux.
Iodo-Maisine Globules.	Sels de Lithine efferves-
Iodométine.	cents.
Iodone Robin.	Sel Pennès.
Iodonésyl.	Silicyl.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

## ARTHRITISME

Sirop iodotannique Guil-	Ulmacétyl.
lermond.	Ulmarène Gigon.
Sodothiol.	Uralysol.
Solution Normet scléro-	Uraseptine.
lytique.	Urazine.
Solvuric.	Uriduine.
Stopral.	Uroclase.
Sulfobyl.	Uroformine Gobey.
Sulfoidol Robin.	Uroiodine.
Sulfo-Thiorine.	Urométhyl.
Sulfureux Pouillet.	Urométine Lambiotte.
Térozone.	Uromil.
Théocalciode.	Urophényl.
Thiocitran Thévenot.	Urophile.
Thiorine.	Urozan Dufayard.
Tiodine Cognet.	Véralgine.
Triglandine.	Viophan.
Triseptine.	Vulcase.
Trynol.	Zymatine Lescène.

## ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Adral.	Biogénol Demasles.
Adrénoïdes Béral.	Bionélo.
Alexime.	Biophorine Girard.
Aliment Tinardon.	Biosine Le Perdriel.
Ampoules Névrosthéniques	Biotrignon.
Dausse.	Blédine Jacquemaître.
Amunine.	Cachets Spévin.
Anacamphre.	Cacodyle Gonnon.
Angitan.	Cacodyline Janimes.
Antasthène.	Cador.
Antiphi.	Calciline.
Appetyl.	Calcional.
Arcica.	Calci-Sténine.
Ardogène.	Calcium Sandoz.
Arrhénuclène Bergevin.	Calmaby.
Arsécrinol.	Carnine Lefrancq.
Arséniode Buriat.	Catalyl Mg.
Arsi-Strychnal Longuet.	Cérébro-Lipase.
Arsycodile.	Cérébroil Leisyn.
Arsylène Roche.	Cérébrosthénine Dali.
Ascoléine Rivier.	Céréossine Dehaussy.
Bain Carré.	Céthocal du Dr Lemay.
Baumolacpinine.	Chlorhydrol.
Beef Lavoix.	Chlormagnésium
Bemax.	Chloro-magnésion.
Benzylocalcium.	Choléopeptine.
Biocalcose.	Cholergine.
Biodynamine.	Cimarsényl.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

## ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Cinalose.	Fortossan irradié.
Clupeyl.	Forxol
Colloïdogénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Fosfomagnyl.
Complextraits.	Fosfoxyl Carron.
Composé Gmet.	Fosyls Carron.
Créagénol.	Gaduase.
Crinocardine.	Gasthréma.
Crino-sthényl.	Gaurol.
Curoraisin.	Génergosine.
Cyto-Manganol Corbière.	Génosthéniques.
Cyto-Sérum Corbière.	Génostrychnine.
Cytopan.	Glandex phoscalcique.
Delbiase.	Glandocalcyl.
Dialyl.	Globexine.
Diasés.	Glycérophosphate Dailloz.
Diasténine Grémy.	Glycérophosphate Robin.
Diastogène Dehaussy.	Glyctone phosphitée Char- rière.
Diastogène F. Dehaussy.	Glykolaine Robin.
Digistabiline.	Gouttes arsénosthéniques Dausse.
Dolophos.	Gouttes halogènes du D <sup>r</sup> Bern.
Dragées névrosthéniques Yse.	Gouttes phosphosthéniques Dausse.
Élixir Ducro.	Gouttes Magalo.
Élixir Dussaud.	Granoxyl.
Élixir Grez.	Granulés Caresmel.
Énergine iodée de Berck.	Granules de Pantofort du D <sup>r</sup> Boveil.
Énergine phosphorée de Berck.	Hectine.
Eufosfyl Vély.	Hémagénine Giraud.
Euglyma.	Hémoantitoxine Sofos
Exhépa.	Hémocalcine.
Extrait de Malt français Déjardin.	Hémo-Cyto Sérum Cor- bière.
Fa-Ner-Val.	Hémogénol Dausse.
Fénucine.	Hémogényl.
Fenugrène.	Hémoglobine Deschiens.
Fer intraveineux Fraisse.	Hémopanbiliae.
Fer Lacarde.	Hémo-phagostyl.
Fer ovarine Vitalis.	Hémo-plase Lumière.
Ferrocol.	Hémo-plasmine du D <sup>r</sup> Mo- relli.
Ferrophytine Ciba.	Hémostra Roche.
Ferydal.	Hémostyl.
Fixase.	Hémotal.
Fixase irradiée.	Hémoviris.
Fludiose.	Hépaphos.
Fludyle.	Hépatrol.
Fluoganèse.	Hépatrol injectable.
Fondant de Cola Dausse.	
Fondant mangano-fer- reux Dausse.	
Fortossan Ciba:	

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

## ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Héracléol.  
Hipposarcine Roy.  
Histogénol.  
Holos.  
Huile de foie de morue  
  médicinale suractivée  
  Rhône-Poulenc.  
I. A. M  
Iodocalcium.  
Ionyl.  
Jemalt Wander.  
Kola granulée Astier.  
Kola Monavon.  
Lauriatol.  
Lécithine Vacheron.  
Limol Churchill.  
Lioncyl.  
Lipocérébrine Chevreton.  
Liposplénine du D<sup>r</sup> Groc.  
Logaphos.  
Magnésio-Cacodyline  
  Jammes.  
Magnésium Hardy.  
Magnésio-tubes Robinet.  
Malt français Déjardin (Ex-  
  trait de).  
Malt Wander ou Gloma.  
Maltea Moser cristallisée.  
Mancobène.  
Mangano-phosphal Julien.  
Mangarsenic.  
Mangratinés.  
Marinol.  
Maté Douglas.  
Malt Pailleté.  
Mésothorium Rhemda.  
Méthylarsinates Bouty.  
Minergil.  
Morisland irradié.  
Morrhualène Gautier.  
Morrhuétine Jungken.  
Morrhuétine Jungken vita-  
  minée.  
Morrhuxine.  
Morubiase.  
Moruxase.  
Musculosine Byla.  
Néoarsite.  
Néo-Arsycodile.  
Néo-Calculine.  
Néo-Neurosine Prunier.

Néo-Rhomnol.  
Néotrophène.  
Nergine Heudebert.  
Nervocithine Tissot.  
Nésal.  
Neurinase.  
Neuroplasma Fort.  
Neuroplasma Massif.  
Neuropol.  
Neurosine Prunier.  
Neurotrol.  
Neurotrophol Byla.  
Névrosthénine Freyssinge.  
Nucléarsitol Robin.  
Nucléasine.  
Nucléatol Robin.  
Nucléigène.  
Nucléophorène.  
Nuclergol.  
Oenophos.  
Opocalcium du D<sup>r</sup> Guer-  
  sant.  
Opocalcium irradié du  
  D<sup>r</sup> Guersant.  
Opocobalt.  
Opoferrine vitaminée.  
Oponuclyl irradié Trouette-  
  Perret.  
Opophos.  
Oposynergines.  
Opothérapie Choay.  
Opothérapie du D<sup>r</sup> Frayssé.  
Orex.  
Organi-calcion simple et  
  endocrinien.  
Orthogénol.  
Orthozomine.  
Pancrinol du D<sup>r</sup> Debat.  
Panostyl.  
Panstosmase.  
Panvita.  
Panxylon.  
Pepto-Kob. Robin.  
Peptone Vassal.  
Percalcine.  
Persodine Lumière.  
Phagostyl.  
Phagostyl Mangané.  
Phosbiose.  
Phoscamine.

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Phosoforme.	Splényl.
Phosma.	Sthénoléine.
Phosol.	Sterogyl.
Phospharsol.	Sthénoxal.
Phospho-Fluor Beynet.	Stovafer.
Phospholéose Demasles.	Strychnal Longuet.
Phosphopinal Juin.	Strychnarsitol Robin.
Phostyl.	Suppotonic Lagoutte.
Phylla Dyn.	Surrasthénine.
Phytine Ciba.	Syphonéol.
Phyto-Lécithine.	Synergyl Vadam.
Phytospléno Plé.	Taburol Monal.
Plasma de Quinton.	Tanno-Calcine.
Plurion Couturieux.	Tannurgyl du Dr Letan-
Pneumo-Lipase.	neur.
Poliol Churchill.	Terpoxyl interne.
Procalcyl.	Thalassotonine Vadam.
Prodynase.	Thorix.
Progaster.	Tonax.
Prosthénase Galbrun.	Tonicalcine.
Protonic.	Tonigène.
Quassia Kina Rabot.	Tonikéine Chevreton.
Quergémol.	Tonique Gannon.
Quina Baron.	Tonique Roche.
Quinarsol antianémique.	Tonucyl.
Quinéine.	Tonudol.
Quinoidine.	Total-Tonic.
Quinquina Gmet.	Traphéine.
Radiogastrol.	Trephonyl.
Réalphène Guisson.	Ultra-Violets.
Reconstituant Mary.	Ultravitamine 4.
Réparateur Thuau.	Uvé (gouttes).
Rhizotanin.	Uvéphorine.
Rhominol	Vanadarsine Guillaumin.
Sanas.	Végéphos.
Sanguil.	Véguva.
Sels du Jura.	Vigostérol.
Sérifer Laurençon.	Vin de Baudon.
Sérogène.	Vin de Bugeaud.
Sérôme Rey.	Vin de Carneose.
Sérosthényl.	Vin Girard.
Sérum Neuropsychique.	Vin Lux Gaillac mous-
Sérum névrosthénique	seux.
Fraise.	Vin Raimoa Tonic.
Sirop Girard.	Vin de Vial.
Solution Bardet.	Viosten.
Spectrol.	Vioxyl Mouneyrat.
Splénarmone.	Viradène.
Spléno-Magnésium.	Vitacalcine Moncour.
Splénomanganol.	Vitacrine.

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Vitagermine.	Zymatine irradiée.
Vitaminol.	Zimbyl.
Vitamorrhaine,	Zohol.
Vitastérol.	Zomine.
Vitène.	Yo-Androl.
Vivoléol.	

### ATHREPSIE

Amunine.	Kymosine Rogier.
Arcica.	Lait Mont Blanc.
Bemax.	Larosan Roche.
Bioentérase.	Mangarsenic.
Blédine Jacquemaire.	Marimine.
Carottase.	Marinol.
Dryco.	Opothérapie Choay.
Élixir Dussaud.	Ozobiase.
Élixir eupeptique Tisy.	Pancréastase Defresne granu- lée.
Élixir Grez.	Phosoforme.
Ergorone.	Phylla Dyn.
Férydal.	Plasma de Quinton.
Fixasé.	Polyminéral Fort.
Fixase irradiée.	Quinquina Gmet.
Fortossan Ciba.	Sulfarsénol.
Fortossan irradié.	Suppotonic Lagoutte.
Fosfoxyll Carron.	Ultra-violet.
Huile de foie de morue médicinale suractivée	Vitagermine.
Rhône-Poulenc.	Zymatine irradiée.
Iloglandol Roche.	Zymatine Lescène.
Insulyl.	

### AVITAMINOSE

Amunine.	Huile de foie de morue médicinale suractivée
Amylodiastase Thépénier.	Rhône-Poulenc.
Ascoléine Rivier.	Lait Mont Blanc.
Bemax.	Levuro-Maltine Déjardin.
Benzylocalcium.	Malt français Déjardin (Extrait de).
Blédine Jacquemaire.	Malt Wander ou Gloma.
Calcoléol.	Marimine.
Carottase.	Morisland.
Comprimés Levure Mycéta.	Nucléigène.
Crescol Buisson.	Opocalcium irradié du D <sup>r</sup> Guersant.
Cytobiase.	Oponuclyl irradié Trouette- Perret.
Dryco.	
Extrait de Malt français Déjardin.	
Fortossan irradié.	

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### AVITAMINOSE

Organ-calcion endocrinien.	Vitadone.
Phylla Dyn.	Vitagermine.
Provitol.	Vitaminol.
Splényl.	Vitamorrhuiné.
Ultra-violet.	Vitamyl.
Ultravitamine 4.	Vitastérol.
Uvéphoriné.	Vitène.
Uvestérol.	Vivoléol.
Véguva.	Zymatine irradiée.
Viosten.	Zimbyl.
Vitacalcine Moncour.	

### GARENCE CALCIQUE — GARENCE PHOSPHATÉE

(Voir: Tuberculose, Reminéralisants).

### GARENCE MAGNÉSIENNE

(Voir: Cancer.)

### DIABÈTE

Androstine Ciba.	Kodos.
Antidiabétique Monavon.	Lécithine Vacheron.
Arcica.	Leyure fraîche Mécéta.
Canol.	Lioncyl.
Carbolactyl bilie.	Lobuline.
Catalyl Mg.	Magol Churchill.
Cholepan Longuet.	Manganésia.
Chophytol Rosa.	Mangarsenic.
Citralin.	Médicoferment.
Comprimés Vichy-État.	Minergil.
Cynurol Rosa.	Neurotrol.
Diabétalim.	Œnophos.
Diabétifuge.	Opochol.
Diasclérol.	Opothérapie Bouty.
Dosurine.	Orthogénol.
Endopancrine.	Oxyol Leisyn.
Fénucine.	Ozobiase.
Ferment pur de Raisin.	Pain Massé « Sana ».
Fosfoxyl Carron.	Pain Redeuil.
Fosyl Carron.	Pancréanne.
Hépto-manganol.	Pancrépatine Laletif.
Hoglandol « Roche ».	Pepto-Kola Robin.
Insuline-Buccale Fournet.	Phosforme.
Insuline Byla.	Pilules du Dr Debouzy.
Insuline Léo.	Pilules du Dr Séjournet.
Insulyl.	Pilules lithuranees du
Ionyl.	Dr Boveil.
Juglane.	Pipérazine Midy.



## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### DIABÈTE

Prodynase.  
Progaster.  
Quinarsol antianémique.  
Quinino phytine Ciba.  
Sels de Lithine efferves-  
cents  
Sinabin.  
Sucre Edulcor.  
Synthaline B.

Total-Tonic.  
Ulcéosine.  
Vagotonine.  
Vin de Bugeaud.  
Vin « Lux » Gaillac Mous-  
seux.  
Vioxyl Mouneyrat.  
Vitamyl.

### GOUTTE

Absuric.  
Aigue d'Or.  
Alcamfétol.  
Algatan.  
Algophagine.  
Algorol.  
Ampoules Boissy iodure  
de potassium.  
Ampoules Reipar.  
Anaclasine.  
Anégrine.  
Antalgol Dalloz.  
Antialgol Christaens.  
Antiphlogistine.  
Antilurique de Contrexé-  
ville.  
Arthrilax.  
Ascéine.  
Atomine.  
Atophan Cruet.  
Atophanyl.  
Atoquinol Ciba.  
Banikol.  
Baume Adol.  
Baume Aroma.  
Baume Bengué.  
Benzobromine.  
Benzo iodhydrique.  
Bétul-Ol Midy.  
Bi-Citrol Marinier.  
Biliogastrine Chevillon.  
Buccurol.  
Bulgarine Thépenier.  
Cachets du Dr Boveil.  
Cachets Spévin.  
Calcozymase.  
Calmant Meunier.  
Carboiodure Fraudin.  
Citralin.

Citrofluyl.  
Colchi-Sal Midy.  
Collo-Iode Dubois.  
Cryogénine Lumière.  
Crypthiol.  
Cynurol Rosa.  
Dépuratif Rob Lechaux.  
Dépuratif du Dr Roger  
Weber.  
Dialyl.  
Diasclérol.  
Dicaliodé.  
Disolurane Vély.  
Diurétique Gmet.  
Dolysine.  
Elgine Julien.  
Endodermol.  
Eranol.  
Fucoiodine.  
Fucus Gmet.  
Globules Fumouze à l'Io-  
dure de Potassium.  
Gmet (Extraits).  
Guipsine.  
Guitose.  
Hexaranol.  
Hexotal.  
Immuno-vaccin  
Iodalose Galbrun.  
Iodassium.  
Iode organique Boissy.  
Iodex.  
Iodhéma.  
Iodinjectol Jammes.  
Iodogénol Pépin.  
Iodo-Malsine Globules.  
Iodométine.  
Iodone Robin.  
Iodonésyl.

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR GARENCE. T. S.

### GOUTTE

Iodonucléol.	Salénal Ciba.
Iodosan	Salsanos.
Iodo-Vitasine.	Salyserum.
Iodural Novat.	Sambul.
Iodurasc.	Sanoquinol Ciba.
Iodure Pachaut.	Santhéose.
Irénine Gonnon.	Sel hépatique U. N. Arque-
Ixiurn Buisson.	vaux.
Jécofluyl.	Sels de Lithine efferves-
Kalmigraine.	cents.
Kétophan.	Séotral Leisyn.
Levure fraîche Mycéta.	Sodogastrol.
Lipiodol Lafay.	Sodothiol.
Lipiodine Ciba.	Solvuric.
Lysarthrol.	Spécifique Béjean.
Magiodyl.	Stopral.
Magnésium Hardy.	Sulfo-Thiorine.
Magnéso-Tubes Robinet.	Sulfureux Pouillet.
Mésothine.	Sulfurion.
Mésothorium Rhemda.	Théosalvose.
Métaformine.	Théoxantine.
Métophan.	Thiorine.
Micelliode.	Thorix.
Myoden.	Tiodine Cognet.
Néalgyl Bottu.	Ulmacétyl.
Néoriodine.	Uralysol.
Novacétine Prunier.	Uraseptine Rogier.
Opochol.	Urazine.
Opothérapie Bouty.	Urisanine.
Orthogénol.	Urobuccol Malmanche.
Ozothine.	Uroclase.
Paradol.	Uroformine Gobey.
Pépiodon.	Uroiodine.
Phosoforme.	Urométhyl.
Pipérazine Midy.	Urométine Lambiotte.
Polyiodure Gonnon.	Uromil.
Pyrelaine Collas.	Urophényl.
Pyréthane.	Urophyle.
Radiotropine.	Urosan Dufayard.
Rhésal Vicario.	Urozéa.
Rhocva Dyn.	Véralgine.
Riodine.	Viophan.
Salène Ciba.	

### OBÉSITÉ

Adipolysine.	Antiurique de Contrexé-
Algatan.	ville.
Ampolases.	Arthrilax.
Androstine Ciba.	Banikol.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. 8.

## OBÉSITÉ

Benzo-iodhydrique.	Iodone Robin.
Bi-Citrol Marinier.	Iodonésyl.
Cachets Spévin.	Iodonucléol.
Calcozymase.	Iodosan.
Carboiodure Fraudin.	Iodo-Thyroidine Catillon.
Chophytol Rosa.	Iodo-Vitasine.
Colloïdine Laleuf.	Iodura <sup>1</sup> Novat.
Collo-iodé Dubois.	Iodurase.
Crinex.	Iodure Pachaut.
Crypthiol.	Jecofluyl.
Curiode.	Kodos.
Cuscutine Fouilon.	Lipiodol Lafay.
Cynurol Rosa.	Lipiodine Ciba.
Dépuratif Rob Lechaux.	Lysarthrol.
Dépuride du D <sup>r</sup> Roger Weber.	Magiodyl.
Dialyl.	Magnésium Hardy.
Diasclérol.	Magnéso-tubes Robinet.
Diasténine Grémy.	Micelliode.
Dicaliode.	Néo-Rioline.
Dinitra Dyn.	Normalarine (longuets).
Disolurane Vély.	OPOCHOL.
Dragecalcion.	Opothérapie Bouty.
Eniode Lefebvre.	Opothérapie Byla associée.
Éranol.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Fraysse.
Évine.	Orthogénol.
Fer-Ovarine Vitalis.	Ovaro-Thyroidine Optima.
Follicormoné Hinglais.	Oxydothyridine Paris.
Folliculine Crinex.	Panglandine Couturier.
Fondant iodotannique Dausse.	Pépiodon.
Fucoiodine.	Phosoformé.
Fucus Gmet.	Rhocya Dyn.
Globules Fumouze iodure de potassium.	Rioline.
Hépaté Manganol.	Salsanos.
Holovarine.	Sanoquinol.
Hormocrinol.	Selunic.
Hormovarine Byla.	Sodogastrol.
Iodalose Galbrun.	Théocalciode.
Iodassium.	Thyroidine.
Iodaubépine.	Thyroxine Roche.
Iode organique Boissy.	Tiodine Cognet.
Iodinjectol Jammes.	Triglandine.
Iodogénol Pépin.	Triglandol.
Iodo-Maisine Globules.	Uroiodine.
Iodométine.	Uromil.
	Valovarine.
	Vascurol.
	Vichy-purgatif.

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### PHOSPHATURIE

Adrénocalcine.	Opocobalt.
Arsécrinol.	Opophos.
Benzylocalcium.	Pangaduine.
Colloïdogénine du Dr Bayle.	Parathyrocalcine Moncour.
Calcigénol Pinard.	Percalcine.
Cynurol Rosa.	Phosoforme.
Dolophos.	Phospharsol.
Dysthène.	Phosphates du Dr Pinard.
Doloma.	Phosphate Vital de Jacquemaire.
Doloma injectable.	Phospho-Fluor Beynet.
Elixir Ducro.	Phostyl.
Fenucalcium.	Phytine Ciba.
Fixase.	Phytogénine Byla.
Fixase irradiée.	Phytosplénol Pié.
Fosfomagnyl.	Poliol Churchill.
Fosfoxyll Carron.	Polyminéral Fort.
Glandex phoscalcique.	Prodynase.
Hémocalcine.	Radiogastrol.
Hexotal.	Rhomnel.
Holos.	Sanas.
Ionyl.	Sanguil.
Lécithine Vacheron.	Suppotonic Lagoutte.
Limol Churchill.	Sur-bi-cal.
Lipovita.	Tanno-Calcine.
Logaphos.	Tannurgyl du Dr Letanneur.
Mangano-Phosphal Julien.	Tonax.
Mancobène.	Tonigène.
Neuropol.	Ultra-violet.
Neurosine Prunier.	Uraseptine Rogier.
Nucléigène.	Urosan Dufayard
Nuclergol.	Uvéphorine.
Œnophos.	Viosten.
Opocalcium du Dr Guersant.	Vitène.
Opocalcium irradié du Dr Guersant.	Zohol.

### RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Adrénaline Invar.	Arcica.
Adrénine.	Ardogène.
Adrénocalcine.	Arsécrinol.
Adrénoïdes Béral.	Arséniode Buriat.
Algatan.	Arsycodile.
Aliment Tinardon.	Arsylène Roche.
Amunine.	Ascoléine Rivier.
Amylodiastase Thépénier.	Bactioxyné.
Antasthène.	Bain Carré.
Antiphi.	Banikol.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

## RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Baume Iki.	Élixir Ducro.
Baumolacpinine.	Énergine iodée de Berck.
Bemax.	Énergine phosphorée de Berck.
Benzylcalcium.	Éniode Lefebvre.
Biocalcose.	Épicral.
Bionéol.	Éranol.
Biosine Le Perdriel.	Ergorone.
Biotrignon.	Extrait de Malt français
Blédine Jacquemaire.	Déjardin.
Cachets « Roche » de Thio- col.	Féminadène.
Calciline.	Fenugrène.
Calci Sténine.	Ferocol.
Calcional.	Ferrophytine Ciba.
Calcium Sandoz.	Férydal.
Calcoléol.	Fixase.
Carnine Lefrancq.	Fixase irradiée.
Carottase.	Fludiose.
Cérébroil Leisyn.	Fluoganèse.
Cérébrosthénine Dalin.	Fondant iodotannique
Céréossine Dehaussy simple.	Dausse.
Céréossine irradiée.	Fortossan Ciba.
Chloro-calcion.	Fortossan irradié.
Clupéyl.	Forxol.
Collo-iode Dubois.	Fosfomagnyl.
Colloidogénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Fosfoxyl.
Comprimés « Roche » ae Thiocol.	Fosyls.
Créagénol.	Fucoglycine du D <sup>r</sup> Gressy.
Créosal Dubois.	Gaduamine.
Crescogénol.	Gaduase.
Crino-Stényl.	Galliodine.
Curiode.	Gasthréma.
Curiode arsenié.	Gaurol.
Curoraisin.	Génosthéniques.
Cytobiase.	Glandocalcyl.
Cyto-Manganol Corbière.	Globexine.
Cytopan.	Gluphosol.
Cyto-Sérum Corbière.	Glycérophosphate Dalloz.
Dépuriodide du D <sup>r</sup> Roger Weber.	Glycérophosphate Robin.
Diasthénine Grémy.	Glyctone phosphatée Char- rière.
Diastogène Dehaussy.	Gmet (Extraits).
Diastogène F. Dehaussy.	Granoxyl.
Dicaliode.	Granulés Caresmel.
Dohyfral.	Granules de Pantofort du D <sup>r</sup> Boveil.
Doloma.	Hémagénine Giraud.
Doloma injectable.	Hémato-iodine.
Dolopaus.	Hémoantitoxine « Sofos ».
Dragécalcion.	Hémocalcine.
Dryco.	Hémo-Cyto-Sérum Corbière.

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Hémostérine irradiée.	Minergil.
Hémopanbiline.	Morisland irradié.
Hémotal.	Morrhualène Gautier.
Hémoviris.	Morrhuéline Jungken et
Héparfer	Morrhuéline Jungken vi-
Hépaphos.	taminée.
Hépatergol.	Morrhuxine.
Héracléol.	Morsine.
Histogénol.	Morubiase.
Holos.	Moruxase.
Huile de foie de morue mé-	Murones du D <sup>r</sup> Robert
dicalesuractivéeRhône-	Jacques.
Poulenc.	Musculosine Byla.
I. A. M.	Néo-Calciline.
Iodalose Galbrun.	Neurocalcium.
Iodarsénic Guiraud ou	Neuropol.
gouttes Paidophiles.	Neurosine Prunier.
Iodaseptine Cortial.	Nucléarsitol Robin.
Iodassium.	Nucléasine.
Iodocalcium.	Nucléigène.
Iodogénol Pépin.	Nucléophorène.
Iodo-Matsine Globules.	Nuclergol.
Iodométine.	Œnophos.
Iodo-vitasine.	Opocalcium du D <sup>r</sup> Guer-
Iodosan	sant.
Iodure de fer inaltérable	Opocalcium irradié du
de Blancard.	D <sup>r</sup> Guersant.
Irrastérine.	Opocobalt.
Jemalt Wander.	Oponuclyl irradié Trouette-
Lait Mont Blanc.	Perret.
Lécithine Vacheron.	Opophos.
Limol Churchill.	Oposynergines
Lioncyl.	Opothérapie Byla associée.
Lipiodol Lafay.	Opothérapie Bouty.
Lipiodine Ciba.	Opothérapie Choay.
Liposplénine du D <sup>r</sup> Groc.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Frayssé.
Lipovita.	Opothérapie Fournier.
Lugocalcion.	Opotonine.
Magol Churchill.	Organi-calcion simple et
Malt français Déjardin (Ex-	endocrinien.
trait de).	Orthozomine.
Malt Wander ou Gloma.	Ostéoglandulol.
Maltea Moser cristallisée.	Panbiline.
Mancobène.	Pancréastase Defresne gra-
Mangano-phosphal Julien.	nulée.
Mangratinés.	Pancrinol du D <sup>r</sup> Debat.
Marimine.	Pangaduine.
Marinol.	Panglandine Couturieux.
Marrucol.	Panostyl.
Mésothorium Rhemda.	Panvita.
Micelliode.	Panxylon.

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Pépiodon.	Solution Pautauberge.
Percalcine.	Spectrol.
Parathyrocalcine Moncour.	Splénarmone.
Persodine Lumière.	Splénomanganol.
Phosbiose.	Sthénoléine.
Phoscamine.	Stérogyl.
Phosma.	Sthénoxal.
Phosoforme.	Sulfuryl Monal.
Phosol.	Suppositoires Pyrax.
Phosphates du Dr Pinard.	Suppotonic Lagoutte.
Phosphate Vital de Jacquemaire.	Sur-bi-cal.
Phospho-Fluor Beynet.	Sylcase.
Phosphogaiacol Mary.	Syncrisines Choay.
Phospholéose Demasles.	Tanno-Calcine.
Phostyl.	Thiocol Roche.
Phylla Dyn.	Thyroxine Roche.
Phytine Ciba.	Tonigène.
Phytogénine.	Tonique Gonnon.
Phyto-Lécithine.	Tonuclyl.
Phytomarine.	Tonudol.
Phytosplénol Plé.	Toritanol Lamo.
Plasma de Quanton.	Tréphonyl.
Poliol Churchill.	Tricalcine.
Polyminéral Fort.	Triglandine.
Procalcyl.	Triglandol.
Prodynase.	Ultra-Violets.
Quinoïdine.	Ultravitamine 4.
Quinquina Gmet.	Uvé (Gouttes).
Reconstituant Mary.	Uvéphorine.
Rénaleptine.	Uvestérol.
Rhocya Dyn.	Valovarine.
Rhomnol.	Vanadarsine Guillaumin.
Riodine.	Végéphos.
Sanas.	Véguva.
Sanguil.	Vigostérol.
Sels du Jura.	Vin de Baudon.
Serifer Laurençon.	Vin de Carnéose.
Sérodausse infantile	Vin Girard.
Sérogyne.	Vlosten.
Sirop de glycérophosphates	Vioxyl Mouneyrat.
Vacheron.	Vitacalcine Moncour.
Sirop Girard.	Vitadone.
Sirop iodotannique Guil- lermond.	Vitaminol.
Sirop de Lovel.	Vitamorrhéine.
Sirop minéral sulfureux	Vitamyl.
Crosnier.	Vitastérol.
Sirop du Dr Reinwiller.	Vitène.
Sirop Roche au Thiocol	Vivoléol.
Sirop Tinardon.	Zomine.
Solution Bardet.	Zymatine irradiés.
	Zymatine Lescène.

# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

## RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

Absuric.	Cachets Van-Sol.
Actiphos.	Cadior.
Aigue d'Or.	Calcozymase.
Alcacyl.	Calmant Meunier.
Alcamfétol.	Carboiodure Fraudh.
Algatan.	Cérébrine Fournier.
Algophagine.	Chéloidine.
Algorol.	Cibalgine.
Allochrysine Lumière.	Citrofluyl.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Colchi-Sal Midy.
Ampoules Boissy d'iodure de potassium.	Collo-iodé Dubois.
Ampoules Reipar.	Crédone Dehaussy.
Anaclasine.	Crésopirine.
Anégrine.	Cryogénine Lumière.
Antalgol Dalloz.	Crypthiol.
Antialgo-Christiaens.	Curatine Brunet.
Antidouleur Barbessou.	Curiodé.
Antiphlogistine.	Curogène.
Arthrilax.	Cynurol Rosa.
Antisciatique P Chambon.	Dépuratif Rob Léchaux.
Antitrique de Contrexé- ville.	Dépuriodé du Dr Roger Weber.
Ascéine.	Dialacétine Ciba.
Asciatine.	Dialyl.
Atomine.	Diasclérol.
Atophan Cruet.	Diathermie.
Atophanyl.	Dicaliodé.
Atoquinol Ciba.	Disolurane Vély.
Azurol.	Dolysine.
Bain Bagnor Radioactif.	Elgine Julien.
Bain Carre.	Endodermol.
Bain Salvia.	Eniode Lefebvre.
Banikol.	Entéro-Antigènes.
Baume Adol.	Éranol.
Baume Aroma.	Erytbra Dyn.
Baume Bengué.	Euphysol.
Baume Iki.	Fango Fisch et Co.
Baume Rhodia.	Ferment pur de raisin.
Baume du Dr Serin de Gaillac.	Follicormone Hinglais.
Baumolacpinine.	Fondant iodotannique Dausse.
Bensamine.	Fosfoxyll Carron.
Benzobromine.	Fucoiodine.
Betul-Ol Midy.	Globules Fumouze iodure de potassium.
Bi-Citrol Marinier.	Gluphosol.
Biliogastrine Chevilhoi.	Granions (Les).
Bisalicylate.	Hexonérol.
Cachet du Dr Bovell.	Hexotal.
Cachets Spévin.	Immunizols Grémy.



# VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

## RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

Immunovaccin antirhumatismal.	Néosaliodé.
Infra-rouges.	Néo Seti.
Iodalose Galbrun.	Névoral Rafey.
Iodaseptine Cortial.	Névralgol Brossard.
Iodassium.	Nitroyl Leisyn injectable.
Iode organique Boissy.	Nopirine Vicario.
Iodex.	Novacétine Prunier.
Iodhéma.	Opothérapie Bouty.
Iodinjectol Jammes.	Orthogénol.
Iodogénol Pépin.	Ovaro-Thyroïdine Optima.
Iodo-Maisine (globules et pommade).	Ozothine.
Iodométine.	Papier iodogène Eymonet.
Iodone Robin.	Paradol.
Iodonésyl.	Paratyroné.
Iodonucléol.	Pépiodon.
Iodosan.	Phosoforme.
Iodo-Vitasine.	Pilules V. E. Doumer.
Iodural Novat.	Pipérazine Midy.
Iodurase.	Polycautére.
Iodure Pachaut.	Polyiodure Gonnon.
Ionyl.	Potion Adol.
Irénine Gonnon.	Pyrelaine Collas.
Ixium Buisson.	Pyréthane.
Jabosulfène.	Quinsal.
Kalmigraine.	Radiotropine.
Kérafine.	Révulsif liquide Boudin.
Kétophan.	Révulsif Procipha.
Kodos.	Rhésal Vicario.
Leophani.	Rhocya Dyn.
Lipiodol Lafay.	Rhoféine.
Lipoiodine Ciba.	Riodine.
Lysarthrol.	Salène Ciba.
Magiodyl.	Salénal Ciba.
Magnésium Hardy.	Salsanos.
Magnéso-tubes Robinet.	Salysérum.
Mésothine.	Sambul.
Mésothorium Rhemda.	Sanoquinol Ciba.
Métaformine.	Santhéose.
Métophan.	Seignet'fruits.
Micelliode.	Sel hépatique U. N. Arquevaux.
Mitigans.	Sels de Lithine effervescents.
Morrhualène Gautier.	Séneçol.
Myoden.	Sirop iodotannique Guillermond.
Myoral.	Sodothioli.
Myothermine.	Solution Normet sclérotique.
Naïodine Logeais.	
Néalgyli Bottu.	
Néo-Riodine.	

## VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

### RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

Solvuric.  
Spécifique Béjean.  
Spicanol.  
Sthénoléine.  
Sulfodermol Flahaut.  
Sulfoïdol Robin.  
Sulfo-Thiorine.  
Sulfureux Pouillet.  
Sulfurion.  
Sulfuryl Monal.  
Suppoalgos.  
Térozone.  
Théinol.  
Théocalciode.  
Théosalvose.  
Théoxantine.  
Thigénol Roche.  
Thiorine.  
Thorix.  
Thyroidine.  
Tiodine Cognet.  
Triglandine.  
Triglandol.

Ulcéosine.  
Ulmacétyl.  
Ulmarène Gigon.  
Uralysoi  
Urascptine Rogier.  
Urazine.  
Urifluine.  
Urobuccol Malmanche.  
Uroclase.  
Uroformine Gobey.  
Uroiodine.  
Urométhyl.  
Urométine Lambiotte.  
Uromil.  
Urophényl.  
Urophile.  
Urosan Dufayard.  
Urozéa.  
Véganine.  
Velpeau (Bande crêpe).  
Véralgine.  
Viophan.

## IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. G.

### ANTIPRURIGINEUX

Acécolex.  
Albuplast Vigier.  
Allergantyl.  
Aloplastine.  
Amphotonyl.  
Antipiol.  
Arthrila.  
Baume du D<sup>r</sup> Baissade.  
Baume Duret.  
Baume Sélénia.  
Camphydryl.  
Crataegus Gmet.  
Dermacid.  
Dermatyol.  
Dermofagine.  
Dermo-plastol Dumesnil.  
Dermosplénine.  
Eczéda.

Eczosec.  
Entéro-antigènes.  
Euphoryl.  
Hyposulfène.  
Laccodermes.  
Lynevol.  
Nestosyl.  
Onction Leisyn.  
Onguent Fréval.  
Percaïnal Ciba.  
Pommade au Nestosyl.  
Sapolan.  
Sarcoptol.  
Solution huileuse au Nes-  
tosyl.  
Stovaine.  
Tégéol.

## ANTISEPTIQUES

Acéclex.	Iodex.
Alibourine.	Iodosan.
Aloysine (pommade).	Lauréol Médicinal.
Anaxéryl.	Lynévol.
Aniodol.	Métacuprol.
Antipiol.	Méta-Vaccin.
Aristargol.	Néo-Collargol.
Azufrol.	Ocalan.
Baume du Dr Baissade.	Onction Leisyn.
Baume Duret.	Pommade Kléos.
Baume Sélénia.	Pyo amphogel Ronchèse.
Boricine Meissonnier.	Pyodermase.
Borostyrol Schlatter.	Pyroléol Édet.
Camphydryl Robin.	Savons Mollard.
Comprimés d'Alibour.	Séphydine.
Créosoforme Lamblotte.	Sunoxol.
Cryptargol Lumière.	Staphylocide Audras.
Dermofagine.	Staphylothanol.
Dermo-rhinistol.	Stéramine.
Dermo-Stalys du Dr Wa-	Sunalcol.
gon.	Tégéol.
Ektogan.	Térébine.
Eranol.	Terpoxyl externe.
Évine.	Thigénol Roche.
Ganderma.	Tubes Chauvin.
Gelée vaccin Ivago (anti-	Uvéoline.
pyogène).	Vioforme Ciba (et ovules au
Goménol.	Vioforme).
Gouttes Daynoc.	

## KÉRATOPLASTIQUES

Acéclex.	Méta-Titane.
Albuplast Vigier.	Onction Leisyn.
Aloplastine.	Opodermyl.
Belhémine.	Ormatol.
Borostyrol Schlatter.	Pommade Raimoa.
Denisoline.	Pommade V. E. Doumer.
Dermo-plastol Dumesnil.	Poudre et pommade d'In-
Dermoradol.	suline Phyloze.
Dermorhinistol.	Poudre Mass plastique.
Eczosec salicylé.	Rozoderme.
Ektogan.	Sapolan.
Emplâtres Rogé Cavallès.	Tégéol.
Gélicurine.	Térébine.
Insulanol.	Vioforme Ciba.
Insuline Phyloze.	Vulnérine du Dr Bergen
Lynévol.	

## VACCINS

Ampho-Vaccins Ronchèse.	Gelée vaccin Ivago.
Antipiol.	Immunizols Grémy.
Arapal.	Ivago de Goldenberg-Vac-
Entéro-antigènes.	cin.

## **IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. G.**

### **VACCINS**

Lévrine extractive.	Vaccins pansements Virul-
Osmo-Vaccin Bréant.	tra.
Probios.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Pyo-Amphogel Ronchèse.	pho-Vaccins.
Stalysine.	Vaccins Sténé.
Staphylagone.	Vaccins intra-dermiques et
Vaccinothérapie atoxique	gelées-vaccins Ivago de
Cépède.	L. Goldenberg.
Vaccins atoxiques stabilisés.	Vaclyderm.
Vaccins bactériens I. O. D.	Vaclydun.

## **IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.**

### **ACNÉ**

Allergantyl.	Euphoryl.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Évolaxine.
Anaxéryl.	Facmine Longuet.
Antipiol.	Fluokol.
Anthracalcine.	Furonculase.
Arthrila.	Ganderma.
Arvensyl.	Gatran.
Aseptoradol.	Gelée vaccin Ivago « D ».
Azufrol.	Glésol.
Baume du D <sup>r</sup> Baissade.	Glyco-Thymoline.
Baume Duret.	Hyposulfène.
Biolax.	Immunizols Grémy.
Boldolactic.	Inotyol.
Cachets Spévin.	Iodex.
Camphydryl Robin.	Ivago-Sta (buvable).
Carbolactyl simple.	Kodos.
Cataplasme du D <sup>r</sup> Lelièvre.	Levure fraîche Mycéta.
Chlormagnésium.	Levrine extractive.
Chloro-magnésion.	Lévuro-Maltine Déjardin.
Choléfluine.	Lynévol.
Comprimés Levure Mycéta.	Magnésium Hardy.
Delbiase.	Magnéso-Tubes Robinet.
Denisoline.	Médicoferment.
Dépuriode du D <sup>r</sup> Roger	Mucyllium.
Weber.	Néobiol.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Néotrophène.
Dermo-plastol Dumesnil.	Nestosyl.
Dermoradol.	Osmo-vaccin Bréant.
Dermo-Stalys du D <sup>r</sup> Wa-	Oxyléine.
gon.	Panbiline.
Eczosec sulfo-camphré.	Paralactine Byla.
Elkin (dragées-granules).	Pommade au Nestosyl.
Entéro-antigènes.	Pommade Kléos.
Euglyma.	Poudre Mass plastique.

## IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

### ACNÉ

Précikase.	Sulfureux Pouillet.
Probios.	Sulfurion.
Protiodyne injectable.	Sulfuryl Monal.
Pyo Amphogel Ronchèse.	Tégéol.
Pyrelaine Collas.	Tergyl Lamo.
Rectopanbiline.	Terpoxyl externe.
Rob Lechaux.	Terpoxyl interne.
Sapolan.	Thiophyl.
Savons Mollard.	Thiorine.
Séphydine.	Ultra-Violets.
Sirop minéral sulfureux	Vaccinothérapie atoxique
Crosnier.	Cépède.
Sodothioli.	Vaccins atoxiques stabi-
Stalysine.	lisés.
Stanion.	Vaccins bactériens I. O. D.
Stannoxyli.	Vaccins intra-dermiques et
Staphylagone.	gelées-vaccins Ivago de
Staphylase du Dr Doyen.	L. Goldenberg.
Staphylocide Audras.	Vaccins pansements Virul-
Staphylo-Coccine Fraquet.	tra.
Staphylothanol.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Sulfa.	pho-Vaccins.
Sulfobyl.	Vaccins Sténé.
Sulfocadol.	Vaclydun.
Sulfocrème Liless.	V. A. V.
Sulfo-Thiorine.	Yaourtine.
Sulfodermol Flahaut.	

### ALOPÉCIES

Acépiline.	Plasma de Quinton.
Carbolactyl simple.	Sapolan.
Gatran.	Savons Mollard.
Glycocarpine.	Séphydine.
Iodex.	Sulfodermol Flahaut.
Néobioli.	Terpoxyl externe.
Phosoforme.	

### CREVASSES — GERÇURES — ENGELURES

Acécolex.	Créosoforme Lambiotte.
Acésine Guillaumin.	Cymarsényl.
Albuplast Vigier.	Dermatyol.
Aloplastine.	Dermo-dulcis Lagoutte.
Androstine Ciba.	Dermofagine.
Antipiol.	Dermo rhinistol.
Baume Daynoc.	Dermo-Stalys du Dr Wa-
Baume Delacour.	gon.
Baume de la Maternité.	Diadermine.
Baume du Dr Baissade.	Dialine.
Borostyrol Schlatter.	Eczéda.
Carbolactyl simple.	Eczosec.
Cataplasme du Dr Le-	Ektogan Bocquillon.
lièvre.	Endodermol.

# IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

## CREVASSES — GERÇURES — ENGELURES

Fludiose.  
Gélicurine.  
Goménol.  
Inotyl.  
Iodex.  
Kérafline.  
Laccodermes.  
Linadéline.  
Lynévol.  
Lysacrème L. M. L.  
Méta-Titane.  
Myothermine.  
Nestosyl.  
Onction Leisyn.

Ozothine.  
Percaïnal Ciba.  
Pommade au Nestosyl.  
Propidex.  
Pyo-Amphogel Ronchèse.  
Pyroléol Édet.  
Sapolan.  
Savons Mollard.  
Séphydine.  
Stéramine.  
Sulfarsiode.  
Térébine.  
Ultra-Violet.  
Vulnérine du D<sup>r</sup> Bergen.

## ECZÉMAS

Acécolex.  
Actiphos.  
Alcasodine.  
Alibourine.  
Allergantyl Miluc.  
Aloplastine.  
Amibiasine.  
Anaclasine Ranson.  
Anapeptone Vassal.  
Anaxeryl.  
Anthracalcine.  
Antipiol.  
Arthrilax.  
Arvensyl.  
Aseptoradol.  
Azigol Thévenot.  
Azufrol.  
Bacillactine.  
Baume du D<sup>r</sup> Baissade.  
Baume Duret.  
Baume Sélénia.  
Bioentérase.  
Biolax.  
Biophylactine Mg.  
Boldo Gmet.  
Boldolactie.  
Cachets Spévin.  
Carbolactyl simple.  
Cataplasme du D<sup>r</sup> Lelièvre.  
Céthocal du D<sup>r</sup> Lemay.  
Chlormagnésium Fisch.  
Chloro-magnésion.  
Cholécystine.  
Choléfluine.  
Chophytol Rosa.  
Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle.  
Comprimés Galac.

Comprimés Levure Mycéta.  
Coprex.  
Créscogénol.  
Delbiase.  
Dépuriode du D<sup>r</sup> Roger Weber.  
Dermatyl.  
Dermofagine.  
Dermo-Plastol Dumesnil.  
Dermoradol.  
Dermo-rhinistol.  
Dermosplénine.  
Dermo-Stalys du D<sup>r</sup> Wagon.  
Détergine du D<sup>r</sup> Bourdeau.  
Dialyl.  
Dicaliode.  
Dolophos.  
Dragécalcion.  
Eczéda.  
Eczosec.  
Ektogan Bocquillon.  
Elkin (dragées, granules).  
Emplâtres Rogé Cavallès.  
Entéro-Antigènes.  
Épicral.  
Euglyma.  
Euphoryl.  
Euskine.  
Facmine Longuet.  
Fer Intra-Veineux Fraisse.  
Fluokol.  
Fondant iodotannique Dausse.  
Ganderma.  
Gatran.  
Glyco-Thymoline.

# IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

## EOZÉMAS

Gouttes Daynoc.	Peptogil A. et L.
Hépariline.	Percaïnal Ciba.
Hépatie Efa du Dr Leca- cheux.	Phosoforme.
Humoro-stabiline.	Pipérazine Midy.
Hyposulfène.	Plasma de Quinton.
I. A. M.	Pommade Lenoir.
Immunizols Grémy.	Polypeptonal.
Inotvol.	Pommade Bertol-Vichy
Inoxémol.	Pommade Kléos.
Iodarsenic Guiraud ou Gouttes Paidophiles.	Pommade au Nestosyl.
Iodex.	Pommade Ratmoa.
Iodo-Maisine (Pommade).	Pommade V. E. Doumer.
Iodonésyl.	Postérisan.
Jabosulfène.	Poudre Mass plastique.
Kéraffine.	Précikase.
Kodos.	Prézymase.
Laccodermes.	Protiodyne.
Levurine extractive.	Protiodyne dragées.
Levuro-Maltine Déjardin.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Ludin.	Pyrelaine Collas.
Lysacrème L. M. I.	Pyroléol Édet.
Magnésium Hardy.	Rhocya Dyn.
Magnéso-Tubes Robinet.	Rob Lechaux.
Médicoferment.	Rozoderme.
Métacuprol.	Salvé.
Méta-Titane.	Salvébyl.
Mucyllium.	Sapolan.
Néopancarpine.	Sarcoptol.
Néo-Physio.	Silicyl.
Néotrophène.	Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Nertose.	Sodothiol.
Nestosyl.	Solution huileuse au Nes- tosyl.
Nigérine.	Splénocrisine.
Nisameline Trouette-Perret.	Sulfa.
Nitium Buisson.	Sulfarsénol.
Normatensol Bouret.	Sulfobyl.
Onction Leisyn.	Sulfocadol.
Opodermyl.	Sulfodermol Flahaut.
Opothérapie Bouty.	Sulfo-Thiorine.
Opothérapie Choay.	Sulfoxyl.
Opothérapie Fournier.	Sulfureux Pouillet.
Ormatol.	Sulfurion.
Orthogénol.	Sulfuryl Monal.
Ouataplasme du Dr Lan- glebert.	Tapo.
Oxyléine.	Tégéol.
Pancréastase Defresne gra- nulée.	Térébine:
Pancréatose Idon.	Tergyl Lamo.
Paralactine Byla.	Terpoxyl externe.
Peptalmine.	Terpoxyl interne.
Thiorine.	Thigénol Roche.
	Thiocitran Thévenot.
	Thiophyl.

# IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

## ECZÉMAS

Thyroïdine.	Végétol.
Triseptine.	Vioforme Ciba et Ovules au
Ulcéosol Pommade.	Vioforme.
Ulcéosol Poudre.	Vitamyl.
Ulcérophile Nosan.	Vulcase.
Ultra-Levure.	Vulnérine du Dr Bergen.
Vaccins pansements Virul-	Yaourtine.
tra.	Zymatine Lescène.

## ÉRYTHÈMES — INTERTRIGO

Albuplast Vigier.	Inotyol.
Allergantyl.	Iodex.
Aloplastine.	Linadéline.
Antipiol.	Lynévol.
Bacillactine.	Médicoferment.
Baume Duret.	Méta-Titane
Baume de la Maternité.	Nestosyl.
Baume de Dr Baissade.	Onction Leisyn.
Borostyrol Schlatter.	Opodermyl.
Carbolactyl simple.	Opothérapie Bouty.
Dermatyol.	Percaïnal Ciba.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Phosoforme.
Dermofagine.	Pommade au Nestosyl.
Dermo-plastol Dumesni..	Pommade Bertol-Vichy.
Dermoradol.	Pommade Kléos.
Dermo-Stalys du Dr Wa-	Pommade Noëlline.
gon.	Poudre Noëlline.
Diadermine.	Poudre Satine.
Dialine.	Pyo-Amphogel Ronchès.
Eczéda.	Rhagadine Bracquemond.
Eczosec.	Rozoderme.
Ektogan Bocquillon.	Sapolan.
Euphoryl.	Tergyl Lamo.
Ganderma.	

## HERPÈS

Antipiol.	Lynévol.
Carbolactyl simple.	Nestosyl.
Choléopeptine.	Nitium Buisson.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Opothérapie Bouty.
Dermofagine.	Paralactine Byla.
Dermo-plastol Dumesnil.	Percaïnal.
Dermoradol.	Phosoforme.
Euphoryl.	Pommade au Nestosyl.
Facmine Longuet.	Pommade Lenoir.
Ganderma.	Pyodermase.
Humoro Stabilline.	Rob Lechaux.
Iodo-Thyroïdine Catillon.	Sanoquinol Ciba.
Levurine extractive.	Séphydine.



# IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

## HERPÈS

Staprolysat.  
Sulfoxyl.  
Sulfureux Pouillet.  
Sulfurion.

Sulfuryl Monal.  
Thyroidine.  
Ultra-violet.

## IMPETIGO

Acécolex.  
Alibourine.  
Ampho-Vaccins Ronchèse.  
Aniodol.  
Antipiol.  
Arapal.  
Aristargol.  
Arséniode.  
Arthrila.  
Arvensyl.  
Bacillactine.  
Baume du D<sup>r</sup> Baissade.  
Baume Duret.  
Boricine Meissonnier.  
Borostyrol Schlatter.  
Carbolactyl simple.  
Comprimés d'Alibour.  
Dépuriode du D<sup>r</sup> Roger Weber.  
Dermatyl.  
Dermo-dulcis Lagoutte.  
Dermofagine.  
Dermo-Plastol Dumesnil.  
Dermo-Stalys du D<sup>r</sup> Wagon.  
Emplâtres Rogé-Cavaillès.  
Entéro-Antigènes.  
Euphoryl  
Fludiose.  
Fondant Iodotannique Dausse.  
Furonculase.  
Ganderma.  
Humoro-stabiline.  
Inosepta.  
Iodarsénic Guiraud ou Gouttes Païdophiles.  
Iodex.  
Iodo-Maisine (Pommade.)  
Kérafine.  
Laccodermes.  
Laurenol Médicinal.

Levuro-Maltine Déjardin.  
Métacuprol.  
Méta-Titane.  
Méta-Vaccin.  
Morrhualène Gautier.  
Néo-Physio.  
Nestosyl.  
Onction Leisyn.  
Opothérapie Bouty.  
Ormatol.  
Percaïnal Ciba.  
Pommade au Nestosyl.  
Poudre Mass plastique.  
Pyo-Amphogel Ronchèse.  
Pyodermase.  
Rob Lechaux.  
Sarcoptol.  
Séphydine.  
Stalysine.  
Stanion.  
Stannoxy.  
Staphylagone.  
Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.  
Staphylocide Audras.  
Staphylo-Coccine Fraquet.  
Staphylothanol.  
Sulfodermol Flahaut.  
Tapo.  
Tégéol.  
Térébine.  
Terpoxyl externe.  
Thiophyl.  
Thyroidine.  
Ultra-violet.  
Vaccins pansements Virultra.  
Vaccins Ronchèse Ampho-Vaccins.  
Vaclodym.  
Vaclodyn.  
Vulnérine du D<sup>r</sup> Bergen.

# IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

## MYCOSES — SYCOSIS

Anaxéryl.	Ivago-Sta (buvable).
Antipiol.	Kérafline.
Baume du D <sup>r</sup> Baissade.	Levure fraîche Mycéta.
Baume Duret.	Levurine extractive.
Baume Sélénia.	Lipiodol Lafay.
Cadior	Lipiodine Ciba.
Carbofodure Fraudin.	Magiodyl.
Cimarsényl.	Méta-Vaccin.
Collo-Iode Dubois.	Néo-Riodine.
Cortiode.	Nestosyl.
Crescogénol.	Onction Leisyn.
Dépuriodide du D <sup>r</sup> Roger	Ormatol.
Weber.	Percainal Ciba.
Dermo-Stalys du D <sup>r</sup> Wa-	Pommade au Nestosyl.
gon.	Pommade Lenoir.
Dicallode.	Probios.
Eczosec.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Éniode Lefebvre.	Pyodermase.
Éranol.	Rhocya Dyn.
Ganderma.	Riodine.
Gelée-Vaccin Ivago « D ».	Sapolan.
Globules Fumouze à l'io-	Savons Mollard.
dure de Potassium.	Séphydine.
I. A. M.	Stalysine.
Inosepta.	Stanion.
Iodassium.	Stannoxyd.
Iode organique Boissy.	Staphylagone.
Iodex.	Staphylase du D <sup>r</sup> Doyen.
Iodogénol Pépin.	Staphylocide Audras.
Iodo-Maisine Globules.	Staphylo-Coccine Fraquet.
Iodo-Maisine Pommade.	Staphylothanol.
Iodone Robin.	Sulfarsiode.
Iodonésyl.	Sulfodermol Flahaut.
Iodonucléol.	Sulfoxyl.
Iodosan.	Sulfurion.
Iodo-Vitasine.	Sulfuryl Monal.
Iodural Novat.	Sunalcol.
Iodurase.	Sunoxol.
Iodure Pachaut.	Tiodine Cognet.
Ivago de Goldenberg Vac-	Toritanol Lamo.
cin « D ».	

## PHTIRIASIS — TEIGNE — GALE

Alibourine.	Pommade au Nestosyl.
Anaxéryl.	Pommade Lenoir.
Nestosyl.	Sarcoptol.
Onction Angélini.	Végétol.
Percainal.	

## PITYRIASIS

Acécolex.	Iodex.
Aloplastine.	Magnésium Hardy.
Anaxéryl.	Néobiol.
Denisoline.	Pommade Lenoir.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Pyrelaine Collas.
Dermofagine.	Sapolan.
Dermo-Plastol Dumesnil.	Savons Mollard.
Eczéda.	Sulfobyl.
Eczosec.	Sulfodermol Flahaut.
Ektogan Bocquillon.	Ultra-violet.
Ganderma.	V. A. V.
Gatran.	

## PRURIGO — DARTRES — PRURITS

(Voir : *Système nerveux, Sédatifs.*)

Agocholine.	Euglyma.
Allergantyl.	Euphoryl
Aloplastine.	Facimine Longuet.
Anthracalcine.	Féminadène.
Antipiol.	Fluokol.
Arthrilax.	Ganderma.
Arvensyl.	Héparbiline.
Aseptoradol.	Humoro-stabiline.
Azigol Thévenot.	Inotyl.
Baume du D <sup>r</sup> Baissade.	Inoxémol.
Baume Duret.	Insulanol.
Biliogastrine.	Jabosulfène.
Biolax.	Kéraffine.
Biophylactine M. G.	Kinéchol.
Boldolactic.	Laccodermes.
Borostyrol Schlatter.	Levuro-Maltine Déjardin.
Camphydryl Robin.	Linadéline.
Cataplasme du D <sup>r</sup> Lelièvre.	Lynévol.
Cholécystine.	Magnésium Hardy.
Choléfluine.	Magnéso-Tubes Robinet.
Cimarsenyl.	Médicoferment.
Comprimés Galac.	Méta-Titane.
Cratægus Gmet.	Néotrophène.
Delbiase.	Nertose
Dépuriodé du D <sup>r</sup> Roger	Nestosyl.
Weber.	Neurinase.
Dermatyl.	Nisaméline Trouette-Perret.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Onction Leisyn.
Dermo-Plastol Duquesnil.	Opodermyl.
Dermoradol.	Opothérapie Fournier.
Dermosplénine.	Ormatol.
Dialine.	Orthogénol.
Dragécalcion.	Pancréatose Idon.
Eczosec.	Peptamine.
Entéro-Antigènes.	Peptogl A. et L.
Entérobyl Delussy.	Perceinal Ciba.

# IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

## PRURIGO — DARTRES — PRURITS

(Voir : *Système nerveux, Sédatifs.*)

Plasma de Quinton.	Sarcoptol.
Polypeptonal.	Savons Mollard.
Pommade au Nestosyl.	Séphydine.
Pommade Bertol-Vichy.	Sodothioli.
Pommade Fornet.	Splénocrisine.
Postérisan.	Tégéol.
Précikase.	Thiocitran Thiévenot.
Prézymase.	Thiophyl.
Protiodyne dragées.	Thiorine.
Rob Lechaux.	Ulcéosol pommade.
Salvé.	Ulcéosol poudre.
Salvébyl.	Yaourtine.
Sapolan.	Zymatine Lescène.

## PSORIASIS

Acéclex.	Iodo-Maisine Pommade.
Allergantyl.	Ixium Buisson.
Anaxéryl.	Levure fraîche Mycéta.
Antipiol.	Levurine extractive.
Arsylène Roche.	Magnésium Hardy.
Aseptoradol.	Magnéso-Tubes Robinet.
Baume du Dr Baissadé.	Onction Leisyn.
Baume Duret.	Percainal Ciba.
Cacodyle Gonnon.	Phagostyl.
Chophytol Rosa.	Phagostyl mangané.
Cimarsényl.	Phosoforme.
Crescogenol.	Plasma de Quinton.
Delbiase.	Pommade au Nestosyl.
Dépuriode du Dr Roger Weber.	Pommade Fornet.
Dermo-Plastol Dumesnil.	Pommade Lenoir.
Dermoradol.	Psoréon.
Dicaliode.	Psothanol.
Dolophos.	Rob Lechaux.
Eczéda.	Sapolan.
Emplâtres Rogé Cavallès.	Savons Mollard.
Entéro-Antigènes.	Sirop minéral sulfureux
Euphoryl.	Crosnier.
Fer intraveineux Fraisse	Sulfarsénol.
Follicormone Hinglais.	Sulfobyl.
Ganderma.	Sulfodermol Flahaut.
Granions (Les).	Thorix.
I. A. M.	Tiodine Cognet.
Immunizols Grémy.	Ultra-Levure.
Iodarsenic Guiraud ou	Ultra-Violet.
Gouttes Païdophiles.	V. A. V.

## PYODERMITES

Acéclex.	Aniodol.
Alibourine.	Antipiol.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Arapal.

## PYODERMITES

Aristargol.	Onction Leisyn.
Arthrila.	Osmo-vaccin Bréant.
Baume Séléna.	Pommade au Nestosyl.
Boricine Meissonnier.	Probios.
Borostyrol Schaltter.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Comprimés d'Alibour.	Pyodermase.
Créosoforme Lambiotte.	Pyo-Vaclydun.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Séphydine.
Dermo-plastol Dumesnil.	Stalysine.
Dermo-Stalys du Dr Wa-	Stanion.
gon.	Stannoxy.
Furunculase.	Staphylogone.
Ganderma.	Staphylase du Dr Doyen.
Gelée vaccin Ivago « P ».	Staphylocide Audras.
Inotyol.	Staphylo-Coccine Fraquet.
Ivago de Goldenverg Vac-	Staphyloethanol.
cin « P ».	Tapo.
Ivago-Sta buvable.	Tégéol.
Ivago Pyo buvable.	Terpoxyl externe.
Laurenol médicinal.	Thorix.
Lysacrème L. M. L.	Uvéoline.
Médicoferment.	Vaclyderm.
Méta-Vaccin.	Vaclydun.
Néo-Physio.	Vitadone.
Olcalan	

## SÉBORRHÉE

Allergantyl.	Hyposulfène.
Azulroi.	Médicoferment.
Baume du Dr Baissade.	Néobiol.
Cimarsényl.	Pommade Lenoir.
Denisoline.	Précikase.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Pyrelaine Collas.
Dermorhinistol.	Sapolan.
Eczéda.	Sarcoptol.
Eczosec.	Savons Mollard.
Ektogan.	Séphydine.
Euphoryl.	Sodothiol.
Ganderma.	Sulfocrème Liless.
Gatran.	Sulfodermol Flahaut.
Humoro-stabiline.	Terpoxyl externe.

## TUBERCULOSE CUTANÉE — LUPUS

Aloysine (pommade).	Huile iodée Finikoff.
Arséniode.	Iodex.
Céthocal du Dr Lemay	Molène.
Cinalose.	Murones du Dr Robert
Colloïdogénine du Dr Bayle.	Jacques.
Créositoires.	Myoral.
Dicaliode.	Nestosyl.
Doloma.	Nitium Buisson.

# IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.

## TUBERCULOSE CUTANÉE — LUPUS

Onction Leisyn.	Ultra-Violets.
Percaïne Ciba.	V. A. V.
Plasma de Quinton.	Végétol.
Pommade au Nestosyl.	Vulnérine du Dr Bergen.
Sthénoléine.	Zimbyl.

## TUMEURS DE LA PEAU — VERRUES

Baume Iki.	Gouttes Halogènes du
C. 40.	Dr Bern.
Catalyl Mg.	Gouttes Magalo.
Chlormagnésium Fisch.	Magnésium Hardy.
Chloro-Magnésion.	Magnéso-Tubes Robinet.
Delbiase.	Phosphomagnésium.
Dolophos.	Silicyl.
	Verrulyse.

## ULCÈRES VARIQUEUX

Acécoline.	Insulanol.
Acécolex.	Insuline Phyloze.
Alibourine.	Iodassium.
Aloplastine.	Iodex.
Angioxyl	Kérafine.
Angitan.	Léotamine.
Antipiol.	Lynévol.
Belhémine.	Lysacrème L. M. L.
Borostyrol Schlatter.	Néo-Collargol.
Cataplasme du Dr Le-	Nestosyl.
lièvre.	Nitium Buisson.
Céthocal du Dr Lemay.	Onction Leisyn.
Cimarsényl.	Ormatol.
Dermo-dulcis Lagoutte.	Percaïnal Ciba.
Dermo-plastol Dumesnil.	Phléboguil.
Dermoradol.	Phosoforme.
Dermorhinistol.	Pommade au Nestosyl.
Eczéda.	Pommade Bertol-Vichy.
Eczosec.	Pommade Fornet.
Ektogan.	Pommade Raimoa.
Élastoplaste.	Pommade V. E. Doumer.
Emplâtres Rogé-Cavaillès.	Poudre Mass plastique.
Endopancrine.	Poudre et pommade d'in-
Entéro-antigènes.	suline Phyloze.
Epical.	Protidyne ampoules.
Glyco-Thymoline.	Proveïnase Midy.
Gouttes de Sérû.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Hamaméline Roya.	Pyroléol Édet.
Hamamélis Gmet.	Rénovol.
Hamamélis Grandval.	Rhagadine Bracquemond.
Hémorroidine gouttes.	Rozoderme.
Humoro-stabiline.	Séphydine.
Immunizols Grémy	Stéramine.
Inotyol.	Tégéol.

## ULCÈRES VARIQUEUX

Térébinte.  
Terpoxyl externe.  
Tulle rose Beslier.  
Ulcéoplaqué. — Ulcéo-  
bande.  
Ulcérophile Nosan.  
Uvéoline.  
Végétol.

Veinogène.  
Veinotrope.  
Veinotrope poudre.  
Velpeau (Bandé crêpe).  
Vioforme Ciba.  
Viscoveine.  
Vulnérine.

## URTICAIRE

Agocholîne.  
Allergantyl.  
Albuplast Vigier.  
Aloplastine.  
Aloysine.  
Amphotonyl.  
Anaclasine Ranson.  
Anapeptone Vassal.  
Anthracalcine.  
Antipiol.  
Arthrîlax.  
Arvensyl.  
Aseptoradol.  
Azigol Thévenot.  
Bacillactine.  
Biliogastrine.  
Biolax.  
Biophylactine Mg.  
Boldo Gmet.  
Boldolactine.  
Cachets Spévin.  
Calci-Sténine.  
Calcozymase.  
Carbolactyl bilié.  
Chlormagnésium.  
Chloro-magnésion.  
Cholécystine.  
Choléfluine.  
Choléopteine.  
Chophytol-Rosa.  
Colloil Leisyn.  
Comprimés Galac.  
Dépuriode du Dr Roger  
Weber.  
Dermatyol.  
Dermo-dulcis Lagoutte.  
Dermoplastol Dumesnil.  
Dermosplénine.  
Dragécalcion.  
Eczosec.  
Elkin (dragées, granules).  
Entéro-Antigènes.

Entérobyl Dehaussy.  
Euglyma.  
Euphoryl.  
Facmine Longuet.  
Fluokol.  
Gastéose.  
Gélicurine.  
Héparbiline.  
Hyposulfène.  
Iodarsenic Guiraud ou  
gouttes Paidophiles.  
Jabosulfène.  
Kinéchol.  
Levure fraîche Mycêta.  
Levurine extractivè.  
Lugocalcion.  
Lynévol.  
Mucyllium.  
Néopancarpine.  
Nertose.  
Nestosyl.  
Organicalcion.  
Ormatol.  
Panbiline.  
Pancréastase Defresne gra-  
nulée.  
Pancréatose Idon.  
Pancrébile.  
Paralactine Byla.  
Peptalminé.  
Peptogil A et L.  
Peptonal.  
Peptone Vassal.  
Phosoforme.  
Phylactone Byla.  
Polypeptonal.  
Pommade au Nestosyl.  
Précikase.  
Prézymase.  
Protiodyne.  
Protiodyne dragées.  
Salvébyl.

## **IX. — MALADIES DE LA PEAU. T. S.**

### **URTICAIRE**

Sulfodermol Flahaut.  
Sulfo-Thiorine.  
Thiocitran Thévenot.  
Triseptine.

Urométhyl.  
Yaourtine.  
Zymatine Lescène.

## **X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. G.**

### **ANTIPYRÉTIQUES**

Alcacyl.  
Antigrippine Midy.  
Arcanan.  
Ascéine.  
Bisalicylate.  
Cachets du Dr Boveil.  
Calmant Meunier.  
Créo-suppo-camphre.  
Cryogénine Lumière.  
Curatine Brunet.  
Erythra Dyn.  
Eucalyptine.  
Gouttes Daynoc.  
Grains céphalgifuges.  
Irénine Gonnon.  
Kalmigraine.  
Muronex du Dr Robert  
Jacques.  
Névorol Rafey.

Névralgol Brossard.  
Panfébrine.  
Pyréthane.  
Quinino-phytine Ciba.  
Quinquina Gmet.  
Révulsoplasme.  
Rhoféine.  
Sédogrippine.  
Septicémine Cortial.  
Solution Bardet.  
Sthénoléine.  
Stopral.  
Suppositoires Pyrax.  
Térébine.  
Terpoxyl interne.  
Thermocédone.  
Urol.  
Véganine.  
Véralgine.

### **ANTISEPTIQUES EXTERNES**

Acécolex.  
Alibourine.  
Amborhinol.  
Ampho-Tablettes Ronchèse  
Anaquintine Lescène.  
Anexol.  
Antipiol.  
Aseptorine.  
Balmiga.  
Clearol.  
Goménol.  
Gouttes Daynoc.

Iodex.  
Pennès (Produits).  
Rhinadrargol.  
Rhinod Béral.  
Rhino-Liposeptine.  
Séphydine.  
Septolan.  
Térébine.  
Terpoxyl externe.  
Vinaigre de Pennès.  
Vioforme.

### **ANTISEPTIQUES INTERNES**

Acatar.  
Alcacyl.  
Alcamfétol.

Algophagine.  
Ampho-vaccin Ronchèse.  
Ampoules Reipa.



## **X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. G.**

### **ANTISEPTIQUES INTERNES**

Aniodol.	Iodinjectol Jammes.
Antalgol Dalloz.	Lantol.
Antigrippine Midy.	Médicoferment.
Antiphymique Vadam.	Métaformine.
Arcanan.	Mictoseptol.
Argion.	Néo-Collargol
Ascéine.	Néo-Physio.
Atophan Cruet.	Ovules au terpoxy.
Atophanyl.	Oxyléine.
Bensamine.	Panxylon.
Benzobromine.	Pennès (Produits).
Bioentérase.	Quinoidine Duriez.
Boricine Meissonnier.	Radiotropine.
Bucmine.	Rectopanbilline.
Canol.	Septicémine Cortial.
Carboiodine.	Sulfarsénol.
Chloramine Freyssinge.	Térébine.
Chlorobacilline.	Terpoxy interne.
Colloi-iodé Dubois.	Themsaline.
Cryptargol Lumière.	Triseptine.
Cynurol Rosa.	Ultraformine.
Dicaliode.	Urseptine Rogier.
Dioradin.	Ur-Clar.
Elgine Julien.	Urisanine.
Entérargol.	Uroformine Gobey.
Ethyl Pneumine « Ler- sam ».	Uroiodine.
Eucalyptine Le Brun.	Urol.
Évobiline.	Urométhyl.
Formocitrine.	Urométine Lambiotte.
Gambéol.	Urosaly.
Glyco-Thymoline.	Urosan Dufayard.
Gonacrine.	Urozéa.
Granions.	Uvargol.

### **BACTÉRIOPHAGES**

Bacté-Phages.	Levuro-Maltine Déjardin.
Entérofagos.	Probios.
Kerlactine.	

### **BACTÉRIOTHÉRAPIE FERMENTS LACTIQUES**

Ampho-vaccins Ronchèse.	Koumyl.
Bi-ferments lactiques stables.	Lactaris.
Biolactyl Fournier.	Lacticholéine Tulivet.
Bulgarine Thépenier.	Lactimase.
Chlorure d'ammonium Bréant.	Lactobacilline.
Entéroxin.	Lactochol.
Galabactéine.	Levuro-Maltine Déjardin.
Kerlactine.	Néo-physio. — Physiosthé- nine.
	Yaourtine.

## **X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. G.**

### **BALNÉOTHÉRAPIE**

(Voir : Chirurgie.)

### **CHIMIOTHÉRAPIE — COLLOÏDES**

Alcamfétol.  
Algocratine.  
Antiphymique Vadam.  
Diénol.  
Dioradin.  
Elgine Julien.  
Erythra Dyn &  
Eucalyptine Lebrun.  
Granions.  
Ifranol.  
Leucoseptyl.

Mésothorium Rhemda.  
Mycolysine du D<sup>r</sup> Doyen.  
Néo-Collargol.  
Néo-Physio.  
Orargol Amicros.  
Polyvaline.  
Salyptol Narty.  
Sédogrippine.  
Septicémine Cortial.  
Stanion.  
Sthénoléine.

### **DIAPHORÉTIQUES**

Acodros.  
Alcacyl.  
Do-Sa-No-Sal.

Rosalyl.  
Sédogrippine

### **SÉRUMS — VACCINS**

Amphovaccins Ronchèse.  
Antigénines.  
Antivirus.  
Avistyl.  
Bilivaccin.  
Broncho-Vaclydun.  
Colitique.  
Coli-Vaclydun.  
Entéro-antigènes.  
Entérofagos.  
Entérovaccin Lumière.  
Entéroxin Leclerc.  
Immunizols Grémy.  
Institut Pasteur Sérums.  
Institut Pasteur Vaccins.  
Ivago Coli (buvable).  
Ivago de Goldenberg Vaccins.  
Ivago Pyo (buvable).  
Lysaxins L. M. L.  
Néo-Physio. — Physio-  
sthénine.

Osmo-vaccin Bréant.  
Probios.  
Propidon.  
Stalysine.  
Staphylagone.  
Strepto-Vaclydun.  
Vaccin anti-grippal du professeur Minet.  
Vaccinothérapie atoxique Cépède.  
Vaccins Bruschetti.  
Vaccins atoxiques stabilisés.  
Vaccins bactériens I. O. D.  
Vaccins intra-dermiques et gelées-vaccins Ivago de L. Goldenberg.  
Vaccin pansement Virutra.  
Vaccins Ronchèse Ampho-vaccins.  
Vaclyderm.  
Vaclydun.

### **COLIBACILLOSE**

Amibiasine.  
Amiphène Carron.  
Ampho-vaccins Ronchèse.  
Anthrseptol.  
Bensamine.

Binoxol.  
Bioentérase.  
Carbargyre.  
Carbolactyl bilié.  
Carbolactyl simple.

## **X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.**

### **COLIBACILLOSE**

Casaldyl.	Néo-Collargol.
Chloramine Freyssinge.	Néo-Physio.
Cholagol.	Néphryl.
Chrysémine.	Œnophos.
Colitique.	Osmo-vaccin Bréant.
Coli-Vaclydun.	Oxyléine.
Combrosmol.	Ozothine.
Cryptargol Lumière.	Passicarbonate.
Cynurol Rosa.	Phosoforme.
Diathermie.	Polyvaline du D <sup>r</sup> Bayle.
Dioradin.	Probios.
Dragées Elkin.	Pyoformine.
Elgine Julien.	Pyurol.
Entérargol	Sélamon.
Entéro-antigènes.	Stomoxygène.
Entérofagos.	Tannurgyl du D <sup>r</sup> Letan-
Entérovaccin Lumière.	neur.
Entéroxin Leclerc.	Térébine.
Félicol.	Terpoxyl interne.
Formocarbène.	Thoroxyl.
Formocarbos.	Triseptine.
Fosfoxyl.	Ultraformine.
Galabactéine.	Ultra-Levure.
Géranine.	Urarseptine Rogier.
Hexotal.	Ur-Clar.
Immunizols Grémy	Uribiline.
Immuno-vaccins anti-rhu-	Uriclarine.
matismal à ingérer.	Urométhyl.
Kerlactine.	Uvargol.
Lacto-sérum Lavril.	Vaccinothérapie atoxique
Lantol.	Cépède.
Leucoseptyl.	Vaccins Bruschettini.
Levure B. 17.	Vaccins bactériens I. O. D.
Lithinoformine	Vaccins intra-dermiques et
Métaformine.	gelées-vaccins Ivago de
Microlyse.	L. Goldenberg.
Mictasol.	Vaccin Ronchèse (ampho-
Mucyllium.	vaccins).
Naphtocarbène.	Vaclydun.

### **DIPHTÉRIE**

(Voir Oto-rhino-laryngologie, Angines.)

Colarsénol.	Physiosthénine.
Dragécalcion.	Polyvaline du D <sup>r</sup> Bayle.
Fornose.	Rhinadrargol.
Institut Pasteur Sérums.	Rhino-Liposeptine.
Institut Pasteur Vaccins.	Séphydine.
Néo-Physio.	

## X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

### ÉRYSIPELE

Acécolex.	Pommade au Nestosyl.
Alibourine.	Probios.
Amphovaccins Ronchèse.	Propidon.
Aniodol.	Protiodyne ampoules.
Antigénines.	Pyo-Amphogel de Ron-
Antipiol.	chèse. <i>-R. L. M. d.</i>
Antivirus.	Sephydine.
Bucmine.	Septicémine Cortial.
Collo-iode Dubois.	Staphylase du Dr Doyen.
Elgine Julien.	Staphylo-coccine Fraquet.
Glyco-Thymoline.	Strepto-Vaclydun.
Goménol.	Sulfarsénol.
Gouttes Daynoc.	Térébine.
Iodex.	Themsaline.
Leucoseptyl.	Thigénol Roche.
Levuro-Maltine Déjardin.	Vaccinothérapie atoxique
Liposeptine.	Cépède.
Lysaxins L. M. L.	Vaccins Bruschetti.
Naso-Sulfolarsan.	Vaccins Ronchèse Ampho-
Néo-Physio.	Vaccins.
Nestosyl.	Vaclyderm.
Nucléatol Robin.	Vaclydun.
Polyvaline du Dr Bayle.	Vulnérine du Dr Bergon.

### FIÈVRES ÉRUPTIVES — LÈPRE

Adrénargol.	Orargol Amicros.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Panfèbrine.
Aniodol.	Physiosthénine.
Ascéine.	Phytinate de quinine Ci-
Baume du Dr Baissade.	ba.
Benzobromine.	Polyvaline du Dr Bayle.
Bucmine.	Poudre Mass plastique.
Créositoires.	Pyréthane.
Diénol.	Quinino phytine Ciba.
Elgine Julien.	Quinquina Gmet.
Erythra Dyn.	Rhinadrargol.
Eucalyptine.	Rhino-liposeptine.
Goménol.	Sephydine.
Gouttes Daynoc.	Septicémine Cortial.
Lantol.	Sirop Famel.
Leucoseptyl.	Suppositoires Pyrax.
Liposeptine.	Terpoxyl interne.
Métaformine.	Théosalvose.
Mictoseptol.	Tubérol.
Mycolysine du Dr Doyen.	Urisanine.
Néo-Physio.	Zimbyl.

### GRIPPE

Acodros.	Algocratine.
Adrénargol.	Amborhinol.
Aigue d'or.	Ampho-vaccins Ronchèse.
Alcacyl.	Anaquinine Lescène.
Alcamfétol.	Aniodol.

# X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

## GRIPPE

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Antalgot Dalloz.           | Curatine Brunet.          |
| Anthraccalcine.            | Curogène.                 |
| Antidouleur Barbessou.     | Cynuroi Rosa.             |
| Antigenines.               | Dépuriodé du Dr Roger     |
| Antigrippine Midy.         | Weber.                    |
| Antiphymique Vadam.        | Diénot.                   |
| Appétyl.                   | Dioradin.                 |
| Arcanan.                   | Elgine Julien.            |
| Ardogène.                  | Élixir Bonjean.           |
| Arsécrinol.                | Élixir Ducro.             |
| Arsi-Strychnal Longuet.    | Élixir Grez.              |
| Ascéine.                   | Entérargol.               |
| Asciatine.                 | Erccerhinol.              |
| Avistyl.                   | Erythra Dyn.              |
| Bacté-phages.              | Ethyl Pneumine.           |
| Balmiga.                   | Eucalyptine Le Brun.      |
| Balsamol Lescène.          | Ferment pur de raisin.    |
| Benzobromine               | Germose.                  |
| Biophorine Girard.         | Goménol.                  |
| Blagny.                    | Gouttes Daynoc.           |
| Bronchitol.                | Gouttes Leconte.          |
| Bronchodermine.            | Gouttes Narkay.           |
| Bronchoforme.              | Gouttes Nican.            |
| Bronchoseptol Lauriat.     | Granules des Vosges.      |
| Broncho-Vaclydun.          | Guttoléol.                |
| Broncosol.                 | Hémoviris.                |
| Bucmine.                   | Hexotal.                  |
| Cachets du Dr Boveil.      | Holaseptine.              |
| Cachets Kapytan.           | Hylol.                    |
| Cachets « Roche » de Thio- | Ifranol.                  |
| col.                       | Immunizols Grémy.         |
| Cacodyle Gonnon.           | Immuno-vaccin broncho-    |
| Calmant Meunier.           | pulmonaire.               |
| Camphodausse.              | Inhalation Lancosme.      |
| Campho-spartéine Dubois.   | Iodométine.               |
| Camphostyl Lacroix.        | Iodure de fer inaltérable |
| Camphydryl Robin.          | de Blancard.              |
| Carboiodine.               | Irénine Gonnon.           |
| Cérébrine Fournier.        | Ivago de Goldenberg Vac-  |
| Cérébrosthénine Dalin.     | cin « A ».                |
| Chlorobacilline.           | Kalmigraine.              |
| Citrolargol.               | Kipsol.                   |
| Codobromyl.                | Kola granulée Astier.     |
| Codocol.                   | Kola Monavon.             |
| Collo-iode Dubois.         | Lantol.                   |
| Comprimés « Roche » de     | Léniforme.                |
| Thiocol.                   | Leucoseptyl.              |
| Coryphédrine.              | Marrubène.                |
| Crédone Dehaussy.          | Marrucol.                 |
| Créoformine.               | Métaformine.              |
| Créositoires.              | Mictoseptol.              |
| Créo-suppo-camphre.        | Miroxyl.                  |
| Crésopirine.               | Mycolysine du Dr Doyen.   |
| Cryogénine Lumière.        | Myothermine.              |

## **X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.**

### **GRIPPE**

Nasargine.  
Nazinette.  
Néo-Collargol.  
Néo - Physio.  
Néopulmine.  
Néorhomnol.  
Névorol Rafey.  
Névralgol Brossard.  
Nopirine Vicario.  
Œnophos.  
Orargol Amicros.  
Oxyléine.  
Oxymenthol Perraudin.  
Ozothine.  
Panfébrine.  
Panxylon.  
Passicarbonate.  
Pâte Mireille.  
Pecthionol.  
Phagostyl.  
Phagostyl Mangané.  
Phosote Lambiotte.  
Pilules V. E. Doumer.  
Pneumo-Lipase.  
Polyvaline du D<sup>r</sup> Bayle.  
Potion Adol.  
Prévalidine.  
Primulyse.  
Probios.  
Protiodyne.  
Protonic.  
Pulvéol.  
Pyoformine.  
Pyréthane.  
Quergémol.  
Quinarsol.  
Quinéine.  
Quinino-phytine Ciba.  
Quinoidine Duriez.  
Quinquina Gmet.  
Quinsal.  
Radiotropine.  
Réstyl.  
Révulsoplasme.  
Rhino-Liposeptine.  
Rhoféine.  
Salyptol Narty.  
Sanex-Inhalant.  
Sédogrippine.  
Sénécol.  
Septicémine Cortiol.  
Septolan.

Sirop antiphlogistique de  
Bréant.  
Sirop Brahma.  
Sirop de créosote Vacheron.  
Sirop de Gaiarsol.  
Sirop Famel.  
Sirop Roche au thiocol.  
Sirop Vacheron au gaiacol.  
Solucamphre Delalande.  
Solution Pautauberge.  
Spican ol.  
Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.  
Staphylo-coccine Fraquet.  
Sthénoléine.  
Stopral.  
Sulfoxyl.  
Sulfureux Pouillet.  
Sulfuryl Monal.  
Suppositoires Pyrax.  
Tanno-Calceine.  
Tapo.  
Térébine.  
Terpoxyl interne.  
Themsaline.  
Thiocol.  
Tubérol.  
Uraseptine Rogier.  
Urisanine.  
Uroformine Gobey.  
Uroiodine.  
Urol.  
Urométhyl.  
Urométine Lambiotte.  
Urosan Dufayard.  
Uvargol.  
Vaccin anti-grippal du pro-  
fesseur Minet.  
Vaccinothérapie atoxique  
Cépède.  
Vaccins atoxiques sta-  
bilisés.  
Vaccins intra-dermiques et  
gelées-vaccins Ivago de  
L. Goldenberg.  
Vaccins Ronchèse. — Am-  
pho-vaccins.  
Vaclydun.  
Véganine.  
Véralgine.  
Zaryl.  
Zimbyl.

## **X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.**

### **OREILLONS**

Adrénargol.  
Anaquintine.  
Baume Iki.  
Bucmine.  
Elgine Julien.  
Goménol.  
Iodex.

Liposeptine.  
Polyvaline du Dr Bayle.  
Suppositoires Pyrax.  
Terpoxyl interne.  
Tubérol.  
Véganine.  
Véralgine.

### **RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU**

Alcacyl.  
Algocratine.  
Algophagine.  
Ampho-vaccins Ronchèse.  
Ampoules Boissy d'iodure  
de potassium.  
Ampoules Reipar.  
Anégrine.  
Ascéine.  
Atophan Cruet.  
Atophanyl Cruet.  
Atoquinol Ciba.  
Banikol.  
Baume Adol.  
Baume Aroma.  
Baume Bengué.  
Baume Rhodia.  
Bisalicylate.  
Bucmine.  
Cachets du Dr Boveil.  
Crédone Dehaussy.  
Crésopirine.  
Curatine Brunet.  
Cynurel Rosa.  
Dolysine.  
Elgine Julien.  
Endodermol.  
Entéro-antigènes.  
Erythra Dyn.  
Grains céphalgifuges.  
Immunizols Grémy.  
Immunovaccin antirhumat-  
ismal.  
Iodex.  
Iodinjectol Jammes.  
Iodométine.

Kétophan.  
Magsalyl Mg.  
Myoden.  
Naiodine Logeais.  
Nopirine Vicario.  
Nucléocardyl.  
Opothérapie Bouty.  
Panfébrine.  
Paradol.  
Polyvaline du Dr Bayle.  
Pyréthane.  
Révulsif liquide Boudin.  
Révulsif Procipha.  
Rhésal Vicario.  
Rhocya Dyn.  
Salénal Ciba.  
Salène Ciba.  
Salysérum.  
Sambul.  
Septicémine Cortial.  
Spécifique Béjean.  
Sulfoidol Robin.  
Sulfureux Pouillet.  
Sulfurion.  
Thorix.  
Thyroidine.  
Triglandine.  
Triglandol.  
Ulmarène Gigon.  
Ultraformine.  
Urométhyl.  
Uromil.  
Véganine.  
Velpeau (Bande crêpe).  
Véralgine.  
Viophan.

### **ROUGEOLE**

Adrénargol.  
Anaquintine.  
Benzobromine.  
Créositoire infantile.  
Erythra Dyn.  
Eucalyptine Lebrun.

Polyvaline du Dr Bayle.  
Poudre Mass plastique.  
Pyroléol Édet.  
Rhino Liposeptine.  
Suppositoire Pyrax.

## X. — MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

### SEPTICÉMIES

Alcamfétol.	Nitroyl Leisyn injectable.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Orargol Amicros.
Aniodol.	Oxy-injecteur du D <sup>r</sup> Fialip.
Antigénines.	Panfébrine.
Ascéine.	Physiosthénine.
Bensamine.	Polyvaline du D <sup>r</sup> Bayle.
Bikréol.	Probios.
Bucmine.	Progone.
Cadior.	Propidon.
Camphodausse.	Protiodyne injectable.
Campho-spartéine Dubois.	Pyoformine.
Camphostyl Lacroix.	Quinquina Gmet.
Camphydryl Robin.	Rhinadrargol.
Cryogénine.	Rhoféine.
Dicaliode.	Sédogrippine.
DiénoI.	Septicémine Cortial.
Digitaline Nativelle.	Solucamphre Delalandé.
Dioradin.	Stalysine.
Elgine Julien.	Stanion.
Ethyl Pneumine • Ler- sam ».	Staphylagone.
Eucalyptine.	Staphylo-vaclydun.
Goménol.	Stovafer.
Gônacrine.	Strepto-Vaclydun.
Granions.	Suppo-pyrax.
Hémoviris.	Térébine.
Institut Pasteur Sérums.	Térozone.
Iodinjectol Jammes.	Terpoxyl interne.
Iodométine.	Themsaline.
Lantol.	Urol.
Leucoseptyl.	Urométhyl.
Lipodéterpénol.	Vaccins bactériens I. O. B.
Métaformine.	Vaccins Ronchèse. — Am- pho-vaccins.
Mycolysine du D <sup>r</sup> Doyen.	Vaclydun.
Néo-Physio.	Zimbyl.

### TÉTANOS

(Voir : *Système nerveux.*)

Institut Pasteur Sérums. | Institut Pasteur Vaccins.

### TYPHOÏDES ET PARATYPHOÏDES

Acolitol.	Bilivaccin.
Amiphène Carron.	Bioentérase.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Biolactyl Fournier.
Aniodol.	Bucmine.
Anthraccalcine.	Bulgarine.
Antigénines.	Carbolactyl bilié.
Bensamine.	Carbolactyl simple.
Benzobromine.	Casaldyl.



## TYPHOÏDES ET PARATYPHOÏDES

Chloramine Freyssinge.	Panbiline.
Chlorobacilline.	Pancarbo Hardy.
Cryogénine Lumière.	Panfèbrine.
Cryptargol Lumière.	Physiosthénine.
Cynurol Rosa.	Phytine.
Dioradin.	Polyvaline du Dr Bayle.
Elgine Julien.	Poudre Mass plastique.
Entérargol.	Protiodync.
Entérofagos.	Pyoformine.
Entéro-vaccin Lumière.	Quinio-Phytine.
Eucalyptine.	Quinquina Gmet.
Formocarbine.	Septicémine Cortial.
Formocitrine.	Sthénoléine.
Galabactéine.	Solucamphre Delalande.
Goménol.	Tapo.
Immunizols Grémy.	Triseptine.
Institut Pasteur Vaccins.	Uraseptine Rogier.
Kerlactine.	Urisanine.
Lantol.	Urométhyl.
Leucoseptyl.	Urosan Dufayard.
Liposeptine.	Uvargol.
Néo-Physio.	Vaccins bactériens I. O. D.
Nergine Meunier.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Nucléatol Robin.	pho-vaccins.

## ZONA

Acéclex.	Néo-Physio — Physiosthé-
Algocratine.	nine.
Baume Adol.	Nestosyl.
Baume Aroma.	Névoral Rafey.
Baume Bengué.	Névrargol Brossard.
Cachets du Dr Boveil.	Nitroyl Leisyn.
Calmant Meunier.	Oxyléine.
Cataplasme du Dr Lelièvre.	Percaïnal Ciba.
Choléopeptine.	Pommade au Nestosyl.
Curatine.	Pyroléol Edet.
Dragécalcion.	Rectopanbiline.
Érythra Dyn.	Rozoderme
Glyco-Thymoline.	Sédogrippine.
Infra-rouge.	Staprolysat.
Kalmigraine.	Sulharsenol.
Kérafine.	Suppositoires Pyrax.
Lynevol.	Ulmacétyl.
Nalodine Logeais.	Ultra-violet.
Néopancarpine.	Véganine.
	Véralgine.

# XI. — MALADIES PARASITAIRES.

## AMIBIASÉ

Amibiasine.  
Amidal.  
Amiphène Caron.  
Absuric.  
Bismuth Desleaux.  
Bismuth Tulasne.  
Caparlem.  
Carbalcaloïdes.  
Céphcemétine.  
Chrysémine.  
Crésentyl.  
Géranine.

Ludin.  
Malarsan.  
Nigérine.  
Panlabyl.  
Pâte Spécia.  
Prévarsyl.  
Sanluol.  
Stovafer.  
Stovarsol.  
Suppositoires Corbière.  
Tréparsol.

## HELMINTHIASE

Bioentérase.  
Bismuth Desleaux.  
Bismuth Tulasne.  
Carbonate de Bismuth.  
Chénantol.  
Chrysémine.  
Crésentyl.  
Curoxyure.  
Gambéol.  
Géranine.  
Glyco-Thymoline.  
Oxyléine.

Salvé.  
Stovarsol.  
Sulfa.  
Sulfureux Pouillet.  
Tablettes Perroud.  
Taenifuge Bardet.  
Taenifuge du D<sup>r</sup> Jacquème.  
Taenifuge français du  
D<sup>r</sup> E. Duhourcau.  
Taenifuge Kirn.  
Vermifuge Cornet.  
Vermirène Audibert.

## MALADIE DU SOMMEIL

Arsénomyl.  
Bismuthoidol Robin.  
Physiosthénine.

Prévarsyl.  
Trilues.

## MYCOSES

Algatan.  
Carboiodure Fraudin.  
Collo-iodé Dubois.  
Cortiodé.  
Dépuriode du D<sup>r</sup> Roger  
Weber.  
Dicaliodé.  
Éniode Lefebvre.  
Éranol.  
Géranine.  
Globules Fumouze à l'io-  
dure de Potassium.  
Iodassium.  
Iode organique Boissy.  
Iodogénol Pépin.  
Iodo-Maïsine Globules.

Iodone Robin.  
Iodonucléol.  
Iodosan.  
Iodo-Vitasine.  
Iodural Novat.  
Iodurase.  
Iodure Pachaut.  
Lipiodol Lafay.  
Lipoiodine Ciba.  
Magiodyl.  
Néo-Riodine.  
Rhocya Dyn.  
Riodine.  
Sulfarsiodé.  
Tiodine Cognet.  
Toritanol Lamo.

# **XI. — MALADIES PARASITAIRES.**

## **PALUDISME**

Agamétol.	Neurotrol.
Algatan.	Nucléarsitol Robin.
Analgénine.	Opocrinases.
Arsénomyl.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Frayssé.
Arsylène Roche.	Panbiline.
Bionéol.	Panfèvreine.
Biotrigon.	Panostyl.
Boldo Verne.	Phagosthyl.
Cachets du D <sup>r</sup> Boveil.	Phagosthyl Mangané.
Cacodyle Gonnon.	Pilules V. E. Doumer.
Catalyl Mg.	Plurion Couturieux.
Cérébroil Leisyn.	Prévarsyl.
Chophytoi Rosa.	Pyréthane.
Curatine.	Quergémol.
Diéménal.	Quinarsol Antianémique.
Férydal.	Quinarsol Fébrifuge.
Ferrocodile et Ferricodile.	Quinoïdine.
Ferrocil.	Quinéine.
Florhépatine.	Quinicardine.
Gamétoxiyl.	Quinio-Stovarsol.
Gastrhéma.	Quininophytine Ciba.
Gouttes Daynoc.	Quinoforme Lacroix.
Hectargyre.	Quinoïdine Duriez.
Hectine.	Quinquina Gmet.
Hémoglobine Deschiens.	Septicémine Cortial.
Hémostyl.	Serifer Laurençon.
Iodaseptine Cortial.	Séroma Rey.
Iodonesyl.	Solucamphre quininé.
Ifranol.	Solution Bardet.
Lioncyl.	Sthénoléine.
Liposplénine.	Sulfarsénol.
Magnésio-Cacodyline	Syphonéol.
Jammes.	Taburoi Monal.
Malarsan.	Trilues.
Mangratinés.	Vanadarsine Guillaumin.
Néoarsite.	Vin de Bugeaud.
Néo-Arsycodile.	Zimbyl.

## **PARASITES DE L'INTESTIN ET DES VOIES BILIAIRES**

Binoxol.	Gambéol.
Bioentérase.	Géranine.
Bismuth Desleaux.	Glyco-Thymoline.
Bismuth Tulasne.	Goménol.
Caparlem.	Kerlactine.
Carbalcaloïdes.	Levuro-Maltine Déjardin.
Carbonate de Bismuth.	Magistère de bismuth Fou-
Chénantol.	ché.
Chrysémine.	Mucobismuthine.
Crésentyl.	Oxyléine.
Curoxyure.	Pyrelaine Collas.

## **XI. — MALADIES PARASITAIRES.**

### **PARASITES DE L'INTESTIN ET DES VOIES BILIAIRES**

Rectagine.  
Rectopanbiline.  
Salvé.  
Sulfureux Pouillet.  
Taenifuge Bardet.

Taenifuge français du  
D<sup>r</sup> E. Duhourcau.  
Tœnifuge Jacquême.  
Tœnifuge Larix.  
Vermifuge Cornet.  
Vermirène Audibert.

## **XII. — OPHTALMOLOGIE.**

### **ANESTHÉSQUES LOCAUX**

Aristargol.  
Allocaine Lumière.  
Chloraseptine Optima.  
Collyres Chibret.  
Delcaine Roques.  
Nestosyl.  
Panthésine Sandoz.  
Percaïne Ciba.  
Pommades ophtalmologi-  
ques Chibret Optima.

Pommade au Nestosyl.  
Scurocaine.  
Stillargol.  
Thigénol Roche.  
Tubes Blache.  
Tubes Dulcis.  
Tubes du D<sup>r</sup> Guiraud.  
Tubes ophtalmologiques  
Ferlux.  
Tubes Strana.

### **ANTISEPTIQUES LOCAUX**

Aniodol.  
Aristargol.  
Boricine Meissonnier.  
Chloraseptine Optima.  
Clearol.  
Collyres Chibret.  
Comprimés d'Alibour.  
Conjonctol.  
Cryptargol Lumière.  
Glyco-Thymoline.  
Goménol.  
Inosepta ophtalmique.  
Ophtalmine  
Optraex Famel.  
Opzomyl.

Pommades ophtalmologi-  
ques Chibret Optima.  
Poudre Chaumel.  
Pyo Amphogel Ronchèse.  
Rosaseptor.  
Térébine.  
Thigénol Roche.  
Tubes Blache.  
Tubes Dulcis.  
Tubes du D<sup>r</sup> Guiraud.  
Tubes ophtalmologiques  
Ferlux.  
Tubes Strana.  
Végétol externe.  
Vitargyl.

### **BAINS D'YEUX**

Antipiol.  
Aristargol.  
Clearol  
Hamamélis Gmet.  
Optraex Famel.

Pommades ophtalmologi-  
ques Chibret optima.  
Poudre Chaumel  
Rosaseptor.

## XII. — OPHTALMOLOGIE.

### INSTILLATIONS — COLLYRES

Adrénaline Invar.	Panthésine Sandoz.
Adrénine.	Percaine Ciba
Allocaïne Lumière.	Rhinofluine.
Antipiol.	Sérébé du D <sup>r</sup> Blaizot.
Collyres Chibret.	Stillargol.
Ephédrine naturelle Béral.	Térébine.
Orargol Amicros.	

### POMMADES

Antiphlogistine.	Pommades ophtalmologi-
Antipi l.	ques Chibret Optima.
Eczeda.	Salantale.
Eczosec.	Tubes Blache.
Goménol.	Tubes du D <sup>r</sup> Guiraud.
Méta-Vaccin.	Tubes Duleis.
Onction Leisyn.	Tubes ophtalmologiques
Ophtalmine.	Ferlux.
Percainal Ciba.	Tubes Strana.

### VACCINS

Entéro-antigènes.	Vaccins pansements Virul-
Immuno-vaccin	tra.
Ivago de Goldenberg Vac-	Vaccins Polyvalents du
cins.	D <sup>r</sup> Renard.
Vaccins Ivago de Golden-	Vaccins Ronchèse. — Am-
berg.	pho-vaccins.
Vaccinothérapie atoxique	V. A. V.
Cépède.	

## XIII. — OPOTHÉRAPIE.

Adipolysine.	Follicormone buccale Hin-
Agomensine.	glais.
Ampolases.	Folliculine Choay.
Androcalcion H et E.	Folli-Lobine.
Androstine Ciba.	Gastricine.
Antélobine.	Glandex phoscalcique.
Arsécrinol.	Gynocalcion.
Carbolactyl bilié.	Hématoéthyroïdine.
Colloïdogénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Hémocalcine.
Collo-iode Dubois.	Holovarine.
Crinex.	Hormocrinol.
Détensyl.	Hormovarine Byla.
Féminadène.	Indhaméline Lejeune plu-
Folestrine Grémy.	riglandulaire.
	Lipoides Iscovesco.

### XIII. — OPOTHÉRAPIE.

Neurovarol.	Oxydothyridine Pâris.
Ocréine Grémy.	Oxydovarine Pâris
Œstrobrol.	Pancrêbile.
Opoferrine vitaminée.	Panglandine Couturieux.
Opothérapie Bouty.	Peptosthénine Choay.
Opothérapie Byla associée.	Post-hypophyse Choay.
Opothérapie Byla simple.	Proxystases.
Opothérapie Carrion.	Quinovarine Optima.
Opothérapie Choay.	Sédofoline.
Opothérapie du D <sup>r</sup> Fraysse.	Sérogyné.
Opothérapie Fournier.	Sistex.
Opothérapie Moncour.	Sistomensine Ciba.
Opothérapiques Pellissier.	Sténovarine.
Opozones Lumière.	Syncrines Choay.
Orchidine Optima.	Térozone.
Orex.	Triglandine.
Ovaire Fournier.	Valovarine.
Ovarine Optima.	Vitacrines.
Ovarine Tisy.	Yo-Androl.
Ovaro-Thyroidine Optima.	Yo-gynine.

### XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

#### ANALGÉSIIQUES GÉNÉRAUX

Acobella.	Credone Dehaussy.
Acodros.	Curatine Brunet.
Acoégenol.	Curogène.
Alcacyl.	Erythra.
Algocratine.	Pyréthane.
Antigrippine Midy.	Sédogrippine.
Arcanan.	Somnicones Béral.
Cachets du D <sup>r</sup> Boveil.	Spasmalone.
Cibalgine.	Suppositoires Pyrax.
Chloral bromuré du D <sup>r</sup> Du-	Véganine.
bois.	Véralgine.
Corizol.	

#### ANALGÉSIIQUES LOCAUX

Allocaïne Lumière.	Nestosyl.
Amborhinol.	Otalgolex.
Anaquintine.	Panthésine.
Baume Bengué.	Pastilles M. B. C.
Camphydryl Robin.	Pâte Mireille.
Chlorinol.	Percaïne Ciba.
Cocaïne Midy.	Pharyngaseptyl.
Delcaïne Roques.	Rhino-Salva.
Diathermie.	Séuroforme.
Dragées Bengué au menthol.	Solution huileuse au Nes-
Ephédrasmine.	tosyl.
Ephedrocampa.	Stovaine.
Fornose.	Stovédrine.

## ANTISEPTIQUES

Adrénargol.	Gouttes Daynoc.
Amborhinol.	Iodex.
Ampho-Tablettes Ronchèse.	Iodosan.
Ampho-vaccins Ronchèse	Léniforme.
Anaquinine Lescène.	Mésiforme.
Anexol	Mucosodine.
Aniodol.	Nasargine.
Argion.	Nasobore.
Argybil.	Nazinette.
Arhine.	Néo-Chloral Nau.
Aristargol.	Oéréliode.
Aseptorhine.	Olisol.
Boricine Meissonnier.	Pastilles M. B. C.
Bulgarine Thépenier.	Pâte Neyret.
Camphydryl Robin.	Pharyngaseptyl.
Chloraseptine Optima.	Résocaïne.
Chlorinol.	Rhinadrargol.
Clonazone Daufresne.	Rhinadrol.
Collubleu.	Rhinaspir.
Corizol.	Rhinodrops Béral.
Dermo-rhinistol.	Rhinol.
Dragées Bengué au Menthol.	Saubarsinol.
Ephédrocamphre.	Séphydine.
Éphédrolénol.	Stillargol.
Eucalyptine Lebrun.	Sulfarsénol.
Gouttes Daynoc.	Sulfoxyl.
Fornose.	Térébine.
Galform Lambiotte.	Terpoxyl externe.
Galliodine.	Thigénol Roche.
Gernal.	Vaso-Rhinol adrénalisé.
Glyco-M.	Vaso-Rhinol (simple et mentholé).
Glyco Thymoline.	Végétol externe.
Goménol.	Vitargyl.
Gosierine Dalloz.	Zaryl.

## GARGARISMES — COLLUTOIRES — LAVAGES

Ampho-Tablettes Ronchèse	Hyol.
Anaquinine.	Inhalation.-gargarisme Vo-
Anexol.	caldop.
Boréol.	Inolène
Chloraseptine Optima.	Iodassium.
Clonazone Daufresne.	Podosan.
Colarsénol.	Mucosodine.
Collubleu.	Nasobore.
Collutoire V. E. Doumer.	Néo-Chloral Nau.
Édistol.	Néol.
Évine.	Noviode.
Glyco-M.	Ozothine.
Gobérol.	Perubore.
Goménol.	Pharyngaseptyl.
Hamamélis Ginet.	Pulvéol.

# **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.**

## **GARGARISMES — COLLUTOIRES — LAVAGES**

Rhinol.	Sulfureux Pouillet.
Saubarsinol.	Térébine.
Sédorhinol.	Terpoxyl externe.
Séphydine.	Vocaldop.

## **INHALATIONS**

Adréroléine.	Nasobore.
Anaquinine.	Olisol.
Bainiga.	Ozothine.
Boréol.	Paratone.
Créosote soluble Vacheron.	Perubore.
Édistol.	Pharyngaseptyl.
Éphédroléol.	Pulvéol.
Eucalyptine Lebrun.	Sanex-Inhalant.
Goménol.	Sédorhinol.
Hyol.	Sulfureux Pouillet.
Inhalation-Gargarisme Vo-	Térébine.
caldop.	Térozone.
Inhalation Lancosme.	Thymo-Menthol Eupnique
Inhalol.	Belhomme.
Inhalone.	Vocaldop.
Inhalo-Sel.	Zaryl.
Inhaloxyl.	

## **INSTILLATIONS — PULVÉRISATIONS**

Acécoline.	Glyco-M.
Adénoseptyl.	Goménol.
Adrénargol.	Guttoléol.
Adréroléine.	Hyol.
Amborhinol.	Iodex.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Léniforme.
Anaquinine Lescène.	Nasargine.
Antigénines.	Nasobore.
Antipiol.	Néo-Collargol.
Argybil.	Oéréliode.
Aseptorhine.	Olisol.
Bacté-Phages.	Orargol Amicros.
Biolactyl Fournier.	Otalgolox.
Chlorinol.	Perubore.
Citrolargol.	Pharyngaseptyl.
Créosote soluble Vacheron.	Rhinadrargol.
Édistol.	Rhináspir.
Édricamphre.	Rhinodrops Béral.
Éphédrasmime.	Rhinofluine.
Éphédrine naturelle Béral.	Rhino-Liposeptine.
Éphédrocamphre.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Éphédroléol.	Saubarsinol.
Épholéine.	Sinuzy.
Ercérhinol.	Stillargol.
Essoforme.	Stovédrine.
Eucalyptine Lebrun.	Sulfa.



## INSTILLATIONS — PULVÉRISATIONS

Sulfureux Pouillet.  
Térébine.  
Terpoxyl externe.

Tubérol.  
Vaso-Rhinol (simple et mentholé).

## POMMADES

Acécolex.  
Aniodol.  
Antipiol.  
Dermo-rhinistol.  
Dermo-Stalys du Dr Wa-  
gon.  
Eczéda.  
Eczosec  
Ektogan.  
Éphédro-rhinol.  
Fornose.  
Gelée vaccin Ivago (anti-  
pyogène).  
Goménol.  
Iodex.

Naso-Sulfolarsan.  
Onction Leisyn.  
Percaïnal Ciba.  
Phosorine.  
Pyo-Amphogel Ronchèse.  
Résocaine.  
Rhinadrol.  
Rhinol.  
Rhino Salva.  
Sédorhinol.  
Sinuzyl.  
Stovédrine.  
Tubes Chauvin.  
Vaso-Rhinol adrénalisé.

## POUDRES

Arhine Lambiotte.  
Aristargol.  
Biolactyl Fournier.  
Boricine Meissonnier.  
Bulgarine Thépenier.  
Cimatryl.  
Ektogan.

Inhalation-Gargarisme Vo-  
caldop.  
Kydalose.  
Pharyngaseptyl.  
Pulvéol.  
Rhinaspir.  
Salasényl (poudre).  
Vioforme Ciba.

## VACCINS

Ampho-vaccins Ronchèse.  
Antigénines.  
Antipiol.  
Entéro-Antigènes.  
Immunizols Grémy.  
Immuno-vaccin broncho-  
pulmonaire.  
Ivago de Goldenberg Vac-  
cins.  
Ivago pyo (buvable).  
Lysaxins L. M. L.  
Néo-Physio.  
Osmo-vaccin Bréant.  
Probios.

Pyo-Amphogel Ronchèse.  
Rhino-Vaclydun Corbière.  
Salantale.  
Vaccinothérapie atoxique  
Cépède.  
Vaccins intra-dermiques et  
Gelées Vaccins Ivago de  
L. Goldenberg.  
Vaccins Pansements Virul-  
tra.  
Vaccins Ronchèse. — Am-  
pho-Vaccins.  
Vaccins Sténé.  
Vaclydun.

## VASO-CONSTRICTEURS — DÉCONGESTIFS

Adrénaline Invar.  
Adrénargol.  
Adrénine.

Adrénoléine.  
Allocaïne Lumière.  
Amborhinol.

## **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.**

### **VASO-CONSTRICTEURS — DÉCONGESTIFS**

Anaquinine.  
Chlorinol.  
Corizol.  
Éphédrasmine.  
Éphédrolénol.  
Éphédro-rhinol.  
Épholéine.  
Ergotine Lamante.  
Fornose.  
Hamamélis Gmet.

Kidoline.  
Otalgolex.  
Rénaleptine.  
Rhinadrol.  
Rhinodrops Béral.  
Rhino-Salva.  
Stovédrine.  
Térébine.  
Vaso-Rhinol adrénalisé.

## **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.**

### **ANGINES AIGÜES**

Adénoseptyl.  
Adrénargol.  
Alcacyl.  
Ampho-Tablettes Ronchèse.  
Ampho-Vaccins Ronchèse.  
Anexol.  
Argion.  
Arhine Lambiotte frères.  
Baume Bengué.  
Baume Iki.  
Boréol.  
Camphydryl Robin.  
Capsules Kuchner au Mécaptol.  
Chloraseptine Optima.  
Chlorinol.  
Cibalgine.  
Clonazone Daufresne.  
Cocaïne Midy.  
Colarsénol.  
Collubleu.  
Collutoire V. E. Doumer.  
Corizol.  
Crédone Dehaussy.  
Dragées Bengué au Menthol.  
Édistol.  
Érythra.  
Galform Lambiotte.  
Galliodine.  
Glyco-M.  
Glyco-Thymoline.

Gobérol.  
Goménol.  
Gosiérine Dalloz.  
Gouttes Daynoc.  
Hamamélis Gmet.  
Inolène.  
Iodassium.  
Mésoforme.  
Mucosodine.  
Nasobore.  
Néo-Chloral Nau.  
Néol.  
Néo-Physio.  
Noviode.  
Oéréliode.  
Oxymenthol Perraudin.  
Pastilles M. B. C.  
Pâte Mireille.  
Perubore.  
Pharyngaseptyl.  
Physiosthénine.  
Polyvaline du Dr Bayle.  
Pulvéol.  
Pyréthane.  
Quinquina Gmet.  
Révulsoplasme.  
Rhinol.  
Rhino-Liposeptine.  
Rhino-Vaclydun Corbière.  
Salychlore.  
Saubarsinol.  
Sédorhinol.  
Séphydine.

## ANGINES AIGÜES

Septicémine Cortial.  
Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.  
Staphylo-Coccine Fraquet.  
Staphylothanol.  
Stovaine.  
Sulfo-Thiorine.  
Térébine.  
Terpoxyl externe.  
Themsaline.  
Thiophyl.

Thiorine.  
Thymo-Menthol Eupnique  
Belhomme.  
Vaccins Sténé.  
Vaclydun.  
Vaso-Rhinol adrénaïisé.  
Vaso-Rhinol simple et  
mentholé.  
Véralgine.

## ANGINE DE VINCENT

Adrénaïrgol.  
Ampho-Tablettes Ronchèse.  
Anexol.  
Baume Iki.  
Boréol.  
Colarsénol.  
Collubleu.  
Collutoire V. E. Doumer.  
Curatine.  
Dragées Benguë au Menthol.  
Nasobore.  
Néo-Chloral Nau.  
Néo-Physio — Physiosthé-  
nine.  
Noviöde.

Pharyngaseptyl.  
Révulsoplasme.  
Rhino-Liposeptine.  
Rhino-Vaclydun Corbière.  
Saubarsinol.  
Séphydine.  
Septicémine Cortial.  
Sulfarsénol.  
Suppositoires Corbière.  
Terpoxyl externe.  
Themsaliné.  
Tréparsol.  
Triluës.  
Véralgine.

## BOURDONNEMENTS D'OREILLES — SURDITÉ

Acécoline.  
Acoégénol.  
Anaquintine.  
Audigénine.  
Collo-iode Dubois.  
Déstensyl.  
Dicaliode.  
Eranol.  
Féminadène.  
Fornose.  
Globules Fumouze à l'io-  
dure de Potassium.  
Glycocarpine.  
Guimelinde.

Hamamélis. Gmet.  
Hémoductyl.  
Nazinette.  
Phosoforme.  
Silguine.  
Silicyl.  
Solvosclérose.  
Spasmine Jolly.  
Spasmosédine.  
Tiodine Cognet.  
Vaso-Neurine.  
Vériané.  
Verticurine.

## CORYZAS (AIGÜS, CHRONIQUES)

Acodros.  
Adénoseptyl.  
Adrénaïline Invar.  
Adrénaïrgol.

Adrénaïne.  
Adrénaïléine.  
Amborhinol.

# XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

## CORYZAS (AIGUS, CHRONIQUES)

Ampho-vaccin rhino-pharyngien Ronchèse.	Kidoline.
Anaquinine.	Kinectine.
Aniodol.	Kipsol.
Antigrippine Midy.	Kydalose.
Arcanan.	Léniforme.
Argion.	Mucosodine.
Argybil.	Narsargine.
Arhine.	Nasobore.
Aristargol.	Naso-Sulfarsan.
Aseptorhine.	Nazinette.
Bacté-Phages.	Néo-Chloral Nau.
Biolactyl Fournier.	Néo-Collargol.
Blagny dragées.	Néopancarpine.
Boréol.	Néo-Physio.
Bulgarine Thépenier.	Oéréliode.
Chlorinol.	Olisol.
Citrolargol.	Orargol Amicros.
Corizol.	Ozothine.
Coryphédrine.	Paratone Léo.
Curatine.	Percaïnal
Delcaine Roques.	Pérubore.
Dermo-rhinistol.	Phosorine.
Édistol.	Probios.
Ephédrasmine.	Protidyne injectable.
Ephédrine naturelle Béral.	Pulvéol.
Ephédrocamphre.	Résocaïne.
Ephédro-rhinol.	Rénaleptine.
Ephédrolénol.	Rhinadrargol.
Épholéine.	Rhinadrol.
Erцерhinol.	Rhinaspir.
Erythra.	Rhinodrops Béral.
Essoforme.	Rhinofluine.
Eucalyptine Lebrun.	Rhinol.
Fornose.	Rhino-Liposeptine.
Gernal.	Rhino-Salva.
Glyco-M.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Glyco-Thymoline.	Salantale.
Goménol.	Sanex Inhalant.
Gouttes Nican.	Sédogrippine.
Granulés des Vosges.	Séдорhinol.
Guttoléol.	Séphydine.
Hydrorrhéol.	Sinuzyl.
Hylol.	Sirop antiphlogistique de Bréant.
Hypophédrine.	Solution huileuse au Nos-tosyl.
Immuno-vaccin broncho-pulmonaire.	Spicanol.
Inhalations Lancosme.	Staphylase du D <sup>r</sup> Doyen
Inhalol.	Staphylo-Coccine Fraquet.
Inhalone.	Staphylothanol.
Inhalo-Sel.	Stillargol.
Inhaloxyl.	Stopral.
Iodex.	Stovédrine.

## **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.**

### **CORYZAS (AIGUS, CHRONIQUES)**

Térébinte.  
Térozone.  
Terpoxyl externe.  
Thymo-Menthol eupnique  
Belhomme.  
Tubérol.  
Vaccins intra-dermiques et  
Gelées Vaccins Ivago de  
L. Goldenberg.  
Vaccins pansements Virul-  
tra.

Vaccins Ronchèse. — Am-  
pho-Vaccins.  
Vaccins Sténé.  
Vaclydun.  
Vaso-Rhinol adrénalisé.  
Vaso-Rhinol (simple et men-  
tholé).  
Vitargyl.  
Zaryl.

### **CORYZA SPASMODIQUE — RHUME DES FOINS**

Acatar.  
Adrénargol.  
Amborhinol.  
Amphotonyl.  
Anaclasine Ranson.  
Anapectone Vassal.  
Anaquintine Lescène.  
Antiasthme Bengalais.  
Anxiol.  
Asthmolysine.  
Balmiga.  
Benzylol.  
Biophylactine Mg.  
Blagny dragées.  
Corizol.  
Coryphédrine.  
Delcaine Roques  
Entéro-Antigènes.  
Éphédrasmine.  
Éphédrine naturelle Béral.  
Éphédrocamphre.  
Éphédrolénol.  
Éphédro-rhinol.  
Épholéine.  
Essoforme.  
Fornose.  
Frénasma.  
Glyco-M.

Glyco-Thymoline.  
Goménol.  
Hectine.  
Hydrorrhéol.  
Hypophédrine.  
Iodex.  
Kidoline.  
Kinectine.  
Kipsol.  
Lugocalcion.  
Mucosodine.  
Nazinette.  
Néopancarpine.  
Olisol.  
Ozothine.  
Protidyne injectable.  
Pyréthane.  
Rhinaspir.  
Rhinodrops Béral.  
Rhinoliposeptine.  
Rhinofluine.  
Sanex-Inhalant.  
Spasmoneural.  
Stovédrine.  
Sulfoxyl.  
Terpoxyl externe.  
Zaryl.

### **ÉPISTAXIS**

(Voir : Appareil circulatoire, Hémostatiques).

### **LARYNGITES AIGÜES, CHRONIQUES**

Acobella.  
Adénoseptyl.  
Adrénargol  
Ampho-Tablettes Ronchèse  
Antigrippine Midy.  
Arcanan.

Asthmo-Actine.  
Balmiga.  
Biolactyl Fournier.  
Boréol.  
Bronchoforme.

## LARYNGITES AIGÜES, CHRONIQUES

Capsules Kuchner au Mé-	Néol.
captol.	Néo-Physio.
Capsules Noguès.	Néopulmine.
Cataplasmes du D <sup>r</sup> Lelièvre.	Oéréliode.
Chlorinol.	Olisol.
Citrolargol.	Ozothine.
Cocaïne Midy.	Papier iodogène Eymonnet.
Coderax.	Paratone Léo.
Codoforme.	Pastilles M. B. C.
Corizol.	Pâte Mireille.
Créositoires.	Pérubore.
Créosote soluble Vacheron.	Pharyngaseptyl.
Curiode.	Physiosthénine.
Curiode arsenié.	Pulmodion.
Dragées Bengué au Menthol.	Quinthéryl.
Édistol.	Résyl.
Éphédrasmine.	Révulsif liquide Boudin.
Éphédrocamphre.	Révulsif Milko.
Éphédrolénol.	Révulsif Procipha.
Eucalyptine Lebrun.	Révulsoplasme.
Euphon.	Rhinadrargol.
Fornose.	Rhinadrol.
Galform Lambiotte.	Rhinol.
Galliodine.	Rhino-Salva.
Gatercodéine Domergue.	Salyptol Narty.
Gernal.	Sédorhinol.
Glottyl.	Séphydine.
Glyco-M.	Sinuzyl.
Glyco-Thymoline.	Sirop antiphlogistique de
Goménol.	Briant.
Gosiérine Dalloz.	Sirop Brahma.
Gouttes Daynoc.	Sirop de créosote Vacheron.
Gouttes Nican.	Sirop de Sirtal.
Gouttes Pilka.	Sirop Vacheron au Gaïacol.
Granulés des Vosges.	Spicanol.
Guttoléol.	Stillargol.
H yol.	Stovaine.
Infangyl Carlier.	Suifo-Thiorine.
Inhalation-Gargarisme Vo-	Sulfoxyl.
caldop.	Sulfureux Pouillet.
Inhalation Lancosme.	Sulphium.
Inhalol.	Térébine.
Inhalone.	Térozone.
Inhalo-Sel.	Terpine granulée Baron.
Inhaloxyl.	Thiorine.
Iodex.	Thymo-Menthol Eupnique
Léniforme.	Belhomme.
Miroxyl.	Vaccins pansements Virul-
Mucosodine.	tra.
Murones du D <sup>r</sup> Robert	Valthène.
Jacques.	Vaso-Rhinol (simple et men-
Narcyl.	tholé).
Nasargine.	Vocaldop.
Nasobore.	Zaryl.

## LARYNGITE STRIDULEUSE

Anaquantine.  
Cataplasme du D<sup>r</sup> Lelièvre.  
Éphédroléol.  
Fornose.  
Gouttes Malone.  
Infangyl Carlier.  
Kidoline.

Lobéline Bruneau.  
Lobéline Sandoz.  
Révulsoplasme.  
Sédoneurol Dehautssy.  
Spasmalone.  
Spasmoneural.  
Zaryl.

## OTITES — MASTOÏDITES

Adrénargol.  
Amborhinol.  
Ampho-vaccins Ronchèse.  
Anaquantine Lescène.  
Anexol.  
Aniodol.  
Antigénines.  
Antipiol.  
Argybil.  
Arhine.  
Bacté-Phages.  
Boricine Meissonnier.  
Cachets du D<sup>r</sup> Boveil.  
Cibalgine.  
Citrolargol.  
Curatine.  
Dermo-rhinistol.  
Dermo-Stalys du D<sup>r</sup> Wa-  
gon.  
Édistol.  
Ektogan Bocquillon.  
Ercérhinol.  
Fornose.  
Goménol.  
Guttoléol.  
Immunizols Grémy.  
Ivago de Goldenberg Vac-  
cin « P ».  
Kydalose.  
Lysaxins L. M. L.  
Mucosodine.  
Nasargine.

Naso-Sulfolarsan.  
Nazinette.  
Néo-Physio.  
Nestosyl.  
Oéréliode.  
Orargol Amicros.  
Osmo-vaccin Bréant.  
Otalgolex.  
Probios.  
Protidyne injectable.  
Pyréthane.  
Rhinaspir.  
Sédorhinol.  
Séphydine.  
Solution huileuse au Nes-  
tosyl.  
Térébine.  
Terpoxyl externe.  
Ultra-violets.  
Vaccinothérapie atoxique  
Cépède.  
Vaccin Ivago de Golden-  
berg.  
Vaccins pansements Virul-  
tra.  
Vaccins Ronchèse — Am-  
pho-Vaccins.  
Vaso-Rhinol (simple et  
mentholé).  
Véganine.  
Véralgine.  
Vitargyl.

## OZÈNE

Acécoclex.  
Acécoline.  
Anexol.  
Anozyl.  
Antipiol.  
Argion.  
Argybil.  
Arhine Lambiotte.

Aseptor.  
Biolactyl Fournier.  
Boricine Meissonnier.  
Bulgarine Thépenier.  
Cimatryl.  
Cortiode.  
Dermo-rhinistol.  
Ektogan Bocquillon.

## **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.**

### **OZÈNE**

Éphédrolénoï.	Rhino-Socoll.
Fornose.	Séphydine.
Goménol.	Sinuzyï.
Inhalation Lancosme.	Stillargol.
Ivago de Goldenberg Vaccin « R ».	Sulfo-Thiorine.
Kydalose.	Sulfureux Pouillet.
Mucosodine.	Térébine.
Naso-Sulfolarsan.	Terpoxyl externe.
Nazinette.	Thiorine.
Probios.	Vaccinothérapie atoxique
Résocaïne.	Cépède.
Rhinadrol.	Vaccins intra-dermiques et
Rhinaspir.	Gelées Vaccins Ivago de
Rhinofluine.	L. Goldenberg.
Rhino-Liposeptine.	Vaccins Sténé.
	Zaryl.

### **PHARYNGITES AIGÜES**

Adénoseptyl.	Goménol.
Adrénargol.	Gosierine Dalloz.
Amborhinol.	Gouttes Daynoc.
Ampho-Tablettes Ronchèse.	Gouttes Eryl.
Antigrippine Midy.	Granulés des Vosges.
Arcanan.	Guttoléol.
Argybil.	Hyol.
Arhine Lambiotte.	Immunizols Grémy.
Bacté-Phages.	Inhalation-Gargarisme Vo-
Balmiga.	caldop.
Blagny Dragées.	Inhalation Lancosme.
Boréol.	Inhalol.
Camphydryl Robin.	Inhalone.
Chlorinol.	Inhalo-Sel.
Citrolargol.	Inhaloxyl.
Cocaïne Midy.	Inolène.
Collubleu.	Léniforme.
Dermo rhinistol.	Nasargine.
Dragées Bengué au men-	Nasobore.
thol.	Naso-Sulfolarsan.
Édistol.	Nazinette.
Éphédrasmine.	Néo-Chloral Nau.
Éphédro-camphre.	Néol.
Éphédrolénoï.	Néo-Physio. — Physios-
Ercérhinol.	thénine
Eucalyptine Lebrun.	Oériode.
Euphon.	Oxymenthol Perraudin.
Fornose.	Paratone Léo.
Galform Lambiotte.	Pastilles M. B. C.
Galliodine.	Pâte Mireille.
Gatercodéine Domergue.	Pérubore.
Gernal.	Pharyngaseptyl.
Glyco-M.	Phosorine.
Glyco-Thymoline.	Pulvéol.
Gobérol.	Révuïsoptasme.



## **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.**

### **PHARYNGITES AIGÜES**

Rhinadrol.	Thymo-Menthol eupnique
Rhinofluine.	Belhomme.
Rhinol.	Tubérol.
Rhino-Liposeptine.	Vaccins pansements Virultra.
Rhino-Salva.	Vaccins Ronchèse (amphovaccins).
Rhino-Vaclydun Corbière.	Vaccins Sténé.
Scuroforme.	Vaclydun.
Séphydine.	Vaso-Rhinol adrénalisé.
Sirop antiphlogistique de Briant.	Vaso-Rhinol (simple et mentholé).
Stovaine.	Vocaldop.
Sulfoxyl.	Zaryl.
Sulphium.	
Terpine granulée Baron.	
Terpoxyl externe.	

### **RHINO-PHARYNGITES CHRONIQUES**

Acatar.	Gosiérine Dalloz.
Adrénaline Invar.	Immunizols Grémy.
Adrénargol.	Inhalation-Gargarisme Vocaldop.
Adénine.	Inhaloxyl.
Amborhinol.	Marinol.
Ampho-Vaccin Rhinopharyngien Ronchèse.	Nasobore.
Anaquinatine.	Néo-Physio. — Physiothénine.
Argybil.	Oéréliode.
Arhine Lambiotte.	Olisol.
Aseptor.	Osmo-vaccins Bréant.
Bacté-Phages.	Oxymenthol Perraudin.
Balmiga.	Ozothine.
Biolactyl Fournier.	Paratone.
Blagny dragées.	Pastilles M. B. C.
Boréol.	Pâte Mireille.
Chlorinol.	Pharyngaseptyl.
Cocaine Midy.	Résocaïne.
Collubleu.	Révuksoplasme.
Corizol.	Rhinadrol.
Dermo-rhinistol.	Rhinofluine.
Dragées Bengué au Menthol.	Rhinol.
Édistol.	Rhino-Liposeptine.
Entéro-antigènes.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Ephédrasmine.	Salychlore Lavire.
Ephédro-camphre.	Sanex-Inhalant.
Ephédrolénol.	Séphydine.
Ephédro-rhinol.	Sirop antiphlogistique de Briant.
Épholéine.	Stillargol.
Eucalyptine Lebrun.	Stovédrine.
Euphon.	Sulfa.
Fornose.	Sulfoidol Robin.
Galform Lambiotte.	Sulfo-Thiorine.
Galliodine.	Sulfoxyl.
Goménol.	

## XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

### RHINO-PHARYNGITES CHRONIQUES

Sulfureux Pouillet.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Sulfurion.	pho-Vaccins.
Sulfuryl Monal.	Vaclydun.
Sulphium.	Vaso-Rhinol adrénalisé.
Térozone.	Vaso-Rhinol simple et men-
Terpoxyl externe.	tholé.
Thiorine.	Yaourtine.
Vaccins pansements Virul-	Zaryl.
tra.	

### SINUSITES

Adrénargol.	Nasargine.
Adrénoléine.	Nasobore.
Amborhinol.	Naso-Sulfolarsan.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Nazinette.
Anaquinine Lescène.	Néo-Physio. — Physio-
Anexol.	sthénine.
Aniodol.	Olisol.
Antigénines.	Orargol Amicros.
Antipiol.	Osmo-vaccins Bréant.
Argybil.	Ozothine.
Arhine Lambiotte.	Pérubore.
Bacté-Phages.	Pharyngaseptyl.
Balmiga.	Probios.
Biolactyl Fournier.	Pulvéol.
Boréol.	Pyréthane.
Bulgarine Thépenier.	Résocaine.
Chlorinol.	Rhinadrargol.
Cibalgine.	Rhinadrol.
Citrolargol.	Rhinaspir.
Corizol.	Rhino-Liposeptine.
Curatine.	Rhino-Salva.
Édistol.	Salantale.
Éphédrasmine.	Sanex-Inhalant.
Éphédrine naturelle Béral.	Séphydine.
Éphédrocamphre.	Sédorhinol.
Éphédrolénol.	Sinuzyl.
Éphédro-rhinol.	Stillargol.
Ercérhinol.	Stovédrine.
Essoforme.	Térébine.
Fornose.	Terpoxyl externe.
Fosyls Carron.	Thymo-Menthol Eupnique
Glyco-Thymoline.	Belhomme.
Goménol.	Vaccin Ivago de Golden-
Guttoléol.	berg.
Immunizols Grémy.	Vaccins pansements Virul-
Inhalol.	tra.
Inhalone.	Vaccins Ronchèse Ampho-
Inhalo-Sel.	Vaccins.
Inhaloxyl.	Vaso-Rhinol (simple et men-
Ivago de Goldenberg-Vac-	tholé).
cins « P ».	Véganine.
Kydalose.	Vitargyl.
Léniforme.	Zaryl.
Mucosodine.	

## **XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.**

---

### **VÉGÉTATIONS ADÉNOÏDES — ADÉNOÏDITES**

Adénoseptyl.	Glyco-Thymoline.
Adrénoleine.	Goménol.
Adrénergol.	Guttoléol.
Amborhinol.	I. A. M.
Anaquinine Lescène.	Iodométine.
Anexol.	Kidoline.
Aniodol.	Nasargine.
Argybil.	Naso-Sulfolarsan.
Aristargol.	Nazinette.
Baume Iki.	Phosorine.
Chlorinol.	Rhinadrol.
Cinol.	Rhinodrops Béral.
Citrolargol.	Rhinol.
Collubleu.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Curiode.	Rhino-Salva.
Curiode arsenié.	Sédorhinol.
Dicaliode.	Spicanol.
Édistol.	Stillargol.
Éphédrasmine.	Tubérol.
Éphédro-camphre.	Vaso-Rhinol adrénalisé.
Éphédrolénol.	Vaso-Rhinol simple et mentholé.
Ercérhinol.	Vitargyl.
Glyco-M.	

---

## **XV. — RADIOGRAPHIE.**

---

Diagnothorine.	Lipiodol Lafay.
Foriod.	Radiopaque Heudebert.
Gélobarine.	Radiotétrane Gérard.

---

## **XVI. — STOMATOLOGIE.**

---

Ampho-Tablettes Ronchèse.	Collubleu.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Curatine.
Anexol.	Dragées Bengué au Menthol.
Arsénogyl.	Elzevir Dentition.
Boricine Meissonnier.	Fluosalyl Beaugourdon.
Calciline.	Gelée vaccin Ivago (anti-pyorrhéique).
Calcium Sandoz.	Gluphosol.
Chloraseptine Optima.	Glyco-Thymoline.
Chloro-calcion.	Goménol.
Clonazone Daufresne.	Gosiérine Dalloz.
Coaltar Saponiné Le Beuf.	

## XVI. — STOMATOLOGIE.

Gouttes Daynoc.  
Hémostérine irradiée.  
Iodosan.  
Ivago de Goldenberg-Vaccin « B ».  
Lait de magnésie Phillips.  
Mésoforme.  
Néalgyl.  
Néo-Chloral Nau.  
Néol.  
Nestosyl  
Opophos.  
Panthésine.  
Pastilles M. B. C.  
Pâte dentifrice Ivago.  
Percaine Ciba.  
Pharyngaseptyl.  
Phosoforme.

Probios.  
Pyréthane.  
Salychloré Lavire.  
Sanogyl.  
Sanoram.  
Sculoforme.  
Séphydine.  
Septicémine Cortial.  
Solution huileuse de Nestosyl.  
Stovaine.  
Sulfarsénol.  
Terpoxyl externe.  
Tochloriné.  
Tripyoryl.  
Vaccin Ivago de Goldenberg.  
Véralgine.

## XVII. — SYPHILIS.

### PRÉVENTIFS

Comprimés vaginaux  
Leisyn.

Préventyl.  
Salvatyl.

### TRAITEMENT ARSENICAL

Acétylarsan.  
Arsénomyl.  
Arsenos-Solvant.  
Arsylène Roche.  
Cacodyline Jammes.  
Élixir Spès du D<sup>r</sup> Guiraud.  
Galyl.  
Gastrolues.  
Hectine.  
Myovarsyl.  
Néoarsite.  
Néo-Arsycodile.  
Novarsénobenzol Billon.  
Nucléarsitol Robin.

Pentalues.  
Phagosthyl.  
Plurion Couturieux.  
Prévarsyl.  
Rhodarsan.  
Rob Oberlin.  
Sirop Morlas.  
Stovarsol.  
Sulfarsénol.  
Suppositoires Corbière.  
Tréparsol.  
Trilues.  
Uclarsyl.

### TRAITEMENT BISMUTHIQUE

Benzo-Bismuth Millot.  
Biazan.  
Biscamph.  
Bis-Hyd.  
Bismhydral.

Bismutartrol.  
Bismuthion Couturieux.  
Bismuthoidol.  
Bivatol.  
Cicabi Fouché.

## TRAITEMENT BISMUTHIQUE

Granions.	Quinby.
Iodo-Bismuthate de Quinine Fraisse.	Quinby soluble.
Iodo-Bismuth Ercé.	Rubyl.
Lipobismuth Ercé.	Sol-Bi Fraisse.
Muthanol.	Solmuth.
Néocardyl.	Spirochtan.
Néo-Trépol.	Stérobi.
Olbia.	Trépobiur.
Oxymuth Saca.	Trépol.
Quinimuthol Saca.	Trépoquinol.

## TRAITEMENT IODURÉ

Ampoules Boissy iodure de potassium	Iodone Robin.
Banikol.	Iodonésyl.
Carboiodure Fraudin.	Iodonucléol.
Collo-Iode Dubois.	Iodosan.
Curiodé.	Iodo-Vitasine.
Curiodé arséné.	Iodural Novat.
Dépuriodé du Dr Roger Weber.	Iodurase.
Dicaliodé.	Iodure Pachaut.
Éranol.	Lipiodol Lafay.
Fuciodine	Lipoiodine Ciba.
Globules Fum uze à l'iodure de potassium.	Magiodyl.
Granions.	Micelliodé.
Iodalose Galbrun.	Néo-Riodine.
Iodassium.	Pépiodon Henry.
Iode organique Boissy	Riodine.
Iodogénol Pépin.	Rob Cabanès.
Iodo-Malsine Globules.	Rob Oberlin.
	Tiodine Cognet.
	Uroiodine.

## TRAITEMENT MERCURIEL

Arquéritol Lesure.	Novolug.
Bis-hyd.	Pilules Myosotis.
Bismhydral.	Rob Cabanès.
Calmaby.	Rob Oberlin.
Capsules grises Cabanès.	Salvé.
Créscogénol.	Sféol.
Cyanhermine.	Sirop Morlas.
Diurégan.	Supparyres du Dr Faucher.
Élixir Spès du Dr Guiraud.	Suppositoires Hymel.
Épicral.	Suppositoires Rocav.
Gambéol.	Suppositoires S. F. E. A. T.
Granions.	Syphonéol.
Hermophényl Lumière.	Torigyre Lamo.
Huile grise Ercé.	
Novargyre.	

## XVII. — SYPHILIS.

### TRAITEMENT MIXTE

Bi-Iodural Novat.	Phosoforme.
Bismhydral.	Rob Cabanès.
Crypthermol Dehaussy.	Rob Oberlin.
Elixir Hymeal.	Salvé.
Elixir Iodépuratif Pépin.	Sirop Nevra.
Épicral.	Spirochtan.
Hectargyre.	Sulfarsiode.
Hygiodyne.	Sulfosine.
Ludin.	Toritané Lamo.

## XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.

### ANALGÉSQUES EXTERNES

Allocaïne Lumière.	Percaïnal Ciba.
Baume Adol.	Percaïne Ciba.
Baume Aroma.	Pommade au Nestosyl.
Baume Bengué	Rhésal Vicario.
Baume du D <sup>r</sup> Serin.	Salène Ciba.
Baume Rhodia.	Salénal Ciba.
Bétul-Ol Midy.	Solution huileuse au Nes-
Dolysine.	tosyl.
Endodermol.	Spicanol.
Iodex.	Suppositoires au Nestosyl.
Nestosyl.	Suppositoires Pyrax.
Nisaméline Trouette-Perret.	

### ANALGÉSQUES INTERNES

Aigue d'or.	Atophan Cruet.
Alcacyl.	Atophanyl.
Algocratine.	Broméine Montagu.
Algophagine.	Cachets du D <sup>r</sup> Boveil.
Allonal Roche.	Cachets Van-Sol.
Allophaquina.	Calmant Meunier.
Amphotenyl.	Campho-Satyl Fraisse.
Ampoules de Pantopon	Cérébrine Fournier.
Roche.	Cibalgine.
Ampoules Reipar.	Chloral bromuré du D <sup>r</sup> Du-
Analgénine.	bois.
Anégrine.	Condurango Gmet.
Antalgol Dalloz.	Crataegus Gmet.
Antidouleur Barbessou.	Crédone Dehaussy.
Antigrippine Midy.	Crésopirine.
Ascéine.	Cryogénine Lumière.
Asciatine.	Curatine Brunet.
Atomine.	Curogène.

## **XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.**

### **ANALGÉSIIQUES INTERNES**

Demalgon.	Pantopon Roche.
Dialacétine Ciba.	Pavéron Dausse.
Didial Ciba.	Paxène.
Dolysine.	Potion Adol.
Dragées Lumeval.	Pulsamone.
Emerson's Bromo-Seltzer.	Pyréthane.
Erythra Dyn.	Quinoïdine Duriez.
Génomorphine	Quinsal.
Grains céphalgifuges.	Rhoféine.
Hémypnai Ciba.	Sambul.
Hypalène.	Sédogrippine.
Irénine Gonnon.	Sirop du Dr Gelineau.
Kalmigraine.	Somnicones Béral.
Mensuosédyl.	Soporigène Delqué.
Métophan.	Spasmalone.
Mitigans.	Spécifique Béjean.
Naïodine Logeais.	Stopral.
Neuréol.	Suppoalgos.
Neuridor.	Thébaïl.
Neuro-calcium.	Théinol.
Névorat Rafey.	Thermocédone
Névralgol Brossard.	Valériane Gmet.
Nisaméline Trouette-Perret.	Véganine.
Nopirine Vicario.	Véralgine.
Optalidon Sandoz.	Viophan.

### **ANESTHÉSIIQUES GÉNÉRAUX**

Balsoforme.	Rectanөл.
-------------	-----------

### **ANESTHÉSIIQUES LOCAUX**

Allocaine Lumière.	Percaïne Ciba.
Baume du Dr Serin.	Scurocaïne.
Chloréthyle Bengué.	Scuroforme.
Delcaïne Roques.	Solution huileuse au Nes-
Nestosyl.	tosyl.
Panthésine Sandoz.	Stovaïne.

### **ANESTHÉSIIQUES RACHIDIENS**

Delcaïne Roques.	Scurocaïne.
Panthésine Sandoz.	Stovaïne.
Percaïne Ciba.	

### **ANTISPASMODIQUES**

Adonal.	Ampoules Spasmalgine
Alepsal.	Roche.
Amphosthène.	Anaural.
Amphotonyl.	Angiosédine.

## **XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.**

### **ANTISPASMODIQUES**

Anxiosédine.	Pansolanée.
Azizol Thévenot.	Paradol.
Belladénal Sandoz.	Paratyroné.
Bellafoline Sandoz.	Passiflorine.
Benzosflorine Julien.	Passival.
Benzylol.	Paxène.
Blagny (gouttes et dragées).	Phytosplénol Plé.
Borosodine Lumière.	Plexorine Vély.
Capsules Bruel.	Poudre anti-épileptique
Chloral bromuré du D <sup>r</sup> Du-	Cassarini.
bois.	Pulmocardine.
Comitiol.	Pulsamone.
Cratægus Gmet.	Rhodazil.
Dialacétine.	Sédofoline.
Disonyl.	Sédogrippine.
Dragées Lumeval.	Sédosine.
Dragécalcion.	Somnicones Béral.
Éphétropine.	Spasalgine Roche.
Eupavéryl Pachaut.	Spasmine Jolly.
Fantyl Manseau.	Spasmoneural.
Féminadène.	Spasneurol.
Freinospasmyl.	Spasmosédine.
Gardéphédrine.	Sympathyl.
Genhyoscyamine.	Valbornine Rogier.
Génoscopolamine.	Valbrol.
Gouttes Malone.	Valédyl.
Hyoscyamine Houdé.	Valénal Novalis.
Intrait de Valériane	Valérianate Gabail.
Dausse,	Valérianate Grignon.
Iodotensyl Dubois.	Valérianate Pierlot.
Lobéliane Laleuf.	Valériane Byla.
Narcyl.	Valériane Gmet.
Néospasmodyl Vély.	Valériane Pachaut.
Neurène.	Valérianose Gigon.
Neuréol.	Valérinodor Malmanche.
Neuridor.	Valérium Paul Thibault.
Neurobore.	Valéromenthol.
Neurocalcium.	Valovarine.
Névrosan.	Véganine.
Novo-Brol.	Vériané.

### **HYPNOTIQUES**

Adonal.	Asciatine.
Alepsal Genevrier.	Béatol.
Allonal Roche.	Bromadyl Vicario.
Amphotonyl.	Capsules Bruel.
Ampoules de Pantopon	Chloral bromuré du D <sup>r</sup> Du-
Roche.	bois.
Anaural.	Chloralosane.
Angiosédine.	Codérax.
Anxiosédine.	Cratægus Gmet.
Aphosal.	Dial Ciba.



# **XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.**

## **HYPNOTIQUES**

Dialacétine Ciba.	Polybromure Gonnon.
Didial Ciba.	Rutonal.
Disonyl.	Sandoptal.
Élixir Gabail.	Sédobrol Roche.
Éphétropine.	Sédogrippine.
Eusomnine Bélières.	Sédormid Roche.
Fantyl Manseau.	Sédosine.
Gardénal.	Sirup du Dr Gelineau.
Hyoscyamine Houdé.	Somnifène Roche.
Hypalène.	Somnicones.
Isonal.	Somnopol.
Lobéliane Laleuf.	Somnothyryl.
Magbromyl.	Sonéryl.
Nésal.	Soporalose.
Neuréol.	Soporigène Delqué.
Neuridor.	Spasmine Jolly.
Neurinase.	Suppoalgos.
Neuroflorine.	Thébaïl.
Noctysédyl.	Valbornine Rogier.
Novo-Brol.	Valédyl.
Optalidon Sandoz.	Valérianate Gabail.
Pantopon Roche.	Valériflore.
Passiflorine.	Valérinodor Malmarche.
Passival.	Valérium Paul Thibault.
Pavéron Dausse.	Valéronal.
Paxène.	Valovarine.
Phénacodine.	Vérianè Buriat.
Phosphobrom.	

## **MODIFICATEURS DU SYMPATHIQUE ET DU PARASYMPATHIQUE**

Acécoline.	Campho Spartéine Dubois.
Adonal.	Chloral bromuré du Dr Du-
Adrénaline Invar.	bois.
Adrénine.	Chlorumagène.
Adréphédrine Béral.	Crataegus Gmet.
Alepsal Genevrier.	Delbiase.
Amphosthène.	Disonyl.
Amphotonyl.	Ephédrine naturelle Béral.
Ampoules Spasmalgine	Eupavéryl.
Roche.	Euphytose.
Anaclasine Ranson.	Fosfoxy.
Anaüral.	Freinospasmyl.
Androcalcion E.	Gardéphédrine.
Androcalcion H.	Génatropine.
Androstine.	Génésérine.
Angiosédine.	Glycocarpine.
Anxiol.	Gynergène Sandoz.
Asthmolysine.	Humoro-stabiline.
Ballotyl.	Hypotan.
Belladénal Sandoz.	Lobéliane Laleuf.
Bellafoline Sandoz.	Magnésium Hardy.

## MODIFICATEURS DU SYMPATHIQUE ET DU PARASYMPATHIQUE

Magnéso-tubes Robinet.  
Néospasmodyl Vély.  
Neuridor.  
Neurinase.  
Névrosan.  
Novo-Brol.  
Pansolanée.  
Paxène.  
Physioscyamine.  
Plexorine Vély.  
Poudre Danica.

Pragmoline.  
Pyréthane.  
Rénaleptine.  
Sédosine.  
Spasmine Jolly.  
Spasmosédine.  
Sympathyl.  
Vagosédyl.  
Vagotonine.  
Valénal Novalis.

## NEURO-TONIQUES

Adrénoides Béral.  
Alexime.  
Ampolases.  
Ampoules névrosthéniques  
Dausse.  
Androcalcion E.  
Androcalcion H.  
Antasthène.  
Antiphi.  
Arcica.  
Ardogène.  
Arrhénuclène Bergevin.  
Arsécrinol.  
Arsi-Strychnal Longuet.  
Arsylène Roche.  
Benzylocalcium.  
Biodynamine.  
Biogénol Demasles.  
Bionéol.  
Biophorine Girard.  
Biosine Le Perdriel.  
Biotrignon.  
Campho-spartéine Dubois.  
Cérébro-Lipase.  
Cérébrosthénine Dalin.  
Céthocal du D<sup>r</sup> Lemay.  
Chlormagnésium Fisch.  
Chloro-Magnésion.  
Chlorumagène.  
Chophytol Rosa.  
Clupeyl.  
Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle.  
Composé Gmet.  
Créagénol.  
Cytopan.  
Cyto-Sérum Corbière.  
Diastogène Dehaussy.  
Diastogène F. Dheaussey.

Doloma injectable.  
Dragécalcion.  
Dragées névrosthéniques  
Ysc.  
Dysthène.  
Élixir Ducro.  
Eufosyl « Vély ».  
Euglyma.  
Fa-Ner-Val.  
Fer Ovarine Vitalis.  
Ferrocol.  
Fondant de Kola Dausse.  
Fortossan irradié.  
Forxol.  
Fosfoxyl Carron.  
Fosyls Carron.  
Gastrhéma.  
Gaurol.  
Génergosine.  
Génosthéniques.  
Génostrychnine.  
Glandex phoscalcique.  
Glycérophosphate Dalloz.  
Glycérophosphate Robin.  
Glykolaine Robin.  
Gouttes phosphosthéniques  
Dausse.  
Gouttes arsénosthéniques  
Dausse.  
Gouttes Halogènes du  
D<sup>r</sup> Bern.  
Granulés Caresmel.  
Granules de Pantofort du  
D<sup>r</sup> Boveil.  
Hémocalcine.  
Hémogényl.  
Hémotal.  
Hémoviris.

## NEURO-TONIQUES

Histogénol.  
 Humoro-stabiline.  
 I. A. M.  
 Ionyl.  
 Kola granulée Astier.  
 Kola Monavon.  
 Lauriatol.  
 Lécithine Vacheron.  
 Limol Churchill.  
 Lioncyl.  
 Logaphos.  
 Magnésio Cacodyline  
     Jammes.  
 Magnésium Hardy.  
 Magnésio-Tubes Robinet.  
 Maltea Moser cristallisée.  
 Mangano-Phosphal Julien.  
 Maté Douglas.  
 Malt Wander ou Gloma.  
 Morisland.  
 Morsine.  
 Néo-Rhomnol.  
 Nergine Heudebert.  
 Neuroplasma Fort.  
 Neuro-Plasma massif.  
 Neuropol.  
 Neurosine Prunier.  
 Neurotrol.  
 Neurotrol Byla.  
 Névrosthénine Freyssinge.  
 Nucléarsitol Robin.  
 Nucléasine.  
 Nucléigène.  
 Nucléophorène.  
 Œnophos.  
 Opocalcium du D<sup>r</sup> Guer-  
     sant.  
 Opocalcium irradié du  
     D<sup>r</sup> Guersant.  
 Oponucyl irradié Trouette-  
     Perret.  
 Opothérapie du D<sup>r</sup> Fraysse.  
 Orex.  
 Orthogénol.  
 Percalcine.  
 Phagosthyl.  
 Phagosthyl Mangané.  
 Phosbiose.  
 Phosoforme.  
 Phosma.

Phosol.  
 Phospharsol.  
 Phosphate Vital de Jacque-  
     maire.  
 Phospho-Fluor Beynet.  
 Phospholéose Demasles.  
 Phosphopinal Juin.  
 Phostyl.  
 Phylla Dyn.  
 Phytine Ciba.  
 Phytogénine Byla.  
 Phyto-Lécithine.  
 Phytomarine.  
 Plasma de Quinton.  
 Poliol Churchill.  
 Quinoïdine.  
 Réparateur Thuau.  
 Rhomnol.  
 Sanguil.  
 Sérogyne.  
 Sérum neuropsychique.  
 Sérum névrosthénique  
     Fraisé.  
 Sirop du D<sup>r</sup> Reinwiller au  
     phosphate de chaux.  
 Spasmine Jolly.  
 Stovafer.  
 Strychnal Longuet.  
 Strychnarsitol Robin.  
 Strychnotonine.  
 Suppotonic Lagoutte.  
 Synergyl Vadam.  
 Theinol.  
 Thorix.  
 Tonucyl.  
 Traphéine.  
 Valérianate Gabail.  
 Valériane Gmet.  
 Val'oxarine Farma.  
 Végéphos.  
 Vin de Vial.  
 Viosten.  
 Vioxyl Mouneyrat.  
 Viradène.  
 Visco-Sérum.  
 Vitacalcine Moncour.  
 Vitacrine.  
 Vitène.  
 Yo-Androl.  
 Yo-gynine.

## SÉDATIFS

Acodros.	Féminadène.
Adonal.	Gardénal.
Algosédine.	Génomorphine.
Alepsal Genevrier.	Hypalène.
Allonal Roche.	Intrait de Valériane Dausse.
Amphosthène.	Iodaubépine.
Amphotonyl.	Isonal.
Ampoules de Pantopon Roche.	Kalmobrol.
Anaaural.	Lobéliane Laleuf.
Angiosédine.	Magbromyl.
Anxiosédine.	Néosaliode.
Ascéine.	Nésal.
Atomine.	Neurène.
Azigol Thévenot.	Neuréol.
Baume du D <sup>r</sup> Serin.	Neuridor.
Béatol.	Neurinase.
Belladénal Sandoz.	Neurobore.
Benzytol.	Neurocalcium.
Blagny gouttes et dragées.	Neuroflorine.
Borosodine Lumière.	Névrosan.
Broméine Montagu.	Noctisedyl.
Bromiase.	Novo-Brol.
Bromogénol Pépin.	Cestrobrol.
Bromo-Maisine.	Optalidon Sandoz.
Bromone Robin.	Pantopon Roche.
Bromovose.	Paradol.
Broséyl.	Passiflorine.
Cachets du D <sup>r</sup> Boveil.	Passival.
Calcibronat « Sandoz ».	Pavéron Dausse.
Calmocardine.	Paxène.
Cantéine Bouteille.	Phosphobrom.
Capsules Bruel.	Physioscyamine.
Chloral bromuré du D <sup>r</sup> Du-bois.	Plexorine Vély.
Cibalgine.	Polybromure Gonnon.
Comitiol.	Poudre anti-épileptique Cassarini.
Complextraits.	Poudre Danica.
Comprimés Kléos.	Rénovol.
Cratægus Gmet.	Rutonal.
Curatine.	Sédarsan.
Dial Ciba.	Sédatose.
Dialacétine Ciba.	Sédatuline.
Didial Ciba.	Sédobrol Roche.
Dragées du D <sup>r</sup> Gelineau.	Sédofoline.
Dragées Lumeval.	Sédogrippine.
Eczéda.	Séfol.
Eczosée.	Sédoneurol Dehaussy.
Élixir Gabail.	Sédosine.
Éphétrépine.	Sirop du D <sup>r</sup> Gelineau.
Euphytose.	Sirop Teyssède.
Eusomnine Bélières.	Solution huileuse au Nes-tosyl.
Fantyl Manseau.	Somnicones Béral.

## **XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. G.**

### **SÉDATIFS**

Somnothyrid.	Valérianate Gigon.
Soporolose.	Valérianate Pierlot.
Spasmine Jolly.	Valériane Byla.
Spasmosédine.	Valériane Gmet.
Spasneural.	Valériane Pachaut.
Stopral.	Valérianose Gigon.
Strychnotonine.	Valériflore.
Suppoalgos.	Valérinodor Malmanche.
Suppositoires au Nestosyl.	Valérium Paul Thibault.
Suppositoires Pyrax.	Valérobromine Legrand.
Tablettes Hova.	Valéromenthol.
Tartrate borico-potassique	Valéronal.
Pachaut.	Val'ovarine.
Thébaïl.	Valovosan.
Tribromure Gigon.	Véganine.
Valbornine Rogier.	Vériane Buriat.
Valérianate Gabail.	Véronidia Buisson.

## **XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.**

### **ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES — NÉVRITES**

Acodros.	Antiasthmaticque ~ Domergue
Adonal.	Antidouleur Barbossou.
Agocholine	Antigrippe Midy.
Agozimase	Antisciatique P. Chambon.
Aigue d'Or	Anxiol.
Alcacyl	Arsi-strychnal Longuet.
Alepsal Genevrier	Ascéine.
Algocratine	Asciatine.
Algophagine	Atomine.
Algosédine	Atophan Cruet.
Allonal Roche.	Atophanyl.
Allophaquina.	Atoquinol.
Amphotonyl.	Bain Bagnor.
Ampoules Boissy d'Iodure de Potassium.	Bain Carré.
Ampoules de Pantopon Roche.	Banikol.
Ampoules Reipar.	Baume Adol.
Anaclasine Ranson.	Baume Aroma.
Analgénine.	Baume Bengué.
Anapeptone Vassal.	Baume Ciba.
Anégrine.	Baume du D <sup>r</sup> Serin.
Antalgot Dalloz.	Baume Rhodia.
Antalgos Christiaens.	Bétul-Ol-Midy.
Anthraseptol.	Biophorine.
	Biophylactine M. G.

# **XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.**

## **ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES — NÉVRITES**

Broméine Montagu.  
Bromiase.  
Bromogénol Pépin.  
Bromo-Maisine,  
Bromone Robin.  
Bromovose.  
Broséyl.  
Cachets du Dr Boveil.  
Cachets Van-Sol.  
Calcibronat « Sandoz ».  
Calmant Meunier.  
Camphro-Salyl Fraisse.  
Cérébrine Fournier.  
Chloral Bromuré du Dr Du-  
bois.  
Chloréthyle Bengué.  
Cholalcol.  
Cholécystine.  
Choléfluine.  
Choléopeptine.  
Chophytol-Rosa.  
Cibalgine.  
Crédone Dehaussy.  
Crésopirine.  
Cryogénine Lumière.  
Curatine Brunet.  
Curogène.  
Demalgon.  
Dépuriode du Dr Roger  
Weber.  
Détersyl.  
Dialacétine Ciba.  
Dialyl.  
Diathermie.  
Didial Ciba.  
Dolysine.  
Dragées Lumeval.  
Emerson's Bromo Seltzer.  
Endodermol.  
Entéro-antigènes.  
Éphédro-rhinol.  
Erythra Dyn.  
Euphoryl.  
Eusomnine Bélières.  
Fluokol.  
Fosfoxyl Carron.  
Freinospasmyl.  
Gastronaldine.  
Genomorphine.  
Glykolaine Robin.  
Grains céphalgifuges.  
Granions.

Gui Byla.  
Gynergène Sandoz.  
Humoro-stabiline.  
Hypalène.  
Immuno-vaccin anti-rhu-  
matismal.  
Infra-Rouges.  
Iodex.  
Iodinjectol Jammes.  
Iodométine  
Irénine Gonnon.  
Ixium Buisson.  
Jabosulfène.  
Kalmigraine.  
Kérafline.  
Kodos.  
Lipiodol Lafay.  
Lysarthrol.  
Magbromyl.  
Mesothine.  
Mensuosédyl.  
Métophan.  
Mitigans.  
Mucyllium.  
Myoden.  
Nalodine Logeais.  
Néalgyl Bottu.  
Néosaliode.  
Néo-Séti.  
Nésal.  
Neurène.  
Neuréol.  
Neuridor.  
Névoral Rafey.  
Névralgol Brossard.  
Nisaméline Trouette-Per-  
ret.  
Nitroyl Lelsyn injectable.  
Noctisédy.  
Nopirine Vicario.  
Normatensol Bouret.  
Novo-Brol.  
Optalidon Sandoz.  
Orthogénol.  
Papier iodogène Eymonnet.  
Paradol.  
Pavéron Dausse.  
Peptalmine.  
Peptogil A et L.  
Peptonal.  
Peptone Vassal.  
Percaïne.

**ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES  
NÉVRALGIES  
SCIATIQUES — NÉVRITES**

Phosoforme.	Spasmalgine Roche.
Phylactone Byla.	Spasmalone.
Physioscyamine.	Spasmoneural.
Pilules V. E. Doumer.	Spécifique Béjean.
Pipérazine Midy.	Spicanol.
Plasma de Quinton.	Staprolysat.
Polycautére.	Stopral.
Polypeptonal.	Stovèdrine.
Potion Adol.	Strychnal Longuet.
Poudre Cassarini	Strychnotonine
Poudre Danica.	Suppoalgos.
Prézymase.	Suppositoires Pyrax.
Protiodyne.	Théinol.
Protiodyne dragées.	Thermocédone.
Pyréthane.	Thorix.
Quinino Phytine Ciba.	Tonigène.
Quinoïdine Duriez.	Triseptine.
Quinsal.	Ulmacétyl.
Révulsif liquide Boudin.	Ulmarène Gigon.
Révulsif Procipha.	Vagosédyl.
Rhésal Vicario.	Valérianate Grigon.
Rhoféine.	Valérianate Pierlot.
Salène Ciba.	Valériane Byla.
Salénal Ciba.	Valériane Gmet.
Salicéral.	Valérianose Gigon.
Salvébyl.	Valérium Paul Thibault.
Salysérum.	Valérobromine Legrand.
Sambul.	Valéromenthol.
Sédatuline.	Valovarine.
Sédobrol Roche.	Valovosan.
Sédogrippine.	Vaso-Neurine.
Sédoneurol Dehaussy.	Véganine.
Sel hépatique U. N. Arque- vaux.	Veinoposine
Sénécol.	Velpeau (Bande crêpe).
Sirop du Dr Gélinau.	Véralgine.
Somnicones Béral.	Vésicatoire rose Beslier.
	Viophan.

**CONGESTION CÉRÉBRALE — HÉMORRAGIE  
CÉRÉBRALE — RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL  
HÉMIPLÉGIE**

Acécoline.	Dépuriode du Dr Roger Weber.
Angioxyl.	Détensyl.
Antonal.	Diurétique Gmet.
Artérase.	Épicral.
Artérior Vincardi.	Nitroyl Leisyn.
Artério-Veinine.	Phosoforme.
Cardi-Sédine.	Pragmoline.
Cuscutine Foulon.	

**CONGESTION CÉRÉBRALE — HÉMORRAGIE  
CÉRÉBRALE — RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL  
HÉMIPLÉGIE**

Révilusoplasme.  
Rhocya.  
Sécacornine Roche.  
Silguine.

Silicyl.  
Tiodine Cognet.  
Tonigène.  
Verticurine.

**ENCÉPHALITE AIGÜE  
SÉQUELLES D'ENCÉPHALITE**

Acécoline.  
Adonal.  
Alepsal Genevrier.  
Antasthène.  
Belladéal Sandoz.  
Bellafoline Sandoz.  
Benzoflorine Julien.  
Cérébroyl-Leisyn.  
Curatine.  
Éphédrine naturelle Béral.  
Éranol.  
Génoscopalamine.

Hyoscyamine Houdé.  
Naïodine.  
Pansolanée.  
Physiosthénine.  
Pyoformine.  
Pyréthane.  
Septicémine Cortial.  
Staprolysat.  
Sulfosine.  
Uraseptine Rogier.  
Uroformine Gobey.

**GOÛTRE EXOPHTALMIQUE**

Acécoline.  
Ampoules Boissy (à l'iodure  
d'éthyle).  
Angioxyl  
Basedowine.  
Baume Iki.  
Belladéal.  
Bellafoline Sandoz.  
Benzoflorine.  
Cardiosthénine.  
Cratægine  
Cratægus Gmet.  
Diliodotyrosine Roche.  
Élixir Gabail.  
Éranol.  
Glycocarpine.  
Gynergène Sandoz.  
Hématoéthyröidine.  
Immuno-vaccin  
Iodassium.  
Iodaubépine.  
Iode organique Boissy.  
Iodogénol Pépin.  
Iodo-Maisine Globules.  
Iodométine.  
Iodone Robin

Iodonucléol.  
Iodo-Vitasine.  
Lipiodol Lafay.  
Lipoïodine Ciba.  
Magbromyl.  
Morisland.  
Néo-Riodine.  
Neurène.  
Neuréol.  
Neurinase.  
Novo-Brol.  
Opothérapie Bouty.  
Opothérapie Byla associée.  
Pansolanée.  
Paxène.  
Riodine.  
Sédoneurol Dehaussy.  
Somnifène Roche.  
Somnothyryl.  
Spasmine Jolly.  
Spasneural.  
Théocalciode.  
Tonigène.  
Val'ovarine Farma.  
Vériane Buriat.



## INSOMNIES — NERVOSISME

Noctisédyll.  
 Novo-Brol.  
 Œstrobrol.  
 Optalidon Sandoz.  
 Orthogénol.  
 Paradol.  
 Passiflorine.  
 Passival.  
 Pavéron Dausse.  
 Paxène.  
 Phénacodine.  
 Phosoforme.  
 Phosphobrom.  
 Phytine Ciba.  
 Plexorine Vely.  
 Polybromure Gonnon.  
 Poudre anti-épileptique  
   Cassarini.  
 Poudre Danica.  
 Pulsamone.  
 Rutonal.  
 Sandoptal.  
 Sédarsan.  
 Sédatuline.  
 Sédobrol Roche.  
 Sédogrippine.  
 Sédol.  
 Sédoneurol Dehaussy.  
 Sédormid Roche.  
 Sédosine.  
 Sirop du D<sup>r</sup> Gélinau.  
 Sirop Teyssèdre.  
 Somnicones Béral.  
 Somnifène Roche.  
 Somnothyrid.

Sonéryll.  
 Soporalose.  
 Soporigène Delqué.  
 Spasalgine Roche.  
 Spasmine Jolly.  
 Suppoalgos Lagoutte.  
 Suppositoires Pyrax.  
 Sympathyl.  
 Tablettes Hova.  
 Tartrate borico-potassique  
   Pachaut.  
 Thébail.  
 Tribromure Gigon.  
 Vagosédyl.  
 Valbornine Rogier.  
 Valbrol.  
 Valédyl.  
 Valénal Novalis.  
 Valérianate Gabail.  
 Valérianate Grignon.  
 Valérianate Pierlot.  
 Valériane Byla.  
 Valériane Gmet.  
 Valériane Pachaut.  
 Valérianose Gigon.  
 Valériflore.  
 Valérinodor Malmanche.  
 Valérium Paul Thibault.  
 Valérobromine Legrand.  
 Valéromenthol.  
 Valéronal.  
 Valovarine.  
 Véganine.  
 Vériane Buriat.  
 Véronidia Buisson.

## MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE

Cibalgine.  
 Curatine.  
 Goménol.  
 Institut Pasteur Sérums.  
 Institut Pasteur Vaccins.

Métaformine.  
 Mycolysine du D<sup>r</sup> Doyen.  
 Pyoformine.  
 Pyréthane.  
 Somnicones Béral.

## MÉNINGITE TUBERCULEUSE

Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle.  
 Créositoires.  
 Phymo-stéryl Leisyn.  
 Pneumo-Lipase.

Pyoformine.  
 Pyréthane.  
 Somnicones Béral.

## MIGRAINE OPHTALMIQUE

Acécoline.  
Adonal.  
Alepsal Genevrier.  
Algocratine.  
Allonal Roche.  
Allophaquina.  
Ascéine.  
Baume Adol.  
Baume Aroma.  
Baume Bengué.  
Cachets du D<sup>r</sup> Boveil

Cholécystine.  
Cibalgine.  
Crésopirine.  
Curatine Brunet.  
Érythra Dyn.  
Naïodine.  
Phosoforme.  
Pyréthane.  
Rhinofluine.  
Salysérum.  
Véralgine.

## NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Adonal.  
Alepsal Genevrier.  
Alexime.  
Allonal Roche.  
Amphosthène.  
Amphotonyl.  
Ampolases.  
Ampoules de Spasmalgine Roche.  
Ampoules Névrosthéniques Dausse.  
Anaural.  
Androcalcion E.  
Androcalcion H.  
Angiosédine.  
Angioxyl.  
Antasthène.  
Antiphi.  
Anxiosédine.  
Arcica.  
Ardogène.  
Arrhénuclène Bergevin.  
Arsécrinol.  
Arsi-Strychnal Longuet.  
Arsylène Roche.  
Baumolacpinine.  
Béatol.  
Belladénal Sandoz.  
Bellafoline Sandoz.  
Benzoflorine Julien.  
Biodynamine.  
Biogénol Demasles.  
Bionéol.  
Biophorine Girard.  
Biosine Le Perdriel.  
Biotrigon.  
Borosodine Lumière.  
Broméne Montagu.  
Bromiase.

Bromogénol Pépin.  
Bromo-Maisine.  
Bromone Robin.  
Bromovose.  
Calcibronat « Sandoz ».  
Calmocardine.  
Campho-spartéine Dubois.  
Cantéine Bouteille.  
Capsules Bruel.  
Carbolactyl simple.  
Cardiséine.  
Cérébro-Lipase.  
Cérébroil Leisyn.  
Cérébrosthénine Dalin.  
Céthocal du D<sup>r</sup> Lemay.  
Chloral bromuré du D<sup>r</sup> Du-bois.  
Chloralosane.  
Chlormagnésium Fisch.  
Chloro-Magnésion.  
Chlorumagène.  
Clupéyl.  
Comitiol.  
Complextraits.  
Composé Gmet.  
Cratægus Gmet.  
Créagénol.  
Cytopan.  
Cyto-Sérum Corbière.  
Demalgon.  
Détensyl.  
Dialacétine Ciba.  
Dial Ciba.  
Didial Ciba.  
Diastogène Dehaussy.  
Diastogène F. Dehaussy.  
Disonyl.  
Doloma injectable.  
Dragées du D<sup>r</sup> Gélinau.

**NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE**

Dragées Lumeval.  
 Dragées Névrosthéniques  
     Yse.  
 Dysthène.  
 Entéro-antigènes.  
 Éphétropine.  
 Eufosyl Vély.  
 Euglyma.  
 Euphytose.  
 Eusomnine Bélières.  
 Fa-Ner-Val.  
 Fer Ovarine Vitalis.  
 Ferrocol.  
 Fondant de Kola Dausse.  
 Fortossan irradié.  
 Forxol.  
 Fosfoxy Carron.  
 Fosyls Carron.  
 Gardénal.  
 Gauro.  
 Générgosine.  
 Génomorphine.  
 Génosthéniques.  
 Génomorphine.  
 Glandex phosphocalcique.  
 Glycérophosphate Dalloz.  
 Glycérophosphate Robin.  
 Glykolaine Robin.  
 Gouttes phosphosthéniques  
     Dausse.  
 Gouttes arsénosthéniques  
     Dausse.  
 Gouttes halogènes du  
     D<sup>r</sup> Bern.  
 Granulés Caresmel.  
 Granules de Pantofort du  
     D<sup>r</sup> Boveil.  
 Hémostaline.  
 Hémogényl.  
 Hemotal.  
 Hémovir.  
 Histogénol.  
 Humoro-stabilline.  
 Hypalène.  
 I. A. M.  
 Intrait de Valériane Dausse.  
 Ionyl.  
 Isonal.  
 Ixium Buisson.  
 Kalmobrol.  
 Kola granulée Astier.  
 Kola Monavon.  
 Lacpinine.  
 Lauriatol.

Lécithine Vacheron.  
 Limol Churchill.  
 Lioncyl.  
 Lipocérébrine Chevreton.  
 Liposplénine du D<sup>r</sup> Groc.  
 Lobéliane Laleuf.  
 Logaphos.  
 Magbromyl.  
 Magnésio-Cacodyline  
     Jammes.  
 Magnésium Hardy.  
 Magnésio-tubes Robinet.  
 Maltéa Moser cristallisé  
 Mancobène.  
 Mangano-Phosphal Julien.  
 Maté Douglas.  
 Malt Wander ou Gloma.  
 Morisland.  
 Morsine.  
 Musculosine Byla.  
 Néo-Neurosine Prunier.  
 Néo-Rhomnol.  
 Néospasmodyl Vély.  
 Néotrophène.  
 Nergine Heudebert.  
 Nésal.  
 Neurène.  
 Neuréol.  
 Neuridor.  
 Neurinase.  
 Neurobore.  
 Neurocalcium.  
 Neuroflorine.  
 Neuroplasma Fort.  
 Neuroplasma Massif.  
 Neuropol.  
 Neurosine Prunier.  
 Neurotol.  
 Neurotrophol Byla.  
 Névrosan.  
 Névrosthénine Freyssinge.  
 Noctisédy.  
 Novo-Brol.  
 Nucléarsitol Robin.  
 Nucléasine.  
 Nucléigène.  
 Nucléophorène  
 Cenophos.  
 Opocalcium du D<sup>r</sup> Guer-  
     sant.  
 Opocalcium irradié du  
     D<sup>r</sup> Guersant.  
 Opocobalt.

# XVIII. — SYSTÈME NERVEUX. T. S.

## NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Oponuclyl irradié Trouette-Perret.	Sédormid Roche.
Opothérapie du D <sup>r</sup> Fraysse.	Sédosine.
Orchitine Optima.	Sérogyne.
Orthogénol.	Sérosthényl.
Ostéoglandulol.	Sérum Neuropsychique.
Panglandine Couturieux.	Sérum Névrosthénique
Pansolanée.	Fraïsse.
Paradol.	Somnifène Roche.
Passiflorine.	Somnicones Béral.
Passival.	Somnothyrl.
Pavéron Dausse.	Soporalose.
Paxène.	Spasinalgine Roche.
Pepto-Kola Robin.	Spasmine Jolly.
Peptone Vassal.	Spasmoneural.
Percalcine.	Spasneurol.
Persodine Lumière.	Splénomanganol.
Phagosthyl.	Stovafer.
Phagosthyl Mangané.	Strychnotonine.
Phosoforme.	Strychnal Longuet.
Phosbiose.	Strychnarsitol Robin.
Phosma.	Suppotonic Lagoutte.
Phosol.	Sympathyl.
Phospharsol.	Synergyl Vadam.
Phosphates du D <sup>r</sup> Pinard.	Tablettes Hova.
Phosphate Vital de Jacquemaire.	Taburol Monal.
Phosphobrom.	Thalassotonine Vadam.
Phospho-Fluor Beynet.	Thébaïl.
Phosphoséose Demasles.	Thorix.
Phosphopinal Juin.	Tonigène.
Phostyl.	<b>Tonikéna</b> Chevrein.
Phylla Dyn.	Tonique Gonnon.
Phytine Ciba.	Tonique Roche.
Phytogénine Byla.	Tonuclyl.
Phyto-Lécithine.	Total-Tonic.
Phytomarine.	Tribromure Gigon.
Plasma de Quinton.	Ultravitamine 4.
Plexorine Vély.	Vagosédyl.
Poliol Churchill.	Valbornine Rogier.
Polybromure Gonnon.	Valbrol.
Poudre anti-épileptique Cassarini.	Valédyl.
Protonic.	Valénal Novalis.
Pul amone.	Valérianate Gabail.
Réparateur Thuau.	Valérianate Grignon.
Rhomnol.	Valérianate Pierlot.
Rutonal.	Valériane Byla.
Sanguil.	Valériane Gmet.
Sédarsan.	Valériane Pachaut.
Sédatuline.	Valérianose Gigon.
Sélobrol Roche.	Valériflore.
Sédoneurol Dehaussy.	Valérinodor Malmanche.
	Valérium Paul Thibault.
	Valérobromine Legrand.
	Valéromenthol.
	Valéronal.

## NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Valovarine.	Vioxyl Mouneyrat.
Valovosan.	Viradène.
Vanadarsine Guillaumin.	Visco-Sérum.
Véganine.	Vitacrine.
Végéphos.	Vitacalcine Moncour.
Vériane Buriat.	Vitène.
Véronidia Buisson.	Yo-Androl.
Vin de Vial.	Yo-gynine.
Viosten.	

## PARALYSIE AGITANTE

Arsylène Roche.	Endopancrine
Belladénal Sandoz.	Génoscopolamine.
Bellafoline Sandoz.	Naïodine.
Chlormagnésium.	Orthogénol.
Chloro-Magnésion	Pansolanée.
Chlorure bromuré du D <sup>r</sup> Du-	Sédol.
bois.	Sédoneurol Dehaussy.
Comitiol.	Valériane Gmet.
Delbiase.	

## PARALYSIES PÉRIPHÉRIQUES

Arsi-Strychnal Longuet.	Gouttes arsénosthéniques
Dépuriode du D <sup>r</sup> Roger	Dausse.
Weber.	Plasma de Quinton.
Génostrychnine.	Strychnal Longuet

## TABÈS

(Voir: Syphilis.)

Acécoline.	Erythra Dyn.
Ampoules Boissy.	Gambéol.
Anxiol.	Naïodine.
Banikol.	Nitroyl Leisyn injectable.
Cibalgine.	Pyréthane.
Crédone Dehaussy.	Rhocya Dyn.
Curatine Brunet.	Sédol.
Dépuriode du D <sup>r</sup> Roger	Somnicones Béral
Weber.	Soporalose.
Didial Ciba.	Staprolysat.
Épicral.	Tiodine Cognet.
	Valériane Gmet.

## TICS — CONVULSIONS — DÉLIRES

Adonal.	Ampoules de Pantopon
Alépsal Genevrier.	Roche.
Allonal Roche.	Ampoules de Spasmalgine
Amphotonyl.	Roche.
	Anaural.

## TICS — CONVULSIONS — DÉLIRES

Angiosédine.	Paratyrone.
Azigol Thévenot.	Pavéron Dausse.
Baumolacpinine.	Paxène.
Béatol.	Phosphobrom.
Belladénal Sandoz.	Plexorine Vély.
Benzoflorine Julien.	Polybromure Gonnon.
Benzylol.	Poudre anti-épileptique
Biosine Le Perdriel.	Cassarini.
Borogodine Lumière.	Pulsamone.
Bromiase.	Pyréthane.
Bromogénol Pépin.	Rutonal.
Bromo-Maisine.	Sédarsan.
Bromone Robin.	Sédatuline.
Bromovose.	Sédobrol Roche.
Calcibronat « Sandoz ».	Sédoneurol Dehaussy.
Calcium Sandoz.	Sédosine.
Chloral bromuré du D <sup>r</sup> Du-	Sirop Teyssèdré.
bois.	Somnifène Roche.
Chloro-calconi.	Somnopol.
Comitiol.	Somnothyrid.
Complextraits.	Spasmalgine Roche.
Comprimés Kléos.	Spasmine Jolly.
Dialacétine Ciba.	Spasmoneural.
Dial Ciba.	Spasneurol.
Didial Ciba.	Suppositoires Pyrax.
Dragées du D <sup>r</sup> Gelineau.	Tablettes Hova.
Dragées Lumeval.	Tartrate borico-potassique
Épical.	Pachaut.
Eusomnine Bélières.	Théinol.
Gardénal.	Tribromure.
Genhyosciamine.	Valbornine Rogier.
Génomorphine.	Valbrol.
Gluphosol.	Valédyl.
Gouttes Malone.	Valénal Novalis.
Humoro-stabiline.	Valérianate Gabail.
Intrait de Valériane Dausse	Valérianate Grignon.
Isonal.	Valérianate Pierlot.
Kalmobrol.	Valériane Byla.
Lipocérébrine Chevretin.	Valériane Gmet.
Lobéliane Laleuf.	Valériane Pachaut.
Magbromyl.	Valérianose Gigon.
Nésal.	Valériflore.
Neurène.	Valérinodor Malmanche.
Neuréol.	Valérium Paul Thibault.
Neuridor.	Valérobromine Legrand.
Neurinase.	Valéromenthol.
Neurobore.	Valéronal.
Neurocalcium.	Vériane Buriat.
Neuroflorine.	Véronidia Buisson.
NoVo-Brol.	

## TROUBLES VAGO-SYMPATHIQUES

Acécoline.	Génésérine.
Acécoline Yohimbine.	Glycocarpine.
Adonal.	Gynergène Sandoz.
Adrénaline Invar.	Humoro-stabline.
Adrénine.	Hypotan.
Adréphédrine Béral.	Ionyl.
Alepsal Genevrier.	Kalmobrol.
Amphosthène.	Lobéliane Laleuf.
Amphotonyl.	Magnésium Hardy.
Ampoules de Spasmalgine	Magnésio-tubes Robinet.
Roche.	Néospasmodyl Vély.
Anaclasine Ranson.	Novo-Brol.
Anaural.	Œstrobrol.
Androcalcion E.	Organi-calcion simple et
Androcalcion H.	endocrinien.
Androstine.	Orthogénol.
Angiosédine.	Pansolanée.
Angitan.	Passiflorine.
Anxiol.	Paxène.
Ballotyl.	Phosoforme.
Belladénal Sandoz.	Physioscyamine.
Bellafoline Sandoz.	Plexorine Vély.
Benzylol.	Poudre Danica.
Calcional.	Pragmoline.
Chlorumagène.	Pyréthane.
Crataegus Gmet.	Rénaleptine.
Delbiase.	Sédosine.
Disonyl.	Spasmine Jolly.
Dragées Lumeval.	Spasmoneural.
Elixir Gabail.	Spasmosédine.
Ephédrine naturelle Béral.	Sympathyl.
Eupavéryl Pachaut.	Theinol.
Euphytose.	Vagosédyl.
Fosfoxy Carron.	Vagotonine.
Freinospasmyl.	Valénal Novalls.
Gardéphédrine.	Vériane Buriat.
Génatropine.	

## XIX. — TUBERCULOSE

### AMAIGRISSEMENT

Adral.	Arséniode Buriat.
Algatan.	Arsi-Strychnal Longuet.
Aliment Tinardon.	Arsycodile.
Amunine.	Arsylène Roche.
Angiolymphe du D <sup>r</sup> Rous.	Ascoléine Rivier.
Ardogène.	Bemax.
Arsécrinol.	Benzylocalcium.

# XIX. — TUBERCULOSE

## AMAIGRISSEMENT

Biocalcose.	Mangarsenic.
Biodynamine.	Minergil.
Biogénol Demasle.	Morisland.
Biotrignon.	Murones du Dr Robert
Cacodyle Gonnon.	Jacques.
Cacodyline Jammes.	Nucléasine.
Carnine LeFrancq.	Nucléigène.
Cadior.	Cenophos.
Cérébroil Leisyn.	Opocalcium irradié du
Cholagol.	Dr Guersant.
Cinalose.	Opoferrine Vitaminée.
Chupeyl.	Orthozomine.
Colloidogénine du Dr Bayle.	Ozobiase.
Créagénol.	Ozobiase Opothérapique.
Curiod Arsénic.	Ozothine.
Cytobiase.	Pancrimol du Dr Debat.
Cyto-Manganol Corbière.	Panstomase.
Cytopan.	Panxylon.
Cyto-Sérum Corbière.	Peptone Vassal.
Diasés.	Phagosthyl Mangané.
Diastogène Dehaussy.	Phosoforme.
Diastogène F. Dehaussy.	Phosphates du Dr Pinard.
Doloma injectable.	Phylla Dyn.
Elixir Grez.	Phytine Ciba.
Extrait de Malt français	Phyto-splénol Pié.
Déjardin.	Réalphène Buisson
Fenucalcium.	Sérogène.
Fénucine.	Splénomanganol.
Fénugrène.	Splényl.
Fosfoxyl Carron.	Sthénoléme.
Fucus Gmet.	Sulf-Y.
Gastrhéma.	Terpoxyd interne.
Gastricine.	Tonax.
Globexine.	Tonigène.
Gouttes arsénosthéniques	Tonucyl.
Dausse.	Total-Tonic.
Hémo-Cyto Sérum.	Uvéphorine.
Hémofer.	Vanadarsine.
Hormocline.	Vin Girard.
Insuline-Buccale Fornet.	Vin de Vial.
Insuline « Léo ».	Viosten.
Insulyl	Vioxyd Mouneyrat.
Iodo-calcium.	Vitadone.
Jemalt Wander.	Zimbyl.
Lauriatol.	Zomine.
Liposplénine du Dr Groc.	Zymatine irradiée.
Malt français Déjardin	
(Extrait de).	

## ANTISEPTIQUES GÉNÉRAUX

Acatar.	Allisatine « Sandoz ».
Alcamfétol.	Allochrysine Lumière.
Algatan.	Aloysine.



## ANTISEPTIQUES GÉNÉRAUX

Aniodol.	Iodométine.
Antiphymique Vadam.	Iodone Robin.
Azotyl.	Iodonésyl.
Cachets « Roche » au Thio- col.	Iodonucléol.
Capsules Dartois.	Iodo-Vitasine.
Cholergine.	Lipiiodol Lafay.
Cimarsényl.	Lipoiodine Ciba.
Cinalose.	Lita.
Collo-Iode Dubois.	Métaformine.
Comprimés « Roche » de Thiocol.	Méthylarsinates Bouty.
Créosal Dubois.	Micelliode.
Créositoires.	Murones du Dr Robert Jacques.
Créosote Soluble Vacheron.	Néo-Riodine.
Créo-suppo-camphre.	Oxyléine.
Curliode.	Panxylon.
Curliode arsenié.	Pépiodon Henry.
Dicaliode.	Prévalidine.
Dioradin.	Pulmosérum.
Éniode Lefebvre.	Rhocya Dyn.
Éranol.	Riodine.
Eucalyptine Le Brun.	Sirop de gaïarsol.
Goménol.	Sirop Girard.
Gouttes Daynoc.	Solucamphre gaïacolé.
Granions.	Solution Pautauberge.
Holaseptine.	Sulphium.
Huile Gallina.	Térozone.
Iodalose Galbrun.	Terpoxyl externe.
Iodaseptine Cortial.	Terpoxyl interne.
Iodassium.	Triradol.
Iode organique Boissy.	Uroiodine.
Iodogénol Pepin.	Urométhyl.
Iodo-maisine (globules).	Zimbyl.

## MÉDICATIONS LOCALES

Balmiga.	Eucalyptine Lebrun.
Benzoquinol.	Goménol.
Bronchodermine.	Révuksif Liquide Boudin.
Créosoforme Lambiotte	Révuksoplasmé.
Endodermol.	Ultra-Violet.
Éranol.	Ur-Clar.

## TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RECALCIFIANTS

Actiphos.	Alexime.
Adral.	Aliment Tinardon.
Adrenaline Invar.	Amunine.
Adrénine.	Amylodiastase Thépenier.
Adrénocalcine.	Androcalcion E.
Adrénoides Béral.	Angiolymphé du Dr Rous.

# XIX. — TUBERCULOSE

## TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

Antasthène.	Dolophos.
Antiphi.	Dragécalcion.
Ardogène.	Dragées Hecquet.
Arsérinol.	Dysthène.
Arséniode Buriat.	Élixir Ducro.
Arsi-Strychnal Longuet.	Élixir Grez.
Arsycodile.	Énergine iodée de Berck.
Arsylène Roche.	Énergine phosphorée de Berck.
Ascoléine Rivier.	Eufosyl « Vély ».
Bactioxyne.	Exhépa.
Beef Lavoix.	Extrait de Malt français Déjardin.
Bemax.	Fa-Ner-Val.
Benzylocalcium.	Fenucalcium.
Biocalcose.	Fénucine.
Biodynamine.	Fénugrène.
Biogénol Demasies.	Fer Lacarde.
Bionéol.	Fer Ovarine Vitalis.
Biophorine Girard.	Ferocol.
Biosine Le Perdriel.	Fixase.
Biotrignon.	Fixase irradiée.
Cacodyle Gonnon.	Fludiose.
Cacodyline Jammes.	Fluodyle.
Calcigénol.	Fluoganèse.
Calciline.	Fondant de Kola Dausse.
Calcional.	Fondant Iodotannique Dausse.
Calci-Sténine.	Fondant Mangano-Ferreux Dausse.
Calcium Sandoz.	Fortossan Ciba.
Calcoléol.	Fortossan irradié.
Carnine Lefrancq.	Forxol.
Cérébroil Leisyn.	Fosfomagnyl.
Cérébrosthénine.	Fosfoxyl Carron.
Céréossine Dehaussy simple	Fosyls Carron.
Céréossine irradiée.	Fucoglycine du Dr Gressy.
Chloro-Calcion.	Fucus Gmet.
Cimarsényl.	Gaduamine.
Cinalose.	Gaduase.
Clupeyl.	Gastrhema.
Colloïdogénine du Dr Bayle.	Gaurol.
Composé Gmet.	Génergosine.
Créagénol.	Génosthéniques
Créosal Dubois.	Génostrychnine.
Crescogénol.	Glandex phoscalcique.
Curiode Arsenié.	Glandocalcyl.
Cytobiase.	Globexine.
Cyto-Manganol Corbière.	Gluphosol.
Cytopan.	Glycérophosphate Dalloz.
Cyto-Sérum Corbière.	Glycérophosphate Robin.
Dépuride du Dr Roger Weber.	Glyctone phosphatée Charrière.
Diastogène Dehaussy.	
Diastogène F. Dehaussy.	
Doloma.	
Doloma injectable.	

# XIX. — TUBERCULOSE

## TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

Glykolaïne Robin.	Kola granulée Astier.
Gouttes arsénosthéniques Dausse.	Kola Monavon.
Gouttes phosphosthéniques Dausse.	Lauriatol.
Granions.	Lécithine Vacheron.
Granoxyl.	Levuro-Maltine Déjardin.
Granulé Carel.	Limol Churchill.
Granulé de Pantofort du Dr Boveil.	Lioncyl.
Hectine.	Lipocérébrine Chevreton.
Hémagénine Giraud.	Liposplénine du Dr Groc.
Hémato-Iodine.	Lugocalcion.
Hémoantitoxine « Sofos ».	Magnécithine.
Hémocalcine.	Malt français Déjardin (Extrait de).
Hémo-Cyto-Sérum Corbière	Malt Wander ou Gloma.
Hémofer.	Maltea Moser cristallisé
Hémogénol Dausse.	Mancobène.
Hémogényl Godart.	Mangano-Phosphal Julien.
Hémoglobine Deschiens.	Mangarsenic.
Hémopanbiline.	Mangratin.
Hémo-Phagosthyl.	Marimine.
Hémoplasme Lumière.	Marinol.
Hémostérine irradiée.	Marrucol.
Hémostra « Roche ».	Maté Douglas.
Hémostyl.	Méthylarsinates Bouty.
Hémotal.	Minergil.
Hépanème.	Morisland irradié.
Hépaphos.	Morrhualène Gautier.
Heparfer.	Morrhuetine Jungken
Héparmone.	Morrhuetine Jungken vitaminée.
Hépatergol.	Morrhuxine.
Hépathémo.	Morubiasé.
Hépatrol.	Moruxase.
Hépatrol injectable.	Murones du Dr Robert Jacques.
Heracéol.	Musculosine Byla.
Hipposarcine Roy.	Néoarsite.
Histogénol.	Néo-Arsycodile.
Holos.	Néo-Calculine.
Huile de foie de Morue médicinalesuractivéeRhône-Poulenc.	Néo-Neurosine Prunier.
Huile Gallina.	Néo-Rhomnol.
I. A. M.	Nergine Heudebert.
Iodarsenic Guiraud ou Gouttes Paldophiles.	Nervocithine Tissot.
Iodentérol.	Neuroplasma Fort.
Iodocalcium.	Neuroplasma Massif.
Iodure de fer inaltérable Blancart.	Neurosine Prunier.
Ionyl.	Neurotrol.
Irrastérine.	Neurotrophol Byla.
Jemalt Wander.	Névrosthénine Freyssinge.
	Nucléarsitol Robin.
	Nucléasine.
	Nucléigène.
	Nucléophorène.

# XIX. — TUBERCULOSE

## TONIQUES — REMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

Œnophos.	Pulmosérum.
Opocalcium du D <sup>r</sup> Guersant.	Quina Baron.
Opocalcium irradié du D <sup>r</sup> Guersant.	Quinarsol Antianémique.
Opocrinase.	Quinoidine.
Opoferrine Vitaminée.	Quinquina Gmet.
Opouclyl irradié Trouette- Perret.	Reconstituant Mary.
Opophos.	Rénaleptine.
Opothérapie du D <sup>r</sup> Fraysse.	Rhizotanin.
Organi-calcion simple et endocrinien.	Rhomnol.
Orthogénol.	Sanas.
Ozobiase.	Sanguil.
Ozobiase Opothérapique.	Sérifer Laurençon.
Pancrinol du D <sup>r</sup> Debat.	Sérum Neuropsychique.
Pangaduine.	Sérum Névrosthénique Fraissee.
Panostyl.	Silicyl.
Panstomase.	Sirop de Gaiarsol.
Panvita.	Sirop Girard.
Panxylon.	Sirop de Glycérophosphate Vacheron.
Parathyrocalcine Moncour.	Sirop de Lovel.
Pélospanine.	Sirop Famel.
Pepto-Kola Robin.	Sirop du D <sup>r</sup> Reinwiller au phosphate de chaux.
Peptone Vassal.	Sirop iodotannique Guil- lermond.
Percalcine.	Sirop Tinardon.
Phagosthyl.	Solucamphre cholestérine.
Phagosthyl Mangané.	Solution Bardet.
Phosbiose.	Solution Pautauberge.
Phoscamine.	Spectrol.
Phosoformé.	Splénarmone.
Phosol.	Spléno-Magnésium.
Phospharsol.	Splénomanganol.
Phosphates du D <sup>r</sup> Pinard.	Stérogyl.
Phosphate Vital de Jacque- maire.	Sthénoléine.
Phospho-Fluor Beynet.	Sthénoxal.
Phospholéose Demasles.	Strychnal Longuet.
Phosphopinal Juin.	Strychnarsitol Robin.
Phostyl.	Suppotonic Lagoutte.
Phylla Dyn.	Sur-Bi-Cal.
Phytine Ciba.	Synergyl Vadam.
Phytogénine Byla.	Taburol Monal.
Phyto-Lécithine.	Tanno-Calcine.
Phytomarine.	Thalassotonine Vadam.
Phytosplénol Plé.	Tonax.
Plasma de Quinton.	Tonigène.
Pneumo-Lipase.	Tonikéine Chevreton.
Poliol Churchill.	Tonique Gonnon.
Polyminéral Fort	Tonique Roche.
Poudre Danica.	Tonucyl.
Præcalcyl.	Tonudol.
Prodynase.	Total-Tonic.

## XIX. — TUBERCULOSE

### TONIQUES — REMINÉRALISANTS RECALCIFIANTS

Tréphonyl  
Tricalcine.  
Tridynol.  
Traphéine.  
Ultra-violet.  
Ultravitamine 4.  
Uvé (Gouttes).  
Uvéphorine.  
Uvestérol.  
Vanadarsine Guillaumin.  
Végéphos.  
Vériane Buriat.  
Vin de Baudon.  
Vin de Bugeaud.  
Vin de Carnéose.  
Vin Girard.

Vin de Vial.  
Viosten.  
Vioxyl Mouneyrat.  
Visco-Sérum.  
Vitacalcine Moncour.  
Vitadone.  
Vitamorrhéine.  
Vitamyl.  
Vitastérol.  
Vitène.  
Vivoléol.  
Zimbyl.  
Zohol.  
Zomine.  
Zymatine irradiée.

### TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Avistyl.  
Biocholine.  
Bronchitol.  
Cadior.  
C. B. K.  
Cinalose.  
Cinéyl.  
Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle.  
Créositoïres.  
Créosote soluble Vacheron.  
Crisalbine.  
Crysiodal.  
Cyto-Choline.  
Dioradin.  
Eucalyptine Lebrun.  
Hémoantitoxine « Sofos ».  
Hormocline.  
Institut Pasteur Vaccins  
B. C. G.

Lipaurol.  
Molène.  
Moréthyl Dausse.  
Myoral.  
Oléo-sanocrysine de Mollgard.  
Ozobiase opothérapique.  
Phymo-stéryl Leisyn.  
Pulvita.  
Résyl.  
Sanocrysine de Mollgard.  
Sérum de Jousset.  
Sérum Végétal du D<sup>r</sup> Cu-guillière.  
Tébéphaguine Fornet.  
V. A. V.  
Zimbyl.

### TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE ANOREXIE

(Voir : Appareil digestif. Anorexie.)

### TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DIARRHÉE

Acatar.  
Acolitol.  
Alucol Wander.  
Alunozal.

Amidal.  
Amiphène Carron.  
Ampoules Spasalgine  
Roche.

## **XIX. — TUBERCULOSE**

### **TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DIARRHÉE**

Amunine.	Gélotanin.
Amylodiastase Thépenier.	Goménol.
Binoxol.	Hopogan.
Bioentérase.	Kerlactine.
Bismuth Desleaux.	Lait Mont Blanc.
Bismuth Tulasne.	Mucicarbos.
Cador.	Nigérine.
Calcional.	Oxyléine.
Carbolactyl simple.	Paratyrone.
Carbonate de bismuth.	Rhizotanin.
Carbophos.	Spasmalgine Roche.
Casaldyl.	Stupho.
Dragécalcion.	Tablettes Perroud.
Entérofagos.	Tréparsol.
Formocarbine.	Zimbyl.
Gastrocaol.	Zymatine irradiée.

### **TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DYSPNÉE**

Ampoules Boissy.	Frénasma.
Ampoules de Pantopon Roche.	Hypophédrine.
Angitan.	Murones du Dr Robert Jacques.
Benzoquinol.	Oxy-injecteur du Dr Fialip.
Campho-spartéine Dubois.	Pneumogéine.
Coramine.	Rythmos Leisyn.
Élixir thiogaïacolé Arquevaux.	Solucamphre.
Eucalyptine.	Zimbyl.

### **TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE EXPECTORATION**

Alcamfétol.	Créosal Dubois.
Allisatine « Sandoz ».	Créositoires.
Aloysine.	Créosote soluble Vacheron.
Balsamol.	Créo-suppo-camphre.
Bronchitol.	Élatine Bouin.
Bronchodermine.	Élixir thiogaïacolé Arquevaux.
Bronchoseptol Lauriat.	Eucalyptine Le Brun.
Broncosol.	Gaïacamphre.
Cachets Kapytan.	Goménol.
Cachets « Roche » de Thiocol.	Gouttes Daynoc.
Capsules Dartois.	Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret.
Capsules Noguès.	Guéthural.
Capsules et Sirop Préga.	Marrubène.
Codobromyl.	Marrucol.
Codocol.	Miroxyl.
Comprimés... « Roche » de Thiocol.	Murones du Dr Robert Jacques.
Créoformine.	

## **XIX. — TUBERCULOSE**

### **TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE EXPECTORATION**

Néopulmine.	Sirop Gribell.
Pectoforme.	Sirop Mireille.
Perles Taphosote.	Sirop Noguès.
Phosote Lambiotte.	Sirop Vacheron au Gaïacol.
Phosphogaïacol Mary.	Solution Pautauberge.
Phymo-Steryl Leisyn.	Sulfo-Thiorine.
Pneumostyl Daguin.	Sulfoxyl.
Pulmâcardia.	Sulf-Y.
Pulmosérum.	Terkal Monal.
Pulmoverne.	Térozone.
Résyl.	Terpine Gonnon.
Sirop Brahma.	Thiocol Roche.
Sirop de Créosote Vacheron.	Thiorine.
Sirop de Gaïarsol.	Thiosote.
Sirop de Glycérophosphates Vacheron.	Thio-Terpine Dalin.
Sirop Famel.	Tubérol.
	Zimbyl.

### **TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE FIÈVRE**

Ascéine.	Murones du D <sup>r</sup> Robert
Cachets du D <sup>r</sup> Bovell.	Jacques.
Colloïdogénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Panfèbrine.
Créositoire infantile.	Phymo-stéryl Leisyn.
Cryogénine Lumière.	Protiodyne injectable
Curatine.	Pyréthane.
Elbon Ciba.	Quinquina Gmet.
Erythra Dynn.	Solution Bardet.
Eucalyptine Lebrun.	Suppositoires Pyrax.
Gaïacamphre.	Terpoxyl interne.
Gouttes Daynoc.	Zimbyl.

### **TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE HÉMOPTYSIES**

(Voir : Appareil circulatoire. Hémostatiques.)

### **TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE SUEURS**

Acécoline.	Novatropine.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Ozobiase.
Génatropine.	Phymo-stéryl Leisyn.
Genhyosciamine.	Pragmoline.
Gouttes Daynoc.	Sécacornine Roche.
Murones du D <sup>r</sup> Robert	Spasmalgine Roche.
Jacques.	Zimbyl.

# XIX. — TUBERCULOSE

## TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE TOUX

Acobella.	Marrucol.
Aethone.	Miroxyl.
Ampoules de Pantopon	Murones du Dr Robert.
Roche.	Jacques.
Balmiga.	Narcyl.
Balsamol Lescène.	Néopulmine.
Benzoquinol.	Oxymenthol Perraudin.
Blagny gouttes et dragées.	Ozothine.
Bronchitol.	Pecthional.
Bronchodermine.	Pectoforme.
Bronchoseptol Lauriat.	Perles Taphosote.
Broncosol.	Phosote Lambiotte.
Cachets Kapytan.	Phosphogalacol Mary.
Cachets « Roche » de Thiocol.	Phymo-stéryl Leisyn.
Capsules Dartois.	Pneumogénol.
Capsules Kuchner au Mé-	Pneumostyl Daguin.
captol.	Pulmacardia.
Capsules et sirop Préga.	Pulmosérum.
Capsules Noguès.	Pulmoverne.
Chloral bromuré du Dr	Quinthéryl.
Dubois.	Résyl.
Codobromyl.	Rhizotanin.
Codocol.	Rosalyl A et B.
Codoforme.	Salypsol Narty.
Comprimés « Roche » de	Sirop Brahma.
Thiocol.	Sirop Castanol.
Créoformine.	Sirop de Créosote Vacheron.
Créosal Dubois.	Sirop de Galaisol.
Créositoires.	Sirop de Glycérosphos-
Créosote Soluble Vacheron.	phates Vacheron.
Créo-suppo-camphre.	Sirop Famel.
Élatine Bouin.	Sirop Gribell.
Elbon Ciba.	Sirop Mireille.
Élixir Thiogalacolé Arque-	Sirop Noguès.
vaux.	Sirop Vacheron au Galacol.
Eucalyptine Le Brun.	Sirop Viano.
Frénasma.	Solution Pauauberge.
Germose.	Sulfocol Godart.
Glottyl.	Sulfo-Thiorine.
Goménol.	Sulfoxyl.
Gouttes Livoniennes de	Sulf-Y.
Trouette-Perret.	Terkal Monal.
Gouttes Malone.	Térozone.
Gouttes Narkay.	Terpine Gannon.
Gouttes Nican.	Thiocol Roche.
Gouttes Pilka.	Thiorine.
Guéthural.	Thiosote.
Hergénol.	Thio-Terpine Dalin.
Hypophédrine.	Tubérol.
Inhalation Lancosme.	Valthène.
Lucodal.	Zimbyl.
Marrubène.	



## XX. — TUMEURS — CANCER.

(Voir **SYSTEME NERVEUX**, *Analgésiques.*  
**APPAREIL CIRCULATOIRE**, *Hémostatiques.*  
**TUBERCULOSE**, *Toniques.*)

Anaclasine Ranson.  
Anéo-Leisyn.  
Antiméase.  
Aretica.  
Backérine.  
C. 40.  
Ealmaby.  
Catalyl Mg.  
Cérébroil Leisyn.  
Chlormagnésium Fisch.  
Chloro-Calcion.  
Chloromagnésion.  
Chlorumagène.  
Cibalgine.  
Delbiase.  
Doloma.  
Doloma Injectable.  
Dolophos.  
Dysthène.  
Elixir Ducro.  
Fer intraveineux Fraisse.  
Fosfomagnyl.  
Fosyls Carron.  
Gloxines.  
Gouttes Halogènes du  
D<sup>r</sup> Bern.  
Gouttes Magalo.  
Granions.  
Héparfer.  
Hopogan Bocquillon.  
Ixiun Buisson.  
Magnécythine.  
Magnésie Drouet et Pelet.  
Magnésium Hardy.  
Magnésio-Tubes Robinet.  
Néothorium Rhemda.

Néolyse et Néolyse Radio-  
Active.  
Néo-Neurosine Prunier.  
Néophage.  
Néotrophène.  
Néosuline.  
Nestosyl.  
Oenophos.  
Oposynergines.  
Organi - calcion-endocri-  
nien.  
Orthogénol.  
Patholysine.  
Peptone Vassal.  
Percalcine.  
Phagosthyl.  
Phagosthyl Mangané.  
Phosbiosé.  
Phoscamine.  
Phosphomagnésium.  
Plombyl.  
Poudre Danica.  
Prodynase.  
Prostaphile Leisyn.  
Pyréthane.  
Séléniol.  
Séphydine.  
Spléno-Magnésium  
Syphonéol.  
Terpoxyl externe.  
Thorix.  
Traphéine.  
Véralgine.  
Vernis à la Diachusine.  
Vin Rairgoa Tonic.





*Deuxième Partie*

---

**DICTIONNAIRE  
DE SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES**

---



## ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique.  
Le plus puissant antiseptique urinaire.

**Composition.** — Citro-lactate de lithine.  
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de quinoléine.

**Indications.** — Affections des reins et de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, urétrites, etc.). Goutte, arthritisme, gravelle, rhumatismes, artériosclérose, dysenterie amibienne.

**Posologie.** — 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée.  
Le flacon : 16 fr.

**Laboratoire de l'ABSURIC**  
17, rue de Provence — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## ACATAR

(a privatif, contre le catarrhe).  
Médication balsamique par excellence.

**Composition.** — Pilules glutinisées à base de Baume de Tolu, Terpènes d'Abiès, Cinnamobenzoate de soude, Goudrons de pinus et Juniperus (Harlem), Argent colloïdal.

**Indications thérapeutiques.** — Véritable balsamique très doux n'irritant pas les reins, médication antiseptique et anti-infectieuse, modifiant les sécrétions, applicable dans tous les écoulements aigus ou chroniques, toutes manifestations catarrhales irritatives ou douloureuses des voies urinaires, bronchiques, biliaires, intestinales (cystites, cystalgies, gonorrhées, prostatorrhées, néphrites, toutes pyélo-néphrites, tuberculose rénale ou intestinale, etc...).

**Mode d'emploi.** — Dose moyenne : 9 pilules par jour, en 3 fois.

**Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE**  
74, quai de Jemmapes — PARIS (X<sup>e</sup>).  
Tél. : Botzaris 38-78.

# ACÉCOLINE

## Chlorure d'Acétylcholine stabilisé.

Substance dilatatrice des artérioles de la périphérie et des membres, sédative des spasmes artériels, excitante de la musculature lisse.

**L'Acécoline** est présentée sous deux formes :

**Acécoline-Solution** : Solution anhydre et stable de chlorure d'acétylcholine directement injectable par la voie sous-cutanée ou intramusculaire.

**Acécoline-Poudre** : chlorure d'acétylcholine associé au glucose anhydre, à dissoudre avant l'emploi. C'est le produit bien connu des premières applications cliniques.

Boîtes de 6 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 cgr. de chlorure d'acétylcholine.

### Indications et posologie.

**Hypertension artérielle** : Accidents, manifestations et troubles fonctionnels, dose quotidienne : 1 ou 2 injections de 10 cgr.

**Troubles vasculaires** : a) Par spasmes artériels ou artériolaires (Ictus hémiplegique, syndrome de Raynaud, spasmes des artères rétinienne et labyrinthiques, angine de poitrine, acrocyanose, migraines ophtalmiques).

Dose quotidienne : 10 à 20 cgr.

b) Par lésions anatomiques (Artérites avec ou sans troubles trophiques, gangrènes, claudication intermittente).

Dose quotidienne : 1 ou 2 injections de 20 cgr.

c) Avec troubles trophiques (Ulcères des moignons, ulcères variqueux, sclérodermie).

Dose quotidienne : 10 ou 20 cgr.

**Déséquilibre vago-sympathique** : dose : 10 cgr.

**Hypochlorhydrie** : 20 à 40 cgr. pendant 12 à 15 jours.

**Coliques de plomb** : 10 à 20 cgr. toutes les 10 minutes.

**Sueurs des tuberculeux** : Dose quotidienne 2 à 4 cgr.

### Mode d'emploi :

Injectations sous-cutanées ou intramusculaires. NI intolérance, ni contre-indication.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS

Adresse télégraphique : Chevrematte 90-Paris.

## ACÉCOLINE-SPARTÉINE

**Vaso-dilatateur et Toni-cardiaque**

Acécoline (Chlorure d'Acétylcho-  
line). . . . . 0 gr. 10

Spartéine (Sulfate) . . . . . 0 gr. 05

*Hypertension avec insuffisance cardiaque. Accidents  
d'insuffisance ventriculaire gauche.*

**Posologie.** — Injection d'une à 3 ampoules par  
jour.

## ACÉCOLINE-CAMPBRE

**Vaso-dilatateur et Eupnéique.**

Acécoline (Chlorure d'Acétylcho-  
line) . . . . . 0 gr. 10

Campbre . . . . . 0 gr. 20

*Dyspnée des hypertendus. Asthénie des hyperten-  
dus.*

**Posologie.** — 1 ampoule matin et soir.

## ACÉCOLINE-YOHIMBINE

**Hypotenseur et Sympathicolitique.**

Acécoline (Chlorure d'Acétylcholine). 0 gr. 10

Yohimbine . . . . . 0 gr. 01

*Hémorragies cérébrales et méningées. Hypertensions  
paroxystiques.*

**Contre-indications.** — Ramollissement cérébral  
et spasmes des artères rétiniennes.

**Posologie.** — 1 ampoule matin et soir, 2 ampoules  
dans les cas d'urgence.

## ACÉCOLEX

**Pâte trophique à l'Acécoline.**

Traitement des Ulcères variqueux des Plaies atones  
et des Dermatoses.

(Chlorure d'Acétylcholine ; fenchone ; oxydes de  
zinc, de titane ; ichtyol, etc...)

Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère. — PARIS

Adresse télégraphique : Chevrematte 90-Paris.



## ACEPILINE

**Composition.** — Acétone très pur, Alcool, Pilocarpine, Essences aromatiques stimulantes déterpénées.

**Indications.** — Alopécies post-fébriles, Alopécies séborrhéiques.

**Posologie.** — Chaque matin peigner au démêloir et à la brosse dure, puis friction à l'Acepiline avec une brosse à dents demi-dure, raie par raie pendant 10 minutes pour la femme, ou durant 5 minutes sur toute la tête pour l'homme. Quand les cheveux morts cesseront de tomber, continuer par périodes d'une semaine de temps en temps.

**Laboratoire FLAHAUT**

74, rue Monge — PARIS (V<sup>e</sup>).

---

## ACÉSINE GUILLAUMIN

**Composition.** — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaïne.

**Propriétés.** — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

**Indications.** — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

**Mode d'emploi.** — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**  
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## ACÉTYLARSAN

4 - oxy - 3 - acétylamino - phényl - 1 - arsinate de diéthylamine.

Solution aqueuse neutre et stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien toléré. Toxicité réduite.

**Indications.** — Arsénothérapie de la Syphilis et de certaines protozooses par les voies sous-cutanée ou intramusculaire.

**Présentation et posologie.** — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23,6 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cc. (Boîtes de 10).

*Acétylarsan infantile* : solution à 9,4 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cc. (Boîtes de 10.)

Injectations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires (consulter les Notices spéciales).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## ACOBELLA

**Le médicament sédatif de la Toux.**

**Forme.** — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 20 comprimés.

**Formule.** — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera, 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de lobelie, 0,01 ; Benzoate de soude, 0,01 ; Poudre de Dover, 0,06 pour 1 comprimé.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

**Indications.** — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacillose pulmonaire.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N<sup>o</sup> 403-1.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

## ACODROS

**Composition.** — Préparation à base d'aconitine stabilisée, XX gouttes contiennent 1/10<sup>e</sup> de milligramme d'Alcaloïde.

**Action thérapeutique.** — Décongestif, sédatif, analgésique, diaphorétique.

**Indications.** — Grippe, coryza, inflammations et infections de l'appareil respiratoire.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : XV à XX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un liquide quelconque.

*Enfants* (au-dessous de 5 ans) ; 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires BOUVELOT**

62, rue d'Antibes — CANNES (A.-M.).

---

## ACOEGENOL

**Principes actifs.** — Iodures de rubidium, de cæsium, de potassium, de sodium, iode, mimotannin (tannin extrait du mimosa) ; teintures d'aconit, de gelsemium, de cimicifuga et de ballote.

**Action.** — Action principale sur la nutrition, action secondaire sur la circulation et enfin action antispasmodique et sédative.

**Indications.** — Bourdonnements, vertiges, surdité.

**Mode d'emploi.** — Se prend avec de l'eau vineuse ou avec de la tisane.

**Posologie.** — *Dose moyenne* : 2 cuillerées à café par jour, 20 jours par mois (les 10 autres jours du mois, 2 mois sur 3, il est bon, surtout s'il y a de l'oto-sclérose, de prendre des gouttes Chauvin à l'Audisclérocure).

**Prescription.** — Il est bon de faire suivre le produit du nom patronymique et de prescrire ainsi : un Acoégénol Chauvin.

**Établissements Alfred CHAUVIN**

AUBENAS (Ardèche).

## ACOLITOL

Topique intestinal.

**Composition.** — Charbon organique pur à pouvoir d'adsorption élevé, Carbonate de calcium pur amorphe, Salicylate de Bismuth, Peroxyde de magnésium, Belladone pulvérisée titrée.

**Présentation.** — Poudre et granulé.

**Propriétés.** — Topique intestinal de choix, neutralisant et sédatif. Régularise les réactions chimiques du milieu intestinal, entrave les fermentations anormales et les putréfactions, modifie la flore microbienne, adsorbe les toxines.

**Indications.** — Colites, entérocolites, stases colitiques, fermentations, intoxications, auto-intoxications, dysenteries, entérite des tuberculeux.

**Doses.** — 1 cuillerée à entremets délayée dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun et une 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

### LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## ACTIPHOS

**A base de Phosphates Monométalliques de Magnésium, associés au Calcium, Manganèse et Fer.**

**Caractéristiques.** — Puissant modificateur du pH dans tous les cas d'alcalose sanguine.

Reminéralisateur et reconstituant puissant dans toutes les affections diathésiques caractérisées par un *Déséquilibre acido-basique* ou une *Déminéralisation*.

**Mode d'action.** — Rétablit l'équilibre acido-basique sans toucher à la réserve alcaline et sans déminéralisation par l'action de ses *Radicaux phosphatés non saturés*.

**Avantages.** — 1° Un effet plus rapide et plus énergique que l'*Acide phosphorique* officinal ou les autres Préparations spécialisées usuelles à base de cet acide, dont l'action est lente, puisqu'ils doivent d'abord faire subir une transformation totale à la réserve alcaline et l'acidification est faible, car l'acide carbonique est faible et l'élimination gazeuse est rapide.

2° Une augmentation plus régulière de l'acidité sanguine et une reminéralisation prolongée, contrairement à ce qui se passe avec les acidifiants énergiques, tels que les *Chlorures alcalins* :  $\text{NH}^4 \text{Cl}$  ou  $\text{Ca Cl}^2$ , bouleverseurs trop brusques du métabolisme minéral et aqueux et exerçant une action irritative sur les muqueuses gastriques.

3° Un effet acidifiant en agissant uniquement sur la teneur en  $\text{CO}^2$  libre du sang, sans porter atteinte à la réserve alcaline. Le métabolisme minéral est donc intégralement préservé, tout en augmentant et en équilibrant la concentration en ions H du sang.

**Forme.** — Ampoules buvables de 3 cc.

**Posologie.** — Dose de 24 heures :

**Adultes** : 1 à 6 ampoules suivant avis médical, à prendre pendant les principaux repas dans un verre d'eau, de vin blanc ou de sirop de fruit.

**Enfants** : 1 à 3 ampoules suivant l'âge à prendre pendant les repas dans un verre d'eau ou de sirop de fruit.

**Laboratoires PROCHIMAL**

10, rue de Florence — PARIS (VIII°).

Tél. : Europe 40-31.

## **ADÉNOSEPTYL**

**Pour instillations et pulvérisations nasales.**

**Formule.** — Collargol, argyrol, Protargol, adrénaline, goménol, eucalyptol.

**Propriétés thérapeutiques.** — Infections du nez et de la gorge.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 884-1.

**Pharmacie BLOUIN**

50, rue de Turenne — PARIS.

---

# ADIPOLYSINE

## POUDRE CHOLAGOGUE ET OPOTHÉRAPIQUE POLYVALENTE

### RÉGULATRICE DE LA NUTRITION par modification physiologique de l'assimilation PARTICULIÈREMENT EFFICACE CONTRE L'OBÉSITÉ

Sans action élective sur le corps thyroïde et les glandes génitales

Sans réduction de la ration d'entretien

Sans la stricte observation d'un dur régime alimentaire

#### — PRÉSENTATION —

**PRÉSENTÉE SOUS FORME DE DRAGÉES**  
rendues inaltérables par un enrobage soluble dans l'eau

#### — AVANTAGES —

### ASSOULPIT L'ORGANISME

NE TROUBLE  
PAS LE CŒUR

NE DÉPRIME  
PAS LE SUJET

### AUCUNE CONTRE-INDICATION

#### — COMPOSITION —

#### 1° Poudres salines :

Phosphate de soude.....	0 gr. 04
Sulfate de soude.....	0 gr. 05
Sulfate de magnésium.....	0 gr. 06
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 05
Citrate monosodique.....	0 gr. 06
Bromure de calcium.....	0 gr. 05
Hyposulfite de magnésium .....	0 gr. 02

#### 2° Poudres d'organes :

Poudre d'estomac.....	0 gr. 02
— de duodénum.....	0 gr. 01
— d'intestin .....	0 gr. 02
— de foie.....	0 gr. 05
— de pancréas.....	0 gr. 04
— de rate.....	0 gr. 03
— de surrénale.....	0 gr. 002
— de thyroïde.....	0 gr. 001
— d'hypophyse.....	0 gr. 001

pour 1 dragée

N. B. — Les poudres salines, chimiquement pures, sont toujours desséchées avant leur emploi. Aussi, la dose de chaque poudre inscrite dans la formule correspond-elle approximativement à un poids double du sel officinal de même nom.

Le sulfate de magnésium introduit dans l'estomac avec les autres éléments constitutifs de l'« Adipolysine » donne forcément naissance à du chlorure de magnésium sous l'influence des chlorures alimentaires et des chlorures du liquide gastrique. Or, chacun sait la valeur thérapeutique du chlorure de magnésium.

Les préparations opothérapiques employées sont faites à partir d'organes frais rigoureusement sélectionnés et contrôlés, puis desséchés dans le vide et à froid avant d'être pulvérisés. Ces préparations sont garanties pures et sans odeur. Leur conservation est indéfinie.

## EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L'ADIPOLYSINE

Les effets physiologiques de l'« Adipolysine » dépendent essentiellement des moments où se produisent les décharges biliaires après l'absorption de quantités données de ce produit médicamenteux cholagogue par rapport aux heures des repas.

### — PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES —

Selon le moment de son administration

#### L'ADIPOLYSINE

#### FAIT MAIGRIR LES OBÈSES

sans prescription de régime spécial  
accélère les digestions lentes  
ou guérit la constipation

### — INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

Obésité sous toutes ses formes

Digestions lentes

Constipation opiniâtre

Aérophagie — Insuffisance du Foie — Entérite

#### — MODE D'EMPLOI ET DOSES —

Les dragées s'avalent et ne se croquent pas

**DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES**

**ADULTES :**

**OBÉSITÉ :** 3 dragées à la fois 1/2 heure exactement avant chacun des 2 principaux repas.

**DIGESTIONS LENTES :** 3 dragées à la fois au milieu de chacun des 2 principaux repas.

**CONSTIPATION :** 3 dragées à la fois le matin à jeun et 3 également le soir au coucher

tous les jours pendant plusieurs mois consécutifs ou

même plusieurs années avec intervalles de repos.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du médecin.

**ADOLESCENTS :** 2/3 des doses ci-dessus.

**ENFANTS :** 1/3 des doses ci-dessus.

#### — PRIX DE VENTE IMPOSÉ —

Le flacon de 60 dragées (Modèle unique): 20 fr.

### LABORATOIRE DU DOCTEUR L. DELALBRE

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS**

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

#### DÉPOT GÉNÉRAL

Service Commercial et Service Médical

**2, R. CLAUDE MATRAT - 188Y-LES-MOULINEAUX (Seine)**

G. R. LANG, Pharmacien de classe  
**ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE**



## **ADONAL VICARIO**

**Phényl-éthyl-malonyl-urée.**

Comprimés à 10 centigrammes.

**Sédatif énergique — hypnotique.**

**Anticonvulsivant**, son emploi constitue le traitement de choix du mal comitial.

La forme spéciale des comprimés permet la division facile soit en quatre parties égales, soit en deux parties égales (2 centigrammes et demi ou 5 centigrammes).

**Doses habituelles.** — De 2 centigrammes et demi à 30 centigrammes par jour, à prendre loin des repas.

Le flacon de 15 comprimés : 8 francs.

**Laboratoires VICARIO**

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## **ADOVERNE « ROCHE »**

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

**Action thérapeutique.** — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

**Avantages.** — Étalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

**Posologie.** — XL gouttes ou 4 granules = 1 cc. d'une solution à 5 p. 1 000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

**Modes d'emploi.** — Par voie buccale = XX à XL gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

### **Adoverne « Roche »**

*Gouttes* (flacon de 15 cc.).

*Granules* (flacon de 60).

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## ADRAL

**Constitution.** — Poudre d'Algues sélectionnées, stabilisées, et privées de leurs sels minéraux.

**Principes actifs.** — 1° *Iode combiné organique* : modificateur le plus puissant de l'assimilation générale ;

2° *Eléments organiques de choix* : Protéines, Graisses, Hydrates de Carbone.

**Indications.** — *Suraliment spécifique* pour bacillaires, convalescents et amaigris.

**Avantages.** — *Augmentation* rapide du poids des malades.

**Formes.** — *Cachets pour adultes* : 2 à 5 par jour.

*Granulé pour enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

## ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

**Action.** — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

**Indications.** — Rachitisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

**Formes.** — Ampoules de 1 cc. boîtes de 6 ampoules au millig. Solution au millième, flacons de 5 et 10 grammes.

Le flacon de 10 grammes au Public : 9 fr.

**Pharmacie Centrale de France**  
21, rue des Nonnains-d'Hyères  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## ADRENARGOL

(Ampoule Nasale)

Adrénaline associée aux sels d'argent.

**Avantages.** — Bactéricide énergique. Ni irritant, ni toxique.

**Indications.** — Antisepsie préventive et curative du rhino-pharynx, Sinusites, Rhinites, Coryzas, Angine, Grippe, etc.

**Mode d'emploi.** — IV à V gouttes dans chaque narine, matin, midi et soir.

### Laboratoires

**J. BRESSIER, Docteur en pharmacie**  
102, rue Vincent — MARSEILLE.

---

## ADRÉLINE

Solution d'Adrénaline au 1 ‰

**Action.** — L'**ADRÉLINE** possède une action :

- 1° Sur la pression sanguine ;
- 2° Sur le cœur ;
- 3° Sur les fibres musculaires lisses et plus électivement sur celles des petits vaisseaux ;
- 4° Sur la nutrition.

### Posologie :

*Per os*, Cent gouttes à doses fractionnées (toutes les heures, par exemple).

Injectons sous-cutanées, 1 à 10 mmgr. par séries d'injections dans les 24 heures.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.



## ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

### Formes :

Poudres. — Cachets. — Granulés.

### Composition :

Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

### Posologie :

3 doses par jour.

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie

GRANVILLE (Manche)

## ADRÉNOÏDES BÉRAL

Comprimés pour l'administration efficace de l'adrénaline par voie buccale.

**Composition.** — Chaque Adrénoïde contient 1/4 de milligramme d'adrénaline stabilisée, ce qui correspond à V gouttes de la solution d'adrénaline au millième.

**Propriétés.** — Toutes les propriétés de l'adrénaline *per os*, avec cet avantage que l'absorption des Adrénoïdes par la muqueuse buccale met l'adrénaline à l'abri des altérations causées par le suc gastrique et évite sa destruction au niveau du foie.

« Depuis 1904, j'emploie systématiquement l'adrénaline et ai presque exclusivement recours à l'administration par voie buccale. Les résultats obtenus ne me permettent pas de douter de son efficacité. Netter., *Bulletin Société Biologie*, mai 1922.

**Mode d'emploi.** — Laisser fondre les *Adrénoïdes* dans la bouche. « C'est perdre l'avantage de l'absorption par la muqueuse buccale que de les avaler. »

**Posologie.** — Un *Adrénoïde* toutes les 2, 3 ou 4 heures, soit de 6 à 12 par jour.

**Indications.** — Toutes Affections aiguës ou chroniques avec asthénie ou dépression circulatoire, Tuberculose, Etats hémogéniques, Purpuras, Vomissements incoercibles, etc.

Formuler : Adrénoïdes Béral. Une boîte.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

## ADRÉNOLÉINE

### INHALANT

**Forme pharmaceutique et composition.** — *Huile adrénalinée* au millième, avec addition de chlorétone, orthoforme et essences antiseptiques.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur, sédatif, antiseptique des voies respiratoires.

**Avantages.** — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée* d'action est considérablement *augmentée*, le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

**Indications thérapeutiques.** — Sinusites, Hémorragies nasales, Catarrhe nasal. Troubles respiratoires et Coryza de l'enfance, Adénoidites aiguës.

L'Adrénoléine ne présente aucune contre-indication.

**Mode d'emploi.** — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine) 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique (type Vaast grand modèle), *avant* les inhalations.

**Prescription.** — Un flacon *Adrénoléine* Falvy.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences,

Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

## ADRÉPATINE

### POMMADE-SUPPOSITOIRES

Association pluriglandulaire.

**Composition.** — *Extraits d'Organes*: Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate.

**Extraits Végétaux**: Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamelis.

*Excipient antiseptique et Calmant.*

**Propriétés et Indications thérapeutiques.** — *L'Adrépatine* est une préparation pharmaceutique qui :

- 1<sup>o</sup> Par les extraits polyglandulaires englobés ;
- 2<sup>o</sup> Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
- 3<sup>o</sup> Par son action vaso-constrictive locale ;
- 4<sup>o</sup> Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des *Hémorroïdes internes et externes, des Rectites, Prostatites, du Prurit anal et des Fistules.*

**Mode d'emploi.** — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Boîte de 15 suppositoires..... 12 fr. 50

Tube de pommade avec canule rectale..... 12 fr. 50

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ADRÉPHÉDRINE BÉRAL

**Ampoules de 2 centicubes pour injections sous-cutanées.**

**Composition.** — 1/4 milligramme d'Adrénaline et 2 centigrammes d'Ephedrine naturelle par centicube.

**Propriétés.** — Toutes les propriétés de l'adrénaline sous-cutanée, mais avec cette différence avantageuse qu'à doses égales elle est moins toxique, plus maniable et surtout d'une durée d'action beaucoup plus prolongée. De plus, cette action n'est pas suivie de la réaction hypotensive adrénalinique. Elle présente donc tous les avantages de l'adrénaline sans ses inconvénients.

**Indications.** — Toutes celles de l'adrénaline sous-cutanée, notamment : *Accès d'asthme déclenchés, Etats de choc avec défaillance circulatoire périphérique et collapsus* (chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), *Etats hémogéniques, Purpuros, Anémies, Hémoptysies*, etc. Donne d'excellents résultats contre les rhinites et rhume des foins en pulvérisations nasales avec l'Ephédriseur.

**Posologie.** — De 1 à 4 centicubes sous-cutanés. Chez sujet neuf, débiter par 1 centicube. Comme pour l'adrénaline, éviter la voie musculaire qui pourrait exposer à injecter dans un petit vaisseau.

Formuler : Adréphédrine. Une boîte.

**Laboratoire BÉRAL**

194, rue de Rivoli — PARIS.

## AÉROCID

**Conception entièrement nouvelle.**

Traitement opothérapique de l'aérophagie et de ses conséquences.

Basé sur l'action de la parathyroïde dans le métabolisme du calcium, dont le rôle antispasmodique a été mis en évidence par de nombreux auteurs.

**Formule :**

Parathyroïde .....	0,001
Hypophyse .....	0,05
Splénine .....	0,05
Surrénine .....	0,05
Hépatine .....	0,30

**Indications.** — Aérophagie, Asthme, Emphysème, Fausse angine de poitrine, Insomnie.

**Dose et mode d'emploi.** — Un cachet ou deux comprimés le matin au réveil, un le soir en se couchant.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## AÉROPHAGYL

Boîte de 45 comprimés : 14 fr.

**Indications.** — Spécifique de l'*Aérophagie* et de ses conséquences : insomnies, troubles cardiaques, nerveux et pulmonaires, toutes gastrites nerveuses,

**Posologie.** — 1 comprimé délayé dans un demi-verre d'eau, au milieu des repas. En cas de crise 2 comprimés à la fois.

Enfants, 1/2 doses.

**Composition.** — Combinaison complexe constituée par l'association, à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br. et Ca.

Echantillons gratuits :

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (Xe).  
Tél. : Nord 76-85.

---

## AESCULASE

**Composition.** — Alcoolature de marron d'Inde stabilisée, extraits d'hamamélis et de capsicum.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action vasoconstrictive énergique et constante sur le système veineux périphérique. Action régulatrice de la circulation, puissant analgésique, antihémorroïdaire.

**Indications.** — Tous les troubles circulatoires, Puberté, Ménopause, Hémorroïdes.

**Mode d'emploi.**

Troubles de la circulation : XV gouttes avant les deux repas. Hémorroïdes : pour éviter les crises : X gouttes avant les deux repas.

Dans les crises aiguës : XXX à L gouttes 2 fois par jour.

**Laboratoire MICHELON**

20, boulevard Heuxteloup — TOURS (I.-et-L.).



## ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche  
et de la Toux.*

**Doses.** — Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : I goutte par mois d'âge
		De 1 à 2 ans : XII à XX gouttes.
		De 2 à 5 ans : XX à XXV gouttes.
		De 5 à 10 ans : XXV à XXX gouttes.
		De 10 à 15 ans : XXX à XXXV gouttes, et plus s'il est nécessaire.

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou de sirop de tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

Prix : 10 fr. 80 le flacon.

**Laboratoire de l'ÆTHONE**

9, rue Boissonade — PARIS.

## AGAMÉTOL

Traitement rationnel du paludisme.

Solution aqueuse à base de formiate de quinine dont la teneur en quinine (87,56 p. 100) en fait le plus actif de tous les sels de cet alcaloïde.

L'Agamétol étant une solution rigoureusement neutre et stérile, *ne précipite pas* en présence du sérum sanguin. Il est totalement indolore et ne provoque jamais ni réactions inflammatoires ni abcès.

Deux modèles :

Boîte de 12 ampoules 0,25, 2 cc.

Boîte de 12 ampoules 0,50, 2 cc.

Echantillon gratuit et notice au Corps Médical sur demande.

**Laboratoires des Établissements**

**H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## **AGARASE**

### **Composition :**

Comprimés à base d'agar-agar, de ferments lactiques et d'extraits végétaux.

### **Action :**

Réveille la tonicité de l'intestin, lubrifie la muqueuse, dissocie le bol fécal, supprime les fermentations.

### **Avantages :**

Petits comprimés très faciles à avaler ; enrobage soluble dans l'intestin évitant les réactions gastriques ; répartition de la dose active en plusieurs comprimés, ce qui évite une action brutale sur un segment isolé du tube digestif.

Pas d'accoutumance, pas de coliques.

### **Indications :**

La constipation sous toutes ses formes, colites, entérocolites, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique.

Céphalées, obésité, artériosclérose, affections du foie.

Dermatoses.

### **Mode d'emploi :**

Trois comprimés à chacun des principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau sans croquer.

Pour les enfants, deux comprimés à chacun des repas.

**Laboratoire G. REAUBOURG**

2, rue Boucicaut — PARIS (XV<sup>e</sup>)

Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## AGAROL

### Traitement rationnel de la constipation.

Emulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée, infusions, potages).

#### Composition :

Huile de paraffine neutre et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphthaléine.

#### Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications ; utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices ; constipations post-opératoires. Absence totale d'inconvénients.

#### Action physiologique :

Lubrifie l'intestin, pénètre et ramollit le résidu alimentaire, active le péristaltisme sans provoquer l'irritation ou la constipation secondaire consécutive à l'usage des purgatifs usuels.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion, ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

#### Dose et mode d'emploi :

*Adultes* : De 1 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir, au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

*Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué. ☺

Le flacon de 210 cc. : 24 francs belges.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

**Laboratoires SUBSTANTIA, S. A.**

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

## AGOBYL

### Le drain des voies biliaires.

**Formes.** — Granulés, Cachets et Dragées.

**Composition.** — Peptone, Sulfate de Magnésie, Camomille, Extrait de Réglisse.

**Indications thérapeutiques.** — Drainage des voies biliaires. Troubles d'origine hépatique. Insuffisance biliaire.

**Posologie.** — *Granulés* : Le matin à jeun 1 à 2 cuillérées à café dans un peu d'eau chaude, se coucher ensuite une demi-heure, sur le côté droit.

*Cachets* : 1 avant chaque repas.

*Dragées* : 2 à 4 par jour.

### Laboratoire de Thérapeutique Générale

**A. FOUCHERE, Pharmacien,**

44 bis, rue du Mouillon — RIVE-DE-GIER (Loire).

---

# AGOCHOLINE

**Stimulant hépato-biliaire.**

## Forme.

Granulé soluble aromatisé à la menthe ou sans arôme.

## Composition.

Sulfate de Magnésie desséché.

Peptone sèche purifiée.

## Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.

Réalise le drainage des voies biliaires *per os*, et le rend facile en clientèle.

## Indications.

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.

Lithiase biliaire.

Ictère et Cholémie.

Cholécystites chroniques.

Certains troubles digestifs	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.	} d'origine hépato-biliaire.
Certains troubles généraux	{	Céphalée, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.	

## Contre-Indications. (Temporaires.)

Cholécystites aiguës.

Diarrhées aiguës.

## Posologie :

*Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeûn, dans un demi-verre d'eau chaude.

*Enfants* : A partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café, suivant l'âge.

**N. B.** — Il est bon de commencer par les doses faibles et de les augmenter progressivement, suivant la tolérance du malade.

Prix : 17 fr. 50

## Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.

Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux.

Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, Rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>)

Tél. : Diderot 28-96.

## AGOMENSINE CIBA

**Hormone ovarienne hydrosoluble**  
physiologiquement contrôlée.

**Action physiologique.** — Favorise le flux menstruel, accélère le développement des organes et l'apparition des caractères sexuels secondaires.

**Indications :**

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale.
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

*Comprimés. — Ampoules.*

**Doses.** — 3 à 9 comprimés par 24 heures, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 20 comprimés : 13 francs.

— de 40 — : 22 francs.

— de 100 — : 50 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

(Voir *Sistomensine*.)

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**  
109 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## AGOZYMASE

**Granulé de saveur aromatique.**

**Composition.** — Sulfate de soude desséché, Sulfate de Magnésie desséché, Chlorure de magnésium, Peptone purifiée, Extrait de boldo.

**Indications :**

- 1° *Maladies des voies biliaires* : Congestion du foie, Cirrhose, Atonie et Stase vésiculaires, Cholécystite.
- 2° *Maladies gastro-intestinales* : Dyspepsie, Atonie gastrique, Flatulence, Constipation.
- 3° *Maladies cutanées* : Prurits généralisés et localisés, Urticaires, Eczémas, Prurigos, etc.
- 4° *Action dérivative intestinale* : Dans l'Hypertension artérielle, les Néphrites chroniques, les Migraines, les Céphalées.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café de granulé au réveil dans une infusion chaude ou dans eau de Vichy pendant 10 jours.

A renouveler après 5 jours de repos.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire**

71, avenue République — CHAMPIGNY (Seine).

## AIGUE D'OR

Analga du D<sup>r</sup> Redier.

### Composition :

Diméthyle amido-antipyrine...	0,25	} pour un verre à liqueur.
Salicylate de pyramidon.....	0,25	
Héroïne .....	0,001	
Plantes sédatives. ....	Q. S.	

**Propriétés.** — Action thérapeutique du Diméthyle amido-antipyrine et du Salicylate de Pyramidon *considérablement renforcée* par la dose minime d'Héroïne. L'action tonique de l'alcool corrige l'action déprimante des calmants.

**Indications.** — Névralgies, Migraines, *Dysménorrhées*, *Tranchées utérines*, Douleurs dentaires, Coliques néphrétiques, Gripes.

**Posologie.** — 1 verre à liqueur renouvelé, si nécessaire, 1/2 heure après.

*Efficacité plus grande dans une tasse d'infusion.*

*Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose, selon âge.*

*Sans contre-indication.*

**Présentation.** — Liqueur agréable.

Le flacon : 13 fr. 50.

**Laboratoire de L'AIGUE D'OR**

53 bis, boulevard de la Liberté — LILLE (Nord)

## AIROGLYCE

**Composition.** — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée).

**Mode d'action.** — Réalise le pansement et l'antiseptie de la muqueuse urétrale.

**Indications.** — Blennorragie aiguë (période du déclin). Blennorragie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

**Mode d'emploi.** — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

**Ovules:** Agent thérapeutique de choix dans le traitement des métrites, vaginites, ulcérations du col, etc.

**Suppositoires :** Prostatites. Hémorroïdes.

**Laboratoires PIALOUX**

55, rue de Chabrol — PARIS (X<sup>e</sup>).

## ALBUOL LEISYN

**Anti-albuminurique énergique, complètement inoffensif.**

**Indications.** — Toutes albuminuries et cécité albuminurique.

**Action.** — Fait rapidement tomber le taux de l'albumine. L'effet du médicament se prolonge longtemps après la cessation du traitement.

**Présentation.** — Gouttes à prendre dans tisane faite avec la poudre d'ALBUOL.

**Posologie.** — 1 ou 2 cuillerées à café (soit 3 à 6 cuillerées à café par jour), une heure avant ou une heure après les repas, dans tisane faite avec la poudre d'ALBUOL.

**Composition.** — Maïs, Muguet, Gui, Composés tanniques complexes. Préparé par procédé au Sélénium et activé par procédé électrique « EVOO ».

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Adr. télégr. : Laboleisyn Paris.

Tél. : Auteuil 14-73.

---

## ALBUPLAST VIGIER

### Composition :

Sparadrap adhésif caoutchouté à l'oxyde de zinc.

### Avantages :

Suppression des bandes de pansement. — Préparé avec des substances adhésives de première qualité. — Ne se décolle jamais. — Supporté par les épidermes les plus délicats. — Se conserve très longtemps. — Variétés sur toile à voile et tissu extensible.

### Indications :

Contention des pansements. — Traitement des dermatoses (urticairé, érythème polymorphe, ichtyose, furonculose).

**Laboratoires VIGIER et Cie**

**Jean HUERRE et Cie**

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET.



## ALCACYL

**Composition.** — Acétylsalicylate de chaux 0,5, alucol 0,4 pour un comprimé.

Sans action sur l'estomac, le cœur et les reins.

**Forme.** — Comprimés.

**Indications.** — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciatiques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagregés dans un peu d'eau sucrée, avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet.

A répéter si nécessaire 3 à 4 fois dans les 24 heures.

*Enfants* : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

La boîte : 7 fr. 50.

**Laboratoires WANDER**  
**P. BASTIEN, pharmacien**  
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

## ALCALINOSE

**Composition.** — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs. Bicarbonate de sodium saturé.

**Action.** — L'ALCALINOSE fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître; régularise les sécrétions digestives; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée du transit gastrique.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées-mesure avant les repas dans 1/2 verre d'eau, ou 2 à 3 cuillerées mesure le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau.

**Indications.** — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pylorectomie, Aérophagie et Dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses, Entérites et Colites chroniques, Acidose.

Prix : 7 fr. 50.

**Laboratoires CORBIERE**  
27 rue Desrenaudes, — PARIS.  
Téléphone : Carnot 78-11.

## ALCAMFÉTOL

### Composition :

Iodométhylate d'hexaméthylènetétramine (iode réel 45 %)	0 gr. 10
Camphosulfonate de sodium (camphre soluble)	0 gr. 20
Glycéryl Gaïacol	0 gr. 01
Eau bi-distillée, q. s. pour	2 cc.

**Avantages thérapeutiques.** — 4 médications essentielles : de l'Iode, de l'Urotropine, du Camphre et du Gaïacol.

En une seule formule : *Solution aqueuse, stérilisée, à Ph constant.*

**Indications.** — Toutes infections chroniques ou aiguës (septicémies). Défaillance circulatoire. Troubles respiratoires. Maladies de la nutrition.

**Forme.** — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. 25 francs au public.

**Posologie.** — Injections hypodermiques ou intramusculaires indolores. La voie intraveineuse n'est indiquée que pour les cas urgents. Elle n'apparaît pas nécessaire pour les traitements courants.

**Adultes :** 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

**Enfants :** 1/2 à 1 ampoule de 2 cc. par jour.

L'Alcamfétol étant d'une innocuité absolue, ces doses peuvent être augmentées, dans les cas particulièrement graves, *mais sous la surveillance du médecin.*

Laboratoires DOR

DORANTOWICZ, Pharmacien.

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## ALEPSAL

### Comprimés

Grâce à l'association Phényléthylmalonylurée, belladoné et caféïne, l'ALEPSAL supprime les crises convulsives et les équivalents, fait disparaître les troubles du caractère sans exercer aucune action défavorable ni sur l'intelligence, ni sur la mémoire. — Toujours bien supporté et sans accoutumance.

**Trois Dosages :** 1<sup>o</sup> Tube de 20 comprimés dosés à 0 gr. 10 de Phényléthylmalonylurée associée.

2<sup>o</sup> Tube de 30 comprimés dosés à 0 gr. 05 de Phényléthylmalonylurée associée.

3<sup>o</sup> Tube de 80 comprimés dosés à 0 gr. 015 de Phényléthylmalonylurée associée.

**Indications.** — Epilepsie. — Insomnies rebelles. — Etats anxieux. — Troubles neuro-cardiaques. — Angine de poitrine. — Spasmes cardiaques et vasculaires.

**Posologie.** 1<sup>o</sup> Epilepsie Adultes : Débuter par 2 ou 3 comprimés par jour (dosage à 0.10). Se rappeler que les doses initiales doivent être continuées très longtemps sans changements ni interruptions et qu'en cas de diminution dans les doses, on devra procéder très lentement et par paliers successifs. — 2<sup>o</sup> Etats anxieux. Troubles neuro-cardiaques. Terreurs nocturnes. De 1 comprimé à 0,015, ou plusieurs espacés dans la journée. — 3<sup>o</sup> Enfants, Doses variables selon l'âge et les maladies. — Thèse Dr. Labarthe, Dr. Rodiet. Communication Société Médico-Psychologique, PARIS. — Prof. Ferrua. Turin.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché, à NEUILLY — (SEINE).

## ALEXIME

Anciennement « ALEXINE

**Composition.** — Préparé par le procédé de Joulie, est de l'acide phosphorique solidifié, assimilable, hyperactif.

Les résultats de L'ALEXIME sont remarquables et constants dans tous les états de déchéance organique.

**Indications.** — Anémies, Phosphaturie, Déminéralisation, Prétuberculose, Neurasthénie, Fatigue, Faiblesse, Impuissance.

**Posologie.** — 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs.

**Échantillons et littérature au**

**Laboratoire A. LEBLOND**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
Ex-interne des hôpitaux de Paris,  
51, rue Gay-Lussac — PARIS (V<sup>e</sup>).  
R. C. Seine 56 049.

---

## ALGATAN

**Composition.** — Hyposulfi-iodotannate de soude en milieu sulfocalcique fluoré. (Iode entièrement assimilable sans iodisme.)

**Formes.** — Cachets dosés à 1 gramme.  
Comprimés dosés à 0 gr. 50.

**Indications thérapeutiques.** — *Tuberculose pulmonaire, intestinale et osseuse, Artério-sclérose, Emphysème, Asthme, Catarrhe bronchique, Affections cardio-vasculaires, Rachitisme, Tertiarisme, Déchéance physique.*

**Dose et mode d'emploi :**

*Enfants* de 3 à 5 ans : 1/2 cachet ou 1 comprimé.

*Enfants* de 5 à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés.

*Enfants* de 10 à 15 ans : 2 cachets ou 4 comprimés.

*Adultes* : 2 à 6 cachets ou 4 à 12 comprimés.

Par jour au moment des principaux repas.

**Laboratoires de L'ANIODOL**

3 à 9, rue des Alouettes — NANTERRE (SEINE).

## **ALGOCRATINE** (Phénylamidoxanthine.)

**Présentation.** — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation plus rapide que la forme Comprimés).

Produit de prescription médicale.

Ne renferme aucun hypnotique.

**Indications thérapeutiques.** — Migraines, névralgies, sciaticques, grippe, algies cancéreuses. En général, toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les *règles douloureuses*.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Elimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

**Posologie.** — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un second une heure après si nécessaire.

Trois cachets par 24 heures.

### **LANCOSME**

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## **ALGOPHAGINE**

Capsules glutinisées contenant 1/10 de milligramme de colchicine dissous dans l'essence de Gaulthéria pure, iodure de lithium et formine.

### **Indications :**

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

### **Posologie :**

Trois capsules, le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnées d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy) ou hypominéralisée (Vittel, Evian).

### **Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS.

## **ALGOROL**

Traitement des affections rhumatismales,  
Arthrite, Goutte, Poly-arthrite.

En capsules kératinisées à base de iodure de lithium, Essence de Salicylate de Méthyl pur et désodorisé, Colchicine et Urotropine.

### **Mode d'emploi :**

3 capsules le matin avant le petit déjeuner  
et 2 le soir avant le dîner.

Dépôt général :

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## **ALGOSEDINE**

Calme en 15 minutes toutes les viscéralgies : coliques stomacales, intestinales, hépatiques, utérines. Les spasmes du tube digestif. Dyspepsies hyperchlorhydriques ou nerveuses.

**Posologie.** — *Adultes* : XXX gouttes  
4 fois par jour.

Prix : 12 fr. 50,

**Laboratoires P. DORDIN**

56-58, Grande-Rue

HARNES (Pas-de-Calais).

## ALIBOURINE B. E. A.

### Formes :

1° **Pommade** en tube de 50 grammes environ.

### Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs,  
Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli,  
Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lano-  
vaseline.

### Indications :

Eczémas suintants, Impétigo, Teigne, Plaies,  
Ulcères variqueux, Erysipèle.

2° **Solution concentrée** : Flacon de 60 cc.

### Composition :

A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne,  
diluée dans un litre d'eau, une solution se rap-  
prochant d'une Eau d'Alibour un tiers et chi-  
miquement pure. Ces deux préparations n'irri-  
tent jamais.

### Laboratoires B. E. A

Ch. BEHA, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe. — Belfort.

## ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

**Forme.** — Poudre dosée pour la préparation, soit au  
lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable.

### Composition :

Carbonate de chaux...	0,30	Lactose .....	2,50
Phosphate de chaux...	0,20	Caséine purifiée...	0,50
Glycéroph. de chaux ..	0,05	Arrow-Root.....	4 "
Magnésie .....	0,05	Sucre .....	12 "
Eléments céréalo-légu- mineux.....	5 "	Cacao vanillé ....	8,50

Pour 2 mesures.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.

*Adultes* : 2, ~~ou~~ 4 mesures par jour.

**Indications.** — Dégénérescence infantile, Scrofule,  
Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Prix : 15 francs.

### Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

## ALLERGANTYL MILUC

(Complexe organo-galénique.)

**SOLUTION INTERNE.** — Rate désalbuminée, Bardane stab., Saponaire, Noyer, Berbérís.

**Indications thérapeutiques.** — Rétablit l'équilibre normal du système endocrino-sympathique : Furunculose, Eczémas, Allergies cutanées, etc.

**Mode d'emploi.** — *Furunculose* : 3 cuillerées à soupe par jour pendant la première semaine pour diminuer ensuite progressivement.

*Dermatoses* : 2 cuillerées à dessert par jour pendant 20 jours par mois.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau, 1/4 d'heure avant les repas.

**POMMADE.** — Noyer, Saponaire.

Traitement externe synergique complétant l'action de l'ALLERGANTYL, solution interne, dans la cure des dermatoses.

Laboratoires MILUC

L. RAGOUCY, Pharmacien

37, rue Raspail — IVRY-PARIS.

## ALLISATINE « SANDOZ »

**Composition.** — Tous les principes actifs de l'*Allium Sativum* fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, inodores, insipides.

**Propriétés.** — Stimulant des fonctions gastriques, puissant anti-diarrhéique. Hypotenseur. Tolérance parfaite.

**Posologie.** — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour, à la fin des repas.

**Produits SANDOZ**

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

**Constitution.** — (Chlorhydrate de paramino, benzoyl, diéthyl, amino, éthanol).

Les solutions allocaïne-adréraline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérable. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

**Propriétés.** — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacts les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale, fonctions intellectuelles).

**Indications.** — Les mêmes que pour la cocaïne. L'Allocaïne Lumière est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi, aux titrages suivants :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc.

Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc.

Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc.

Solution BB à 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc.

Solution C à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc.

Solution J à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a. à 2 cc.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON.

## ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie par voie intramusculaire.

Traitement de choix des Tuberculeux et des Rhumatismes chroniques infectieux.

**Constitution.** — Thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium.

**Propriétés.** — Injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement; sa toxicité est très faible.

Cette préparation donne la possibilité d'appliquer la méthode chrysothérapique sans avoir recours à la voie intraveineuse, d'une utilisation toujours délicate et souvent dangereuse, ni sans avoir à redouter les graves accidents si fréquents avec les sels d'or même administrés à doses modérées.

**Indications.** — Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie, et la facilité remarquable avec laquelle elle est absorbée permet d'étendre cette méthode, sans arrière-pensée, aux cas bénins où il est normal de ne vouloir faire courir aucun risque au malade. Une indication toute particulière : le rhumatisme chronique infectieux où les résultats dépassent toutes les espérances. Pas de contre-indications formelles, cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales (albuminurie), les lésions intestinales.

Dans les cas très rares de troubles anaphylactoïdes, la substitution au solvant spécial d'une ampoule EMGE LUMIÈRE en évite le retour.

**Présentation.** — Boîte contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution : une de 2 cc. d'Allochryssine; une de 8 cc. de sérum artificiel.

3 dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON.



## ALLONAL « ROCHE »

### ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

**Action thérapeutique.** — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine, il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnotiques de l'acide isopropylallylbarbiturique ( $C^{10} H^{14} O^3 Az^2$ ).

**Indications thérapeutiques.** — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie; agitation, excitation, délires, etc.

**Avantages.** — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

#### Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0,16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 comprimés par 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau ou de tisane, 1/2 h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

#### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE** et  $O^{10}$

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## ALLOPHAQUINA

**Le cachet analgésique rationnel.**

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-3.

Allophanate de benzyle .....	10 cgr.
Diméthylaminoantipyrine .....	30 —
Poudre de quinquina .....	10 —

**Mécanisme d'action.** — L'Allophanate (éther cristallisé, pur et stable) donne, par hydrolyse « in vivo », de l'alcool de benzyle dont les propriétés antispasmodiques sont bien connues et, par dédoublement, de l'urée naissante capable d'entretenir la perméabilité rénale pendant qu'agit, cette fois sans brutalité, la diméthylaminoantipyrine.

**Toutes les Algies.** — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

**Laboratoire du Jécol**

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).

---

## ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 4 centigrammes.

**Aloïne Houdé**

Principe actif cristallisé de l'aloès des Barbades.

**Doses et mode d'emploi :**

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir au repas.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS.

## ALOPLASTINE

### PÂTE À L'EAU ASEPTIQUE

**Indications.** — Toutes les dermatoses aiguës et subaiguës et toutes les maladies des peaux fragiles. **Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras**, évite les méfaits de ceux-ci dans les eczémas aigus et les dermites artificielles. Spécialement indiquée dans les érythèmes des nouveau-nés et les eczémas des nourrissons.

**Mode d'emploi.** — S'applique avec le doigt ou une spatule. À recouvrir de gaze ou à saupoudrer de talc stérilisé ou mieux, de poudre d'Aloplastine. S'enlève avec de l'eau bouillie ou de l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

**Présentation.** — Tube de 100 grammes environ.

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France**  
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise).

## ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail.

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

**Indications.** — Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire, Urticaire.

**Posologie.** — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Pommade Aloysine. — Tuberculoses externes, Plaies suppurées, Dermatoses, etc.

**Prix de vente** { pilules : 10 fr. la boîte ;  
                          { pommade : 7 fr. le tube.

**Laboratoire GOUZÈNE,**  
139, rue de Paris, à PANTIN (Seine).

## ALSODINE

Poudre composée de sels alcalins et de lactose.

En faisant dissoudre 1 cuillerée à café de cette poudre dans une tasse à thé d'infusion tiède non sucrée, ce qui représente 125 centimètres cubes de liquide, on obtient une solution de degré cryoscopique  $\Delta = 0,38$ .

Prescrire cette dose après le repas de midi et du soir, ou au moment des crises douloureuses, chaque fois que les troubles observés pourront être rapportés à une évacuation incomplète ou retardée de l'estomac.

Dyspepsie, hyperchlorhydrie, affections du pylore, atonie, aérophagie, vomissements de la grossesse.

Prix : 9 francs.

Dépôt O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. C. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

## ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal)

Réducteur d'HCl.

*Nouvelle thérapeutique gastro-intestinale* parce que : l'Alucol n'est pas une formule complexe mais un corps chimiquement défini obtenu selon un procédé spécial.

1° Protection de la muqueuse stomacale par le mucilage colloïdal que forme l'ALUCOL, au contact du suc gastrique hyperacide.

2° Fixation par cette masse mucilagineuse des principes fermentescibles et entéro-toxines.

**Formes.** — Cachets, comprimés, paquets poudre, granulés, cachets Belladonés.

Les paquets (dose spéciale 3 gr., pour pansement gastrique et traitement des états aigus).

**Doses.** — Un à deux cachets ou comprimés une heure avant et une ou deux heures après chacun des principaux repas. Le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau sucrée, le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner et environ deux heures après le repas, midi et soir.

Le traitement peut être renforcé sans inconvénient suivant l'avis du médecin.

La boîte cachets : 8 fr La boîte comprimés : 12 fr. La boîte paquets : 12 fr.

La boîte granulés : 15 fr. La boîte cachets Alucol belladonné : 10 fr.

Etablissements WANDER

P. BASTIEN, pharmacien

CHAMPIGNY (Seine).

## ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine sous état gélatineux. Tolérance parfaite.

*Indications :*

**Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons :**

*Posologie :*

*Adultes :* 2 à 10 comprimés ou 2 à 10 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

*Enfants :* 1 à 4 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## ALZINE

**Composition.** — Dionine, Lobélie, Belladone, Polygala, Iodure de Sodium, 0,15 par pilule.

**Forme.** — Pilules enrobées au gluten F1/de 40.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Spasmes bronchiques, Catarrhe.

**Doses.** — Cas aigus : 4 à 6 pilules par jour.  
Après la crise : 2 à 3 pilules par jour.

**Dose préventive.** — 1 à 2 pilules par jour pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

**Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT**  
9, avenue Jean-Jaurès — LYON

## AMBORHINOL

Double ampoule (compte-gouttes) nasale à l'Ephédrine et à l'argent colloïdal chimique en solutions séparées. Médication plus spécialement réservée aux enfants.

**Décongestif** et calmant, sans contre-coup dilatateur, par la sol. d'Ephédrine végétale à 1 p. 100.

**Bactéricide** puissant par la sol. d'argent colloïdal albuminée à 1 p. 100.

Les deux médicaments faciles à employer par instillations nasales successives.

**Indications.** — Inflammations et infections nasopharyngiennes, adénoïdites, otites, grippe, rhino-bronchites, asthme infantile et de l'adulte, coryza spasmodique.

**Mode d'emploi.** — Instiller 2 à 3 fois par jour dans chaque narine IV à V gouttes de la solution I (Ephédrine), et quelques minutes après IV à V gouttes de la solution 2 (ag. colloïdal).

**Laboratoires A. REGAGNON et Co**

276, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

Tél. Vaugirard 26-30.

## AMIBIASINE

**Extrait de Garcinia composé.**

Fournisseur du Ministère des Colonies et de la Guerre.

Non toxique — Sans contre-indications.

Solution brune stabilisée, de saveur amère.

**Propriétés.** — Désinfectant intestinal et antiparasitaire puissants. Antidiarrhéique énergique sans action constipante. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme sans opiacés. Cicatrisant de la muqueuse intestinale et cholagogue puissant.

**Indications.** — Toutes parasitoses intestinales. Diarrhée de toutes natures et origines. Entérite chronique, muco-membraneuse, tuberculeuse. Colibacillurie, eczéma. Diarrhée infantile (Voir Bicentérase).

**Posologie.** — Avoir soin de faire prendre l'AMIBIASINE dans du café noir sucré qui lui enlève toute amertume.

Formes aiguës : 6 à 12 cuillers à café par jour.

Formes chroniques : 3 à 6 cuillers à café par jour.

Administrier le médicament jusqu'à sédation des symptômes intestinaux.

Cure d'entretien : 2 cuillerées à café par jour, 8 jours par mois, pendant 1 à 3 mois.

Régime : Régime habituel des entériques en notant de s'abstenir totalement du lait, des œufs, du bouillon de légumes. Comme boisson : Thé léger sucré ou eau.

Diarrhée infantile : Formuler : AMIBIASINE B. B. 1 à 3 cuillers à café par jour. Remplacer le lait par l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Prix : 16 fr.

Littérature et échantillons :

Laboratoire AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS.

## AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

**Forme.** — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

**Indications.** — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides diarrhéées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, artériosclérose, appendicite chronique.

**Mode d'emploi.** — Deux à 3 cuillerées à café ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre, Comprimés, Cachets : 16 francs.

Le flacon de Dragées : 15 francs.

Le tube de Comprimés : 8 francs.

La boîte de Poudre P. M. : 12 francs. (Boîte aluminium).

### Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien  
4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## AMINO-SEL BYLA

(En flacons-salières.)

**Composition.** — Renferme des corps chimiquement définis, *extraits des féculents et des fruits* : glutamates et tartrates alcalins.

**Propriétés.** — *Condiment hautement sapide*, absolument inoffensif, de conservation indéfinie. Communique aux aliments *la véritable saveur* du SEL, en même temps que l'arome de la viande.

**Indications.** — Tous régimes achlorurés et déchlorurés, albuminurie, affections circulatoires, hépatiques, néphrites aiguës, scarlatine, etc.

**Mode d'emploi.** — Saupoudrer les aliments avant de les consommer, au goût de chaque malade (ne jamais faire cuire avec les aliments).

Les Établissements BYLA  
26, avenue de l'Observatoire, PARIS.

## AMIPHÈNE CARRON

Le plus puissant antiseptique intestinal.

### Nouvel Antidiarrhéique iodé.

Présenté en cachets de 25 centigrammes de : Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse  $C_6H_4O_5SKI + 3\text{ aq.}$

Création du Laboratoire Carron, l'Amiphène contient 31 p. 100 de son poids en iode dissimulé et possède les qualités suivantes :

- 1° *Ne fatigue pas l'estomac*, parce que inattaquable par le suc gastrique.
- 2° *Toxicité nulle. Pas d'iodisme.* Chez l'animal, le chat supporte par kilo et sans aucun trouble *per os* 5 grammes d'Amiphène ; en injection sous-cutanée : 2 gr. 50. Tolérance absolue chez l'homme avec de hautes doses et un traitement prolongé (observations multiples).
- 3° *Antisepsie intestinale parfaite.* Combat les fermentations et les putréfactions intestinales (nombreuses analyses coprologiques).
- 4° *Rapidité de l'action curative.* Remarquable.

**Indications.** — Toutes les diarrhées quelle qu'en soit l'étiologie, aiguës ou chroniques, Diarrhées banales, Fermentations ou putréfactions intestinales, Entérocolites muco-membraneuses, Diarrhées tuberculeuses, Diarrhées colibacillaires, Diarrhées des pays chauds, suites de Dysenterie.

**Mode d'emploi et posologie.** — 2 à 8 cachets par jour à prendre au début de chaque repas.  
Alcaliniser l'intestin dans le cas d'acidité pathologique.

Boîte de 12 cachets : 20 francs.

(C. R. Académie de médecine, 19 novembre 1929 ;  
Société de gastro-entérologie, décembre 1929 ;  
Société de pathologie exotique, décembre 1929 ;  
Société de pathologie exotique, janvier 1931.)

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires CARRON**

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).



## AMPHOSTHÈNE

**Composition.** — Tartrate d'Eséridine, Intrait de Valériane, *Intrait* de Ballote stab., Intrait de Gui.

**Formes.** — Ampoules et dragées.

**Mode d'action.** — Activant du vague et frénateur de l'hyperexcitabilité du Sympathique.

**Indications.** — Troubles nerveux vago-sympathiques, Etats psychonévrosiques, Eréthisme cardio-vasculaire, Syndrome solaire, Toux spasmodiques, Trachéites spasmodiques et saisonnières, Asthme, Rhume des foins.

**Mode d'emploi.** — Sympahticotoni. pure : 1 à 2 ampoules par jour.

Dystonie associée et toux spasmodiques : 1 à 2 dragées avant chaque repas.

**Laboratoires des Produits VELY**  
132, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien.

**Composition.** — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles de Friedlander*, *streptocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles de Pfeiffer*, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

**Indications.** — Véritable gargarisme sec aux antiviruses, immunisant et curatif.

*Traitement des angines, irritations de la gorge, toutes les infections buccales : gingivo-stomatites, pyorrhée alvéolaire, accidents de dents de sagesse, etc...*

Leur rôle prophylactique en période de grippe est des plus importants.

**Doses. Mode d'emploi.** — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

Le flacon de 70 comprimés : 14 francs.

**Laboratoires des Ampho-Vaccins**

**A.-D. RONCHESE, Docteur en Pharmacie**

6, rue Rothschild — NICE.

62, rue Charlot — PARIS

## AMPHOTONYL

**Sédatif spécifique du système vago-sympathique.**

**Composition :**

Phényl-éthyl-malonyl-urée ( <i>gardénal</i> )...	0,02
Extrait de belladone.....	0,002
Para-acetphénétidine ( <i>phénacétine</i> ).....	0,10
Extrait fluide d'aubépine.....	0,05
<i>pour un comprimé.</i>	

**Forme pharmaceutique.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications thérapeutiques.** — Analgésique. Sédatif général. *S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques. Spasmes douloureux. Palpitations, Insomnies, Dyspepsies nerveuses, Asthme, Troubles endocriniens, névralgies, etc.*

*Action très efficace. Aucune contre-indication.*

**Doses.** — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

Prix : Le tube de 40 comprimés : 16 fr. (sans impôt).

*Échantillons, littérature :*

**Laboratoires LERSAM**

17, rue Saint-Saëns. — PARIS (XV°).

## AMPHO-VACCINS RONCHÈSE

Lysat bactérien, ou filtrat de cultures,  
et bactéries entières.

**Vaccins injectables :** anti-infectieux, anti-staphylococcique, intestinal, pulmonaire, urinaire.

**Vaccins à ingérer :** anti-infectieux, anti-staphylococcique, antityphoïdique T. A. B. (curatif), intestinal, pulmonaire, urinaire.

**Vaccins pansements :** antipyrogène, rhino-pharyngien. *Pyo-amphogel* (gelée molle à base d'Ampho-Vaccin pansement antipyrogène). *Ampho-Tablettes* (comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien).

**Composition, avantages, indications, posologie :**

Voir page 46, **Ampho-Tablettes.**  
page 1269, **Vaccins Ronchèse.**  
page 966, **Pyo-Amphogel.**

## AMPOLASES

**Composition.** — Extraits totaux ovariens, orchitiques, rate et foie, préparés à froid et maintenus en suspension isotonique avec toutes leurs propriétés physiologiques. Ampolases O, Ampolases G, Ampolases R et Ampolases F. Ampolases Para N.

**Indications.** — Troubles des fonctions génitales. Dépression.

**Doses.** — Absorption par voie buccale d'une ou deux ampoules par jour, contenant 20 à 33 0/0 de produit actif.

**Durée du traitement :** 12 jours au moins par mois.

La boîte de 6 ampoules : 18 francs.

## OPOLASES

**Composition.** — Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques prélevés aseptiquement dès l'abat et desséchés par froid et l'air sec.

**Avantages.** — Ces produits sont dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

**Principaux produits.** — *Opolases* : Ovaires « O », Ovaire et Thyroïdine « O. T. », Thyroïde « T. », Surrénale totale « S. », Ovaires-Surrénales-Hypophyse-Thyroïdine « P. », Testicules-Surrénales-Hypophyse-Cérébrine « P. M. », Mammaire « M. », Hypophyse « H. », G Testiculaires.

Parathyroïde à 1/10 de millig. — Thyroïde à 1/10 de millig. (Ttt).

La boîte : 18 et 16 francs.

**Laboratoire E. VERGELOT**

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

---

## AMPOULES BOISSY

pour inhalations.

**Ampoules Boissy de nitrite d'amyle.**

**Indications.** — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabès, Mal de mer, Migraines, etc.*

**Ampoules Boissy d'iodure d'éthyle.**

**Indications.** — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

**Mode d'emploi.** — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.

Prix : 15 fr. la boîte de 12 ampoules.

## AMPOULES BOISSY

**d'iodure de potassium.**

Pour injections hypodermiques.

**Formule.** — Ampoules de 2 cc. contenant :

KI pur stabilisé ..... 0 gr. 10

Iodure de codéine ..... 0 gr. 001

En solution aqueuse.

**Indications.** — Médication extrêmement active des *accidents rhumatismaux*, en particulier : *rhumatismes articulaires et déformants, névrites, sciaticques*. Amélioration très rapide dès la 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> injection, suivie d'une guérison durable. Résultats remarquables contre les accidents de la *ménopause*, et toutes applications classiques des iodures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Injections indolores (grâce à l'iodure de codéine) ou peu douloureuses, toujours bien supportées. Diffusion immédiate, sans aucune réaction et sans aucun accident d'iodisme.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule par jour, en injection sous-cutanée profonde (ou intramusculaire).

Prix : 18 fr. la boîte de 10 ampoules.

**Laboratoires BOISSY**

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

## AMPOULES DE PANTOPON « ROCHE »

(Opium total injectable.)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche ».

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. *Enfants* : 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON « ROCHE » représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 ctg. de Pantopon « Roche »

= 0,50 ctg. de teinture d'opium.

= 0,025 mgr. d'extrait d'opium.

= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 ampoules.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>)

---

## AMPOULES DE SPASMALGINE « ROCHE »

(Antispasmodique vrai.)

**Composition.** — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon « Roche ».

Deux centigrammes Papavérine « Roche ».

Un milligramme Atrinal « Roche ».

(Voir page spéciale Spasmalgine « Roche ».)

**Indications thérapeutiques.** — *Tous les états spasmodiques* et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voies hypodermique et intramusculaire).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration indolore de la Strychnine par voie sous-cutanée, en association avec divers rectorporants et toninervins.

**Indications.** — Asthénie, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, adynamie.

### I. — Névrosthéniques simples.

La dose de strychnine est constante : 1, 2, 3, ou 4 milligr. par ampoule selon la demande. Le type en est la série suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.  
Strychnine (Sulfate) 1, 2, 3 ou 4 milligr.  
suivant la demande.

### II. — Névrosthéniques progressives.

Administration de la strychnine à doses progressivement croissantes. Chaque série comprend 24 ampoules et renferme 16 dosages de strychnine allant de 1 à 10 mill. Le type en est la formule suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.  
Sulfate de strychnine.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## AMPOULES REIPAR

**Composition.** — Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

**Indications.** — Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales, Sciatiques.

**Action.** — Curative certaine, sédative très rapide.

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Prix : 15 fr. la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée au

**Laboratoire du REIPAR**

LUCQUY — (Ardennes).

## AMUNINE

### Vitamine A.

**Composition.** — Solution huileuse de *Vitamine A* de croissance et anti-infectieuse concentrée et physiologiquement titrée en unités (1 cc. = 1.500 unités Javillier). Chocolatés d'AMUNINE titrés à 1.800 unités J.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Amunine a pour effet de compléter les rations alimentaires, toujours déficientes en Vitamine A.

**Indications.** — L'Amunine est indiquée : chez l'enfant, dans tous les cas où l'on constate une *insuffisance du développement*, un *arrêt de la croissance*, ou des *irrégularités dans la courbe du poids*. — Chez l'adulte, dans les *diarrhées*, la *fatigue générale*, l'*amaigrissement*, la *perte de l'appétit* et, en général, pour mettre un organisme affaibli à l'abri des infections. — Elle est également indiquée dans la *grossesse*.

**Posologie.** — En flacon de 24 cc., solution dans l'huile d'olives. — Jusqu'à un an : XX gouttes ; de 1 à 10 ans : XL gouttes. — *Adultes et adolescents* : LX gouttes par jour, à mélanger à l'alimentation ordinaire, et dans du lait tiède pour les tout petits. — Chocolatés : 1 à 4 par jour.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et Vitamines de croissance des Céréales germées.

**Formes.** — Comprimés et Sirop.

**Indications thérapeutiques.** — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop 3 fois par jour après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Prix : le flacon sirop . 17 fr. 50 ;

La boîte de comprimés : 13 fr. 75.

Laboratoire des Ferments  
du Docteur A. THÉPÉNIER

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS.

R. C. 150.854

## ANACAMPHRE

**Camphre hydrosoluble indolore.**

**Constitution.** — Solution à 22 p. 100 de camphocarbonate d'aminéthanol. 1 cc. = 0 gr. 10 de camphre droit.

**Avantages.** — A. *Sur l'huile camphrée.*

Remplace l'huile camphrée dans toutes ses applications. Action plus rapide et plus régulière. Possibilité d'utiliser la voie intraveineuse dans les cas graves. Facilités d'emploi, en raison de l'absence de tout corps gras (Possibilité d'user d'aiguilles très fines).

B. *Sur les campho-sulfonates.*

Jamais de douleur, meilleure tolérance.

Jamais d'abcès éloignés.

Action plus complète (le dégagement du camphre est plus facile avec la série carbonique qu'avec la série sulfonique).

C. *Sur les succédanés du camphre.*

Ceux-ci ne dégagent pas de camphre. Action moins sûre.

**Indications.** — Toutes celles de l'huile camphrée : Adynamie, collapsus, shock, défaillances cardiaques, grandes hémorragies, affections cardiaques dépressives, pneumonies, broncho-pneumonies, hémoptysies, etc...

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Jusqu'à 2 grammes de camphre par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 cgr. par année d'âge.

**Injectons intraveineuses.** — Fractionner et injecter lentement.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII<sup>e</sup>).

---

## ANACIDASE

Poudre absorbante, anti-acide, anti-fermentescible.

Facilite les digestions ;

Décongestionne le foie ;

Désinfecte l'intestin.

Prix au public : 10 francs.

Aux médecins pro-pharmaciens : 5 fr. (même par unité) chez les grossistes.

Par postaux franco gare 4 fr. 50, par minimum de 20 unités demandées au :

**Laboratoire MEUNIER**

11, boulevard Davout

AUXERRE (Yonne).

Tél. : 5-94.



## ANACLASINE RANSON

**Antianaphylaxie, Ocytophylaxie, Prophylaxie anticancéreuse.**

**L'Anaclasine Ranson** (ανά = contre, κλάσις = choc) est une préparation *anti-anaphylactique polyvalente et cytophylactique*.

**Forme.** — Comprimés et granulé.

**Action.** — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme, stimule la fonction cellulaire, améliore l'état hépatobiliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension, entrave l'apparition et l'évolution du cancer.

**Composition.** — L'*Anaclasine* comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés halogénés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques de bœuf, de cheval, de mouton, de porc, de gibier, de cabillaud, de merlan, de rouget, de crustacés, d'œuf total, de lait, de pois, de haricots, de lentilles, de céréales, de gélatine animal. (*vingt peptones différentes*).

**Indications.** — Anaphylaxie alimentaire, intolérance digestive, déficience hépatique, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foies, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes, cancer.

**Doses journalières.** — *Adultes* : 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas, ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

*Enfants* : de 1 à 3 comprimés par jour, ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

**Laboratoires de l'OPOCALCIUM**

**A. RANSON**, Docteur en Pharmacie

121, avenue Gambetta — PARIS.

Tél. : Ménil. 62-80, 62-81, 62-82.

## ANALGÉNINE OBERLIN

Deux formes : A, solution. B, cachets.

### A. Solution.

Une cuillerée à soupe contient :

Pyramidon .....	0 gr. 30
Antipyrine .....	0 gr. 30
Bromhydrate de quinine .....	0 gr. 10
Caféine.....	0 gr. 05

Solution agréablement aromatisée au café. A diluer dans une tasse à café d'eau chaude plus ou moins sucrée suivant le goût de chacun.

### B. Cachets.

Même formule, mais phénacétine au lieu de pyramidon.

**Indications.** — Migraines, Névralgies, Sciatique, Paludisme.

Laboratoire OBERLIN

**J. TINARDON**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
de la Faculté de Pharmacie de Paris  
17, rue Cadet — PARIS.

## ANAPEPTONE VASSAL

**Forme.** — Comprimés de Peptone, remplaçant les cachets (conservation parfaite).

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

La boîte : 20 francs.

Échantillon gratuit sur demande.

Établissements **Léon DANJOU**  
**LILLE**

## ANAQUINTINE LESCÈNE

**Composition.** — Aldéhydes benzylocinnamiques, Thymol, Eucalyptol.

**Formes.** — 1° *Solution aqueuse.* Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau. — 2° *Solution huileuse* avec *éphédrine* pour instillations nasales (flacons stilligouttes).

**Indications.** — *Aqueuse* : Toux, Grippe, Coqueluche. — *Huileuse* : Sinusites, rhumes, affections rhinopharyngées, rhume des foins.

**Propriétés.** — *Aqueuse.* Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine; elle calme la toux et réalise l'antisepsie des voies respiratoires.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la *Coqueluche*.

*Prophylaxie des maladies contagieuses en aspersion ou pulvérisation sur les vêtements, linge, draps, etc., en inhalations froides* (Méthode de Milne).

*Huileuse.* En gouttes dans les narines (antiseptique, décongestionnant, sédatif).

**Mode d'emploi.** — 1° *Aqueuse.* La diluer de 4 à 5 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit. En inhalations froides et en aspersions, l'employer pure.

2° *Huileuse*, 3 à 8 gouttes dans chaque narine 3 à 8 fois par jour. Prix 12 fr. sans compresse. — 15 fr. avec compresse. 14 fr. gouttes nasales.

**Laboratoires LESCÈNE**

PARIS, 58, rue de Vouillé — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

## ANAUROL

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Gardénal, rutonal, boratartrate de calcium.

**Indications.** — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

**Doses.** — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 20 francs (10 jours de traitement).

**Laboratoires LAMAR**

1, place Forbin

AIX-EN-PROVENCE

## ANAXERYL

**Forme.** — Pommade (tube).

**Composition.** — Dioxyanthranolsulfonate de sodium, Thioélaïdinosulfonate de sodium, Huile de Bouleau, Résorcine, Baume du Pérou.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Réducteur, Antiparasitaire, Antiseptique.

**Indications.** — Toutes dermatoses sèches ou squameuses, Psoriasis, Parakératoses, Affections parasitaires, Mycoses, etc...

**Mode d'emploi.** — Appliquer l'ANAXERYL en massant légèrement. Enlever l'excès de pommade avec un tampon d'ouate.

Le tube (grand modèle) : 11 francs (en France)

**Laboratoires A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

---

## ANDROCALCION

**Forme H**

**Composition.** — Association de Calcium, de Magnésium, de Phosphore, combinée à la Théobromine, à l'Iodaseptine et à l'Extrait orchitique.

**Indications.** — Accidents de la Ménopause masculine, *Préventif* des troubles de la Cinquantaine, *Traitement* de ses accidents.

**Propriétés.** — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

**Préparation. Doses.** — Dragées à prendre trois fois par jour (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

**Forme E**

**Composition.** — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, *Lobe antérieur d'hypophyse*. Extrait orchitique.

**Indications.** — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent.

**Présentations et Doses.** — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 fois par jour 3 à 4 dragées par 24 heures, 12 jours par mois.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS.

## ANDROSTINE CIBA

**Hormone orchitique issue de la lignée spermatogénétique.**

**Action physiologique.** — *Chez la femme* : Equilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas. — *Chez l'homme* : Activa-trice de la spermatogenèse. — *Dans les deux sexes* : Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

**Indications.** — *Chez la femme* : Troubles de la Ménopause et de la puberté. Anxiété génitale, érotomanie, onanisme. Troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme* : Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes* : Obésité, engelures, acrocyanose, diabète. Comprimés, ampoules.

**Doses.** — 2 à 6 comprimés par jour, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## ANÉGRINE

**Composition :**

Acide quinoléique, carbonique, associé à l'Arbutine, à la phénolactine et au cascara.

**Action :**

Elimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

**Indications :**

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

**Mode d'emploi :**

Cas aigus, 6 à 8 comprimés ou cachets par jour, en deux ou trois fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés ou cachets par jour. — Cas chroniques : 3 à 4 comprimés ou cachets par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre. Prendre les comprimés ou cachets au commencement des repas avec les premiers aliments.

**Laboratoires RIVIER**

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.

## ANÉO LEISYN

**Médication modificatrice et antiproliférante. Régulatrice de l'équilibre cellulaire. Aucune toxicité. Innocuité absolue. Aucun inconvénient. Pas de contre-indication.**

**Indications.** — Cancers, Cancroïdes, Carcinomes, Epithéliomas, Epu-lis, Etats pré-cancéreux, Néoforations, Sarcomes, Tumeurs malignes, etc. Préventif après les interventions chirurgicales.

**Action.** — L'ANÉO LEISYN agit avec une extrême rapidité. Amélioration fréquente en quelques semaines, souvent même en quelques jours, de l'état local et général. Nettoyage rapide des lésions. Cicatrisation des ulcérations. Assèchement des suppurations. Modification des territoires cancéreux et de leur voisinage. La plupart du temps, évolution nette vers la guérison clinique.

**Présentation.** — Ampoules de 2 cc. environ pour injections exclusivement hypodermiques ou intra-tumorales.

**Technique.** — Pour les tumeurs visibles ou que l'on peut atteindre, telles que la prostate, injecter de préférence en plein dans la tumeur. Pour les tumeurs impossibles à atteindre, injecter 1 ou 2 ampoules, soit tous les jours, soit tous les deux jours, hypodermiquement en un point quelconque.

**Composition.** — Acide acétique, Acide citrique, Acide phosphorique, Alumine, Ammoniaque, Chaux, Chlore, Fer (oxydé et préparé par procédé spécial). Potasse, Soude, Sucre, Gomme ou Dextrine, Essences Antiseptiques. Préparé par procédé spécial au Sodium et gaz acéty-lène à hautes températures et à très hautes pressions. Activé électri-quement par procédé « EVOO ».

Les Laboratoires LEISYN  
1 bis, rue Molitor, PARIS (XVI<sup>e</sup>)  
Adresse télégraphique : Laboleisyn Paris.  
Tél. Auteuil 14-73.

## ANEXOL

Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.

**Formes.** — Double boîte de 80 comprimés.  
Boîte de 40 —

**Principe actif.** — Sel sod. acid. sulfam.  
Toluène monoch. (chloramine T.)

**Doses.** — Pour 1 litre d'eau chaude :

Gargarismes . . . . . 1 à 2 comprimés.

Urologie et gynécologie.. 2 à 4 —

Pansement des plaies ... 4 à 6 —

La dissolution des comprimés d'Anexol se fait immédiatement, même à froid.

**Prix :** 14 fr. la double boîte. La boîte : 8 fr.

**LABORATOIRES DROUET ET PLET**  
**RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.).**

# ANGIOLYMPHE DU D<sup>r</sup> ROUS

**Prétuberculose — Tuberculose.**

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire, Osseuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

**Indications :**

*Dans les formes pulmonaires.*

**DIMINUTION** et **DISPARITION** de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.

**AUGMENTATION** de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.

**DIMINUTION, DEGENERESCENCE** et **DISPARITION** des **BACILLES DE KOCH** et autres micro-organismes pathogènes.

*Dans les formes ganglionnaires, osseuses, rénales, etc.*  
Amélioration rapide de tous les symptômes. Une boîte suffit d'ordinaire pour donner un commencement d'amélioration sensible.

**Posologie.** — De 2 à 5 cc. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

**Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE**

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE.

MORO, ph. de 1<sup>re</sup> cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

## ANGIOSEDINE

**Comprimés.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

**Formule.** — Ext. mou de passiflore, de crataegus, de jusquiame, gardénal, nitrite de soude, extrait de muguet, de gui, d'hamamélis, marron d'Inde, d'hydrastis, hypophyse et silicate de soude.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés de 0,50.

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 614-1.

**Pharmacie M. CORTOT**

36, rue des Archives — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## ANGIOXYL

**Nature.** — Extrait pancréatique hypotenseur à action trophique sur les vaisseaux, titré physiologiquement.

**Indications.** — Angine de poitrine, Hypertension artérielle, artériosclérose, artérites de toute nature. Ulcères gastriques, ulcères variqueux. Maladie de Basedow, Anxiétés. Troubles de la Ménopause.

**Formes.** — 1° Angioxyl-Ampoules, en boîtes de 10 ampoules ; 2° Angioxyl-Sirop, en flacons de 150 cc. environ.

**Doses.** — De 1 à 3 ampoules par jour en injection intramusculaire pendant 18 jours.

Ou 3 à 4 cuillerées à dessert de sirop par jour.

*Aucune contre-indication.*

**Laboratoires du Dr ROUSSEL**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---

## ANGITAN

**Tonique de la circulation de retour.**

**Composition.** — Associe aux deux grands modificateurs du tonus veineux et capillaire, Éphédrine naturelle (0,01 cgr.) et Extrait de surrénales (0,05 cgr.), la médication classique par l'Hammélis et le Marron d'Inde. 1 cgr. de phénylméthyl malonylurée assure une tolérance parfaite à l'éphédrine.

**Indications.** — Troubles circulatoires de retour. Etats syncopaux et de collapsus, Hypotension artérielle, Asthénie, Dépressions physiques et nerveuses liées à la faiblesse circulatoire. Troubles circulatoires abdominaux et des membres inférieurs. Asthme.

**Présentation.** — Pilules dragéifiées.

**Doses.** — 2 à 8 pilules par jour, entre les repas.

**Laboratoires VINCENT**

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.



## ANIODOL

Le plus puissant antiseptique interne et externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine  
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

### ANIODOL INTERNE

**Forme.** — Gouttes.

**Indications.** — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

**Mode d'emploi et doses :**

*Nourrissons* : III à V gouttes à chaque tétée.

*Enfants* : XX à L gouttes.

*Adultes* : XXX à CC gouttes.

Par jour dans une tasse de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

### ANIODOL EXTERNE

**Formes.** — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons, ovules ; vaseline.

**Indications.** — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

**Mode d'emploi et doses.** — Normale : 1 cuillerée à bouche pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : asepsie et désinfection des mains et des plaies. Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

**Laboratoires de l'ANIODOL**

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).

**Envoi d'échantillons gratuits à MM. les Docteurs.**

## ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes,  
Suppositoires, Pommade.

**Formule simple.** — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

**Formule composée.** — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive), Adrénaline, Eucaïne, Menthol.

**Administration.** — *Crises aiguës* : Suppositoires Anoïde formule simple. *Cas habituels* : Suppositoires Anoïde, formule composée. Pommade Anoïde.

La caractéristique des suppositoires Anoïde est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement irritant contre les tissus voisins.

**Mode d'emploi.** — *Suppositoires* : Un le soir en se couchant. *Crises aiguës* : Un matin et soir.

Prix : 16 francs,

*Pommade* : Application locale, matin et soir.

Prix : 13 francs.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,  
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## ANOZYL

Liquide épais contenant Thymol arsénié.

**Indications.** — Rhinite atrophique, Ozène.

**Mode d'emploi.** — Badigeonnage de la muqueuse nasale avec un porte-coton et coton situés dans la boîte, matin et soir.

Avantages : expérimenté depuis vingt ans, donne 80 p. 100 de succès.

Laboratoires des Produits Oto-Rhino-  
Laryngologiques  
du Dr DEROZIER

24, rue Jardel — BORDEAUX (Gironde).

## ANTALGOL DALLOZ

**Composition.** — Quino-Salicylate de pyramidon.

**Forme.** — Granulé.

**Propriétés.** — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

**Indications.** — Rhumatisme aigu ou chronique, Goutte, Lumbago, Sciatique, Migraines, Névralgies, Grippe, Contre l'élément Douleur en général.

**Dose.** — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Le flacon : 15 francs.

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## ANTASTHÈNE

**Composition.** — Reconstituant du système nerveux, à base de glycérophosphates associés à un extrait cérébral et spinal.

**Forme.** — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

**Indications.** — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

### MODE D'EMPLOI.

*Enfants* : 1 injection tous les 2 jours.

2 comprimés par jour aux repas.

*Adultes* : 1 injection par jour.

4 comprimés par jour aux repas.

Prix : 20 francs la boîte (12 amp. ou 50 compr.).

**Laboratoire de Biologie Appliquée**

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>**

54, faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**V. BORRIEN, Docteur en pharmacie.**

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées.)

## ANTÉLOBINE

(Lobe antérieur d'hypophyse.)

**Composition.** — Hormone sexuelle du lobe antérieur d'hypophyse, physiologiquement titrée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant excitant de l'ovaire, l'Antélobine est la clef du fonctionnement ovarien. Elle agit, par l'intermédiaire de l'ovaire, sur l'ensemble du tractus génital.

**Indications.** — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, d'agénésie et d'hypogénésie sexuelle; aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la puberté, troubles de la ménopause naturelle. N'agissant que par l'intermédiaire de l'ovaire, l'Antélobine est sans action chez les ovariectomisées totales.

**Posologie.** — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (solution aqueuse) titrées à 20 unités par ampoule. Une série de 6 injections sous-cutanées commençant vers le quinzième jour qui précède la date présumée de la prochaine menstruation.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique  
des D<sup>rs</sup> Dufour et Le Hello.

Médication fondée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

**Indications.** — Hémorragies et Etats hémorragipares. Hémoptysies. Hémostase pré-opératoire.

**Posologie et mode d'emploi.** — Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule de 10 cc., à renouveler au besoin après quelques heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## **ANTHRACALCINE**

**Granulé friable.**

**Composition.** — Charbon animal rigoureusement décyanuré, Benzonaphtol, Urotropine.

**Indications thérapeutiques.** — Dilatation d'estomac, Pyrosis, Flatulences, Etats pré-ulcéreux, Fermentations intestinales, Ptose abdominale, Aérophagie, Entérite, Affections de la vessie, Auto-intoxication, Dermatoses.

**Mode d'emploi.** — Une ou deux cuillerées à café après chacun des deux principaux repas.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires SAUBA**  
**MONTREUIL—PARIS.**

---

## **ANTHRASEPTOL**

**du Docteur DAYNEZ**

Granulé uroformine, charbon, citrate de soude et magnésie.

**Propriétés.** — Absorbant, Antiseptique intestinal, biliaire, urinaire, Cholagogue, draine la vésicule. Laxatif léger.

**Indications.** — Aérophagie, Fermentations intestinales, Colite, Appendicite chronique, Cholécystite, Infections des voies urinaires et biliaires, Migraines, Colibacillose, Syndrome entéro-rénal, Angiocholite, Lithiase.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café une heure après le repas, midi et soir.

**Pharmacie BAUDE**  
**SAINT-AUBERT (Nord).**

## ANTHRAXONE FORNET VACCIN BUCCAL CONTRE LA FURONCULOSE

**Principe actif.** — Staphylocoques de différentes souches, spécialement préparés.

**Indications.** — Traitement spécifique de la Furunculose.

**Posologie.** — 1 à 3 pilules, 3 fois par jour, 1/2 heure avant les repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Fait disparaître les Furoncles naissants, fait mûrir les autres.

Prix : 29 francs.

Vente et échantillonnage :

**Laboratoire de Microbiologie**  
23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).  
Gutenberg 03-45.

## ANTIALGOS CHRISTIAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

Solution diiodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique .....	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner).....	1 gr. environ.
Excipient. Q. s. pour 100 cc.	

**Dose et mode d'emploi.** — *Accès* : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

**Indications thérapeutiques.** — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE  
DE LA PLACE ROYALE**

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS  
Compte Postal Paris 234-33. R. C. Reims 4478.

## **ANTIASTHMATIQUE DOMERGUE**

**Principes actifs.** — Valérianates de Caféine et de Théobromine.

**Indications.** — Toutes dyspnées, Asthme, Emphysème, Toux, Bronchites chroniques, Affections cardiaques, Insomnies, Névralgies.

**Présentation.** — Capsules.

**Doses médicamenteuses.** — 2 à 6 par jour, par deux à la fois de préférence, matin ou soir ou matin et soir.

La boîte de 30 capsules : 18 francs.

**Laboratoires DOMERGUE**  
AGEN (Lot-et-Garonne).

---

## **ANTIASTHME BENGALAIS**

Poudre fumigatoire à base de  
Solanées nitrées, digitale et menthol.

**Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.**  
**Calme la toux.**

**Mode d'emploi.** — Faire brûler une pincée de poudre sur une soucoupe et aspirer doucement la fumée par les narines.

**Indications.** — Crises d'asthme, Emphysème, Oppressions des bronchites chroniques, Catarrhes, Coryza spasmodique, etc.

**Cigarettes Schulzé-Bengalais**  
aux mêmes principes.

**Laboratoires FAGARD**

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
Tél. : Molitor 07-05.

**DERNEVILLE**

7, rue de Joncker — BRUXELLES (Tél. 111-73).

## ANTI-ASTHMINE DEHAUSSY

*A tout asthme, quelle que soit sa forme, il faut une même médication de fond visant le déséquilibre vago-sympathique commun à tous ces malades.*

### Médication de fond.

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobelie, Belladone, Arrhénal.

**Médication complémentaire**  
*particulière à chaque variété d'asthme.*

### Médication de la crise :

*Antiasthmine E* : éphédrine naturelle (à donner par comprimé de demi-heure en demi-heure dès le début de la crise). Sédation en 20 à 30 minutes.

### Médication d'entretien :

10 à 20 jours par mois pour éviter la réapparition des crises. Donner suivant les cas :

*Antiasthmine A* (iodure) : asthme sec.

*Antiasthmine B* (expectorants, balsamiques) : asthme vieilli avec bronchite chronique et emphysème.

*Antiasthmine C* (iodure-caféine) : Asthme vieilli avec retentissement cardiaque, dyspnées paroxystiques des vieux scléreux pulmonaires.

### Posologie :

#### Adultes :

*Comprimés* : 2 à 3 par 24 heures.

*Sirop* : 2 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

*Pilules* : 4 à 6 par 24 heures.

*Enfants*, 10 ans : demi-dose.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.



## ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

**Indications thérapeutiques.** — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attache à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante, et lutte contre l'amaigrissement causé par l'excès de désassimilation.

### Composition et Mode d'emploi :

*Elixir* contenant : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur.

— — — 0 gr. 021 saccharine par verre à liqueur.

Un à 2 verres à liqueur après chaque repas.

Prix : 18 francs.

### Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## ANTIDOULEUR BARBESSOU

Liqueur de goût et de saveur agréables.

**Indications.** — Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes, Sciatiques, Lumbagos, Règles douloureuses, Grippe, Algies diverses.

**Composition.** — Salicyl. double de Diméthyl-phenyl et d'oxyaminothéine dans un excipient hydroalcoolique sucré aromatisé à l'Angélique.

**Dosologie.** — 2 cuillerées à café : jusqu'à 6 par jour.

*Enfants* : 1/2 doses.

**Avantages.** — Action rapide, sûre, constante, pas d'accoutumance, pas d'accumulation.

Prix au public : 8 fr. 50 (le flacon de 10 doses).

**Laboratoires BARBESSOU**  
MARMANDE (Lot-et-Garonne).

## ANTIFLUOR

**Formule et composition.** — Extrait hydro-alcoolique de *Basilicum viride*, associé à l'Extrait de Buchu et de Tolu.  
Forme liquide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action sur les muqueuses de l'appareil génital de la femme. Tarit les sécrétions. Action décongestive sur l'appareil utéro-ovarien. Médication bien tolérée par les voies digestives.

**Indications.** — Vulvo-vaginites, Leucorrhées, Uréthro-ovaro-salpingites. Troubles de la puberté et de la ménopause.

**Doses.** — 2 cuillerées à soupe par jour, pur ou dilué.  
Prix : 16 francs.

**Laboratoire de l'ANTIFLUOR**  
26, rue des Petits-Champs — PARIS.

---

## ANTIFURONCULEUX DOMERGUE

**Principes actifs.** — Aniline parasulfonate de Sodium. Méthylpyrazolone. Alcalins. Bardane.

**Propriétés.** — S'oppose au développement du Staphylocoque. (Réussit même alors que les autres moyens ont échoué.)

**Présentation.** — Cachets (boîtes de 24).

**Durée du traitement.** — Minimum 21 jours.

**Emploi.** — 2 cachets par jour, demi-heure avant chacun des 2 principaux repas.

La boîte : 16 francs.

**Laboratoires DOMERGUE**  
AGEN (Lot-et-Garonne).

## ANTIGÉNINES

### Vaccins par voie buccale.

500 milliards de microbes par ampoule de 10 centimètres cubes.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 25 francs.

### Antigénine C. E.

*Colibacilles-Entérocoques* : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

### Antigénine C.

*Colibacilles polyvalents* : Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

### Antigénine S.

*Staphylocoques polyvalents* : Anthrax, Furunculose, Staphylococcies.

### Antigénine E. P. S.

*Entéro-Pneumo-Streptocoques* : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

### Antigénine T. A. B.

*Bacilles typhiques, Para A. et Para B.* : Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.

**Posologie.** — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

*Aux nouveau-nés et enfants* : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

### Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale.

Boîte de 3 ampoules. Prix : 25 francs.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par 1/2 centimètre cube, augmenter de 1/2 centimètre cube chaque jour, jusqu'à 2 centimètres cubes.

### Bouillon-Antigénine pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

### Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique.

Boîte de 4 ampoules. Prix : 15 francs.

### Ovules-Antigénines : métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 15 francs.

### Laboratoire des ANTIGENINES

1 place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(Anciennement 43, rue Tournefort.)

Gobelins 26-21.

## ANTIGONOL

**Formule et composition.** — Extrait hydro-alcoolique de *Basilicum viride*, forme liquide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif de la douleur dans les affections aiguës de l'urèthre, tarit les sécrétions, toujours bien toléré par les voies digestives, sans action irritante sur le foie et les reins.

**Indications.** — Uréthrites de toutes natures. Blennorrhagies, Cystites.

**Doses.** — De 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, pur ou dilué.

Prix : 20 francs.

### Laboratoire de l'ANTIGONOL

26, rue des Petits-Champs — PARIS.

---

## ANTIGRIPPINE MIDY

**Cachets dosés à 0 gr. 65.**

Poudres d'aconit, de belladone, de gelsemium et de Dover, codéine, caféine, phénacétine et pyramidon (1 cgr. par cachet).

Ni quinine, ni antipyrine.

**Doses et mode d'emploi.** — Pour les adultes seulement, dès le début de la grippe, prescrire de préférence :

1 cachet vers 17 heures,

1 cachet vers 21 heures,

le lendemain et jusqu'à la fin de l'attaque, 1 cachet matin et soir, dans une boisson chaude (alcoolisée) ou tisane (verveine ou menthe).

**Propriétés thérapeutiques.** — Antithermique, Analgésique.

**Indications.** — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbatures, Névralgies.

### Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## ANTINÉASE

**Composition.** — Gélose, kaolin, magnésium hydrocarbonaté. Forme granulée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Pansement gastrique, transforme l'excès nuisible d'H-Cl en chlorure de magnésium naissant.

**Indications.** — Aigreurs, hyperchlorhydrie, ulcère de l'estomac. Prévient le cancer.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café le matin à jeun et 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

Prix : 12 fr. 50.

**M. SALAVERT**

**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

**SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde)**

---

## ANTIPHI

Le plus rapide reconstituant. Médication Arsénio-Phosphorée par sensibilisation.

**Deux formes.** — Elixir. Solution.

**Indications.** — Etats prétuberculeux. Tuberculoses apyrétiques. Surmenage. Toutes les anémies. Convalescences. Neurasthénies. Enfants chétifs.

**Posologie.** — *Elixir* : Un petit verre après les deux repas.

*Solution* : Une cuillerée au milieu des deux repas.

**Laboratoires de l'ANTIPHI**

**JEAN CAPIN, Docteur en Pharmacie**  
**ROQUEFORT (Landes).**

## ANTIPHLOGISTINE

**Composition.** — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria, Eucalyptus).

**Propriétés.** — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'elle attire et engloutit.

**Indications.** — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

**Particularités.** — Pâte molle, se délivre en boîtes fer-blanc embouties d'environ : 150 grammes, 300 grammes, 450 grammes, 900 grammes, 2 kg. 500. Se chauffe au bain-marie, s'applique directement sur la peau ; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

**Laboratoires de l'ANTIPHLOGISTINE**

**B. TILLIER, Pharmacien**

11, rue du Petit-Parc — SAINT-MAUR, près PARIS.  
R. C. Seine 56-956.

---

## ANTIPHYMIQUE VADAM

Chimiothérapie anti-tuberculeuse et anti-infectieuse pulmonaire. Cinnamate de benzyle, Cholestérine, Iode combiné, Gaïacol, Eucalyptol, Goménol, Huile d'arachide neutralisée, stérilisée, q. s. p. 1 cc. 1/2.

Résultats certains chez les malades curables (Antisepsie, Cicatrisation et Histogenèse, Reprise de poids), 1 ampoule tous les deux jours, ou chaque jour (réchauffer l'ampoule au B-M avant l'emploi)  
Injection indolore, résorption aisée.

Prix au public, boîte de 12 ampoules : 22 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 82-1.

Echantillons et littérature aux

**Laboratoires J. PLÉ, Docteur en pharmacie**  
111 bis, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ANTIPIOL

**Vaccin filtrat antipyogène polyvalent.**  
Immunisation locale suivant la méthode de Besredka.

### Trois formes :

- 1<sup>o</sup> Pommade pour pansements non adhérents.
- 2<sup>o</sup> Ampoules de 10 cc. pour compresses.
- 3<sup>o</sup> Ampoules de 1 cc. pour oto-rhino  
et oculistique.

**Indications.** — Furoncles, Phlegmons, Abcès, Plaies infectées, Plaies variqueuses, Ostéomyélites, Gerçures des seins, Crevasses et toutes blessures ou maladies de la peau.

Prix : Les 3 formes : 12 fr.

**Laboratoire de Biologie médicale**  
7, avenue des Sources — NICE.

---

## ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum  
Myagrium, Laurium, Spirea, etc.

**Indications.** — Traitement des hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer des SUPPOSIT-CONES ANTIRRHOÏDES qui plongés dans l'huile antirrhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 26 fr. — Le demi-flacon : 14 fr. 85.

La boîte de supposi-cônes : 12 fr.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ANTISCIATIQUE P. CHAMBON

**Indications.** — Traitement étiologique et rapide de la *Sciatique*, du *Rhumatisme*, du *Lumbago* et des différentes manifestations de l'*Arthritisme*. Aucune contre-indication.

**Composition.** — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (manganèse, magnésium, calcium, nickel, fer et excipient lactosé).

**Forme.** — Paquets de poudre soluble dans l'eau.

**Mode d'emploi très important.** — Sept paquets par jour, d'heure en heure, sans discontinuer malgré les repas; chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte ordinaire (30 paquets)..... 12 fr. 50

Triple boîte (90 paquets)..... 33 fr. 50

Boîte-Cure (pour 21 jours de traitement)..... 50 fr. »

La Boîte-Cure renferme 21 gros paquets spécialement dosés pour le flacon gradué contenu aussi dans la boîte; le malade fera dissoudre un paquet dans le flacon plein d'eau, et absorbera toutes les heures, pendant 7 heures, une cuillerée à soupe de cette solution.

**Laboratoire P. CHAMBON**

place Francheville — PERIGUEUX (Dordogne).

## ANTI-URIQUE DE CONTREXÉVILLE

Granulé effervescent dissolvant de l'acide urique et des urates; antiseptique urinaire; anti-floculant.

### Composition :

Citrate sodique de Pipérazine.. 4 p. 100

Héxaméthylène-tétramine .... 1 —

Benzoate de soude..... 5 —

**Indications.** — Lithiase gravelle, Goutte, Obésité, Artério-Sclérose, Rhumatisme déformant et chronique.

**Doses.** — 2 à 3 cuillerées à dessert par 24 heures dans un verre d'eau immédiatement avant les repas.

**Maison du Docteur PILLET**

5, avenue Victoria — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques microbiens.

**Antivirus colibacillaire.**

**Antivirus staphylococcique.**

**Antivirus streptococcique.**

**Antivirus mixte (strepto-staphylococcique).**

**Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).**

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 12 fr.

— de 12 — 4 cc. — : 20 fr.

— de 6 — 4 cc. — : 10 fr.

**Antivirus puerpéral (streptococcique)** en boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 20 fr.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

**Antivirus mixte en pommade (Arapal) :**

10 fr. et 5 fr.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

**Produits de « La BIOTHÉRAPIE »**

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV°).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales. A base de principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne : Artériosclérose, Cardiopathies artérielles, Angine de poitrine, Ménopause, Congestions hémorragiques, Néphrites, etc.

Deux formes :

Cachets : 1 à 3 par jour. — Comprimés : 2 à 6 par jour.

Prix : { 12 fr. la boîte de cachets } sans impôt.  
 { 12 fr. la boîte de comprimés }

Littérature et échantillons :

**Laboratoires CARESMEL**

2, quai Paul-Bert — TOURS.

Téléphone : 19-42.

## ANUSOL MIALHE

Iodo-résorcino-sulfite de bismuth.

### Forme :

Suppositoires ; pommade.

### Indications :

**Hémorroïdes.**

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

### Dose :

Un suppositoire matin et soir.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## ANXIOL (comprimés)

### Forme pharmaceutique et composition.

Ephédrine naturelle (chlorh.).	0,01	Extrait d'Euphorbia....	0,02
Hypophyse.....	0,02	— de Cratægus....	0,02
Belladone stabilisée.....	0,01	— de Scille .....	0,005
Phényléthylmalonylurée .....			0,01

pour 1 comprimé.

**Propriétés et avantages.** — Synergie médicamenteuse permettant de rétablir l'*Equilibre humoral* par une action simultanée, légèrement *Excitante* sur le *Sympathique* et *Inhibitrice* sur le *Pneumo-gastrique*. L'association éphédrine hypophyse a l'avantage d'une action *rapide* et *durable* par la voie *buccale*.

**Indications thérapeutiques.** — *Asthme bronchique*, *Emphysème*, *Dyspnées asthmatiformes*, *Rhume des foins*, *Vertiges*, *Migraine*, *Hypotension* avec état dépressif. *Spasmes viscéraux*. *Dysménorrhée*, *Petit mal des rayons X*, *Allergies diverses*.

**Mode d'emploi.** — 4 à 8 compr. par jour chez l'adulte ; 1 à 2 compr. par jour chez l'enfant au-dessus de 5 ans ; 1 à 4 compr. par jour chez l'adolescent. Chez l'asthmatique, 2 compr. à jeun le matin et 2 le soir 2 et en cas de menace de crise. Débuter par des doses faibles chez les individus à tension un peu élevée.

**Prescription** (strictement médicale). — 1 étui comprimés *Anxiol Falvy*.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris.  
40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## ANXIOSEDINE

Médication sédative et régulatrice du Système nerveux.

**Forme. —** Sirop.

### Composition :

Codéine .....	0,005
Extr. mou de Jusquiame .....	0,03
Extr. mou d'Aconit .....	0,0025
Extr. mou de Salix Alba.....	0,30
Extr. fluide de Passiflore .....	0,50
Teint. Cratægus Oxyac. ....	XV gouttes.
Sirop d'Ecorces d'oranges amères glycér.....	Q. S.

Pour une cuillerée à café.

**Indications thérapeutiques. —** Anxiété, Dyspnée anxieuse, Oppression, Etats spasmodiques, Neurasthénie, Mélancolie, Hypochondrie nerveuse, Angoisse, Toux et insomnies nerveuses,

**Dose. —** Déséquilibre du système nerveux : 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Insomnies nerveuses : 1 à 3 cuillerées à café le soir en se couchant dans une tisane.

Prix : 16 fr.

Echantillons :

**Laboratoire de THÉRAPEUTIQUE**

74, Faubourg d'Ambrail

EPINAL (Vosges)

## APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

**Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : Aphloïa, Piscidia, Hamamelis, Hydrastis et Viburnum.**

**Indications. —** Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).

Sédatif utéro-ovarien.

**Posologie. —** Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

Prix au public : 16 fr.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels

PARIS (XI<sup>e</sup>)

## APHOSAL

Spécifique de l'insomnie,

Chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

**Composition.** — Chloralose chimiquement pur, préparé d'après les travaux des professeurs Ch.-Richet et Hanriot.

**Présentation.** — Tube de 12 cachets de 20 centigr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique ; sans action sur le rein, ni l'estomac. Tonique du cœur.

**Posologie.** — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Prix : 9 fr. 75.

**Laboratoire de l'APHOSAL**

48 bis, avenue Mozart — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## APPETYL

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille. Extrait délipoidé de muqueuse gastrique.

**Donne de l'appétit. — Aide la digestion. — Favorise l'assimilation des médicaments.**

Ne contient ni AS ni P.

**Posologie.** — Aucune contre-indication, XV à XX gouttes un quart d'heure avant les repas dans un liquide sucré ou mieux encore sur un morceau de sucre. Enfants : 1/2 dose.

Prix : 15 francs pour 25 à 30 jours de traitement.

**Laboratoires de l'APPETYL**

3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise).

## **AQUINTOL PETIT-MIALHE**

### **COQUELUCHE**

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux. Le malade n'éprouve plus de suffocation ni de vomissements, il retrouve l'appétit et le sommeil.

#### **Doses :**

Au-dessous de 6 mois :	2 à 4 cuill. à café.
Moins de 5 ans :	3 à 8 — à café.
Moins 15 ans :	4 à 8 — à dessert.
Adultes :	5 à 8 — à soupe.

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

**Laboratoire du Docteur MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

---

## **ARAPAL**

Bouillon-Vaccin en pâte molle, non grasse, contenant 75 p. 100 d'Antivirus Strepto-Staphylococcique Mixte de *La Biothérapie*.

Son excipient non gras évite toute macération et cloisonnement des exsudats.

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Pyodermites, plaies infectées, Brûlures, etc...

**Présentation.** — En tubes.

Grand modèle : 10 francs.

Petit modèle : 5 francs.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ARCANAN

Marque déposée.

Atophan quininique . . . .	0 gr. 141
Atophan.....	0 gr. 134
Urotropine.....	0 gr. 225

**Forme :**

Boîte de 10 cachets à 0 gr. 50.

**Indications :**

Traitement et prophylaxie de la *grippe* et des affections des voies respiratoires supérieures.

**Mode d'emploi :**

3 à 4 fois par 24 heures : 1 cachet pendant le repas, accompagner l'emploi de l'Arcanan d'un verre d'eau de Vichy ou autre boisson alcaline.

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>)

## ARCICA

**Composition.** — Ampoules buvables renfermant par dose cinq mgr. d'arséniate de soude associé à tous les principes actifs, tanniques et toniques, de la coca, cola, cannelle et condurango.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant dans toutes les asthénies, Stimulant de l'organisme.

**Indications.** — Nutrition défaillante ou déficiente, Suites postopératoires, suites d'accouchement, Convalescence, Surmenage, Anémie, Rachitisme tardif, Neurasthénie, Lymphatisme, Diabète.

**Nota Bene.** — L'Arcica répond aux desiderata de certaines caisses concernant les lois sociales actuelles : ce n'est ni un vin, ni un élixir, ni un aliment. C'est un médicament concentré que le malade peut prendre pur ou additionné, à son goût, de vin liquoreux ou d'eau sucrée.

**Dose journalière.** — Le contenu d'une ampoule avant le repas de midi. Chez les personnes très anémiées, ou chez les enfants (au-dessus de 12 ans seulement), une demi-ampoule.

**Laboratoire du DELTA**

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Trudaine 45-18.

## ARDOGÈNE

Elixir fortifiant, Reconstituant physiologique, Stimulant énergique Hyperleucocytaire, Antichlorotique. Goût exquis.

**Indications.** — Convalescence, Faiblesse générale, Chlorose, sous toutes ses formes, Grippe, Neurasthénie.

Une cuillerée à soupe contient :

Arrhénal ..... 15 milligr.

Phosphate de soude ..... 15 centigr.

Quinium..... 45 milligr.

T<sup>re</sup> de Noix vomique : III gouttes.

Extrait fluide de kola : XX gouttes.

### Doses :

*Adultes* : Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur midi et soir avant les repas.

*Enfants* : A partir de 10 ans, une cuillerée à café midi et soir avant les repas.

Flacon : 20 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

**Laboratoire LEPORCQ**

9, rue du Temple, ENGHIEEN-LES-BAINS (S.-et-O.).

## ARGION

Désinfectant général dans toutes les affections internes et externes.

Infections intestinales, infections rénales, affections stomacales, fièvres infectieuses, affections rhino-pharyngiennes.

**Forme.** — Comprimés.

**Mode d'emploi.** — Affections internes.

Adultes : 3 à 6 comprimés par jour, de préférence après les repas. Enfants : 1 à 3 comprimés. Croquer le comprimé ou l'écraser dans un peu d'eau.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires BELIÈRES**

19, rue Drouot — PARIS.

## ARGYBIL

**Composition.** — Complexe de Vitellinate d'argent (Argyrol de BARNES) et de bile.

**Présentation.** — Liquide.

**Indications.** — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

**Mode d'emploi.** — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

## LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS.

---

## ARGYCUPROL

Traitement intégral et polyvalent  
de la BLENNORRAGIE.

Injection urétrale non caustique, absolument indolore et ne provoquant jamais de rétrécissement.

**Composition.** — Argent colloïdal (10 p. 100), détruit le gonocoque. Cuivre colloïdal (0,1 p. 100), attaque les microbes associés.

**Forme.** — Boîte de 6 ampoule-injections.

**Indications.** — Activité remarquable et tolérance parfaite aussi bien dans les urétrites les plus aiguës que dans les urétrites chroniques.

S'emploie en injections urétrales dans les cas aigus, en grands lavages dans les cas chroniques ; en compresses sur les bourses dans les orchites blennorragiques ; en instillations dans les conjonctivites blennorragiques.

Chez la femme, la blennorragie, les métrites, les vulvites et vulvo-vaginites sont justiciables du traitement par l'Argycuprol.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE (Seine).

MORO, ph. de 1<sup>re</sup> cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.



# ARHÉMAPECTINE GALLIER

## Antihémorragique

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

**Solution** isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante de *Pectine*, associée à son coferment minéral (Calcium).

La **Pectine**, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, C. R. Ac. Médec., 4 nov. 1924).

### Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix : 20 fr.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — 12 fr.

**Indications et Posologie.** — *A titre thérapeutique* : Toutes Hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc.

*Faire boire*, dans un peu d'eau sucrée, 1 à 4 ampoules en 2 heures, selon la gravité de l'hémorragie.

*A titre préventif* : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

Une à quatre ampoules durant les dix heures qui précèdent l'opération.

Dans les cas d'hémorragies massives ou persistantes on se trouvera très bien d'injecter (sous-cutanée) 20 cc. d'*Arhémapectine* une ou deux fois dans la journée.

Ne présente aucune contre-indication.

### Laboratoire R. GALLIER

Pharm., Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
38, bd du Montparnasse — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléph. : Littré 98-89.

## ARHÉOL

**Formule.** —  $C^{16} H^{24} O$ .

**Composition.** — Principe actif de l'essence de santal.

**Forme.** — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 18 environ de produit.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal, supérieure elle-même aux essences de Cèdre.

**Indications.** — Blennorragie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

**Dose.** — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir avant les repas.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène digalacol tannin. Composé chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

**Indications.** — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

**Mode d'emploi.** — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *maux de gorge*.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## ARISTARGOL

Association 9 parties Ichtyol, 1 Argent colloïdal, Antiseptique, Décongest., cicatrisant, Résolutif. Non caustique.

**Ovules à 1 %** (Pansem. vag.).

**Poudre à 1 % Alcaline** (Inject. gynécologie, toilette muqueuse, yeux. O. R. L.).

**Pommades :**

**Aristargol D à 1 %** : Dermatologie.

**Aristargol A** (id. + stovaine 1 %) : Hémorroïdes.

**Aristargol U à 10 %** : pansement utérin (à appliquer par le médecin seulement).  
Prix de vente au public : 14 francs.

**Laboratoire GALBRUN**

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>)

## ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent  
à 40 p. 100 de mercure.

**Mode d'emploi.** — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

**Indications.** — Toutes manifestations syphilitiques.

**Avantages.** — Injection non douloureuse, absence de nodosités, tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure. Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'hygiène.

Flacon de 5 gr. : 22 fr.

Se fait aussi sous la forme suppositoires.

**Pharmacie VIGIER-LESURE**

70, rue du Bac — PARIS.

## ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

**Composition.** — Complexe de Ferro-manganèse codiastasique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

**Propriétés.** — Hématopoïétique, phagocytogène et névrosthénique.

**Indications.** — Toutes les **anémies** et les **asthénies**, le **surmenage des écoliers**, et les **convalescences**.

**Mode d'emploi.** — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

Prix : 15 francs la boîte de 60 pilules.

**G. BERGEVIN**

Docteur en pharmacie  
CHATEAUDUN (Eure-et-Loir).

## ARSÉCRINOL

**Médication spécifique des asthénies.**

**Composition :**

*Eléments catalyseurs sous forme organique :* arsenic, fer, phosphore, manganèse.

*Eléments opothérapiques :* extraits *totaux* de foie et capsules surrénales.

**Forme pharmaceutique.** — Granulé très agréable, fondant.

**Indications thérapeutiques.** — *Toutes les asthénies et déficiences organiques.* Gripes, états pré-tuberculeux, dépression générale, convalescence, surmenage intellectuel, retards de croissance, rachitisme, grossesse, anémies, etc.

*Action très efficace. Aucune contre-indication.*

**Doses.** — *Enfants :* 1 à 3 cuillerées à café par jour.

*Adultes :* 4 —

Croquer au milieu ou avant les repas. Arrêter le traitement pendant quelques jours et reprendre.

Prix : Le grand tube : 20 fr. (sans impôt).

*Échantillons, littérature :*

**Laboratoires LERSAM**

17, rue Saint-Saëns — PARIS (XV<sup>e</sup>.)

## **ARSÉNIODE BURIAT**

**Forme Gouttes.** — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

**Indications.** — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatico-arthritique.

L'Arséniode donne toujours de l'appétit.

**Mode d'emploi.** — Doses moyennes.

Enfant : II gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : XV à XXX gouttes, 2 fois par jour.

Prix : 14 fr.

**Laboratoire BURIAT**

25, rue Copernic — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## **ARSENOGYL**

**Pâte dentifrice à base  
de Novarsenobenzol.**

Prévention et traitement des Pyorrhées,  
Gingivites, Stomatites simples ou  
médicamenteuses, etc...

Le tube : 6 francs.

**Laboratoire RAVAUD**

6, place de Breteuil — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 14-85.

## ARSÉNOMYL

**Nouvel arsénobenzol.**

Très puissant tréponémicide en solution aqueuse stable préparée d'avance.

**Indications.** — Syphilis, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du Sommeil.

**Formes.** — Ampoules pour injections intra-musculaires de solutions d'ARSÉNOMYL aqueuses glucosées préparées d'avance et indolores.

**Posologie.** — *Adultes* : débiter à 0 gr. 30. Augmenter progressivement les doses à 0 gr. 50, 0 gr. 70, 0 gr. 90, 1 gr. 05, suivant les malades.

Chez l'enfant les doses sont de 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 02, 0 gr. 03, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20

**Etablissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).

---

## ARSÉNOS-SOLVANT

**Adopté par les hôpitaux**

Serum glucosé avec addition de Gaïacol et de Chlorétone pour injections hypodermiques d'arsénobenzènes

— Indolores —

**Présentation.** — Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.

Voir *Sulfarsénol*.

**Laboratoires de Biochimie Médicale**

**Ch. Desgrez**, Docteur en Pharmacie.  
19-21, rue Van Loo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléphone : Auteuil 26-62, 04-30.

## ARSI-STRYCHNAL LONGUET

Association « Strychnal-Cacodylate de Na »  
des dérivés non-toxiques de la strychnine  
et de l'arsenic.

Strychnal ..... 0 gr. 01

Cacodylate de Na..... 0 gr. 25

Sérum isotonique Q. S..... 3 cm<sup>3</sup>

par ampoule.

Injection rigoureusement indolore.

**Doses.** — 1 à 2 ampoules par jour.

**Indications.** — Anémie, Convalescence.  
(Voir Strychnal Longuet).

La boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 18 fr.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS.

## ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur.

**Formes.** — Ampoules dosées à 0,05, 0,10,  
0,20 et 0,50 pour applications progressives  
(*bien spécifier*).

**Indications thérapeutiques.** — Accéléra-  
teur de la nutrition générale, ramenant  
l'appétit, etc.

Tout spécialement désigné pour l'usage  
sous-cutané.

**Doses et mode d'emploi.** — Une injection  
par jour pendant huit jours, repos un  
temps égal, reprise en alternant jusqu'à  
guérison.

La première spécialité à base d'arsenic  
organique (1900).

Prix de vente au public : 12 fr. 50.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## ARSYLÈNE « ROCHE »

Acide allylarsinique.

L'Arsylène « Roche » est un arsenic organique nouveau qui, sur les préparations inorganiques, arséniates, arsénites, liqueur de Fowler, etc., etc., possède l'avantage d'une *toxicité pratiquement nulle*, laquelle permet son emploi à doses élevées, sans craindre la brusque apparition de phénomènes d'arsénicisme tels que sécheresse de la gorge et de la bouche, troubles digestifs et nerveux, symptômes cutanés, bouffées congestives, essoufflement, hyperthermie, etc. ; il est en outre *très bien toléré* par les voies digestives, ne provoque pas de dégagement d'oxyde de cacodyle (odeur alliagée de l'haleine) et il est *utilisé presque complètement* dans l'économie ; peut être substitué en toute sécurité, par le médecin traitant, aux cacodylates généralement employés, dans toutes leurs indications et à toutes doses.

### Indications thérapeutiques.

Affections nerveuses et mentales, *sclérose en plaques, Parkinson, contractures, chorée, mélancolie, anxiété, maladies de la peau, psoriasis, affections parasitaires, tuberculose au début, anémie grave, période de dépression du traitement Bi ou Hg*, toutes les *Anémies* et toutes les *Asthénies*.

### Posologie et modes d'emploi.

*Thérapeutique intensive.* — 1 à 4 ampoules de 5 cc. à 0,20 tous les 2 ou 3 jours en injections intramusculaires ou endoveineuses *absolument indolores*.

*Thérapeutique toni-stimulante.* — 1 ampoule de 2 cc. à 0,05 par jour et plus par voie hypodermique ou intramusculaire (injections *absolument indolores*). — *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose.

*Thérapeutique d'entretien.* — *Granules* à 0,01 : 1 à 3 granules. — *Enfants* : 1/4 à 1/2 doses selon l'âge, avant chaque principal repas.

### ARSYLÈNE « ROCHE »

*Granules* : Flacon de 60.

*Ampoules de 2 cc.* : Boîte de 12.

*Ampoules de 5 cc.* : Boîte de 12.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## ARTERASE

**Composition.** — Ail, gui, silice, citrate et formiate de soude, marron d'Inde, cupressus, prêle.

**Propriétés.** — Abaisse la tension artérielle. Diminue la viscosité sanguine. Active la circulation dans les capillaires et les veines. Arrête les hémorragies.

**Indications.** — Cœur, artères, veines. Présclérose, artériosclérose, hypertension, hémorragies (nasales, oculaires, cérébrales, etc.), hémiplegies, œdèmes. Etats congestifs, vertiges, bourdonnements, troubles visuels. Troubles de la ménopause.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 à 2 pilules le matin, à midi et le soir, soit 3 à 6 pilules par jour. Continuer 5 jours, cesser 2 jours et recommencer. Au début du traitement, la dose de 6 pilules par jour sera préférée pour être ramenée à 3 par la suite. Pas de contre-indications.

**Laboratoires Biologiques**

**E. GILBERT, Docteur en Pharmacie**

6, rue du Laos — PARIS (XV°).

---

## ARTÉRION VINCARDI

### HYPOTENSEUR

**Principes actifs.** — Complexes stabilisés extraits du *Viscum album*, de *l'allium sativum*, du *fucus vesiculosus*, du *citrus limonum*. Nitrite sodium.

**Forme.** — Comprimés lenticulaires glutinisés. **Innocuité absolue**, tolérance parfaite. Pas de contre-indication.

**Indications.** — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il dégrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

**Doses.** — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Littérature et échantillons sur demande :

**Laboratoire VINCARDI**

**Ph. VIGUIER, pharmacien**

14, avenue G.-Clemenceau — NICE (Alpes-Maritimes).

Chèques postaux : Marseille 105-38.

R. C. Nice 9046.

## ARTÉRIO-VEININE

**Composition.** — Crataegus, passiflora, gui, marron d'Inde, hamamélis (Extraits stabilisés), iode peptonisé.

**Indications.** — Troubles de la Ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

**Forme.** — Gouttes.

**Doses.** — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires J. KRIEGER**

121, avenue de Saint-Ouen  
PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## ARTHRILAX

**Poudre granulée sodique effervescente.**

Deux cuillerées à café = 10 grs de poudre, contiennent :

Sulfate de soude .....	1 gr. 40
Phosphate de soude .....	0 gr. 60
Citrate de soude .....	1 gr.
Bicarbonate de soude .....	0 gr. 60
Sucre effervescent .....	Q. S.

**Dose moyenne.** — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café dans un verre d'eau chaude, le matin à jeun, ou bien fractionner en plusieurs doses avant ou après les repas.

**Indications.** — Arthritisme et ses douleurs, Congestions hépatiques.

Goutte, Obésité, Migraines, Uricémie.

Hypertension artérielle.

Eczémas, Affections de la peau.

Constipation chronique, Infections gastro-intestinales,

Gastro-entérites aiguës, subaiguës.

Gastralgies, Dyspepsies, Gastrites.

*En résumé, toutes les indications de la formule de Bourget.*

Prix : 18 fr. 50.

Durée du flacon : 2 à 3 semaines.

**A. LYONS, Pharmacien**

30, rue Monge — PARIS (V<sup>e</sup>).

## ARTORADINE

**Hypotenseur radioactif.**

**Composition.** — Iodure de Potassium et Arséniate de soude associés au Bromure de Radium soluble.

**Avantages.** — Suppression par la radioactivité induite des doses massives et, partant, du iodisme. Vitalisation des cellules artérielles par l'action directe du Radium. Innocuité absolue. Conservation indéfinie.

**Indications.** — Artériosclérose, présclérose, aortite, asthme, angine de poitrine, œdème, arthritisme.

**Posologie.** — 4 à 6 pilules (kératinisées) par jour en deux fois au milieu des repas.

**Laboratoire de Radiumthérapie**  
25, rue Vaneau — PARIS.

---

## ARVENSYL

**Formule :**

Phytothérapie associée aux alcalins (Formules dépuratives de BROCCQ).

Une cuillerée à bouche dans un verre d'eau correspond à une infusion de Bardane, Pensée sauvage, Séné lavé à l'alcool, Saponaire, Cassis, Gentiane, et à un verre de la Solution de Bourget.

**Indications.** — Traitement interne des Dermatoses, Hépatisme, Manifestations cutanées de l'Arthritisme.

Par cuillerées à café, ou cuillerées à bouche suivant le cas, dans un verre d'eau avant les repas ou le matin à jeun.

**Laboratoires GERDA**  
163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON

## ASCÉINE

**Analgésique, sédatif, antirhumatismal.**

Acet-salicyl - para-acet - phénétidine - caféine.

Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur.

**Indications.** — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc., Grippe. Arthrites aiguës et toutes manifestations fébriles ou rhumatismales.

**Doses.** — Adultes : 2 à 4 comprimés par jour ; enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Le tube de 20 comprimés : 4 fr. 50.

La pochette de 4 comprimés : 1 franc.

**LABORATOIRES O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## ASCIATINE

Diméthylamido-phényl-diméthyl-pyrazolone-butylchloral.

Antinévralgique, analgésique et hypnotique.

*Action élective dans le domaine du trijumeau.*

**Indications.** — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

**Présentation et posologie.** — Comprimés à 0 gr. 25 (boîtes de 12, 24). 1 à 3 comprimés par dose, 4 à 5 comprimés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## ASCOLÉINE RIVIER

L'ASCOLÉINE est à base de lipéide phosphoré iodé de foie de morue. Elle renferme les vitamines A et C, la **vitamine D à l'état naturel**, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

**Indications.** — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, prétuberculose.

**Quatre formes.** — *Solution huileuse* : Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

*Comprimés* (véritables bonbons) : 1 à 5 comprimés suivant l'âge avant chaque repas.

*Granulés* : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

*Ampoules* : Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Toutes pharmacies ou à défaut chez :

**Henri RIVIER**, Pharmacien

26-28, rue Saint-Claude — PARIS.

## ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

**Formule.** — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

**Indications.** — Antisepsie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, fleurs blanches, ulcération du col de la matrice, toilette intime.

**Avantages.** — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

**Emploi.** — *Poudre* : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir.

*Comprimés* : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

**Prescrire** : Une aseptone, poudre ou comprimés.

Littérature et échantillons.

Prix au public : 10 francs.

**Laboratoires MOULIN**

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

## ASEPTO-POUDRE

(Paquets)

Antiseptique désinfectant.

**Composition :**

Pour un paquet :

Trioxyméthylène . . . . .	0,10
Borate de soude . . . . .	6
Essence de thym . . . . .	IV gttes

**Indications.** — Hygiène intime des deux sexes, suites de couches, pertes fétides, pertes blanches, métrites.

**Avantages.** — Dissolution parfaite, odeur agréable.

**Posologie.** — 1 paquet par injection.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Thérapéutique normale

Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

## ASEPTORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

**Composition.** — Hyposulfite de soude associé au **Bromure de Radium** en solution stable, rigoureusement dosée, d'absorption agréable.

**Propriétés.** — Action du Bromure de Radium sur les échanges biochimiques. Action réductrice et désensibilisatrice de l'hyposulfite de soude sensiblement accrue par radioactivité induite (Ravaut, *Presse médicale*, 1920, Missirliu, *Thèse* 1922).

**Indications.** — Tous les Eczémas, Psoriasis présentant des poussées aiguës, Dermatoses évoluant par poussées récidivantes, Urticaires, Prurits, Dermites artificielles, Furunculose (Werner, Action du Bromure de Radium sur le staphylocoque).

**Posologie.** — XX à XXX gouttes avant chaque repas dans un liquide très sucré.

Aucun des inconvénients des doses massives d'hyposulfite de Na: ni diarrhée, ni éructations soufrées.

Établissements **LABORADIUM**

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

## ASEPTORHINE

Huile aromatique, balsamique et antiseptique à base d'éphédrine, d'adrénaline, d'anesthésine et d'huiles essentielles.

**Indications.** — Désinfection habituelle des fosses nasales, coryza, ozène, rhinites, polypes, ulcérations, protection contre les maladies infectieuses.

**Mode d'emploi.** — En gouttes ou, mieux, en pulvérisations, 2 ou 3 fois par jour.

Dépôt général :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II<sup>e</sup>).

## ASEPTOVULES

Calmant cicatrisant aux essences antiseptiques.

### Composition :

Essence de Géranium. ....	0,0125
Essence de Thym. ....	0,0125
Essence de Verveine. ....	0,0125
Essence d'Origan. ....	0,0125
Résorcine. ....	0, 10
Chloral. ....	0, 07
Menthol. ....	0, 06
Glycérine solidifiée, Q. S. pour un ovule.	

### Indications :

Métrites, Vaginites, Véritable pansement gynécologique.

### Posologie :

Un ovule le soir en se couchant.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire de Thérapeutique normale**

**Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe**  
46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

## ASTASOL DOUETTEAU

**Composition.** — Poudres de plantes sélectionnées d'HYDRASTIS et d'HAMAMÉLIS rendues d'assimilation facile.

Formule rationnelle permettant l'emploi de ces deux plantes *sans incompatibilités chimiques*.  
Action thérapeutique *plus puissante que celle des extraits et teintures*.

**Forme.** — Cachets de petit diamètre.

**Indications.** — Troubles du système veineux, Stases veineuses, Varices, Congestions, Phlébites, Hémorroïdes.

**Doses.** — 3 cachets par jour avant les repas.  
Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 233-2.

**Laboratoires DOUETTEAU frères**

20, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

---

## ASTHMAPHÉDRINE

**Tubes de 20 comprimés.**

**Composition.** — Bellad. pulv., 10 mgr.; Ephédr. hydrochlor., 25 mgr.; Æthylmorph. hydrochlor., 15 mgr.; Kal orthogujacolumsulfonic., 100 mgr.; Natr. benz., 50 mgr.; Sacch. lact.; Acac. gum.  
Pro tablet. compres. un.

**Indications.** — Traitement de l'Asthme et de la bronchite chronique.

**Posologie.** — 1 à 4 comprimés une demi-heure avant les repas.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois

BRUXELLES



## ASTHMO-ACTINE

**Eupnéique, Antispasmodique, Toni-Cardiaque.**  
Le plus fort Elixir antiasthmatique connu.

**Composition. — Synergie totale :** Respiratoire, circulatoire et sympathique.

Une cuillerée à soupe contient : iodure de caféine 0,50, teinture de lobélie 0,50 ; Ext. thébaïque 5 milligr. Ext. belladone 1 milligr. Ars. de soude 1 milligr. Ext. grindélia 0,10... et.

**Nouveauté. — Ext. Actœa 0,05. Ext. nat. surrénale** au 1/10.000 0 gr. 07 dans sirop antiasthmatique stimulant diffusible pour 15 cc.

**Indications. — Asthmes divers. Emphysème. Dyspnée des gazés, Catarrheux, Intoxiqués, etc...**

**Action rapide curative et préventive.**

**Posologie. — Adultes :** 1 à 3 cuillerées à soupe par jour loin des repas dans un peu d'eau ou de lait. **Enfants :** par cuillerées à café.

Le flacon 210 cc. : 15 fr.

**Laboratoires G. BERTHON Pharmacien.**  
DORNES (Nièvre).

## ASTHMOLYSIN

**Composition. —** Solution stérile et isotonique du principe actif de la surrénale additionné d'un extrait d'hypophyse. Ne contient *aucun* narcotique.

**Propriétés. —** Jugule en peu de temps les accès d'asthme bronchique, empêche leur éclosion, rétablit l'eupnée, facilite l'expectoration. Effet rapide et continu. Action très efficace, préventive et curative. Pas d'accoutumance. Tolérance remarquable.

**Forme. —** Ampoules de 1 centicube.

**Indications. —** *Asthme bronchique*, asthme et rhume des foins, angine de poitrine, collapsus cardiaque et vasculaire, pneumonies et broncho-pneumonies (complications de grippe).

**Posologie. —** Injection sous-cutanée de 1 cc., le contenu d'une ampoule ; éventuellement, en cas de crise grave, une deuxième et troisième injection. Pour les enfants : diminution relative de ces doses.

**Laboratoires D. C. E.**

**Henri HOFSTETTER**

6, rue des Cigognes — STRASBOURG (Bas-Rhin).

## ATHÉROLYSINE

Spécifique de l'Artériosclérose et de ses conséquences.  
Silicate de Soude chimiquement pur et Extrait Aqueux de Viscum Album (extrait de Gui avec ses indosés organiques).

**Propriétés thérapeutiques.** — L'ATHÉROLYSINE est le traitement *étiologique et symptomatique* de l'Athérome et des troubles concomitants propres à la cinquantaine (Silicate de Soude, antiscléreux, Viscum Album hypotenseur).

**Indications.** — Présclérose-Artériosclérose et Hypertension. Toutes Scléroses, Vertiges, Obnubilation intellectuelle, Céphalées, Bourdonnements d'oreilles, Troubles oculaires, Perte de la mémoire, etc.

**Forme.** — Granulés, comprimés-pastilles.

**Posologie.** — *Granulés* : 1 à 3 cuillerées à café.

*Comprimés* : 2 à 6 par jour.

(Conforme aux prescriptions légales, l'Athérolysine peut être prescrite aux Assurés sociaux.)

Le flacon : 14 fr.

**Laboratoire JONIDS**

DIJON.

## ATOMINE

**Composition.** — Acide phénylcinchoninique, Phosphate de soude.

**Indications.** — Solvant urato-oxalique en milieu alcalin grâce au phosphate de soude associé ; très bien toléré.

Rhumatismes aigus ou chroniques, Sciatiques, Goutte, Lumbago, Algies, sédatif rapide de la douleur.

**Doses.** — Cas aigus : 3 à 6 cachets par jour pendant 5 jours ; cesser 5 jours et reprendre.

*Cas chroniques ou atténués* : 2 cachets par jour pendant 5 jours, cesser 5 jours et reprendre.

Absorber avec tisane sucrée.

**Laboratoires L. Boize et G. Alliot,**

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

## ATOPHAN-CRUET

Marques déposées.

Acide phénylquinoléine 2 — carbonique 4.  
Produit chimique pur. N'est pas un mélange  
de médicament.

**Formes.** — Boîtes de 20 cachets ou comprimés à 40 centigrammes.

**Indications.** — Rhumatismes, goutte, névralgies.

**Mode d'emploi.** — Trois fois par jour un cachet ou comprimé pendant le repas. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

Prix : 16 francs net (exempt d'impôt).

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## ATOPHANYL

Marque déposée.

**Atophan sodique.** — Salicylate de soude.  
Eau stérilisée.

**Forme.** — Boîtes à 5 ampoules pour injections intraveineuses ou intramusculaires.

**Indications.** — Formes graves et rebelles du rhumatisme musculaire ou articulaire, goutte, névralgies.

Prix : 36 francs net (exempt d'impôt).

---

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## **ATOQUINOL CIBA**

### **Spécifique anti-goutteux**

Phénylcinchoninate d'allyle. Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

**Indications.** — Diathèse urique en général : Goutte, Rhumatisme goutteux, Dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

**Doses.** — Etats aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

La boîte de 20 cachets : 15 francs.

Le flacon de granulé : 18 francs.

(Voir *Sanoquinol*).

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**  
109-113, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON.

---

## **ATURAL**

### **Composition**

Poudre à base d'antilab-ferment et de citrate de soude.

### **Action :**

Produit physiologique, absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum du jeune veau.

Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale.

### **Indications :**

Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte.

Mauvaise digestion du lait et ses conséquences : vomissements, diarrhée verte des nourrissons, gastro-entérite, troubles digestifs divers.

### **Mode d'emploi :**

Une mesure (environ 1 gr.) pour 100 gr. de lait.

(Ne jamais porter à haute température.)

Prix : 14 francs.

**Laboratoires RENARD**

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

## AUDIGENINE

**Forme.** — Comprimés.

**Composition.** — Di-iodo-antipyrine, (2,5 %) et Bromures alcalins (92,5 %).

**Indications.** — Traitement médical interne de la Sclérose de l'oreille moyenne et du tympan. Surdit . Vertiges. Bourdonnements.

**Mode d'emploi.** — 2 comprim s au milieu de chaque repas.

(Le traitement doit  tre interrompu 10 jours chaque mois).

*Litt rature et  chantillons*

**Laboratoires E. VAILLANT & Cie**

19, rue Jacob — PARIS (VI ).

---

## AVISTYL

**Serum normal d'oiseau.**

Autoris  par le d cret n  66 du 22 janvier 1932. (Cette autorisation ne garantit pas l'efficacit  du produit.)

**Origine.** — Ce s rum est extrait du sang de dindons parfaitement sains, ayant subi l' preuve de l'intradermotuberculisation avec une tuberculine mixte, humaine, bovine et aviaire.

**Action.** — Ce s rum, qui est le r sultat de plusieurs ann es de recherches et d' periences, agit d'une fa on  lective sur le terrain pulmonaire. C'est une m dication v ritablement sp cifique des maladies du p umon.

**Indications.** — Pneumonie, Bronchites aigu s et chroniques, Broncho-pneumonies, Congestions pulmonaires, Emphys me, Pleur sie, Grippe et catarrhes pulmonaires, Tuberculose au d but, Toux rebelles d'origine pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — Injections de pr f rence intra-musculaires (r gion scapulaire) de deux ampoules par jour dans les cas aigus et de deux ou trois ampoules par semaine dans les cas chroniques.

Litt rature- chantillons sur demande adress e :

D p t g n ral :

**Laboratoire PERICHON**

11, rue Lepic — PARIS (XVIII ).

## AZIGOL THEVENOT

**Crises convulsives. États nerveux.**

**Composition.** — Tartrate Borico-Calcique, Phényl-éthylmalonylurée. Extrait de Gelsémium et de Piscidia.

**Forme.** — Dragées.

**Indications.** — Toutes crises nerveuses, Epilepsie, Convulsions. Tous états nerveux : Asthme, Prurit, Eczémas, Urticaire, Hyperexcitabilité, Asthme infantile.

A l'action suspensive des crises par le Phényléthylmalonylurée s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits végétaux qui diminuent la sensibilité périphérique et de certains organes, origine des réflexes déclenchant les crises.

**Dose.** — 2 à 6 comprimés par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

**Enfants :** 1/2 à 1 comprimé par jour.

Prix du flacon de 40 dragées : 18 francs.

**Laboratoires THEVENOT — DIJON.**

---

## AZOTYL

**Composition.** — Lipoïdes spléniques et biliaires, cholestérine, goménol, camphre, Irradiés aux rayons ultra-violets.

**Forme.** — Ampoules et pilules.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication antibacillaire (tuberculoses).

**Doses et mode d'emploi.**

A. (Ampoules) injections sous-cutanées ou intramusculaires (tous les jours ou tous les deux jours).

B. Pilules glutinisées, six par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Prix de vente au public. Ampoules : 22 fr. ;

Pilules : 16 fr. ☉

**LABORATOIRES « LOBICA »**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII°).

## AZUFROL

*Soufre colloïdal.*

**Description.** — 1° *Capsules* glutinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° *Pommade* à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

**Action thérapeutique.** — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

**Indications.** — 1° *Capsules* : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif y adjoindre les injections de sulfuron (voir plus loin).

2° *Pommade* : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

---

## AZYM

**S'oppose à la lenteur des digestions.**

**Présentation.** — Poudre.

**Composition.** — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café après le repas... 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommodé. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

**Indications.** — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

**Prix** : 14 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-2.

**Laboratoire PARET**

22, rue Guibal — MARSEILLE.



## BABEURRE GUIGOZ

La Soupe de Babeurre GUIGOZ en poudre. Ne comporte pas de farines, mais des dextrines. Sa cuisson est, en conséquence, inutile et les ferments lactiques conservent toute leur activité.

Sa conservation est remarquable.

Littérature et échantillons :

## LE LAIT GUIGOZ

19, rue J.-J.-Rousseau — PARIS (1<sup>er</sup>).

Tél. : Gutenberg 73-00.

---

## BABEURRE « LA FAYE »

Préparé avec du lait frais à la Ferme de « La Faye » à Marlhès (Loire).

### Présentation :

- 1<sup>o</sup> Babeurre ordinaire (étiquette blanche) aux farines, aussi nourrissant que le lait, d'une digestion très facile. Pour les enfants et les adultes.
- 2<sup>o</sup> Babeurre léger (étiquette bleue) sans farine, alimentation transitoire, d'une digestion extrêmement facile, convient tout particulièrement aux enfants débiles, aux prématurés, aux vomisseurs. Est tout indiqué également pour les hépatiques.
- 3<sup>o</sup> Babeurre gras (étiquette rouge) suralimentation. Dans la convalescence, la croissance, peut remplacer le Yoghourt. Plus nourrissant et plus digestible que le lait.

Fournisseur des Hôpitaux, des municipalités de Lyon et de Saint-Etienne depuis 25 ans.

Echantillons et littérature sur simple demande :

**JEAN COURBON LA FAYE**

Ferme de « La Faye »

MARLHES (Loire).

## BABEURRE NUTRICIA

**Composition.** — Lait écrémé ensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

**Présentation.** — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré. Babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

**Indications thérapeutiques.** — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia, par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé.

Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment.  
Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

**Mode d'emploi.** — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

**Léon CLAEYS**

1, Boulevard St-Martin — PARIS (3°).

Téléphone : Turbigo 92-60.

---

## BACILLACTINE NUTRICIA

**Ferments lactiques purs vivants.**

**Forme.** — Comprimés (Bacillactine) et poudre (Oto-Rhino-Bacillactine).

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour, selon l'âge (le tiers de la dose 1/2 heure avant ou après chaque repas) dans les affections gastro-intestinales, *les troubles digestifs des nourrissons*, rougeurs, eczémas, croûtes de lait, urticaires, digestions laborieuses, les lésions inflammatoires du milieu buccal, etc. Les doses indiquées peuvent être forcées sans aucun inconvénient.

**Nota.** — La date limite d'utilisation est mentionnée, intérieurement et extérieurement, sur toutes les boîtes de Bacillactine Nutricia ; elle vous garantit la fraîcheur et l'activité du produit.

**Laboratoires NUTRICIA**

142, rue Fransman — BRUXELLES II.

# BACKERINE

## ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie.  
Modifiant l'organisme par développement des agents  
de fermentation.

**Formes.** — Ampoules, cachets, dragées.

**Indication.** — Traitement de toutes les hyperplasies  
(tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

**Mode d'emploi.** — Injecter une ampoule SOUS LA  
PEAU, tous les quatre à six jours. On prescrira en  
même temps l'usage des dragées ou des cachets de  
ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'effi-  
cacité des injections. Prendre avant les repas, quatre  
cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans  
les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 25 francs.

La boîte de cachets ou de dragées : 16 francs.

**LABORATOIRE AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## BACTÉ-PHAGES

du Professeur d'Hérelle.

Préparations de Bactériophages mono ou polymicrobiens.

**Mode d'action.** — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

- 1<sup>o</sup> Qui détruit et dissout les bactéries.
- 2<sup>o</sup> Qui se régénère au cours de la lyse.
- 3<sup>o</sup> Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

### **Avantages :**

- 1<sup>o</sup> Action puissante et rapide.
- 2<sup>o</sup> Innocuité absolue.
- 3<sup>o</sup> Pas de contre-indication.

## **I. — BACTÉ-INTESTI-PHAGE**

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.).

**Indications.** — Entérites, Colites, Diarrhées infantiles.

**Mode d'emploi** — Ingestion buccale : Une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline.

## **II. — BACTÉ-COLI-PHAGE**

**Composition.** — Mélange de bactériophages adaptés à de nombreuses variétés de bacilles Coli ou paracoli.

**Indications.** — Colibacilluries, Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Prostatites, etc.

**Mode d'emploi.** — Ingestion buccale : une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline. Instillation vésicale. (Voir notice explicative.)

**Très important.** — L'action du Bacté-Coli-Phage est nulle en milieu acide. Il est donc nécessaire d'obtenir l'alcalinisation des urines.

### III. — BACTÉ-PYO-PHAGE

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.).

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées.

**Mode d'emploi.** — Injection « in situ » (méthode RAIGA) dans le foyer même de l'infection ou dans la région enflammée pouvant passer rapidement à l'état aigu.

### IV. — BACTÉ-STAPHY-PHAGE

**Composition :**

Mélange de bactériophages adaptés aux diverses variétés de Staphylocoques (Aureus-Citreus-Albus).

**Indications :**

Furonculoses aiguës et chroniques, Anthrax, Infections urinaires à staphylocoques.

**Mode d'emploi :**

Injections « in situ » (méthode RAIGA). Applications locales en cas d'ulcération.

## V. — BACTÉ-RHINO-PHAGE

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques, etc.).

**Indications.** — Grippe, Coryza, Rhinopharyngites, Otites, Sinusites.

**Mode d'emploi.** — Pulvériser suivant la gravité des cas la valeur d'une ou plusieurs ampoules au moyen du pulvérisateur spécial : Pulvolyseur Ercé.

## VI. — BACTÉ-DYSENTÉRI-PHAGE

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes de la dysenterie bacillaire (Flexner, Shiga, Hiss).

**Indication.** — Dysenteries bacillaires sous toutes les formes.

**Mode d'emploi.** — Ingestion : Une ampoule dans un demi-verre d'eau ordinaire froide ; répéter la dose de quatre en quatre heures.

---

Agents Généraux :

Laboratoires **ROBERT** et **CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

## BACTIOXYNE

**Formes.** — Gouttes.

Ampoules pour instillations rectales.

Ampoules pour injections intraveineuses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Manganate calcico-sodico-potassique. Médication antibacillaire, hyperoxydante et recalcifliante.

**Indications.** — Prétuberculose ganglionnaire et osseuse.

**Posologie.** — LX à C gouttes 2 fois par jour, de X à XXX gouttes pour les enfants; en augmentant progressivement de 1 à 2 par jour.

Prix de vente au public : 25 francs.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1<sup>er</sup>).

---

## BAIN BAGNOR RADIO-ACTIF

Seul approuvé et autorisé par l'établissement thermal de **BAGNOLES-DE-L'ORNE**.

**Composition.** — Synthèse des éléments minéraux du complexe salin de **BAGNOLES-DE-L'ORNE**. Suractivé par le bromure de radium, l'alun et le bicarbonate de soude.

**Présentation.** — Un paquet de mélange salin pour un bain de 200 litres. A faire dissoudre au moment de l'emploi.

**Indications.** — Troubles circulatoires de toutes natures. Phlébites, Varices, Stase veineuse, Rhumatismes chroniques, Névralgies et toutes affections douloureuses.

**Posologie.** — Cure intensive : 3 bains par semaine pendant 6 semaines.

Cure d'entretien : 1 bain par semaine.

**Laboratoires G. TIXIER**

55, rue du Centre — PANTIN (Paris-est).

## BAIN CARBOGAZEUX WOLO

**Forme.** — Poudres dont les dissolutions successives dans l'eau du bain sursaturent cette eau d'acide carbonique.

**Indications.** — Maladies des organes circulatoires (Cœur, Hypertension, Artério-sclérose), Maladies dites d'échanges internes (Goutte, Rhumatismes), du Système nerveux (Névralgie, Neurasthénie, Surmenage cérébral, etc.).

**Mode d'emploi.** — Verser successivement les sachets 1 et 2 dans le bain en brassant l'eau. Se plonger dans l'eau en laissant agir le dégagement gazeux. La température sera de 30 à 35 degrés, sauf indications spéciales du médecin. Durée du bain : 15 à 20 minutes.

Prix : 8 fr. 45.

**Laboratoires FISCH et Cie**  
4, rue d'Illzach — MULHOUSE  
Agence à PARIS :  
104, faubourg Poissonnière (X<sup>e</sup>).  
Tél. : Lamartine 92-52.

## BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

**Composition.** — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

**Indications.** — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatisme, arthritisme.

*Enfants* : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

**Gynécologie** : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 boîte par bain.

*Enfants* : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

**LANCOSME**

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## BAIN SALVIA

(Un traitement « aux Eaux » chez soi.)

**Composition.** — Silicate de magnésie hydraté, perborate de sodium, nitrate d'uranium.

**Présentation.** — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

**Indications.** — Stases veineuses (Varices, phlébites), arthritisme, rhumatismes et dépression générale. Soins gynécologiques.

**Posologie.** — Un bain à la température d'environ 37°, pendant 20 minutes, traitement de 21 jours. En gynécologie : 1 cuill. à soupe par litre d'eau.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 136 fr. 50 ;  
au corps Médical, 91 fr. 50.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à une station thermale peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures « aux eaux ».

**Pilules Salvia :** Traitement interne des stases veineuses, varices, hémorroïdes, ménopause, puberté, par l'extrait mou de **Teskra**.

**Laboratoires VENOT**

139, avenue Emile-Zola — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## BALDISEDAN

(BALsamique, DIurétique, SÉDatif, ANti-septique.)

### Composition.

Salol .....	0.02
Benzo-Naphtol .....	0.02
Extrait mou d'uva ursi....	0.05
Hexaméthylénetétramine...	0.05
Térébenthine de Venise....	0.05
Acide camphorique.....	0.10
Excipient q. s. pour une pilule glutinisée.	

### Indications.

#### Cystites.

Colibacilluries et toutes Pyuries.

Pyélo-néphrites. Cholécystites.

Gonorrhées et complications.

#### Propriétés thérapeutiques.

Antiseptique et Sédatif génito-urinaire.

Aseptise et clarifie les urines

dont il modifie le p. H.

Tolérance parfaite, sans aucune contre-indication.

### Doses.

4 à 5 pilules avant chacun des deux principaux repas.

---

Littérature et échantillons :

Laboratoires du **BALDISEDAN**

133, rue Lecourbe — PARIS.

Téléphone : Vaugirard 48-10,

## BALLOTYL

**Agent le plus efficace  
de la Phytothérapie antispasmodique  
Sédatif du grand sympathique.**

**Composition.** — Ballote stabilisée.

**Deux formes pharmaceutiques.** —  
Gouttes et dragées.

**Posologie.** — Irritabilité nerveuse, Insomnie, L à C gouttes au coucher ou 1 à 3 dragées.

Etats sympathicotoniques ou vagotoniques,  
5 prises de XXX gouttes ou 3 à 5 dragées  
par 24 heures.

Prix au public : 15 francs.

**Laboratoire de PHYTOTHERAPIE  
de PARIS**

**M. GUILLON, Pharmacien.**

113, boulevard Voltaire — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## BALMIGA

**Tablettes fumigatoires.**

**Forme pharmaceutique :**

Tablettes comprimées effervescentes.

**Composition :**

Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

**Action :**

Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

**Indications :**

Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

**Mode d'emploi :**

Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

**Prix : 6 francs.**

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND**  
Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V<sup>e</sup>).

## BALSAMOL LESCÈNE

**Composition.** — Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoate de Benzyle.

**Formes.** — Sirop, Comprimés.

**Caractéristiques.** — Produit non toxique plus calmant que le bromoforme, les composés forméniques et les narcotiques. *Chez les enfants*, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois.

Antiseptique des voies respiratoires.

**Indications.** — TOUX, COQUELUCHE, toux émétisante des tuberculeux, asthme, *toux des vieillards*. GRIPPE.

**Doses.** — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour.

Prix : Sirop, 12 francs. Comprimés, 11 fr. 90.

**Laboratoires L. LESCENE**

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

## BALSOFORME

Mélange de Schleich  
additionné de Gomenol Prevet  
(formule du docteur Siauve-Evausy).

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Gomenol.

**Indications.** — Anesthésie générale, exempte de complications pulmonaires post-anesthésiques.

**Mode d'emploi.** — S'administre à l'aide de l'appareil d'Ombredanne. Une ampoule de 60 grammes suffit pour une anesthésie de plus d'une heure.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## BANIKOL

(Procédé André Lancien).

*Médication iodée sans iodisme ni troubles gastriques.*

**Composition.** — Comprimés de 0.20 dosés à 1 centigr. d'iodure de tétra-méthyl ammonium en association nucléo-albuminique et argentique.

**Propriétés et mécanisme thérapeutiques.** — Absorption, sans provoquer d'iodisme, de doses importantes d'iode à l'état naissant. Les comprimés sont dissociables dans l'intestin seulement, totalement absorbés et leurs éléments se répandent rapidement dans l'organisme. L'élimination est en grande partie rénale et cutanée.

Le BANIKOL agit comme *Régulateur* des fonctions hépatique, biliaire, rénale :

*Accélérateur* des oxydations organiques, de la régénération cellulaire, de toutes les sécrétions glandulaires, de la croissance retardée par l'insuffisance endocrinienne, de l'élimination urique et uratique dont il augmente le taux.

*Antiseptique* des voies intestinale et rénale, réalisant par ses éléments constitutifs un puissant agent anti-infectieux.

*Sédatif* dans les douleurs articulaires, goutteuses et sciatiques.

*Curarisant* de 1<sup>er</sup> ordre et hypotenseur.

*Décongestif* notamment dans les stases viscérales à tendance hémorragique consécutives aux diverses scléroses.

**Posologie.** — *Cas aigus*, 5 comprimés le matin, 5 comprimés le soir. *Cas chroniques*, 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir, 10 jours de suite, se reposer 10 jours. Cure 1 mois.

**Indications.** — Lymphatisme, Adénopathie, Gbésité. Rhumatisme, Sclérose viscérale, Tertiarisme.

**NOTA.** — Ni toxicité, ni choc, ni trouble d'aucune sorte. Assimilation et action rapide, pas d'incompatibilité médicamenteuse.

Laboratoire Biologique G. CHAUZEIX.

26, rue Pradier — VILLE-D'AVRAY (Seine-et-Oise.)

## BASEDOWINE

**Indications.** — Maladie de Basedow frustre et constituée. Nervosisme féminin. Instabilité thyroïdo-ovarienné. Psychismes thyroïdo-ovariens. REGLES DOULOUREUSES et PUBERTE.

**Composition.** — Thyroxine synthétique dosée en quantité extrêmement faible (0 gr. 000125 par comprimé), Ovarine et Hormone ovarienne contrôlée à l'unité souris (2 1/2 unités par comprimé), un dérivé du Bromure en très faible dose.

**Particularités.** — Médication parfaitement inoffensive.

**Traitement d'essai** de toutes les déficiences et irrégularités du système sympathico-endocrinien chez la femme.

**Posologie.** — 2 comprimés le soir au coucher 5 fois par semaine. (A continuer sans danger.)

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## BAUME ADOL

**Composition.** — Préparation à base de : Acide salicylique, Salicylate d'Amyle, Gaïacol, Menthol, Chloroforme.

**Action thérapeutique.** — Analgésique puissant, anti-rhumatismal. Suppression de l'odeur désagréable du salicylate de méthyle.

**Indications.** — Rhumatismes aigus ou chroniques, goutte, lumbago, *torticolis*, zona, sciatique, névralgies, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, orchites, etc...

**Mode d'emploi.** — Faire une friction légère et une onction et recouvrir d'ouate et de tissu imperméable. Une à deux applications par jour.

Prix : 8 fr. 50.

**Laboratoire ADOL**

**L. GIROUD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

78, Cours de la Liberté — LYON.

## BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général

**Composition et forme.** — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques.....	6	Salicylate d'amyle .....	4
Beurre de muscades .....	2	Acide salicylique.....	3
Vaseline.....	60		

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique et résolutif puissant. Odeur agréable.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, *torticolis*, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

**Mode d'emploi.** — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre ou du thorax et des reins. Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter

## BAUME BENGUÉ

Analgésique.

**Composition.** — Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

**Indications.** — Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

**Mode d'emploi.** — En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

**Docteur BENGUÉ**

Pharmacien

• 16, rue Ballu — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## BAUME DAYNOC

Le spécifique des brûlures.

Le BAUME DAYNOC offre la solution définitive et complète du traitement des brûlures de tous degrés, par son efficacité absolue et la simplicité de son emploi. En effet, une seule application *immédiate*, en couche épaisse, supprime instantanément la douleur et empêche les phlyctènes ; donc pas de plaie.

Aucune préparation préliminaire n'est nécessaire. On étend le BAUME sur toute la surface de la brûlure tel qu'il sort du tube. La peau n'est jamais tachée.

**Indications.** — Brûlures causées par flamme vive, graisse bouillante, courant électrique, sucre cuit, eau bouillante, vapeur, charbon rouge, métal chauffé à blanc, verre en fusion, etc., toutes sans exception, de la plus légère à la plus grave, relèvent du BAUME DAYNOC.

Prix du grand tube ..... 15 fr. 95 (impôt compris).

Prix du petit tube ..... 8 fr. 50 (impôt compris).

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## BAUME DELACOUR

*Gerçures et Crevasses des Seins*

*Gerçures en général.*

**Baume benzo-tannique**

**Mode d'emploi.** — Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec deux bouts de sein :  
6 fr. 50.

**Henry ROGIER**, Docteur en Pharmacie  
56, boulevard Péreire — PARIS.

## BAUME DE LA MATERNITÉ

### Composition :

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,10
Résorcine.....	0,20
Acide borique.....	2 gr.
Dermatol .....	0,50
Baume du Pérou .....	0,10
Lano-vaseline.....	Q. S.
pour un tube.	

**Propriétés thérapeutiques.** — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

**Indications.** — Erythème fessier, toutes gerçures en général.

Prix, le tube : 5 fr.

Dépôt : **Laboratoires NOGUES**  
7, rue Galvani — PARIS.





## BAUME DU D<sup>r</sup> BAISSADE

**Composition.** — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

**Action.** — Anti-prurigineux et analgésique, supprime immédiatement les Démangeaisons et la Douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

**Indications.** — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furonculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

**Mode d'emploi.** — En onction douce (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Prix au public : 10 fr. et 15 fr. 50.

**Laboratoire du Baume du D<sup>r</sup> BAISSADE**  
Saint-Loup — MARSEILLE.

## BAUME

du Dr Serin de Gaillac.

**Indications.** — Rhumatismes, Maux de reins, Goutte, Sciaticques, Lumbagos, Torticolis, Entorses, Foulures, Courbatures, Efforts, Névralgies.

**Composition.** — Pommade en tube à base de térébenthine, Acide orthoxybenzoïque — Extr. Atropa belladonna, odeur agréable.

**Mode d'emploi.** — Onction deux fois par jour, et recouvrir d'une serviette ou d'une flanelle.

**Avantages.** — Action sédative résolutive, analgésique.

Prix au public : 10 fr.

**Laboratoires BARBESSOU**  
**MARMANDE (Lot-et-Garonne).**

---

## BAUME DURET

Créé et adopté à l'hôpital Saint-Louis  
(Dermatothérapie).

**Composition.** — Combinaison de soufre, goudron de Norvège, camphre, huile de cade, résorcine, borate de soude, gaïacol, dans un mélange d'acétone, huile de ricin, lanoline.

**Propriétés.** — Antiseptique, analgésique, décongestif et cicatrisant. Ni toxique, ni irritant.

**Indications.** — Eczéma, Lichen, Psoriasis, Acné, Prurigo, Dartres, Parakératoses, Prurit.

**Mode d'emploi.** — Onction deux fois par jour, recouvrir ensuite d'une compresse de gaze.

Prix : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire National du Contrôle des Médicaments sous le n° 306-3.

**H. ROUTIER, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
20, rue Saint-Lazare — PARIS.

## BAUME IKI

Pommade fondante à l'I et KI

Formule :

Iode bisublimé .....	1 gr.	} pour 100 grammes de pommade.
Chlorhydrate d'ammoniaque. ....	1 gr.	
Iodure de potassium.....	4 gr.	
Iodure de plomb .....	4 gr.	

Par un procédé spécial de fabrication tous les principes actifs se trouvent en dissolution absolue dans le véhicule gras de la pommade.  
**AUSSI PAS DE BRULURE A CRAINDRE.**

**Indications.** — Traitement externe des ADENOPATHIES, OREIL-LONS, Goîtres, Glandes, Kystes, Angines.

**Mode d'emploi.** — En application sur les parties malades. Recouvrir d'une compresse de gaze et d'un enveloppement ouaté. **NE PAS MET-TRE DE BAUME IKI SUR LES PLAIES, COUPURES OU ECORCHURES.**

**Présentation.** — En un original pommadier en verre de 30 gr. bouché au moyen d'une calotte en bois.

Prix : 8 francs.

Produit enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments

**Préparé par Fernand MERCIER**

**Pharmacien, 54, rue d'Etretat.**

**FECAMP (Seine-Inférieure).**

## BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal  
 (Salicylate de Glycol)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.  
 Ne tache pas le linge.

*Indications :*

**Traitement externe des douleurs  
 rhumatismales et des névralgies.**

*Présentation et mode d'emploi :*

Deux présentations : Forme liquide et  
 forme crème.

Onctions légères suivies d'enveloppement  
 ouaté.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPECIA »**

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
 21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## BAUME SÉLÉNIA

### AU SÉLÉNIUM COLLOIDAL

**Propriétés thérapeutiques.** — Il en est quatre principales :

Le **Baume Sélénia** est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, décape les *téguments*, est *cicatrisant*.

**Indications.** — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

**Mode d'emploi.** — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 13 francs.

Echantillon envoyé sur demande.

Préparé par **C. DAVID et ses fils**

Pharmaciens, 49, rue de Bitche — COURBEVOIE  
(Seine).

## BAUME SUELTA

### Pommade à l'Esculéol

**Composition.** — Extrait de Marrons d'Inde stabilisé. Di-Iodosulforésorcinate de Bismuth, Stovaine, Adréraline, Baume du Pérou, Oxyde de zinc.

**Indications et propriétés.** — Traitement local des Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal. **Sédation immédiate de la douleur, décongestion et vaso-constriction**, antiseptie, suppression des hémorragies.

**Mode d'emploi.** — Onction le matin et après chaque garde-robe. Pansement pour la nuit. Une canule s'adapte au tube pour permettre l'application de la Pommade sur les Hémorroïdes internes.

Prix : 13 francs.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

## BAUMOLACPINE

pour bains à l'essence de pin.

**Forme.** — Liquide de fluorescence verte.

**Composition.** — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

**Indications.** — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à soupe par bain.

Prix :	{	Flacon de	30 gr ...	5 fr. 80
		— de	150 gr....	23 fr. 80
		— de	500 gr....	60 fr. »
		— de	1 000 gr....	110 fr. »

**Laboratoires FISCH et C<sup>le</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

---

## BÉATOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif nerveux, Hypnotique.

**Indications.** — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications. Maladies nerveuses ou mentales.

1<sup>o</sup> Forme : Ampoules.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 25
Bromhydrate des copolamine. ....	1/4 de mgr.
Soluté de valériane.....	2 cm <sup>3</sup>

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

2<sup>o</sup> Forme : Liquide.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 18
Valériane stabilisé Q. P.....	5 cm <sup>3</sup>
Extrait de jusquiame .....	0 gr. 015

**Mode d'emploi.** — 1 à 4 cuill. à café par jour, par doses progressives prises dans de l'eau sucrée, avant le repas du soir, ou au coucher.

3<sup>o</sup> Forme : Comprimés.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 18
Intrait de valériane .....	0 gr. 10
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude une heure après le repas.

Prix de vente au public : Comprimés : 14 fr. ;  
Liquide : 14 fr. ; Ampoules : 18 fr.

**LABORATOIRES LOBICA**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## **BEEF LAVOIX**

**ou Vin de Lavoix.**

**Composition.** — A base de vieux vin de Banyuls, le Beef Lavoix contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

**Indications.** — Convalescence.  
Tuberculose.  
Epuisement.  
Inappétence.  
Anémie.  
Grossesse.  
Allaitement.

**Posologie.** — Un verre à madère avant ou après chaque repas.

**Prix :** le flacon, 20 fr. 75 ; le 1/2 flacon, 12 fr. 50

**Maison du Docteur PILLET**  
5, avenue Victoria — PARIS.

---

## **BELHÉMINE**

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval, Sérum hématopoiétique.

**Indications.** — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

**Mode d'emploi.** — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

**Prix public :** 18 francs la boîte de 6 ampoules.  
Compléter le traitement par l'usage de la

### **SANGUIPLASMINE.**

Granulé préparé avec le Caillot sanguin : 2 cuillérées à café par jour.

**Prix au public :** 12 fr. le flacon.

**Littérature et échantillons sur demande :**

**Laboratoire de Sérothérapie**

**H. AMMANN, Pharmacien, Licencié ès sciences.**

**Impasse Adam, 3, BOULOGNE-BILLANCOURT,**

**Tél. : Molitor 01-90.**

## **BELLADENAL « SANDOZ »**

Association de Phényl-éthyl-malonylurée et de Bellafofine.

Sédatif nervin général et des cas résistants.

**Indications spéciales.** — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, douleur morale, vomissements de la grossesse.

**Présentation.** — Tubes de 20 et flacons de 100 et de 500 comprimés.

Boîtes de 5 et de 25 ampoules.

**Posologie.** — *Comprimés* : 2 à 4 par jour. Dans l'épilepsie, 3 à 5 par jour.

*Enfants* : 2 à 4 demi-comprimés.

*Belladenal injectable* : 1 à 4 cc. selon l'intensité des cas.

### **Produits SANDOZ**

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## **BELLAFOLINE « SANDOZ »**

Alcaloïdes totaux de la belladone.

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

### **Posologie :**

*Comprimés* : 1 à 2, trois fois par jour.

*Gouttes* : X à XX, trois fois par jour.

*Ampoules* : 1/2 à 2 par jour (injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses indolores).

*Sirop* : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

### **Naupathie :**

*Bellafofine* : 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures et en plus :

*Belladénal* : 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

### **Produits SANDOZ**

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## BEMAX

**Aliment vitaminé** préparé avec les embryons détoxiqués des céréales (orge, froment, seigle). Une cuillère à soupe de Bemax est plus riche en vitamines que quatre livres de pain complet.

**Préparation.** — Est faite sous la surveillance constante d'un service médical. Par des procédés spéciaux on arrive à conserver et même à concentrer toutes les vitamines (A; B et E) des céréales, surtout les vitamines B.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le plus précieux des compléments de notre alimentation actuelle.

**Indications.** — Tous les troubles, provenant d'une alimentation insuffisante en vitamines.

**Doses.** — Une cuillerée à soupe par jour pour les *adultes*; pour les *enfants* : une cuillère à café. — D'un goût agréable se prend mélangé à n'importe quel aliment au repas du matin et du soir.

Prix : 20 fr. (boîte pour un mois).

**ROBERTS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

5, rue de la Paix — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Opéra 48-91.

## BENSAMINE

**Composition.** — Combinaison boro-benzoïque d'Hexaméthylènetétramine. Antiseptique général interne et anti-infectieux puissant. Action combinée du benzoate et de l'urotropine créant dans son absorption humorale et dans son élimination urinaire le milieu acide favorable au dédoublement de l'urotropine en son composé actif, le méthanal (formol).

**Indications.** — Voies urinaires : urines troubles, alcalines, microbiennes, purulentes. Syndrome entéro-rénal. Pyélites gravidiques, colibacilluries, gravelles.

**Etat général :** Voies biliaires, coliques hépatiques, ictères, septicémies, rhumatismes, arthralgies.

### Formes :

- 1° Comprimés instantanément solubles à 0 gr. 50 de combinaison active. Dose moyenne : 3 à 6 par jour (avalés ou dissous).
- 2° Bensamine liquide : Goût agréable, pure ou diluée : 1 cuillerée à café correspondant à 1 comprimé ; 3 à 6 fois par jour.

**Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE**  
74, quai de Jemmapes — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Botzaris 88-78.

## BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisymphilitique énergique.)

*Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux.*

**Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.**

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacydylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15 ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à fait comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzobismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

*Nota.* — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

**Laboratoires MILLOT**

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 0-69.

## BENZOBROMINE

**Antiseptique Entéro-rénal.**

Diurétique (Acide benzoïque et théobromine).

Antiseptique urinaire (Formine).

Tonique cardiaque (Théobromine).

**Indications.** — Grippe, Scarlatine, Rougeole, Pneumonie, *Pyélo-néphrite*, Fièvre typhoïde. Manifestations entéro-rénales, uricémiques et urémiques.

**Prescrire :** Benzobromine granulé, ou Comprimés, 1 flacon.

**Adultes :** 6 à 8 comprimés ou cuiller à café, par jour avec un peu d'eau.

**Enfants :** Réduire de moitié.

**Laboratoire HERAULT**  
BEAUVAIS (Oise).

---

## BENZOCARBINE

**Antiseptique intestinal.**

**Formes.** — Granulés et cachets.

**Indications.** — Benzo-naphtol, Formine, Noir animal chimiquement pur.

**Indications thérapeutiques.** — Antisepsie du tube digestif, Aérophagie, Pyrosis, Appendicite chronique.

**Posologie.** — *Granulés :* 2 à 3 cuillers à café 3 fois par jour.

*Cachets :* 3 par jour.

**Laboratoire Thérapeutique générale**

**A. FOUCHERE, pharmacien.**

44 bis, rue du Mouillon  
RIVE-DE-GIER (Loire).

## BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes et Comprimés.

### Composition :

Extr. fluide valériane fraîche stabil...	1000
Alcoolature de Passiflora Incarn.....	1000
Teinture de Cratœgus oxyacantha...	1000
Benzoate de benzyle et dériv. benzylés.	10

**Indications.** — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Eréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

**Posologie.** — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion, ou 1 à 3 comprimés. Spasmes : XXV gouttes ou 1 comprimé 3 ou 4 fois par jour. Prix : Gouttes, 13 fr. Comprimés, 15 fr. — Flacon gratuit sur demande.

**Louis JULIEN**, Docteur en Pharmacie  
105, rue de Rennes — PARIS.

---

## BENZO-IODHYDRINE

La BENZO-IODHYDRINE n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du D<sup>r</sup> Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence des Cardio et des Artérioscléreux, des Goutteux, des Emphysémateux. Chaque capsule de gluten correspond à 30 cgr. de KI.

**Doses.** — 3 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Le flacon : 14 francs.

Brochures et échantillons :

**G. BRUEL, Pharmacien**

36, rue de Paris — COLOMBES (Seine).

## BENZOQUINOL

**Composition.** — Benzoate de quinoléine, pyridine, thymol, benjoin mentholé eucalyptolé, aconit, créosote iodée.

**Propriétés.** — Antiseptique et anesthésique des voies respiratoires. Sédatif et antispasmodique certain.

**Indications.** — *Coqueluche, asthme, emphyseme, toux nerveuses, dyspnée, bronchites aiguës et chroniques.*

**Caractéristiques.** — Effet rapide et continu, pas de contre-indication.

**Mode d'emploi.** — En inhalations, quinze gouttes dans un quart de litre d'eau bouillante, deux à trois inhalations par jour.

Pour les enfants en bas-âge, faire les inhalations au pied du lit dans une chambre bien fermée.

**Remarque.** — Que le médecin traite la coqueluche par des vaccins, des injections d'éther, de sérum, il est nécessaire de compléter le traitement par des inhalations au benzoquinol.

Prix : 12 francs.

Laboratoires KERFYSER  
DUNKERQUE.

## BENZYANYL

Valérianate de benzyle.

**Forme.** — Capsules glutinisées dosées à 0 gr. 10 de valérianate de benzyle.

**Propriétés.** — 1° Vasodilatateur et hypotenseur grâce au radical benzyle ;

2° Antispasmodique grâce à l'acide valérianique.

**Indications.** — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, Angine de poitrine, Asthme, Coqueluche.

**Avantages.** — Abaissement simultané de Mx. et de Mn. Suppression rapide des troubles subjectifs. Toxicité nulle, action durable.

**Mode d'emploi.** — *Hypertension* : 6 capsules par 24 heures à distance des repas.

**Autres indications.** — *Adultes* : 2 à 6 capsules.

*Enfants* : 1 à 2 capsules.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE  
37, rue de Bourgogne — PARIS

## BENZYLOCALCIUM

**Recalcification** (Vitaminée Phosphorée) intensive.

**Renforcée par le Fénugrec** (parfaitement désodorisé).

**Assimilation.** — Assurée par les actions combinées :

1° Antispasmodique et hypnotique du *noyau Benzylique*.

2° Antitoxique de la substance *génératrice de Vitamine B*.

### Formule :

Benzylolhypophosphite de calcium .....	7 gr. 50
Fenugrec désodorisé .....	4 gr.
Substance véhicule de Vitamine B (Extraite de Levures) .....	} 2 gr.
0 gr. 01 = $\left\{ \begin{array}{l} 100 \text{ Unités Physiologiques curatives. Unité Pigeon ou,} \\ 200 \text{ Unités Physiologiques préventives. Unité Pigeon.} \end{array} \right.$	

**Formes.** — Le Benzylocalcium se présente sous 2 formes :

*Granulé*, de goût agréable (90 grammes de produit par boîte). 18 francs au public.

*Cachets* (30 cachets par boîte). 20 francs au public.

**Posologie.** — Pour produire le maximum d'effets, le Benzylocalcium doit être pris un quart d'heure avant les repas.

Le granulé peut être croqué ou pris dans un peu d'eau. Dans ce dernier cas, avoir bien soin d'agiter le liquide avant l'absorption.

Chaque boîte contient une petite mesure qui correspond à la valeur d'une cuiller à café.

Cette mesure *bien pleine* représente 1 dose.

**Adultes** : 1 dose de granulé ou 1 cachet, 3 fois par jour avant chacun des repas.

**Enfants de 10 ans et au-dessus** : 1/2 dose de granulé, 3 fois par jour avant chacun des 3 repas ou 1 cachet, 2 fois par jour avant chacun des 2 principaux repas.

**Enfants de moins de 10 ans** : 1/2 dose de granulé, 2 fois par jour avant chacun des 2 principaux repas.

Ces doses, généralement suffisantes, peuvent être largement dépassées, le Benzylocalcium étant absolument inoffensif.

Dans les traitements de longue durée, suspendre la médication une semaine par mois.

**Laboratoires DOR**

**DORANTOW.CZ, Pharmacien**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°).

## BENZYLOL

Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse, à base de Benzoate de Benzyle et de Benzaldéhyde.

*Deux présentations : 1° Gouttes; 2° Perles.*

**GOUTTES.** — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme.

Spécifique de l'Hypertension. Asthme vrai. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Mal de mer.

**Posologie.** — *Adultes* : XXX à XL gouttes toutes les 3 ou 4 heures.

*Enfants* : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

**PERLES.** — Spécifique de la Dysménorrhée (règles douloureuses).

**Posologie.** — Deux perles à un quart d'heure d'intervalle ; 6 à 12 par jour.

Prix : 10 francs.

**Laboratoire E. HAUTDIDIER**

37, rue Galilée — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo-salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par l'eau.

**Composition.** — Menthol et chloral en solution dans le salicylate de méthyle.

**Mode d'emploi.** — Imprégner largement un morceau de flanelle rouge, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé, puis de coton. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du BETUL-OL se fait si rapidement par la peau que 10 minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

**Indications.** — Lumbago, Sciaticques, Douleurs des articulations, Névralgies.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

**Présentation.** — Boîtes de 12 ampoules de 2 cent. cubes rigoureusement titrées à 0 gr. 04 de bismuth métal par cent. cubes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le D<sup>r</sup> L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydro-solubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

**Posologie.** — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série jusqu'à 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 32 francs.

**Laboratoire des ANTIGÉNINES**

1, place Lucien-Herr — PARIS (V°).  
(anciennement, 43, rue Tournefort.) — Gobelins 26-21.

---



## BI-CITROL MARINIER

**L'Agent rationnel de la Médication citratée.**

Citrates monosodique et trisodique en granulé soluble de goût agréable.

**Eupeptique, Cholagogue, Antivisqueux, Décongestif.**

### **Posologie :**

*Dyspepsies, Gastrites, Vomissements :*

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau chaude, au cours du repas et au moment des malaises.

*Insuffisance hépatique, Arthritisme :*

Deux cuillerées à café le matin à jeun dans un verre d'eau tiède ; ou bien une cuillerée à café avant chaque repas.

*Hyperviscosité sanguine :*

(Pléthore, Hypertension, Etats congestifs, Stases veineuses) :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau trois fois par jour avant les repas.

*Pneumonie :*

Une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

*Enfants :* 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

**Prix du flacon : 16 francs.**

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 48-1, le « BI-CITROL » peut être légalement prescrit aux Assurés sociaux.

**Laboratoires G. MARINIER**

**52, rue de Flandre — PARIS**

## BI-FERMENTS LACTIQUES STABLES L. P. F.

**Composition.** — Ferments lactiques à concentration élevée et stabilité très grande (10 années d'activité.)

**Action thérapeutique.** — Détruit les microbes pathogènes de l'intestin.

**Indications.** — Entérites aiguës, entérites chroniques, Gastro-entérites infantiles, Dysenterie, Constipation. Toutes les infections intestinales, Dermatoses. Sa place est indiquée au surplus dans la plupart des maladies infectieuses.

**Forme et mode d'emploi.** — 3 à 5 comprimés par 24 heures, délayés dans un peu d'eau.

**L. HERIN, Pharmacien**  
Ancien interne des Hôpitaux  
98, rue Jeanne-Maillotte  
LA MADELEINE (Nord).

---

## BI-IODURAL NOVAT

**Formule.** — Comprimés contenant chacun 25 centigr. d'iodure de potassium et 5 milligrammes de bi-iodure de mercure.

**Remarque.** — Les comprimés (comme ceux d'iodural) renferment un alcalin chargé de neutraliser, au moment où ceux-ci se forment dans l'estomac, les acides iodique et iodhydrique. Le Bi-iodural est de cette façon parfaitement toléré.

Ces comprimés doivent être absorbés avec un liquide sans y être dissous.

**Laboratoires BCMEL**  
ANNONAY (Ardèche) — France.

## BIKRÉOL

Régulateur de l'activité digestive et de la nutrition générale.

### Composition :

Association d'extrait biliaire .. 0 gr. 20  
et de poudre de pancréas ..... 0 gr. 03

**Indications.** — Toutes les affections de l'estomac, du foie, de l'intestin dans leurs causes et leurs complications, Constipation. — Pas de contre-indication.

**Posologie.** — 4 à 6 pilules par jour après les repas (2 à 3 après chacun des deux principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau). Consulter le médecin.

Prix : 15 francs.

Le *Bikréol* est la médication de base des états infectieux et chroniques.

Littératures et échantillons :

**Laboratoires BAPAUME**

85, avenue de Neuilly — NEUILLY-SUR-SEINE.

## BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(Extraits de la bile de bœuf.)

**Forme.** — Globules glutinisés (digestion intestinale).

**Dose.** — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

**Indications.** — 1° Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention ;

2° Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

L'étui de 60 globules : 14 fr.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## BILIASÉ RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

**Mode d'action.** — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

**Indications.** — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiasé biliaire. Entérocolite et constipation par **insuffisance biliaire**.

**Doses.** — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

**R. RABY, pharmacien**  
**ASNIÈRES (Seine).**  
(Échantillons sur demande.)

---

## BILIBOLDO

**Forme.** — Pilules glutinisées.

**Composition.** — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

**Indications.** — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiasé biliaire, Ictères, Constipation.

**Doses.** — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 12 francs les 60 pilules.  
(15 jours de traitement.)

**Laboratoires LAMAR**  
1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE.

## BILIFLUINE

du D<sup>r</sup> L. BIGNON, de Vichy.  
Traitement de la Lithiase Biliaire  
et des Ictères.

**Composition.** — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

**Indications.** — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal, Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

**Posologie.** — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

La boîte de 45 pilules ou dragées. Le flacon de sirop. Prix au public : 16 fr.

**Laboratoires « STÉNÉ »**  
2, Place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>.)

---

## BILIOGASTRINE

**Forme.** — Granulé légèrement effervescent.

**Composition.** — Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

**Propriétés.** — Draine les Voies biliaires, augmente la Diurèse, nettoie le Rein et l'Intestin.

**Indications.** — Congestions, Lithiases biliaire et rénale, Cholelscystites, Troubles d'origine hépatique et intestinale : Inappétence, Migraines, Urticaire.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées par jour dans un peu d'eau tiède.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## BILIVACCIN

- 1° Antityphique.
- 2° Antidysentérique.
- 3° Anticholérique.

Prix : dose pour adultes : 10 fr. ;

dose pour enfants (moins de 7 ans) : 8 fr.

Vaccination préventive, par VOIE BUC-  
CALE, contre la Typhoïde, les Para A et  
B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication.

Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun, trois matins de suite une  
pilule de bile et 1/4 d'heure après, un com-  
primé de vaccin.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

**Produits de « La Biothérapie »**

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## BILIVACCIN

### ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes  
affections colibacillaires du tractus intes-  
tinal, constipation, colites, appendicites  
et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entéroco-  
que-perfringens-proteus).

A prendre le matin à jeun, pendant 18 jours  
consécutifs, une pilule de bile et 1/4 d'heure  
après, 2 comprimés de vaccin. Renouveler  
après repos de 6 jours.

Prix : 20 francs la dose.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

**Produits de « La Biothérapie »**

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## BINOXOL

**Bismutho-8-oxyquinoléine.**

**Propriétés.** — Antiseptique intestinal ni irritant ni toxique dont l'oxyquinoléine s'élimine en majeure partie par les urines.

**Indications.** — Diarrhées sous toutes formes, **Entérites des tuberculeux**, colibacillaire, putréfaction, parasites intestinaux, troubles des voies urinaires : cholécystites, pyélites, etc.

**Présentation.** — Tubes de 12 cachets, dosés à 0 gr. 50. Boîtes de 12 paquets dosés à 0 gr. 25.

**Posologie.** — 2 à 8 cachets par jour.

**Etablissements KUHLMANN**

**Produits RAL**

145, bd Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## BIOCALCOSE

**Tonique, Stimulant, Reminéralisant intégral.**  
**Granulé soluble, de saveur très agréable.**

**Hypophosphites ; Manganèse, Fer, Magnésie et Chaux en combinaison organique avec le glucose ; Fluor ; Silice, etc., dans les proportions où ces corps se trouvent dans l'organisme.**

**Constitue une véritable synthèse minérale de la matière vivante.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique, reminéralisant.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 8 ans ; 3 à 4 au-dessus de cet âge, à croquer, ou dissoutes dans un peu d'eau, aux repas.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**  
52, rue La Bruyère — PARIS.

**Télégrammes : Chevrematte 90-Paris.**

## BIOCHOLINE

d'après les travaux du Prof. J. CARLES et du D<sup>r</sup> F. LEURET.

**Constitution.** — Chlorhydrate de Choline R. et C., chimiquement pur. Seule préparation contrôlée aux points de vue physiologique et clinique par les auteurs.

**Mode d'action.** — 1° Amélioration du terrain par l'augmentation régulière et durable du taux de *cholestérol* sanguin, principale condition de la résistance aux infections. Régularisation de la Glycémie.

2° Action génératrice sur les *globules sanguins* et la moelle osseuse. Cette réaction de défense se traduit par la disparition des gros polynucléaires, et l'apparition des mononucléaires de défense.

3° Excitation des fonctions d'élimination et du péristaltisme intestinal.

**Indications.** — 1° *Toutes les formes de Tuberculoses*: externes ou viscérales, même évolutives, à tous les degrés et à tous les âges.

2° *Tous les cas d'Anémies*: Maigreur, anorexie, hypertrophies ganglionnaires infantiles.

3° Tous les cas d'insuffisances pancréatiques.

**Avantages.** — Innocuité complète, tolérance parfaite, aucune contre-indication.

**Présentations.** — Ampoules (1 cc. = 0,02). Boîtes de 10 ampoules (type normal); boîtes de 25-50 et 100 ampoules (cures prolongées).

**Suppositoires** (1 suppo = 0,02). Boîte de 10 suppositoires.

**Mode d'emploi.** — Ampoules: 1 injection sous-cutanée, tous les 2 jours, d'une façon continue et sans interruption.

**Suppositoires**: 1 suppositoire tous les 2 jours par séries de 20 jours.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII°).



## BIODYNAMINE

**Indications générales.** — Débilité, Neurasthénie  
Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intel-  
lectuel et tous états asthéniques et atoniques.

### 1° Ampoules :

Sulfate de strychnine.....	1 milligr.
Cacodylate de soude.....	0 gr. 05
Nucléinate de soude.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude.....	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré.....	1 cc. 3

par ampoule.

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

Prix : 13 fr. 75.

**2° Gouttes concentrées** (facilitant l'administra-  
tion progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées,  
avant chaque repas, suivant le cas et d'après le  
tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine.....	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de soude...	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Acide phosphorique.....	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

Prix : 11 fr. 75.

**3° Elixir :** Préparation d'un goût très agréable et  
contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude.....	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal .....	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique .....	0 gr. 012
Sulfate de strychnine.....	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 15 fr. 50.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. Tinardon**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

## BIOENTÉRASE

**Ampoules buvables.**

Non toxique. Sans contre-indications.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Pomiferum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

**Indications.** — Diarrhée verte, Gastro-entérite des nourrissons, Choléra infantile, Entérites aiguës, Entérocolite dysentérique.

**Propriétés.** — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique, sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme, sans opiacés, évite l'athrepsie.

**Doses.** — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée ou en lavement dans 50 cc. d'eau bouillie.

La BIOENTERASE s'emploie de la naissance à trois ans à la dose quotidienne de 1 à 2 ampoules par année d'âge, suivant l'intensité des symptômes et jusqu'à sédation. Une ampoule tous les 2 jours évite l'athrepsie.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables : 18 francs.

— 3 — 10 francs.

Littérature et échantillons :  
69, rue de Wattignies — PARIS.

## BIOGÉNOL DEMASLES

Puissant accélérateur de la nutrition.

**Granulé.** — Contenant, par cuillerée à café :

1 centigr. de glycéro-arséniate.

0,50 centigr. de phosphates organiques.

0 gr. 50 chlorure de magnésium.

1 cuillerée à café avant les deux repas.

Prix : 14 francs.

**Elixir.** — Même composition que le granulé, mais contient de la cola en plus. 1 verre à liqueur avant les repas.

Prix : 14 francs.

**Gouttes Arséno Biogénol.** — Strychnine, glycéro-arséniate, extraits de quina, cola, coca.

**Gouttes Phospho Biogénol.** — Strychnine, acide phosphorique, extraits de quina, cola, coca.

Pour XX gouttes, 1 milligr. de strychnine, 5 milligr. de glycéro-arséniate ou 25 cgr. d'acide phosphorique.

Doses moyennes : X à XX gouttes aux 2 repas. Doses progressivement croissantes : jusqu'à CXX gouttes.

Prix : 12 francs.

**Ampoules.** — De 1 cc. Une ampoule contient :

Glycéro-arséniate..... 0,01 centigr.

Sulfate de strychnine..... 0,001 milligr.

Prix : 10 francs.

**LABORATOIRES DEMASLES. — VIENNE (Isère).**

## **BIOLACTYL FOURNIER**

Symbiose de deux ferments lactiques  
orientaux sélectionnés.

### **Usage médical :**

1<sup>o</sup> Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 24 fr.

En boîte de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 8 fr.

En boîte de 6 tubes (pour le caillage du  
lait).

La boîte : 7 fr.

2<sup>o</sup> Culture sèche ; boîte de 60 comprimés  
(4 à 6 par jour).

L'étui : 14 fr.

**Indications.** — Traitement des putréfac-  
tions intestinales et de l'auto-intoxication  
digestive.

### **Usage chirurgical :**

1<sup>o</sup> Culture liquide, en boîtes de 6 tubes.

La boîte : 7 fr.

2<sup>o</sup> Culture sèche en poudre.

La boîte : 7 fr.

**Indications.** — Pansement des plaies in-  
fectées, escarres, vaginites, cystite tuber-  
culeuse, affections nasales et laryngées,  
pyorrhée alvéolo-dentaire.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## **BIOLAX**

**Laxatif de régime, rééducateur  
de l'Intestin.**

Améliore, entretient, rétablit le foie dans son fonctionnement optimum et procède avec son concours à la rééducation progressive de l'intestin.

**Indications.** — Constipation chronique, Entéroptose et insuffisance hépatique, Congestion du foie, Dermatoses d'origine intestinale, Constipation chez les arthritiques.

**Mode d'emploi.** — Le soir, une à deux dragées.

**Laboratoires ADLER**

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS  
et chez tous les Droguistes et Pharmaciens.

---

## BIOMUCINE

**Protecteur naturel de l'Estomac  
et anti-acide idéal.**

**Constitution.** — La BIOMUCINE ROBERT et CARRIERE est une mucine pure, neutre et stérile, obtenue à partir des muqueuses d'estomac et adaptée à la thérapeutique des affections gastriques.

**Action physiologique.** — 1° BIOMUCINE = PROTECTEUR NATUREL : Elle recouvre la muqueuse d'un enduit visqueux qui la protège contre les irritations des particules alimentaires et contre toute attaque chlorhydropeptique.  
2° BIOMUCINE = ANTI-ACIDE IDEAL : *Le seul réellement physiologique*, puisque c'est le mucus qui à l'état normal assure l'intégrité et le bon fonctionnement de l'estomac.

**Avantages.** — La BIOMUCINE est :

- 1° SUPERIEURE aux ALCALINS qui saturent toute l'acidité, la mucine ne fixe que les acides en EXCES.
- 2° SUPERIEURE aux POUDRES ABSORBANTES (Bismuth-Kaolin), qui réalisent un enduit imperméable aux sucs digestifs et provoquent la constipation. La mucine se laisse pénétrer par la pepsine ; la mucine ne constipe pas.
- 3° SUPERIEURE aux MUCILAGES qui se digèrent, la mucine est indigestible.

La BIOMUCINE est particulièrement remarquable par la RAPIDITE de son action.

**Indications.** — HYPERACIDITÉ et toutes les affections douloureuses de l'estomac provoquées par elle.

ULCERES gastriques et duodénaux, Ulcères peptiques post-opératoires.

**Posologie.** — HYPERACIDITÉ : 2 cachets avant chacun des 2 principaux repas.

ULCERES : 2 cachets, 10 minutes avant toute prise de nourriture ; la poudre mise en suspension dans 1/2 verre d'eau.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

## BIONÉOL

Formes : 1<sup>o</sup> Elixir.

	Par cuillerée à café.	Par cuillerée à soupe.
Méthylarsinate de soude .....	1 cgr.	3 cgr.
Acide nucléinique .....	2 cgr.	6 cgr.
Glycérophosphates .....	5 cgr.	15 cgr.
Strychnine (noix vomique) .....	0,1 de mmgr.	0,3 de mmgr.

2<sup>o</sup> Cachets.

		par cachet.
Méthylarsinate de soude .....	3 cgr.	—
Acide nucléinique .....	6 cgr.	—
Glycérophosphates .....	15 cgr.	—
Strychnine (noix vomique) .....	0,3 de mmgr.	—

**Indications.** — Anémies, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Neurasthénie, Paludisme, Débilité générale, Troubles de la croissance et de la puberté. Excitant de l'Appareil digestif.

**Posologie :**

De 3 à 6 ans, 2 cuillerées à café par jour.

De 6 à 10 ans, 3 — —

De 10 à 15 ans, 2 cuillerées à dessert par jour.

A partir de 15 ans, 2 cuillerées à soupe ou 2 cachets par jour.

A prendre après les repas.

Prix : Elixir : 14 fr., 10 jours de traitement.

Cachets : 14 fr., 15 — —

**Laboratoire du BIONÉOL**

14, rue de Périgueux — ANGOULÊME.

## BIOPHORINE GIRARD

**Granulé.**

Extrait total de kola contenant la caféine, la théobromine et les principes actifs de la noix fraîche ; Glycérophosphate de chaux assimilable, Extrait de quinquina.

**Propriétés thérapeutiques :**

Régulateur cardiaque, réminéralisant, apéritif, tonique nerveux et musculaire.

**Indications :**

Asthénies, Adynamie cardiaque, Anémie cérébrale, Dépression nerveuse, Grippe, Convalescences des maladies infectieuses, Surmenage physique et intellectuel.

**Dose et mode d'emploi :**

3 à 4 cuillerées à café par jour, aux repas, pur ou dans un liquide quelconque.

Enfants : 1/2 doses.

**Laboratoire A. GIRARD**

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire national n<sup>o</sup> 405-1.

## **BIOPHYLACTINE M. G.**

**Médication polypeptique, hyposulfite et magnésienne.**

**Forme.** — Dragées.

**Indications.** — Asthme (digestif), coryzas spasmodiques périodiques (rhume des foins), urticaire, eczéma, prurits, maladie de Quincke, migraines, somnolences, rougeurs ou pesanteurs après les repas, vomissements, inappétence, intolérance digestive.

**Doses.** — Adultes : 2 dragées 1/2 heure avant les 3 repas. — Enfants : une dragée.

Prix du flacon : 15 fr.

Echantillon sur demande.

**Préparé par le laboratoire F. VELLAY**  
**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

116, avenue Berthelot — VIENNE (Isère).

---

## **BIOSINE LE PERDRIEL**

**Glycérophosphate double de chaux  
et de fer.**

Ni intolérance, ni constipation, ni coloration des dents. Reconstituant énergique.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Suite de fractures, Hémorragies.

**Doses.** — 1 mesure (0,30 de glycérophosphate) à 4 mesures par jour au repas dans eau pure ou sucrée.

**Laboratoires LE PERDRIEL**  
11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## BIOTRIGON

### Composition :

*Elixir formule A.* — Extrait fluide de fénu-grec désodorisé, Arrhénal, Manganèse.

*Elixir formule C.* — Extrait fluide de fénu-grec désodorisé. Chlorure de Calcium.

*Dragées.* — Extrait sec de fénu-grec. Phosphate de chaux. Extraits opothérapiques fixateurs.

### Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

### Indications :

*Elixir formule A.* — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

*Elixir formule C.* — Mêmes indications et malades présentant lésions pulmonaires évolutives ou troubles hépatiques.

*Dragées.* — Mêmes indications, mais plus spécialement pour malades en déplacement ou gastro-entéritiques.

### Mode d'emploi :

*Adultes :* 1 cuillerée à bouche au moment des repas.

*Enfants :* 1 cuillerée à café au moment des repas.

Prix du flacon de 1/4 de litre : 20 francs.

**Laboratoire Jacques LORTHIOIR**

8, rue Pierre-Girard — PARIS.



## BISALICYLATE

**granulé effervescent**

plus actif que le salicylate de soude. Tolérance gastr. parfaite, saveur agréable.

Chaque cuillerée à café de granulé (3 gr.) contient 1 gr. de Bisalicylate lithiné sodique (correspondant à 75 cgr. Salicylate de soude et 25 cgr. Salicylate de lithine) dans un excipient lactosé effervescent basique.

Rhumatisme, Arthritisme, Uricolytique, Cholagogue.

**Laboratoire du GASTROCARBONE**  
**SAINT-LOUIS (Bouches-du-Rhône)**

---

## BISCAMPH

**Campho-carbonate de Bismuth.**

En solution dans l'huile d'olive purifiée à l'éther. (Aucun accident d'induration ou d'enkystement.)

**Indication.** — Syphilis.

**Contre-indication.** — Albuminurie.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une injection intramusculaire tous les 3, 5 ou 7 jours.

Séries de 12 à 18 injections séparées par un intervalle d'un mois environ.

Introduire d'abord l'aiguille seule, et n'adapter la seringue que s'il ne s'écoule pas de sang.

Prix de la boîte de 5 ampoules : 25 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments.

**Laboratoires S. GABAIL**  
**5, rue Lefebvre, — PARIS (XV°).**

## BIS-HYD

### Bismuth-Hydrargyre.

En ampoules de 2 cc. dosées à 0,048 de Bismuth métal. Suspension huileuse d'éléments *chimiques* : Iodo-bismuthate de quinine, Hydrargyre et cuivre (Catalyseurs) et d'éléments *biologiques* : Lipoides cérébraux et testiculaires. BIS-HYD réalise pour la première fois une *thérapeutique antisyphilitique complète*.

« Accroît par catalyse les forces défensives de l'organisme contre la spirochétose. » (J. Schumacher.)

BIS-HYD exerce dans la Syphilis et la spirochétose en général une double action :

1<sup>o</sup> *Spécifique* vis-à-vis du spirochète par l'ensemble de ses composants chimiques ;

2<sup>o</sup> *Non spécifique* et immunisante de l'organisme par ses composants biologiques, lipoides cérébraux et testiculaires.

**Posologie.** — Traitement d'attaque : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par semaine (15 à 20 par cure).

Traitement d'entretien : 1 à 2 par semaine (12 par cure)

Les injections indolores seront intramusculaires profondes (point fessier) avec une seringue bien sèche.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 36 fr.

**Laboratoires GENEVRIER**

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).

## BIS-KA-MA

**Formes pharmaceutiques.** — Poudre à l'état de division micellaire.

**Composition.** — Bismuth (carbonate), Kaolin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, Sucre vanillé.

**Action.** — Réalise le « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

**Indications.** — Acidité pré- ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux 3 repas.

Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun.

Prix : 20 francs.

**Laboratoires DURET et RÉMY**  
et du Docteur Pierre ROLLAND  
ASNIERES (Seine).

## BISMHYDRAL

**Composition.** — Définie et stable de chlorure mercureux léger pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Milian).

**Indications.** — Syphilis (à toutes les périodes et sous toutes ses formes; cure d'entretien discrète par voie buccale, la boîte-vente ne renferme aucun prospectus et ne porte pas d'indication de maladies.) Insuffisances hépato-biliaires.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

**Doses.** — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

### LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## BISMUSODINE

(Granulée.)

**Composition.** — Une cuillerée à café contient :

0 gr. 50 carbonate de bismuth.

0 gr. 50 citrate de soude état naissant.

1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

**Indications.** — Gastropathies. — Hyperacidité. — Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. — Antisepsie intestinale.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même croquées telles, suivant indications du médecin.

### Laboratoires R. NIEL

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône).

## BISMUTARTROL

**Bismuth soluble.**

Syphilis à tous les degrés.

Traitements de consolidation.

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth. *Injectons absolument indolores.*  
— 0 gr. 08 de Bismuth Métal par Ampoule de 2 cc. 1/2.

**Posologie moyenne.** — Séries de 10 injections à raison d'une tous les 3 ou 4 jours. Laisser un intervalle de 20 à 30 jours entre deux séries consécutives.

La boîte de 10 ampoules : 30 fr.

**Laboratoires RAVAUD**

6, place de Breteuil — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 14-85. R. C. Seine 269.121.

---

## CRÈME DE BISMUTH

du Docteur Quesneville.

Préparation créée en 1856 et prescrite depuis plus de 80 ans, dans toutes les indications du Bismuth, en thérapeutique gastro-intestinale.

**Composition.** — Hydrate de Bismuth pur, obtenu à l'état de précipité gélatineux et conservé en bouillie dans de l'eau d'hydratation. Etat physique le plus favorable à l'action médicamenteuse du Bismuth. Innocuité absolue.

**Indications.** — Tous signes d'inflammation du tractus digestif, de lésions muqueuses (gastrite, duodénite, jéjunite). Troubles fonctionnels : Hyperchlorhydrie, Diarrhée, Gaz sulfurés intestinaux.

**Mode d'emploi.** — Par cuillerée mesure corresp. à 0 gr. 25 Bi. à prendre dans de l'eau ou du lait. Etats aigus : 4 cuillerées mesures 2 à 5 fois par jour (terminer par doses décroissantes).

Etats chroniques : 1 à 4 cuillerées mesures avant chaque repas.

Le flacon (100 cuillerées-mesure), prix : 19 fra ncs.

## CRÈME DE BISMUTH

Chloro-Magnésienne

du Dr QUESNEVILLE

Médication complémentaire en thérapeutique gastro-intestinale par action topique de l'hydrate de Bismuth associée à l'action cytophylactique du chlorure de magnésium.

**Indications.** — Lésions ulcératives. Anciens ulcères, Etats chirurgicaux, Séquelles de maladies infectieuses et d'affections lésionnelles, Névroses digestives.

**Posologie.** — (Crème semi-liquide). 1 à 2 cuillerées à café par jour, à prendre dans un peu d'eau (médication prolongée sans constipation).

Le flacon, prix : 16 fr. 50.

Laboratoire QUESNEVILLE

12, rue de Buci — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépôt : Pharmacie COLLESSON

5, rue d'Angoulême — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## BISMUTH DESLEAUX

Pansement gastro-intestinal idéal

Carbonate de Bismuth, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial.

**Propriétés thérapeutiques.** — Pansement gastro-intestinal de choix, à teneur en bismuth élevée, assurant un tapissage intégral, homogène, uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Modifie la flore microbienne, met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate, supérieur aux produits de substitution (Charbon, kaolin, magnésie, talc).

**Indications.** — Ulcères et ulcérations gastriques ou duodénales, gastropathies, hyperchlorhydrie, entéropathies, colites, spasmes, oxyurase.

**Présentation.** — Poudre impalpable, de goût agréable.

**Posologie.** — Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond environ à 6 gr. de produit.

**Pansement gastro-intestinal :** 12 à 50 gr. par jour, suivant les cas, soit 1 à 3 mesures prises à jeun, matin, midi et soir 1/2 heure avant les repas, dans 1/2 verre d'eau ou de tisane.

**Oxyures.** — *Adultes :* 30 à 40 gr. (5 à 7 mesures), *enfants :* 15 à 25 gr. (3 à 4 mesures) par jour, en 2 fois, le matin à jeun, 2 à 3 cures de 7 jours (Voir brochure).

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## BISMUTHION COUTURIEUX

**Description.** — Le Bismuthion est une suspension colloïdale isotonique de Bismuth pur dans l'eau distillée, obtenue par procédé électrique et destinée au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

**Action thérapeutique.** — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

**Indications.** — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement : syphilis nerveuses, tabes, hérédosyphilis.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

## BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal, à grains fins.

### Ampoules.

Titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Stériles.

Solution aqueuse.

### Indications.

Spirillicide.

Syphilis.

Toutes maladies à protozoaires.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

**Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## BISMUTH TULASNE

Sous-nitrate de bismuth kaoliné spécialement préparé pour l'emploi à doses élevées.

**Indications.** — Réalise le véritable pansement gastro-intestinal au sous-nitrate de bismuth (méthode du Prof. Hayem) avec la garantie d'une innocuité absolue.

**Estomac :** Ulcères, Ulcérations, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Spasmes, Aérophagie, Vomissements.

**Intestin :** Colites, Diarrhées, Intoxications, Troubles fonctionnels, Infection intestinale et troubles annexes : urinaires (colibacillose), biliaires, nerveux (migraines), circulatoires.

**Oxyurose.**

**Présentation.** — Boîte 10 paquets de 10 gr. : 20 fr. Triple boîte : 50 fr.

**Posologie.** — En général doses massives (10 à 20 gr., 1 à 2 paquets) à prendre en une seule fois le matin, à jeun, dans un verre d'eau pour réaliser le pansement bismuthé de la muqueuse digestive. Les mêmes doses, fractionnées en deux ou trois prises dans la journée, sont indiquées dans certains cas.

**Oxyurose :** *Adultes :* 15 à 20 gr. tous les matins à jeun pendant 5 jours de suite ; 10 gr. chez les enfants ; 5 gr. chez les tout petits. Intervalle de 6 jours entre chaque cure. Aucun régime spécial. Purgation après chaque cure.

INNOCUITÉ ABSOLUE.

**Laboratoires BOUILLET**

48, boulevard des Batignolles — PARIS. Marcadet 82-01.

## BIVATOL

**Formule.** — *a.* Carboxéthyl ; *b.* Méthyl nonoate basique de bismuth.  
Le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

**Présentation.** — Ampoules huileuses fluides de 2 cc. contenant 0 gr. 035 de bismuth métal par cc., soit 7 cgr. au total.

Boîtes de 12 ampoules constituant une cure.

**Indications thérapeutiques.** — Antisypilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien. Provoque la négativation rapide et la disparition de tous accidents. A utiliser chez les hérédos.

**Posologie.** — *Adultes* : 12 injections de 2 cc. faites intramusculaires, à raison d'une tous les deux jours pendant la première semaine, puis de deux par semaine ensuite.

*Enfants* : 0 cc. 1 par semaine jusqu'à 3 ans ; 0 cc. 5 de 3 à 5 ans ; 1 cc. à 10 ans.

Prix au public :

La boîte de 12 ampoules 2 cc. ( <i>adultes</i> ).....	25 fr.
— — 10 — 1 cc. ( <i>enfants</i> ).....	20 fr.

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## BLAGNY

Le traitement symptomatique le plus  
actif dans **LA TOUX.**

Voir **Gouttes Blagny**, page 514.

Voir **Dragées Blagny**, page 360.

**Laboratoires RENÉ PAMELA**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

21, rue de la République  
**FORGES-LES-EAUX (S.-Inf.).**



## BLÉDINE JACQUEMAIRE

**Composition.** — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

**Propriétés.** — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

**Indications.** — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites); désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

**Particularités.** — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

**Doses.** — Du 1<sup>er</sup> au 4<sup>e</sup> mois : 1 *gramme par biberon et par mois d'âge*. Du 5<sup>e</sup> au 6<sup>e</sup> mois : 1 1/2 à 2 *cuillérées par biberon*. A partir du 7<sup>e</sup> mois : 1 *cuillerée à soupe par repas* ; 1 1/2 à 2 *pour les adultes*.

**Nota.** — La *Blédine* peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

**Blécao.** — Toutes les qualités de la *Blédine* se retrouvent dans le *Blécao*, déjeuner reconstituant, aliment de régime d'une digestibilité exceptionnelle.

Établissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, \*, Docteur en Pharmacie,  
VILLEFRANCHE (Rhône).

## BLENNOPIAT

**Composition.** — Association de : Copahu, Cubèbe, Santal, Sassafras, Térébenthine. Ancien opiat complet du Codex sous forme pilulaire, *glutinisée*.

**Action thérapeutique.** — Synergie balsamique efficace, absorption facile, pas de troubles gastriques ni de réaction rénale.

**Indications.** — Blennorragie à toutes ses périodes et toutes complications dues au gonocoque. Cystites. Urétrites.

**Mode d'emploi.** — 6 à 12 pilules par jour, au moment des repas.

Prix : 15 francs la boîte.

Laboratoire ADOL

**L. GIROUD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
78, Cours de la Liberté — LYON.

---

## BLENNOSINE-FORNET

Vaccin buccal contre la Blennorragie.

**Principe actif.** — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

**Indications.** — Blennorragie aiguë ou chronique, ainsi que leurs complications.

**Posologie.** — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une 1/2 heure avant les repas jusqu'à réaction locale et générale. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'activité spécifique de ce vaccin buccal anti-blennorragique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Préventif et Curatif. Supprime rapidement l'écoulement. Jugule les douleurs. Evite ou guérit toutes complications.

Prix : 45 francs.

Vente et échantillonnage :

**Laboratoire de Microbiologie**  
23, rue du Caire — PARIS (11<sup>e</sup>).  
Gutenberg : 03-45.

## **BLOCS « VECOR »**

**Complexe phytothérapique.**

**Forme.** — Blocs de sucre soluble. Dissoudre un bloc dans une tasse d'eau très chaude.

**Composition.** — Gui, prêle, aubépine, oranger, cassis, anis.

**Indications.** — Hypertension, palpitations, azotémie, sclérose, aérophagie.

**Mode d'emploi.** — Solution chaude après les repas, chaude ou froide le matin à jeun.

**H. AMMANN, Pharmacien.**

Licencié ès Sciences

21, Rond-Point de la Reine,  
BOULOGNE-BILLANCOURT

Dépôt Général pour la vente :

**Laboratoires H. AMMANN**

Impasse Adam, 3,

BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél. : Molitor 01-90.

---

## **BOLDINE HOUDÉ**

Granules titrés à 1 milligramme.

**Boldine Houdé**

Principes actifs des feuilles de boldo.

**Emplois thérapeutiques :**

Maladies du foie, lithiase biliaire, ictère, hépatites, insuffisance hépatique, etc.

**Mode d'emploi :**

De 3 à 6 par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS.

## BOLDOBYL

**Composition.** — Extrait de bile, Boldo, Ferments lactiques, Agar-Agar, Podo-phyllin, Bourdaine.

**Forme.** — Dragées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hépatites, Ictères, Cirrhoses, Constipations chroniques, Lithiase biliaire, Cholécystite, Angiocholite.

**Mode d'emploi.** — Coliques hépatiques, Jaunisse, Ictère : 3 dragées avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau de Vichy. Fermentations, Auto-intoxications, Fétidité de l'haleine : 2 dragées avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau de Vichy. Constipation chronique : 2 à 4 dragées le soir en se couchant.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires SAUBA**  
MONTREUIL (Seine).

---

## BOLDO GMET

**Composition.** — Extrait total, liquide, sans alcool ni sucre, renferme *tous* les principes actifs de la feuille de Boldo fragrans : boldine huiles essentielles, matières aromatiques. Correspond à 2 gr. de feuilles fraîches par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Diurétique, cholagogue, stimulant et antiseptique du foie et des voies biliaires.

**Indications.** — Tous les troubles fonctionnels du foie. Insuffisance. Congestion. Lithiase biliaire. Cholécystite. Anorexie. Constipation. A donner au cours d'un traitement opothérapique ou spécifique pour maintenir l'intégrité du foie.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau chaude le matin à jeun ou aux repas de midi ou du soir.

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## BOLDOINE ÉPARVIER

**Forme.** — Granulé fin sucré.

**Composition.** — 1 cuillerée à café équivaut à 4 gr. de Boldo frais, parties active et aromatique comprises.

**Action.** — Stimulant général. Cholagogue. Antisep-tique intestinal favorisant l'oxydation et l'élimination des déchets (urée).

**Indications.** — Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Lithiase rénale. Ictères. Dyspepsies d'origine hépatique. Anorexie. Atonie des voies digestives. Cachexies.

**Posologie.** — Après chaque repas, 1 ou 2 cuillerées à café, prises en nature ou dans un peu d'eau chaude.

Echantillons et littérature:

**Laboratoires ÉPARVIER**

26, grande rue Saint-Clair. — LYON.

## BOLDOLACTIC LAGOUTTE

**Composition et forme.** — Comprimés dragéifiés à base de :

Ext. de feuilles d'artichaut.....	0,10
Ext. de boldo.....	0,05
Ext. biliaires dépigmentés.....	0,05
Ferments lactiques sélectionnés.....	0,05

Pour un comprimé.

**Actions thérapeutiques.** — Spécifique des mala-dies de la cellule hépatique et des voies biliaires.

**Indications.** — Ictère, Cholécystite, Angiocholite, Cirrhoses, Congestion hépatique, Dyspepsie bi-liaire, urticaire et dermatoses.

**Mode d'emploi.** — 6 comprimés par jour, 3 à midi et 3 le soir avant les repas.

Prix : la boîte de 60 comprimés, 12 francs.

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## BOLDORHÉINE

**Composition.** — Capsules glutinisées à base d'extrait de boldo, d'extrait biliaire, de podophyllin et de ferment lactique (conservé à l'état sec, mais vivant, dans un milieu approprié).

**Action thérapeutique.** — Combat l'insuffisance biliaire, stimule l'activité de la cellule hépatique, active la sécrétion et l'excrétion biliaires, régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif.

**Indications.** — Insuffisances hépatiques et biliaires, ictère, lithiase, etc.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 capsules, au moment des repas, avec une gorgée d'eau.

**LABORATOIRE  
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE  
D<sup>r</sup> PH. CHAPELLE**

8, rue Vivienne — PARIS.

---

## BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

**Composition.** — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

**Indications.** — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

**Posologie.** — L à C gouttes par jour.

**Laboratoire VERNE**

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE

## BOLÉASE MONAL

**Forme.** — Globules glutinisés.

**Composition.** — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

**Dose.** — 4 à 6 globules par jour.

**Action.** — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

**Indications.** — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhose, Affections intestinales : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Le flacon de 50 globules : 12 francs.

**Laboratoires MONAL & C<sup>ie</sup>**  
6, rue Bridaine — PARIS

---

## BOLÈNE

**Traitement de la Constipation**

**Composition.** — Héxaméthylènetétramine, Sels biliaires, Pancréatine, Erepsine, Entérokinase, Agar-agar.

**Mode d'action.** — Désinfection et rééducation de l'intestin par l'association d'acides biliaires à l'héxaméthylènetétramine, le meilleur et le plus actif des antiseptiques biliaires.

**Présentation.** — Comprimés dragéifiés de 0.50.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés et plus par jour.

10 francs la boîte de 60 comprimés.

**LABORATOIRES J. M. RICARDOU**

Docteur en pharmacie  
46, rue Pierre-Charron — PARIS

## BORÉOL

**Comprimés pour gargarismes et inhalations.**

**Composition.** — Perborate de soude, bicarbonate de soude. Essence de Wintergreen. Essences de cannelle, badiane, menthe, saccharine, gomme arabique, amidon.

**Propriétés.** — Antiseptique, sédatif et analgésique, déterge et décongestionne les muqueuses.

**Indications.** — Coryzas, sinusites, angines, pharyngites, laryngites, trachéites et trachéo-bronchites.

**Mode d'emploi.** — 1° En gargarismes : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau bouillie, assez chaude.

2° En inhalations : 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante. Se gargariser ensuite avec la même solution, à la fin de l'inhalation.

Prix du tube de 20 comprimés : 12 francs.

Dépôt général pour la France :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II°).

Téléph. : Central 83-15.

## BORICINE MEISSONNIER

Tetraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du biborate de sodium.

Infiniment supérieur à ses composants par :

1° *Sa pureté.* — Sel cristallisé neutre, non caustique.

2° *Sa solubilité.* — 16 p. 100 à froid } dans  
75 p. 100 à l'ébullition } l'eau  
parties égales dans la glycérine.

3° *Son pouvoir bactéricide.* — Stérilisante à 6 p. 100.

4° *Sa non-précipitation des alcaloïdes et son inaction sur les métaux.*

**Indications.** — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antiseptie générale de la peau et des muqueuses, conjonctivites, otites, ozène, stomatites, dermatoses, voies urinaires, gynécologie, plaies, brûlures. Bains.

**Mode d'emploi :**

*En poudre :* Insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

*En solution :* De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 8 gr. **Boricine.**

Prix : 7 fr. 50 net.

**Laboratoires J. LOGEAIS**

BOULOGNE-SUR-SEINE, pres PARIS.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.



## BOROSODINE LUMIÈRE

Médication calmante et antispasmodique  
des Affections nerveuses de toute nature.

**Constitution.** — Solution aqueuse de Tartrate boricosodique chimiquement pur dosée à 1 gr. par cc.

**Propriétés.** — Renferme, à poids égal, une plus forte proportion de bore actif que le Tartrate borico-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

**Indications.** — Agitation, insomnies, délires, hystéries, névroses, chorée et incontinence nocturne d'urine des anormaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du faciès du malade.

**Mode d'emploi.** — Doses progressives qui varient de 2 à 3 gr. par jour chez l'adulte pouvant être notablement dépassées, sans inconvénient.

La BOROSODINE LUMIÈRE peut, sans inconvénient, être administrée dès le plus bas âge sous forme de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE exactement dosé à 1 gr. de BOROSODINE LUMIÈRE par cuillerée à café.

**Dose.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau sucrée.

**Formuler.** — *Adultes* : Flacon de Solution BOROSODINE LUMIÈRE.  
*Enfants* : Flacon de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

## BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances  
cutanées ou muqueuses.

**Composition et présentation.** — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; les deux à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

**Indications.** — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piqûres, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

**Mode d'emploi.** — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 9 fr. 50 ; tube, 8 fr. 75.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien  
273, rue Victor-Rauter.

## BOULES QUIES

Boules plastiques adoptant exactement la forme de l'orifice auditif.

Point de fusion plus élevé que la température maximum du corps = 45°.

Anti-vibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Constituent le seul procédé pratique et sans danger d'isolement des bruits.

**Indications.** — Accessoire précieux de la Thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades.

Contre le mal de mer, les bruits de l'usine et de la rue, du voyage, de l'hôtel, etc.

Indispensable aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans l'oreille.

### DORMIR ET TRAVAILLER AU MILIEU DES BRUITS

(Grand Prix Marseille 1922).

Echantillons sur demande.

### Boules QUIES

47, boulevard Victor — PARIS (XV<sup>e</sup>)

## BRADYGASTRINE DUCLOY

Moderateur de la Sécretion gastrique.

**Formes.** — Granulé. — Comprimés.

**Composition.** — Acide fumaro-protocétrarique-citrate trisodique-phosphate tricalcique-carbonate et bromure de calcium-magnésie calcinée-terre sigillée.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Antinauséuses* par l'acide fumaro-protocétrarique et le citrate trisodique. *Neutralisantes* par la terre sigillée et la MgO. *Moderatrices de la sécrétion* par le phosphate et le bromure de calcium. *Dépourvues d'action excitante secondaire* grâce à la faible proportion de citrate trisodique : 50/0.

**Indications.** — Toutes hyperchlorhydries et hypersécrétions.

**Contre-Indications.** — Aucune. Même l'hyperchlorhydrie des cardiaques.

**Posologie.** — Une dose : 1 cuillerée à café = 3 comprimés.

3 à 6 cuillerées à café de granulé à avaler à sec ou mieux avec une gorgée de liquide ou 9 à 18 petits comprimés à sucer lentement.

*Prendre une nouvelle dose : au bout d'un quart d'heure si l'action sédative n'est pas immédiate ; au moment de la réapparition des douleurs si la sédation est passagère.*

Ces doses moyennes peuvent être augmentées sans inconvénients et très rapidement si le soulagement se fait attendre. Une fois le soulagement obtenu, diminuer progressivement les doses, mais ne pas cesser brusquement.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée en cas de besoin.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie  
ARQUES (Pas-de-Calais).

## BROMADYL VICARIO

**Brom-diéthyl-acétyl-carbamide.**

Comprimés à 50 centigrammes.

### Sédatif léger

Particulièrement indiqué dans les troubles neurasthéniques, phobies, etc.

Provoque rapidement le sommeil et, au réveil, ne laisse pas au malade l'impression pénible de dépression nerveuse.

**Posologie.** — *Comme hypnotique*, 1 ou 2 comprimés dans une infusion chaude, le soir.

*Comme sédatif*, 1/2 ou 1 comprimé, 3 ou 4 fois par jour, dans l'eau froide.

Le tube de 10 comprimés : 8 francs.

### Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine.)

**Propriétés.** — Action sédatif et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

**Indications.** — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

**Formes pharmaceutiques.** — *Ampoules dosées* 0,02 cgr, 15 fr. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour, 12 fr. 50. *Sirop* : 0,03 par cuillerée à soupe, Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 15 fr. — *Gouttes* : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 15 fr.

### Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS

## BROMIASE

**Description.** — Capsules glutinisées contenant :

Bromure de potassium..... 0 gr. 30

Bromure d'ammonium..... 0 gr. 20

Levurine extractive..... 0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

**Action thérapeutique.** — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

**Indications.** — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale  
(Voir l'étude sur l'Iodogénol).

**Forme.** — Gouttes.

**Doses et mode d'emploi.** — XX gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

**Indications.** — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

**Laboratoires PÉPIN et LEBOUcq**  
COURBEVOIE (Seine). Tél. : Défense 09-71.

## BROMO-MAISINE

### Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*, sans aucune autre association médicamenteuse.

**Propriétés particulières.** — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

**Indications.** — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

**Posologie.** — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

### Laboratoire R.-J. SOUDAN

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe — Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire national n° 218-1.

## BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de Peptone de viande de bœuf.

Gouttes : 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : XX à L gouttes. *Enfants* : X à XX gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

**Propriétés thérapeutiques.** — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

**Indications.** — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

### Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

## BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

**Indications thérapeutiques.** — **Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Epilepsie, etc.**

**Posologie.** — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Prix de vente au public : 15 francs.

**Laboratoire MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS

Téléphone : Anjou 16-55.

---

## BRONCHITOL

*Sirop de Thiocol pur, procédé français (Thiocol Elzévir).*

Modifie et tarit les sécrétions bronchiques. Aseptise la flore microbienne pulmonaire.

*Spécifique de la tuberculose et de la bronchite à leurs diverses phases.*

Agréable au goût.

Ne donne pas de troubles gastriques.

*Augmente même l'appétit des tuberculeux.*

Le Thiocol Elzévir est *absolument alcalin* (point capital).

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : dose moitié. Ces doses peuvent être augmentées après avis du médecin.

Echantillon et littérature au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## BRONCHODERMINE

Laboratoires du Docteur TISSOT.

Sous ce nom (déposé) est présenté un nouveau produit à base de *corps gras, spécial, adhérent à la peau*, pour obtenir l'absorption simple et rapide des éléments les plus connus dans le traitement des voies respiratoires : Gaïacol, Sève de Pin, Terpinol, Eucalyptol et Helenine.

La peau est l'agent *dyaliseur, absorbant à grande surface*, le plus actif.

En respectant les *voies stomacales, intestinales et rénales* (ce qui a son prix) on peut traiter par simple application tous les *rhumes, bronchites, pneumonies, gripes, pleurites, danger de bacillose, coqueluches, etc., etc...*

**Mode d'emploi.** — A tous les âges, étendre une bonne couche de Bronchodermine sur le dos, et au besoin la poitrine, recouvrir d'ouate ou de flanelle la même, jusqu'à la fin du traitement.

Laboratoires du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

## BRONCHOFORME

**Composition.** — **Sirop** : Teinture de racines d'aconit, belladone, eau de laurier cerise, benzoate de soude, sirop de bourgeons de sapin, de bromoforme composé et de cerises.

**Comprimés** : Bromoforme, Sulfate de strychnine (faible dose), codéine, arrhénal, terpine et extrait stabilisé de valériane.

**Formes pharmaceutiques.** — Sirop et Comprimés.

**Indications.** — Bronchites aiguës ou chroniques, suite de Gripes, Rhumes négligés, Catarrhes, Influenza, Asthme, Coqueluche, Laryngites, Trachéites, etc.

**Doses.** — **Sirop** : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

**Enfants** : 3 à 5 cuillerées à café par 24 heures.

**Comprimés** : 4 à 5 par jour.

**Enfants** : 7 à 15 ans : 2 à 3 par jour.

Prix du sirop .....	18 francs
— des comprimés .....	13 fr. 75

Laboratoires A.-G. DECHATRE

20 bis, rue du Sergent-Godefroy  
MONTREUIL — PARIS.

Tél. : Avron 14-69.

## BRONCHOSEPTOL-LAURIAT

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration : fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

**Indications cliniques.** — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, tuberculose pulmonaire, gazés de guerre.

**Composition.** — Chaque comprimé renferme :

Poudre de Dover codéinée (Opium 0,01 remplacé par Codéine 0,01).....	0,10
Bromol (Tribromophénol).....	0,02
Extrait d'Aconit titré (Codex).....	0,0025
Extrait de Belladone (titré Codex).....	0,005
Terpine.....	0,05
Benzoate de Soude.....	0,10

Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin et évitant ainsi l'action émétisante de l'Ipéca à doses répétées.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 4 comprimés par jour et 2 dans la nuit, s'il y a lieu.

*Enfants* : au-dessus de 8 ans, demi-dose.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 11 fr. 90.

**Laboratoires LAURIAT**  
LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

## BRONCHO-VACLYDUN

**Lysats vaccins du Docteur Duchon.**

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

**Composition.** — Lysat polyvalent (B. diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

**Indications.** — *Enfants, adultes, vieillards* : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

**Posologie.** — Première injection de 1/2 cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Nourrissons, enfants, adultes, mêmes doses.

(Voir VACLYDUN, page 1274.)

Présentation, en boîtes de 8 ampoules de 1 cc.

Prix : 40 francs.

**Laboratoires Pharmaceutiques CORBIERE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Carnot 78-11.



## BRONCOSOL

Spécifique des affections broncho-pulmonaires.

**Composition.** — Le Broncosol ne se présente que sous la forme de comprimés, chaque comprimé renferme : Codéine, 0 gr. 015 ; Extrait d'aconit, 0 gr. 01 ; Extrait de belladone, 0 gr. 01 ; Terpène, 0 gr. 10 ; Thiocol, 0 gr. 05 ; Ipéca pulvérisé, 0 gr. 02.

**Action thérapeutique.** — Hypnotique puissant, calmant nerveux, modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant parfait, régulateur des actes respiratoires.

**Posologie et mode d'emploi :**

*Adultes* : 5 ou 6 comprimés par 24 heures.

*Enfants* de plus de 10 ans : 2 ou 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer, de préférence dans l'intervalle des repas et au moment des crises.

Prix : 11 francs la boîte de 20 comprimés.

**Laboratoires CH. BRÉSIL**

12, rue Saint-Gilles — Paris (III<sup>e</sup>).

Téléphone : Archives 67-05.

## BROSÉYL

Médication anti-nerveuse.

**Forme pharmaceutique et composition.** — *Dragées* à base de *brome colloïdal* associé aux *Ethers du Bornéol* et suc *frais* de Valériane.

**Propriétés et avantages.** — Calme les douleurs sans déprimer, régît et discipline le système nerveux. Tonique et non toxique, le BROSEYL n'a aucun des inconvénients et additionne tous les avantages des bromures, valériانات et albumines bromées.

**Indications.** — Neurasthénie, épilepsie, insomnie nerveuse, névralgies, palpitations cardiaques, asthme nerveux, troubles de la puberté et de la ménopause, etc.

**Mode d'emploi.** — 1° *Sédatif*, 6 dragées par jour dans le courant de la journée.

2° *Contre l'insomnie*, 4 à 6 dragées en une seule fois, avec une infusion avant de se coucher.

Dragées à avaler sans croquer.

**Prescription.** — Un flacon BROSEYL FALVY.

**Les Laboratoires FALVY**

Licencié ès Sciences

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## BUCMINE

### Buchu-formine.

**Composition.** — Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé. Benzoate de lithine.

**Formes et doses.** — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0,50, 2 à 4 par jour.

**Indications.** — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires G. WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS.

## BULGARINE THÉPENIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

**Forme.** — Bouillon, comprimés et poudre.

**Indications thérapeutiques.** — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte), Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatose, Furunculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra.  
**Poudre :** Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

**Modes d'emploi.** — *Adultes :* Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon 4 fois par jour 1/2 heure avant le repas.

*Enfants :* Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 12 .. 50.

Le 1/2 flacon de bouillon : 8 .. 75.

**Laboratoire des Ferments**

**du Docteur A. THÉPENIER**

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 150.854.

## C 40

**Indications thérapeutiques.** — Traitement des cancers, fibromes et de toutes tumeurs malignes.

**Principe actif.** — Savons doubles de Cu et Mg.

### Formes :

*C 40 Injectable*, en boîtes de 10 ampoules de 10 cc. et de 2 ampoules de 5 cc.

*C 40 Comprimés*. — En flacons de 120.

### Doses :

*Ampoules*. — Faire 3 à 5 séries de 12 à raison d'une ampoule par jour.

*Comprimés*. — Deux comprimés le midi et deux comprimés le soir, pris en mangeant. Faire suivre le traitement pendant un an.

*Prix* : 60 fr. la boîte d'ampoules.

22 fr. le flacon de comprimés.

**Laboratoires DROUET et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## CACHETS DU D<sup>r</sup> BOVEIL

à l'Amino-Phéno-Théine.

Calmant infailible de l'élément douleur, quelle qu'en soit l'origine. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Névralgies, Migraines, Crises de Rhumatisme ou de Goutte, Insomnies, Fièvre, Grippe, Influenza, Courbature, Paludisme, Douleurs menstruelles, Maux de dents, Otite, Mastoïdites et toutes douleurs.

**Doses et Mode d'emploi.** — Un cachet au moment où l'on souffre, avec un liquide chaud de préférence.

*Dose moyenne* : 2 à 3 cachets par jour.

Echantillon et littérature sur demande.

*Prix* : 8 fr. l'étui de 12 cachets.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 346-1.

**Maro PARIS**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>.)

## CACHETS KAPYTAN

*contre la Grippe.*

**Composition.** — Codéine (1 cent. par cachet),  
Teinture d'aconit (III gouttes par cachet),  
Benzoate de soude, terpine, benzonaphtol.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif de la toux,  
fluidifiant les sécrétions bronchiques. Antisepsie  
du tube digestif (Grippe, Influenza).

**Indications.** — Grippe, Bronchites, Asthme pul-  
monaire, Rhumes et toutes Affections broncho-  
pulmonaires.

**Posologie.** — 4 cachets dans les 24 heures, pris  
entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : 12 francs.

Echantillons et Littérature :

**Laboratoires BARDET**

Fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## CACHETS PACHAUT

(Cachets de santé).

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatifs, chola-  
gogues, ne provoquant ni coliques ni selles diarrhé-  
ques.

**Composition :**

**Alpha :**

Extrait de cascara.....	0.25
Agar-agar.....	0.20
Bicarbonate de soude.....	0.15

**Gamma :**

Extrait de cascara.....	0.25
Agar-Agar.....	0.20
Bicarbonate de soude.....	0.15
Belladone . . . . .	un centigramme.

**Mode d'emploi.** — De 1 à 4 cachets par jour à  
prendre de préférence au début du repas du soir.

**Laboratoires PACHAUT**

130, boulevard Haussmann — PARIS

Téléph. : Laborde 16-72.

## CACHETS « ROCHE » DE THIOLCOL

1 cachet « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. galacol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 4 par jour et plus.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupéptique et Orexique.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

**Avis très important.** — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS « ROCHE » de Thiocol

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CACHETS SPÉVIN

**Cure rationnelle d'amaigrissement.**

Ni iode — Ni thyroïdine.

**Indications.** — Obésités simples, Obésités avec hypertension, avec manifestations dites « arthritiques » (Migraines, Asthme, Urticaire, Rhumatisme, Goutte).

**Propriétés thérapeutiques.** — Antisepsie intestinale. Assure le bon fonctionnement des voies digestives et des reins, maintient la force et l'activité.

**Composition.** — Chlorure de magnésium, Charbon végétal pulv., Cascara sagrada, Lactose, Quassia amara, Ergostérine irradiée (Vitamine D).

**Présentation.** — Suivant la proportion des poudres, les cachets Spévin se font sous plusieurs formes.

Cachets Spévin n° 5, formule normale.

Cachets Spévin n° 1, plus forts que n° 5.

Cachets Spévin n° 10, diurétiques.

Cachets Spévin n° 4, contenant en plus un purgatif (jalap).

**Mode d'emploi.** — Suivant indication médicale. Généralement 3 cachets par jour, au moins au début de la cure.

**Laboratoires des produits L. CHAUVIN**

3, rue de Vouillé — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Vaugirard 21-10.

## CACHETS VAN-SOL

### Formule :

Poudre de colchique.....	0,03
Acide acétylsalicylique.....	0,50
Acide phénylcinchoninique..	0,25

**Forme.** — Boîte de 20 cachets.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toutes les formes de rhumatismes et névralgies de toute origine.

**Mode d'emploi.** — De 2 à 4 cachets par jour, pris de préférence au moment des repas, autant que possible à intervalles réguliers en laissant un intervalle de 3 heures entre chaque cachet.

Ne pas en donner aux enfants.

Prix : 15 francs la boîte.

**Laboratoire P. et R. PLAGNOL**

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES  
(S.-et-O.).

---

## CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le procédé Hélier.

### Présentation et composition :

*Sirop* : Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill. à soupe) associé à un sirop iodophosphaté tannique spécial (*Sirop de Lovel*).

*Vin* : 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr. de phosphoglycérate de chaux, soude et potasse.

*Granules* : 2 cgr. de Cacodylate de soude.

*Ampoules* : 5 et 10 cgr. par cc.

*Gouttes* : 1 cgr. par V gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toujours bien toléré, permet d'administrer l'arsenic à haute dose et pendant longtemps, sans craindre les inconvénients des composés minéraux de l'arsenic. Excitant de la nutrition et modérateur nervin.

**Indications.** — Affections pulmonaires, anémie profonde, chlorose, scrofule, impaludisme, psoriasis, et tout état cachectique.

### Posologie :

*Sirop* : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

*Vin* : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

*Granules* : 3 à 6 par jour.

*Gouttes* : V à XV gouttes par jour.

*Ampoules* : 1 par jour.

Sirop et vin : 12 francs.

*Granules, Gouttes et ampoules* : 7 fr. 50.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore.

*Enfants* : Cacodyline A. 10 cgr. Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B : 20 cgr. Cacodylate de soude (2 cc.).

*Adultes* : Cacodyline C; 30 cgr. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgr. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.). Magnésio-Cacodyline. Cacodylate de soude : 30 cgr. Chlorure de magnésium : 20 cgr. (3 cc.).

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

**Indications.** — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis.

Prix public : 18 francs.

### Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CADIOR

**Composition.** — Complexe organo-métallique dépourvu de soufre, dans lequel l'iode, catalysé par le cadmium, ajoute sa puissante action antibacillaire à celle de l'or. Tolérance parfaite assurée par la présence de strontium et de calcium.

**Présentation.** — Ampoules de 5 cc. (boîte de 6) pour injections intraveineuses ou intramusculaires.

**Indications.** — Tuberculose sous toutes ses formes. Septicémies ; complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses ; rhumatismes chroniques ; mycoses ; convalescences traînantes, amaigrissements de causes indéterminées.

**Mode d'emploi.** — Une ou deux injections intraveineuses ou deux injections intramusculaires par semaine. Série de 25 à 30 injections.

(Pour technique détaillée du traitement, consulter littérature spéciale.)

Prix : 35 francs la boîte.

**Etablissements T. LECLERO**

**D<sup>r</sup> P. LEMELAND, Pharmacien**

10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).



## CAFÉDRINE

**A la caféine iodurée et au chlorhydrate d'éphédrine.**

**Formes.** — Elixir et dragées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiasthmaticque, Tonicardiaque, Diurétique.

**Indications.** — Asthme essentiel ou réflexe, Emphysème, Oppressions, Rhume des foies, Rhinites, Bronchites aiguës ou chroniques, Insuffisances cardiaques, Néphrites chroniques avec mal de Bright, Rétentions chlorurée et uréique.

**Mode d'emploi.** — (Elixir) : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Dragées : 2 à 4 dragées par jour.

**Laboratoires SAUBA**  
**MONTREUIL (Seine).**

## CALCIBRONAT « SANDOZ »

**Bromolactobionate de Calcium.**

Combinaison bromo-calcique nouvelle associant en un seul médicament les effets sédatifs du Brome et du Calcium.

Médicament particulièrement efficace, agissant aussi bien sur le système nerveux central que sur le système nerveux organo-végétatif. N'a pas les effets secondaires du Brome et des Bromures. Bien toléré par les centres nerveux, n'amène pas de bromisme, pas de troubles gastriques ou intestinaux, pas d'éruptions cutanées, pas d'action dépressive.

**Formes :**

*Comprimés effervescents* dosés à 0,45 de Brome.

*Poudre granulée* dont 1 cuillerée à soupe renferme 0,45 de Brome.

**Indications.** — Toutes les indications de la médication Bromée et Bromurée, mais plus étendues en raison de la bonne tolérance du Calcibronat par l'organisme.

**Posologie :**

*Comprimés effervescents* : 1 à 3 par jour, dissous dans un verre d'eau.  
*Poudre granulée* : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour, dissoutes dans 1 demi-verre d'eau ou dans le potage.

Ces doses peuvent être augmentées et au maximum doublées dans des cas particuliers.

**Produits SANDOZ**  
**20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).**

## CALCIGÉNOL

Phosphate tricalcique colloïdal  
(avec mouvements browniens).

Doses quotidiennes :

*Adultes* : 2 cuillerées à potage.

*Adolescents* : 2 cuillerées à dessert.

*Enfants* : 2 cuillerées à café.

Prix : 15 francs le flacon.

## CALCIGÉNOL IRRADIÉ

Phosphate tricalcique colloïdal  
(avec mouvements browniens)  
et ergostérine irradiée.

(450 unités physiologiques par cuillerée à potage).

Doses quotidiennes :

*Adultes* : 2 cuillerées à potage.

*Adolescents* : 2 cuillerées à dessert.

*Enfants* : 2 cuillerées à café.

Prix : 18 francs le flacon.

90, boulevard Saint-Denis  
COURBEVOIE-PARIS (Seine).

---

## CALCILINE

**Forme.** — Comprimés, granulé.

Trois formules : Calciline pure, Adréralinée,  
Méthylarsinée.

**Indications.** — Anémie, lymphatisme, tuberculose, maladies des os, croissance, convalescence, grossesse, carie dentaire.

**Doses.** — 2 comprimés ou une mesure (granulé) dans un peu d'eau avant les deux principaux repas, 20 jours par mois pendant 3 mois.

Prix : Calciline, 12 fr. ; Calciline adréralinée, 14 fr. ; Calciline Méthyl., 13 fr.

Laboratoires Gastro-Entérologiques

ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 69-13.

## CALCIONAL

Ion Calcium Stabilisé.

Deux formes :

Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.

1 comprimé = 25 centigr. de  $\text{CaCl}^2$  naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

**Indications.** — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmophilies, tétanies, décalcifications, asthénies).

Doses :

**Comprimés :** Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants : 2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

**Ampoules :** Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. — Adultes, 1 tous les jours.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

## CALCI-STÉNINE

Solution titrée de Chlorure de Calcium

LXXX gouttes = 1 gramme des sels suivants :

Chlorure de Calcium. ....	0,94
Chlorure de Sodium.....	0,03
Chlorure de Magnésium . ....	0,03

**Indications.** — *Reconstituant* : Croissance, Convalescence, Prétuberculose, Grossesse, Allaitement.

*Hémostatique* : Curatif de toutes les hémorragies et préventif des hémorragies post-opératoires.

*Diurétique* : Néphrites, Albuminuries.

*Antianaphylactique* : Accidents sériques, Urticaire.

(La CALCI-STÉNINE, étant à la fois reconstituante et antianaphylactique, est indiquée dans la convalescence de la diphtérie).

Posologie :

**Enfants :** Reconstituant : V gouttes par année ; Hémostatique : XV gouttes par année ; Antianaphylactique : IV gouttes par année.

**Adultes :** Reconstituant : XL gouttes 2 fois par jour ; Hémostatique : LXXX gouttes 3 à 4 fois par jour ; Diurétique : LXXX gouttes 5 à 10 fois par jour ; Antianaphylactique : XXX gouttes 3 fois par jour.

Laboratoire MAIRE, pharmacien

171, rue de Belleville — PARIS

## « CALCIUM-SANDOZ »

**Composition et propriétés.** — Gluconate de chaux, sel soluble, assimilable. Teneur en chaux (CaO) 13 p. 100, soit 9,3 p. 100 de Ca élément. Assure toutes les propriétés physiologiques de l'ion Calcium. Injectable par la voie intramusculaire et la voie endoveineuse, sans inconvénients.

**Formes.** — Ampoules à 10 et à 20 p. 100 de gluconate de chaux ; Poudre granulée (sans sucre) ; Comprimés effervescents ; Tablettes chocolatées.

NOUVELLE FORME THÉRAPEUTIQUE :

« CALCIUM SANDOZ » SIROP.

**Posologie :**

**Adultes :** 1 ampoule de 5 ou 10 cc. tous les jours ou tous les 2, à 3 jours ou bien, par jour, 3 cuillerées à café de poudre granulée ou 3 fois, 2 tablettes chocolatées ou 2 fois un comprimé effervescent ou 2 à 3 fois une cuillerée à soupe de sirop.

**Enfants :** 1 ampoule de 2 ou de 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours, ou bien, par jour, 2 à 3 cuillerées de poudre granulée ou 3 fois une demi à une tablette chocolatée ou 2 fois 1/3 à 1 comprimé effervescent, ou 2 à 3 fois 1 à 2 cuillerées à café de sirop.

**Produits SANDOZ**

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée et solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Avitaminose, assimilation défectueuse du calcium.

**Indications.** — Rachitisme, Troubles de croissance. Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

**Forme.** — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés. (Dragées et granulés glutinisés ne se dissolvant que dans l'intestin.)

**Dose et mode d'emploi.** — **Adultes :** 4 dragées ou 2 cuillers à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

**Enfants :** Moitié de ces doses.

**Prix au public :** Dragées et Granulés : 15 francs.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyspeptique, neutralisant stomacal.

**Indications.** — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

**Emploi et doses.** — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonné aux enfants.

Prix : 14 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande:

**Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

## CALCOZYMASE

### Cure de désensibilisation

**Composition.** — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment, avec un sel de calcium.

**Mode d'action.** — Chez les insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la Prézymase (Voir *Prézymase*).

**Indications.** — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumastisme, etc...

**Mode d'emploi.** — Deux à trois dragées au milieu de chaque repas.

**Laboratoires LEBOIME**

3, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## CALMABY

**Composition.** — Cachets de Calomel suractivé par trituration prolongée avec une poudre neutre ; S. N. Bismuth et Magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Active la fonction hépatique, combat la cholémie : Migraine, Inappétence, Algies, Neurasthénie, Arthritisme ; Indiqué dans le Rachitisme tardif, les Infections intestinales, les Ulcérations stomacales. Peut servir, entre les séries de piqûres, comme cure d'entretien. Augmente la tolérance mercurielle ou iodée et renforce l'action du Sirop de Gibert.

**Mode d'emploi.** — Un cachet le matin à jeun et parfois le soir au coucher, 15 à 20 jours par mois. Comme désinfectant intestinal, 3 à 5 cachets par jour pendant quelques jours.

**Laboratoire du DELTA**

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Trud aine 45-18.

## CALMAG-NA

**Forme.** — Poudre impalpable, légèrement aromatisée.

**Composition.** — Sous-gallate et sous-carbonate de Bismuth, carbonate de Magnésium, Sel de Vichy, carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal.

**Action thérapeutique.** — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques. Action prompte et prolongée, sans formation d'acidité secondaire. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, dyspepsies, gastralgies, pyrosis, flatulence, etc...

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café délayée dans un verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

La boîte : 17 fr. 50.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

**Laboratoires SUBSTANTIA**

**F. Guillemoteau, pharmacien**

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

## CALMANT MEUNIER

Elixir calmant, spécifique de la douleur.

**Composition.** — 10 cc. contiennent :

Codéine .....	0,003
Stovaine .....	0,005
Caféine .....	0,08
Salipyrine .....	0,10
Pyramidon .....	0,30
Liqueur .....	10 cc.

**Propriétés.** — Calmant de la douleur, agréable à prendre, très actif, bien toléré par l'estomac, rapidement assimilé, soulage en quelques minutes.

**Indications.** — Céphalées, Migraines, Odontalgies, Névralgies, Rhumatismes, Torticolis, Lumbago, Goutte, Sciaticque, Dysménorrhée, Zona, Cystite, Fièvre, Grippe.

**Posologie :**

*Enfants :* une demi à une cuillerée à café dans de l'eau.

*Adolescents :* Une à deux cuillerées à café.

*Adultes :* 2 à 3 cuillerées à café.

A prendre en cas de souffrance et renouveler au besoin 2 à 3 fois en 24 heures.

**Présentation soignée** en flacon de 120 cc. au prix de 7 fr. 75.

Préparation exécutée aux :

**Laboratoires MEUNIER, Pharmacien**  
Lauréat 1<sup>er</sup> prix de la Faculté de Montpellier  
**MONTMARAUULT (Allier).**

## CALMOCARDINE LAGOUTTE

**Composition et forme.** — Comprimés dragéifiés à base de :

Sulfate de quинidine.....	0,05
Gardénal.....	0,05
Sulfate de spartéine.....	0,01
Bromure de camphre.....	0,025
Extr. de cratœgus.....	0,015
Extr. de passiflora.....	0,015
Extr. de valériane.....	0,015

**Actions thérapeutiques.** — Sédatifs des fibres musculaires et du système nerveux.

Spécifique des palpitations.

**Indications.** — Palpitations de cœur de toutes origines, Eréthysme cardiaque, Arythmie extrasystolique, Douleurs de l'angine de poitrine, Anxiétés cardiaques des névrosés et des surmenés.

**Mode d'emploi.** — Une dragée tous les 1/4 d'heure jusqu'à quatre, puis toutes les heures jusqu'à huit par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 20 francs.

**Laboratoire LAGOUTTE**  
229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## CAMPHODAUSSÉ

(Camphre soluble dans l'eau.)

(Camphosulfonate de soude.)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection bien tolérée et ne provoquant pas les réactions locales dues au véhicule huileux.

**Indications.** — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

**Mode d'emploi.** — 1 à 5 cc., une ou plusieurs fois par jour, par voie *hypodermique*, *intramusculaire*, ou *intraveineuse*.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---



# CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

**Solution d'acide Campho-Sulfonique et de Spartéine.**

## I. Ampoules de 2 cc. et Gouttes.

### Trois formules.

1° *Simple.* — Chaque ampoule et XX gouttes de solution correspondent à 4 centigr. de spartéine et à 6 centigr. de camphre.

2° *Caféinée.* — Composition simple additionnée de 5 centigr. de caféine par ampoule et par XX gouttes de solution.

*Cette formule est spécialement indiquée contre les dyspnées et, à titre préventif ou curatif, dans les accidents opératoires.*

3° *Strychnée.* — Composition simple additionnée de 1/2 milligr. de sulfate de strychnine par ampoule et XX gouttes de solution.

*Cette formule convient aux malades nerveux déprimés.*

**Indications.** — Toutes les indications du camphre, de la spartéine, de la caféine et de la strychnine comme traitement d'urgence des défaillances et collapsus cardiaques, des palpitations, des insuffisances cardiaques, des asthénies cardio-vasculaires, des états infectieux, des dyspnées d'origine cardiaque et respiratoire, comme diurétique dans tous les cas de déséquilibre du système nerveux vaguesympathique et enfin comme préventif des accidents cardio-vasculaires des malaises lipothymiques, des anesthésies opératoires.

**Mode d'emploi et Posologie.** — Les ampoules de **Campho-Spartéine Dubois** s'administrent par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Ces injections sont indolores grâce à l'analgésie produite par la spartéine et leur action est immédiate et prolongée.

Les doses sont de 1 à 4 ampoules par 24 heures.

**Gouttes :** XX à LX gouttes par 24 heures en deux ou trois fois au début des repas ou au moment des malaises lipothymiques ou syncopaux.

## II. Comprimés.

**Posologie.** — Chaque comprimé contient 10 centigr. de Campho-Sulfonate de Spartéine.

**Mode d'emploi.** — La dose habituelle est de 2 à 5 comprimés par 24 heures au début des repas ou au moment des malaises. *Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer.*

## LABORATOIRES DUBOIS

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII°).

## CAMPHOSTYL LACROIX

**Composition.** — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

**Avantages.** — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Injection parfaitement indolore grâce à son pH = 7.

**Indications.** — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

**Formes pharmaceutiques.** — 1° *Camphostyl simple*.

A. *Ampoules.* — 1° Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 ; 2° boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 ; 3° boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50.

Pour le corps médical, en boîtes de 25, 50 et 100 ampoules.

B. *Gouttes.* — XX à CXXX gouttes par jour.

2° *Camphostyl spartéiné.* — Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 camphostyl et 0,05 de spartéine.

Echantillon sur demande.

**Laboratoires LACROIX**

(V. MEROBIAN et fils, Successeurs).

37, rue Pajol — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## CAMPYRO-SALYL FRAISSE

### Composition :

Salicylate de Benzyle.....	0 gr. 50
Camphre .....	0 gr. 10
Huile d'olive pure.....	5 cc.

### Indications :

Sciatique. — Névrites aiguës ou chroniques.

### Forme :

En ampoules de 5 cent. cubes.

5 à 6 ampoules suffisent pour guérir une sciatique rebelle.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin — PARIS.

## CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé camphré en solution aqueuse, solution à 5 p. 100.

Ampoules de 1, 2, 5 cc. — Tubes de 50 comprimés.

**Dose et mode d'emploi.** — Injections sous toutes formes : 1 cc. pour les enfants ; 2 cc. dans les cas ordinaires des adultes ; 5 cc. dans les cas importants et même 10 cc. dans les shocks traumatiques ou opératoires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Les mêmes que celles des huiles camphrées et de l'alcool camphré, excitant énergique du cœur et des centres nerveux et respiratoires, analgésique et antiseptique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les démangeaisons, prurits, brûlures, angines, etc.

**Indications.** — Troubles cardio-vasculaires, états de shock, crises respiratoires, maladies infectieuses, antiseptie des plaies, antiseptie et analgésie des prurits, acnés, démangeaisons.

L'action est plus rapide et plus intense que celle du camphre. L'injection est indolore et n'amène pas de réaction locale.

**Laboratoires M<sup>re</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

---

## CANOL

**Composition.** — Poudres végétales, sans aucune addition de corps d'origine chimique.

Albumine végétale.....	4.9
Sucre réducteur.....	1.4
Aphloïa . . . . .	0.05
Chimaphila . . . . .	2.85
Pectases . . . . .	0.797
Lawsotanine.....	0.003
Absolument inoffensif, aucune contre-indication.	

La Lawsotanine noircit les urines au début du traitement — ne s'accumule pas — peut être employée indéfiniment sans danger.

**Indications.** — Médication rationnelle des Infections des Voies urinaires, de l'Albuminurie et du Diabète, Néphrites, Pyélo-néphrites, Lithiase rénale, Cystites, Hématuries.

**Forme pharmaceutique.** — Boîte de 50 cachets de 0 cgr. 50.

**Posologie.** — *Dans les néphrites aiguës* : 4 cachets par jour, augmenter jusqu'à 10, suivant indication fournie par l'analyse des urines.

*Dans les néphrites interstitielles.* — En cas de pollakiurie, débiter par 10 cachets par jour, diminuer progressivement jusqu'à 4 par jour.

En cas d'oligurie, commencer par 4 cachets par jour et augmenter jusqu'à 10.

*Pyélo-néphrites et Lithiase rénale.* — D'emblée 12 à 14 cachets par jour, suivant la diminution du pus, du mucus ou du sable, diminuer progressivement jusqu'à 6 cachets.

*Diabète.* — 4 à 6 cachets par jour.

Prix de la boîte de 50 *cachets* : 25 francs.

Echantillon et littérature sur demande :

**Laboratoire du CANOL**

39, rue de l'Arbalète — PARIS (V°)

Téléph. : Gobelins 41-34.

**A. CŒURET, Pharmacien.**

## CANTÉÏNE BOUTEILLE

**Forme.** — Elixir.

### Composition :

Cratœgus .....	XXV gouttes.
Passiflore.....	0 gr. 50
Hamamélis.....	XXX gouttes.
Salix Alba .....	0 gr. 025
Excipient : Q. s. par cuillerée à café.	

**Indications.** — Eréthisme cardiaque, Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs, Ménopause, Neurasthénie, Mélancolie, Déprimés, Varices, Hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

**Laboratoire E. BOUTEILLE**

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Marcadet 04-02.

---

## CAPARLEM

**La thérapeutique protectrice du foie.**  
Préventive et curative des affections hépatopancréatico-biliaires.

**I. Sa formule.** — *Huile de Haarlem d'origine*; pure et vraie, Hétéropolyvalente, à base de distillat du *Juniperus Oxycedrus*, spécifique hépato-vésiculaire, fluidifiant de la bile et bilio-secréteur. Le plus fidèle et le plus doux cholérétique et cholécystokinétique.

**II. — Ses indications thérapeutiques fondamentales.** — *a. Foie.* — Cholécystites chroniques lithiasiques et non lithiasiques, douloureuses ou non, Calculs de transit et calculs sédentaires, Angiocholites et Angiocholécystites, Séquelles de Cholécystectomies, Asthme hépatique et Bile noire, Foie grippal, Amibiases et Lamblioses vésiculaires.

*b. Reins.* — Lithiases rénales et toutes variétés de Pyélo-néphrites, Uricémie, Goutte, Gravelle, Colibacilluries, Rein atone.

**III. — Sa posologie habituelle.** — *Cure d'entretien* : une à deux capsules au milieu des deux principaux repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**IV. Ses avantages.** — Titrage rigoureux, Efficacité **officiellement** reconnue, Pureté extrême des composants, Efficacité thérapeutique cliniquement expérimentée.

La seule huile de Haarlem sans mauvais goût ni renvois désagréables après l'ingestion. — Prix de vente modique.

**Laboratoires de Produits Synthétiques Purs (L. L. P. S. P.)**

**A. DESMOIRES, Docteur en pharmacie,**  
A ETAIN (Meuse). — Tél. : 74.

## **CAPSULES BARDET**

à l'Huile de Haarlem vraie.

**Composition.** — Chaque capsule contient 10 gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la seule maison fabriquant la véritable Huile.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Calculs biliaires, Coliques hépatiques, Ictère, Coliques néphrétiques, Pyélo-Néphrite, Cystites, Arthritisme, Asthme, etc.

**Posologie.** — Affections aiguës : 2 à 4 capsules par 24 heures.

Affections chroniques et cures d'entretien : 1 à 2 capsules par 24 heures.

A avaler avec une gorgée de liquide froid.

Formuler :

## **CAPSULES BARDET**

---

Échantillons et Littérature :

**Laboratoires BARDET**

fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## CAPSULES BRUEL

### A l'Ether Amyl Valérianique.

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Ether Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger. Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux, jusqu'au spasme douleur des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnagogue.

**Doses.** — 3 à 15 capsules par jour.

Le flacon : 10 francs.

Brochures et échantillons :

**G. BRUEL, Pharmacien**

36, rue de Paris — COLOMBES (Seine).

## CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Gaïacol, à la dose de 0,05 cgr. dissoute dans 0,20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

**Dose.** — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas, ou matin et soir avec une tasse de lait ou de tisane.

**Propriétés.** — Elles se dissolvent lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

**Indications.** — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS.



## CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

- 1° Calme l'irritation et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).
- 2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyl-lique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

### Posologie :

*Sirop* : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

*Capsules* : 3 à 4 par jour ; 10 ans : 1 à 2.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## CAPSULES GRISES CABANÈS

pour frictions mercurielles.

N° 1. *Premier âge, nourrissons.*

Mercure métallique.....	0 gr. 03
Lanoline-axonge.....	1 gr.

Par capsule.

N° 2. *Enfants.*

Mercure métallique.....	0 gr. 15
Lanoline-axonge.....	2 gr. 50

Par capsule.

N° 3. *Adultes.*

Mercure métallique.....	0 gr. 75
Lanoline-axonge.....	4 gr.

Par capsule.

La quantité du véhicule Lanoline-axonge est proportionnellement plus forte dans les capsules destinées aux nourrissons et aux enfants, afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, les réactions cutanées.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
de la Faculté de Pharmacie de Paris,

17, rue Cadet — PARIS.

## CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue.

**Forme.** — Capsules de gélatine de 0 gr. 20, spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

**Composition.** — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

**Indications.** — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagie. Innocuité absolue en cas de grossesse.

**Posologie.** — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 13 fr. 50

**Pharmacie SEGUIN**

165, rue St-Honoré — PARIS.

## CAPSULES KUCHNER AU MÉCAPTOL

**Affections bronchiques et pulmonaires.**

**Composition.** — Héléline suractivée par association avec Gaïacol crist., Eucalyptol crist., Codéine et Chl. Thébaïque.

**Action thérapeutique.** — S'opposent au développement du Bacille de Koch, calment la toux, modifient et tarissent l'expectoration, préviennent les hémoptysies, propriétés fébrifuges et anti-dyspnéiques très prononcées.

**Indications.** — Bronchites simples et chroniques, Tuberculose, Emphysème, Angine, Laryngite. Toutes affections des voies respiratoires.

**Posologie.** — 6 capsules par jour en trois fois.

Prix de vente : 12 francs.

**Laboratoire HINGLAIS**

EPERNAY (Marne).

## CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (ext.) 0,001, Belladone (extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpène 0,012, Eucalyptol 0,02, Thiocol (Sulfogalaïcolate de potasse) 0,04, par capsule.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

**Indications.** — Toux opiniâtres, bronchites chroniques, laryngites, asthme, catarrhe, etc.

Prix, le flacon : 11 fr.

**Laboratoires H. NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

## CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

**La Carbatropine.** — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 15 francs.

**Le Carbarséno.** — C + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 18 francs.

**La Carbémétine.** — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 24 francs.

**Le Carbalga.** — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

**La Carbésérine.** — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 18 francs.

**La Carbocarpine.** — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 18 francs.

**Laboratoires MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## CARBARGYRE

**Composition.** — Complexe d'adsorption constitué par du *Charbon activé* (ind. ads. cristalviolet : 35 p. 100) et de l'*Argent colloïdal* associés à l'*hexaméthylène tétramine* et au *peroxyde de magnésium*.

**Propriétés.** — Antiseptique intestinal *puissant* et *non toxique* où le charbon activé sert de véhicule à l'argent colloïdal et le *protège contre l'action du suc digestif*.

**Indications.** — Colibacillose, Syndrome entéro-rénal, Colites, Diarrhées, Putréfactions, Intoxications.

**Forme.** — Granulé fondant dont une cuillerée à potage correspond à 0,10 d'argent colloïdal et à 2 grammes de charbon activé.

### Posologie :

*Adultes* : Une à deux cuillerées à potage par jour, *avant les repas*.

*Enfants* : Une à deux cuillerées à café par jour.

Prix du flacon : 14 francs.

Laboratoire MARCEAU

A. BOUTROUX, Pharmacien,

Chef de Laboratoire à la Faculté,

7, avenue Marceau — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

**Composition.** — 1/2 milligr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de milligr. d'atropine par cuillerée à café.

**Indications.** — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

**Formes.** — Granulé dosé à 5 milligr. par 100 gr., soit 1/4 de milligr. par 5 gr. (cuillerée à café).

Poudre et cachets.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Dosage spécial pour enfants :**

1/10 de milligr. par cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## CARBOCITROL

**Composition.** — A base de citrate trisodique chimiquement pur.

**Indications.** — Gastrite aiguë et chronique. Dilatation de l'estomac. Dyspepsie flatulente. Congestion du foie. Paresse gastrique de toute origine.

*Aucune contre-indication.*

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 paquets ou 2 ou 4 comprimés par jour.

**Laboratoires O. VISCONTI**

64, boul. Barbès — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Téléphone : Nord 30-21

---

## CARBOFIXINE LONGUET

Antiseptique intestinal-antidiarrhéique.  
Granulé à base de lactate d'alumine et de charbon activé.

**Fixe les toxines** par le charbon activé (acti-carbone) et l'alumine gélatineuse.

**Arrête les diarrhées et fermentations** par l'acide lactique naissant.

Intoxication intestinale et ses conséquences,  
Diarrhées.

Granulé à avaler sans croquer ni faire dissoudre. 1 à 2 cuillerées à café après chaque repas.

Le flacon : 12 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS.

## CARBOIODINE

**Formes.** — Tablettes, Comprimés.

**Composition.** — Iodothérapie colloïdale, complexe colloïdal, iode métalloïde et charbon d'algues marines.

**Indications.** — Maladies infectieuses des voies respiratoires, grippe, pneumonie, asthme, emphyseme, affections du cœur et des vaisseaux, etc... Toutes indications de l'iode et des iodures.

**Mode d'emploi.** — 1 à 5 tablettes ou comprimés par jour.

### « PROTHERAPIA »

**Laboratoire G. CHAMAGNE**

Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie,  
Lauréat de l'Académie de Médecine,  
132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## CARBOÏODURE FRAUDIN

**Composition.** — Iodure de potassium chimiquement pur, fixé sur du charbon activé, utilisé comme véhicule.

Granulé friable, d'un goût agréable, contenant 0 gr. 25 d'iodure de potassium, par cuiller à café.

**Propriétés.** — L'iodure de potassium fixé sur le charbon est seulement libéré en milieu alcalin (intestin). *La libération est intégrale.* Ni intolérance stomacale, ni iodisme.

**Indications.** — Toutes celles de l'iodure de potassium : artériosclérose, arthritisme, affections cardio-vasculaires, asthme, etc.

Prix : 17 fr.

**Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN**  
4, avenue Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

## CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale  
hépatique et rénale.

---

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon végétal pulvérisé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

**Indications.** — Auto-intoxications gastro-intestinales. Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatose.

**Formes.** — 1° Boîte de 30 cachets ;  
2° Poudre avec cuiller-mesure.  
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

**Doses.** — Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — Enfants : 2 à 6 mesures *pro die*.

## CARBOLACTYL BILIÉ

**Composition.** — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

**Indications.** — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabètes par Dyshépatie, Artériosclérose par intoxication.

**Forme.** — Boîte de 30 cachets.  
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

**Doses.** — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Echantillons et littérature sur demande:  
19, rue de Fleurus — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## CARBOLIN MIDY

Graines de lin (sélectionnées et triées) enrobées d'un mucilage gommeux et d'un charbon végétal suractivé dit « *Acti-Carbone* » (maximum d'activité et de pureté).

**Mode d'emploi.** — 4 cuillerées à café par jour, aux repas ou à distance des repas suivant les cas, dans une cuillerée de miel.

### Propriétés thérapeutiques :

- 1° Action mécanique de massage de la graine de lin.
- 2° Action émolliente du mucilage gommeux.
- 3° Action absorbante et désinfectante.

**Indications.** — La Coprostase et toutes ses conséquences. Toutes les affections gastro-intestinales depuis la constipation chronique jusqu'aux colites aiguës. Aucune contre-indication.

### Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII°).

## CARBOMUCIL

(Normacol + Charbon).

Préparation associant le pouvoir adsorbant d'un charbon activé aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

**Forme.** — Granulé dragéifié en grains très menus.

**Avantages.** — Assure l'action du charbon tout le long du tractus digestif, les grains de CARBOMUCIL ne libérant la poussière de charbon que peu à peu, au cours de leur gonflement très progressif.

Permet en particulier l'action du charbon dans les côlons et le rectum, en s'opposant par le noyau mucilagineux à la dessiccation du contenu de ces organes (le charbon n'agit qu'en milieu humide).

**Indications.** — Tous états digestifs avec fermentations anormales. Aérophagie.

**Emploi.** — Par cuillerée à café, à la fin ou en dehors des repas. Mettre le granulé sec dans la bouche et l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

### Laboratoire NORGAN

PIERRE ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII°).

Tél. : Laborde 08-00.



## CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offensé, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

**Composition.** — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

**Doses.** — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion* ; dans les *fermentations* intestinales, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

**Laboratoire PERROUD**

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON  
(anciennement, 7, rue des Archers)

## CARBONÉSIE

Boîte de 30 cachets : 15 francs.

**Composition.** — Charbon activé, charbon animal, charbon végétal, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux, magnésie calcinée légère.

**Indications.** — Gastro-entérites, entérocolites, intoxications et auto-intoxications, fermentations gastro-intestinales, etc...

**Posologie.** — Un ou deux cachets après chaque repas. Cure de 15 jours.

Echantillons gratuits :

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 76-85.

## CARBOPHOS

### Médication carbo-calcique.

Aucun toxique : ni belladone, ni opium.

Neutralisation des toxines intestinales et des acides de fermentation.

Recalcification du terrain tuberculeux.

**Forme.** — Cachets.

**Composition.** — Charbon végétal, charbon animal purifié, bromure de calcium, phosphate de chaux, carbonate de chaux.

**Indications.** — Colites chroniques avec fermentations acides et selles molles, diarrhée des tuberculeux, aérophagie, hyperchlorhydrie.

**Doses.** — 3 cachets par jour au début des repas.  
La boîte (30 cachets) : 15 francs.

**Laboratoires H. NOE**  
**SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nora).**

---

## CARBOS

**Composition.** — Le premier charbon animal obtenu chimiquement pur, sans Sulfures ni Cyanures.

**Forme.** — *Comprimés* de 1 gramme. *Granulé* à 60 p. 100, soit 3 grammes de charbon par cuillerée à café.

**Indications.** — Dyspepsies gastro-intestinales avec flatulences, Fermentations, Putréfactions, Infections intestinales aiguës et chroniques, Empoisonnements, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

**Posologie.** — *Comprimés*, 3 à 5 avant ou après les repas. *Granulé*, 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires E. MILLET**  
**RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).**

## CARBOSANIS

### CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR D'ADSORPTION CONSTANT

**Propriétés.** — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

**Indications.** — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocolites, Diarrhées intenses.

**Formes.** — Granulé, poudre et cachets.  
Prix : 15 francs.

**Laboratoire MONTAGU**  
49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## CARDIALGINE DUBOIS

**Composition.** — Une dragée contient :

Bromure de Spartéine .....	3 centigrammes.
Extrait de Strophantus gratus....	1 milligramme.
— d'Aubépine.....	10 centigrammes.
— de Belladone titré.....	5 milligrammes.
Chlorhydrate de Papavérine .....	1 centigramme.

**Action.** — Cardiotonique, régulateur des rythmes du cœur, antispasmodique et sédatif, continue et remplace l'action de la digitale sans crainte d'effets accumulatifs.

**Indications.** — Troubles fonctionnels du cœur et des vaisseaux, insuffisance cardiaque, spasmes vasculaires de l'hypertension, arythmies, tachycardies, éréthisme neuro-cardiaque, atonies graves des infections, etc.

### Posologie :

**Adultes :** 3 à 4 dragées par 24 heures.

**Enfants :** 3 à 6 ans : 1 dragée par jour ; 6 à 12 ans : 2 dragées par jour ; 12 à 16 ans : 3 dragées par jour.

### LABORATOIRES DUBOIS

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.  
16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII°).

## CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure.

Principe actif du *Strophantus gratus*.

**Présentation et posologie.** — 1° *Voie buccale.*

Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1000 (25 gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : 25 gouttes par jour en une fois.

Doses moyennes : 50 à 75 gouttes par jour en 2 ou

3 fois. Doses fortes : 100 gouttes par jour en 4 fois.

2° *Voie intraveineuse.* — Ampoules titrées telles

que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/4 mgr. p. injec.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques avec impor-

tante dilatation ventriculaire et rythme régulier.

Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaïne**.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires DEGLAUDE**

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>). Tél. : Littré 31-85.

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

## CARDION VINCARDI

**Toni-cardiaque d'entretien.**

**Principes actifs.** — Complexes stabilisés, extraits du crataegus, du convallaria, du passiflora, de l'adonis vernalis, du cimicifuga racemosa.

**Forme.** — Comprimés lenticulaires glutinés.

**Indications.** — Tonicardiaque d'entretien associé à des antispasmodiques, Insuffisance cardiaque des hypertendus.

**Doses.** — 3 à 5 comprimés par 24 heures, de préférence entre les repas.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoire VINCARDI**

**Ph. VIGUIER**, pharmacien

14, avenue G.-Clemenceau — NICE (A.-M.)

R. C. Nice 9046.

## CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

### Définition :

La Cardiosthénine, à base d'extrait de strophantus, de sulfate de spartéine, d'extrait de cratægus oxyacantha et d'extrait de valériane, constitue un toni-cardiaque antispasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

### Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goitre exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-artériosclérose, Urémie.

### Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

D<sup>r</sup> Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

## CARDI-SEDINE

Apaise le cœur et les vaisseaux.

**Originalité.** — *Bromhydrate de Spartéine*, sel nouveau en thérapeutique cardio-vasculaire : freine les nerfs du cœur, combat ou abolit l'extrasystole, tonifie le myocarde.

**Composition.** — Bromhydrate de spartéine; Ext. stab. Valériane et Crataegus; Ext. stab. Jusquiame; Codéine: l'phénylethylmalonylurée, dépourvue de Quinine et de Papavérine.

**Présentation.** — Dragées glutinisées.

**Action.** — Synergie d'apaisement cardio-artériel et d'équilibration neuro-cardiaque :

- 1° Impulsivité et algies des cœurs fonctionnels, neurotonies cardiaques, névroses.
- 2° Eréthisme des *cardiopathies organiques*.
- 3° Poussées critiques de l'*hypertension artérielle* et son syndrome subjectif encéphalique et périphérique.

**Doses.** — 3 à 5 dragées par 24 heures : 1/4 d'heure avant les repas et au coucher, temps variable avec les cas cliniques.

Laboratoires MILAN  
7, rue Bonald — LYON

## CARDITONE

**Propriétés thérapeutiques.** — Cardiopathies valvulaires compensées ; Myocardites, Péricardites, Insuffisance cardiaque, Hyposystolie, Asystolie, Hypotension essentielle chronique.

### Composition :

Extrait de Strophantus.....	0 gr. 001
Sulfate de Spartéine.....	0 gr. 02
Extrait de Muguet.....	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé de.....	0 gr. 35

**Mode d'emploi.** — 2 à 5 comprimés par jour suivant prescriptions médicales.

Prix de vente au public : 15 francs.

### Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## CARNINE LEFRANCO

Suc de viande de bœuf crue, concentré à froid, dans le vide, en solution sucrée-glycérinée.

**Indications.** — Reconstituant énergétique, prescrit dans : *Anémie, Anorexie, Convalescences, Tuberculose, Affaiblissements, etc.*

**Dose et mode d'emploi.** — Une à quatre cuillerées à soupe par jour, pure ou additionnée d'une boisson froide.

### Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

## CAROTTASE

**Composition.** — Poudre de carottes fraîches stabilisées à froid. 1gr. de carottase = 4 gr. de carotte fraîche. Aliment végétal renfermant des sels minéraux naturels complètement assimilables, des substances albuminoïdes, des hydrates de carbone, de la cellulose à l'état de poudre très ténue et des vitamines A B C.

**Forme.** — Poudre.

**Indications.** — Favorise le développement des enfants et des nourrissons, excite l'appétit, active la croissance, stimule les fonctions de la nutrition, et régularise les fonctions intestinales.

### Doses

Après 2 mois, 1 pincée dans chaque biberon (0 gr. 50).

Après 3 mois, 1/2 cuillerée à café.

Après 6 mois, 1 cuillerée à café.

Après 8 mois, de 2 à 4 cuillerées à café.

Pour conserver à la Carottase toute son efficacité *ne jamais faire cuire*, la délayer avec du lait bouilli et refroidi, puis l'ajouter au biberon, bouillies ou panades déjà préparés.

Pour la poudre de légumes frais (Carottes, tomates, épinards), voir également VEGUVA.

**Société anonyme des Etablissements WANDER**  
151 bis, route de Joinville. — CHAMPIGNY-s/r-MARNE

## LA CARYPAÏNE

**Papaïne, Extrait de malt,  
Citro-phosphate de soude.**

Permet une parfaite assimilation des aliments dont elle augmente le coefficient de digestibilité.

**Deux formes.** — *Adultes* : Dragées.  
*Enfants* : Sirop.

Vomissements de la grossesse, Toutes digestions difficiles chez l'adulte.

**Toutes les affections gastro-intestinales chez les enfants.**

*Adultes* : 2 à 3 dragées avant les repas.

*Enfants* : Une cuillerée à café, à dessert ou à soupe suivant l'âge.

**FLEURY GALVIN**  
**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
**SAINT-FONS (Rhône).**

## CASALDYL

Granulé dont le principe actif est la Caséine formolée. Cette préparation est douée, grâce à la présence du formol, d'un pouvoir antiseptique considérable : elle possède également des propriétés absorbantes et désodorisantes, dues à l'action de la Caséine.

**Indications thérapeutiques.** — Entéro-colites aiguës ou chroniques, syndromes diarrhéiques de toute origine, même chez les tuberculeux, colibacillose, typhoïde et paratyphoïde. Fermentations secondaires, Météorisme, Etat saburral, Fétidité des matières. Troubles intestinaux chez les nourrissons.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau avant ou entre les repas.

*Enfants* : une demi-cuillerée à café deux à trois fois par jour.

*Nourrissons* : 1/4 de cuillerée à café avant trois des tétées de la journée.

Prix du flacon : 9 francs.

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).



## CASCARA MIDY

A base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1° 0,10 cgr. d'extrait hydro-alcoolique codex de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2° 0,20 cgr. de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

**Doses et mode d'emploi.** — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

**Laboratoires MIDY**  
4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII°).



## CASCARINE LEPRINCE



**Indications thérapeutiques.** — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc. Cholagogue, puis Copragogue de tout premier ordre. (Spécifique des *causes* et des conséquences de la *constipation*.)

Véritable traitement et non pas purgatif banal, employé couramment depuis 50 ans.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 pilules le soir au début du repas.

Prix de vente au public : 8 fr. 75.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## CATALYL Mg.

Soluté de Chlorure de Magnésium cristallisé pur.

Exempt d'Oxychlorure.

Activité intense — Toxicité nulle — Stabilité.

*Seule préparation magnésienne au goût vraiment agréable.*

Suppression sur nos conditionnements de toute allusion au cancer.

**Indications.** — Cholagogue puissant, Asthénies, Surmenage, Hépatisme, Paludisme, Constipation, Sénilité prématurée, Dermatoses, Prostatites, Dysfonctionnement des glandes à sécrétion interne, Diabète, *adjuvant puissant des traitements opothérapiques.*

**Mode d'emploi.** — De une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucrés ou non. Dose variable.

Une cuillerée à café correspond à 0 gr. 50 de Mg Cl<sup>2</sup> anhydre, 0 gr. 02 de chlorure calcium.

Laboratoire DELISS

**A. ROUX, Pharmacien**

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

# CATAPLASME DU D<sup>r</sup> LELIÈVRE

Antiseptique instantané, émollient, résolutif.  
Approuvé par l'Académie de Médecine de Paris.

**Avantages et indications.** — Il est *instantané et économique*. Plus de manipulations compliquées, plus de linges.

Il est *antiseptique et résolutif*. — Abscesses, furoncles, anthrax, panaris.

Il est *anesthésiant*. — Contusions, entorses, brûlures, engelures, eczéma, zona.

Il est *antiphlogistique et émollient*. — Ecchymoses, épanchements, hydarthrose.

Il est *décongestif*. — Laryngites aiguës, faux croup et toutes inflammations.

Il est *inaltérable et remplace tous les pansements humides*.

**Mode d'emploi.** — Soumettre le cataplasme ou un morceau de cataplasme à une faible quantité d'eau tiède ou chaude jusqu'à parfait gonflement, l'appliquer sur la partie malade et recouvrir d'imperméable.

Comme *véhicule*, ce Cataplasme accepte et retient facilement les substances médicamenteuses les plus variées : laudanum, arnica, etc.

On obtient un *Cataplasme sinapise* en le saupoudrant de farine de moutarde au moment de l'application.

E. BOULLE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

Ex-Interne des hôpitaux,

Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CATEMÉNYL

**Composition.** — Le *Cateményl* est à base : d'*Hamamélis virginica*, décongestif, vaso-constricteur veineux, hémostatique, sédatif ; de marron d'Inde, qui fluidifie le sang et calme spécialement la douleur hémorroïdale ; de *Piscidia erythrina*, sédatif utérin ; de *Viburnum prunifolium*, tonique nerveux, astringent, antiabortif ; de *Hydrastis canadensis*, vaso-constricteur abdominal, par action élective sur les splanchniques.

**Propriétés et indications.** — Toutes les affections du système veineux : Varices, Hémorroïdes, Etats variqueux, Eczéma variqueux, Phlébites infectieuses et variqueuses, Hyposphysie des extrémités.

**Mode d'emploi.** — XV à XX gouttes avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau. Cesser pendant les règles.

Littérature et échantillon sur demande.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle sous le numéro 489-I.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du docteur LALAURIE

CUXAC-D'AUDE (Aude).

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 1, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>), et ses succursales.

## C. B. K.

### Chimiothérapie rationnelle de la Tuberculose.

**Composition.** — Le C. B. K. (Contre-Bacille de Koch) est une association injectable qui réunit dans sa formule des cholestérols de cuivre, de cérium et de molybdène activés par l'irradiation et l'effluve, et un éther cinnamique de la cholestérine.

**Propriétés.** — Le C. B. K. agit :

*Sur le développement des corps microbiens* (action antivégétative du cuivre).

*Sur le bacille lui-même* (oxydation des nucléotoxines par le molybdène et le cérium).

*Sur le terrain* (puissance de résistance conférée par le cinnamate de cholestéryle).

**Présentation.** — Ampoules pour injections intramusculaires de 5 cc. Les injections sont indolores, et ne déterminent aucun accident d'intolérance locale ou générale.

**Posologie.** — Séries de 24 injections séparées par un mois de repos. Une injection tous les jours ou tous les deux jours pour la première série; tous les deux jours pour les suivantes.

**Indications.** — Tous les états prétuberculeux et tuberculeux, quelle qu'en soit la nature. Il n'existe pratiquement aucune contre-indication.

**Résultats.** — Le C. B. K., utilisé dans les services spécialisés de Paris, de Berck, etc., améliore très rapidement l'état général (diminution de la fièvre, augmentation du poids et de l'appétit dès la première série) et favorise la cicatrisation des lésions.

#### Prix :

La boîte de 8 ampoules ..... 22 fr.

La triple boîte ..... 60 fr.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## CELLONA

### Bandes Plâtrées

**Forme.** — Plâtre adhérent à la tarlatane, d'où présentation du plâtre en nappe. Bandes de 2 et 4 mètres de long sur 10-12-15-20-25 et 30 centimètres de large. (Largeur de 40 et 50 centimètres sur demande spéciale).

#### Avantages :

- 1<sup>o</sup> — *Transport des bandes* : Encombrement réduit, légèreté.
- 2<sup>o</sup> — *Confection du plâtre* : Propreté; à l'immersion, la bande est totalement imprégnée d'eau en 3 à 5 secondes; rapidité de par la quantité de plâtre apportée par la bande.
- 3<sup>o</sup> — *Masse constituée* : Plâtre à prise rapide d'excellente qualité, permettant un modelage parfait et accusant une résistance à la rupture et au choc, à la flexion, double de celle obtenue avec un plâtre courant, d'où :

légèreté des appareils constitués.

poids et encombrement réduits de moitié.

En fin, aspect extérieur lisse et brillant.

**Mode d'emploi.** — Immerger verticalement la bande, pendant 4 secondes environ, dans l'eau, sans addition saline. Exprimer légèrement et envelopper circulairement ou longitudinalement, en lissant la masse à chaque apport de plâtre. Pour parfaire le moulage, on peut, avant la prise du plâtre, envelopper la masse d'une tarlatane apprêtée et lisser une ultime fois à la main en apportant sur la masse un peu de plâtre. A cette fin, exprimer à fond une bande immergée et essorée.

**Indications.** — Tous les cas médicaux chirurgicaux nécessitant l'immobilisation.

S'emploie pour la confection des attelles et des négatifs orthopédiques etc...

**Laboratoires FISCH et Cie, 4, rue d'Illzach — MULHOUSE**

Agence à PARIS : 104, Frg Poissonnière (Xe) — Tél. Lamartine 92-52

## CELLU-SON

Biscottes de Son de blé dur PUR, sans aucune substance médicamenteuse, laxative ou irritante. D'après la méthode de M. le professeur Fiessinger.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toutes les constipations, mais plus spécialement celles provoquées par : Insuffisance hépatique, Dystonie gastrique et Ptose intestinale, Colites muco-membraneuses, Grossesse, Suites opératoires, Colibacillose.

Dermatoses d'origine intestinale.

**Posologie.** — 2 à 3 biscottes par jour au début du traitement, puis réduire progressivement pour cesser au bout de 3 à 4 mois.

*Enfants* : 1/2 dose.

Prix au public : 13 fr. la boîte de 24 biscottes.

**Laboratoire P. AUBRY**

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Laborde 15-26.

Belgique et Congo :

**Laboratoires Belges du Quinby**

Romain Deschiens — 74, avenue Louis-Bertrand  
BRUXELLES

## CÉPHœMÉTINE

**Composition.** — Combinaison définie d'émétine, céphœline et psychotrine déposée sous le nom de « CÉPHœMÉTINE » dont l'action se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de noir animal à grains microscopiques et lavés, maltine, carbonate de bismuth, et excipient approprié.

**Indications.** — Entérite, Dysenterie, Diarrhée gastrique, infectieuse et parasitaire (amibiase).

**Nota.** — Les troubles dus à l'Helminthiase ne sont pas atténués et l'échec de la thérapeutique éclaire le diagnostic.

**Posologie.** — Un cachet une heure après la fin des repas suivi d'un autre une demi-heure après le premier.

**Présentation.** — Boîte de 30 cachets.

Prix de la boîte : 15 francs.

Dépôt général :

**Laboratoires BORDELAIS**  
49, rue Maleret — BORDEAUX

## CÉRÉALES BÉBÉ FAVRICHON

**Farine de croissance des enfants constipés.**

**Composition.** — Froment, 55 ; Seigle, 35 ; Sucre, 15.

Nous garantissons qu'il n'y entre pas trace de drogue.

**Indications.** — Tous les cas de constipation infantile à partir de 6 mois. Les donner en remplacement de toute autre bouillie, car les Céréales-Bébé sont une farine de croissance de premier ordre, riche en éléments nutritifs, en sels minéraux et vitamines.

**Emploi.** — 1, 2 ou 3 bouillies par jour. Les doses suivant l'âge et mode de préparations sont portées sur une notice incluse dans chaque boîte.

Littérature et échantillon sur demande :

**Produits Diététiques FAVRICHON**  
Pharmacien-chimiste  
SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

## CÉRÉALES GRANULÉES FAVRICHON

**Aliment des constipés.**

**Composition.** — Froment de seigle, 100 p. 100. Pas de trace de drogues.

**Forme.** — Granulé à saveur de grillé.

**Indications.** — Tous cas d'atonie intestinale (sauf cas d'obstruction : tumeur, corps étranger).

**Emploi.** — 2 ou 3 cuillerées à soupe dans un déjeuner, potage, ou plat quelconque, très chaud.

**Produits Diététiques FAVRICHON**

**Pharmacien-Chimiste**

**SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).**

---

## CÉRÉALINE TULIVET

**Composition.** — Farine de Céréales complète (Sels minéraux), tyndallisée à basse température et conservant toutes ses vitamines.

**Forme :**

I. Simple sans cacao ni sucre.

II. Légèrement cacaolée et sucrée.

III. Légèrement cacaolée, sucrée et maltée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment de choix pour les enfants et les vieillards.

**Mode d'emploi.** — N° 1. Se prépare au bouillon de légumes ou lait sucré.

N°s 2 et 3. Se préparent à l'eau ou au lait sucré (jaune d'œuf à volonté).

Une cuillerée à bouche pour bouillie claire, 2 cuillerées pour bouillie épaisse.

**Laboratoires TULIVET**

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

## CÉRÉBRINE FOURNIER

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

**Cérébrino simple.** — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

**Cérébrine bromée.** — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles.

**Cérébrine bromo-iodée.** — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

**Cérébrine iodée.** — Névralgies rhumatismales.

**Cérébrine quiniée.** — Courbature, grippe infectieuse.

**Dose.** — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Prix : 12 fr., toutes variétés.

**A. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**  
147, boulevard Montparnasse — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## CEREBROÏL LEISYN

**Composition.** — Sels solubles non oxydés de phosphore directement assimilables, Yagéine. Yagénine, Sels de terres rares.

**Présentation.** — Liqueur et comprimés. Prescrire de préférence les comprimés qui, par un procédé spécial, se délitent immédiatement dans l'estomac et ne présentent pas le goût désagréable de la liqueur.

**Indications.** — Surmenage intellectuel et surmenage général, insuffisance cérébrale, dépressions nerveuses, perte de mémoire, de volonté, Apathie, Irrésolution, Tics, Aphasie, Asthénie et Asthénie génitale, Méningo-encéphalite, grandes Neurasthénies.

**Propriétés.** — Augmente la faculté d'attention volontaire, l'intensité de la pensée, l'énergie morale, la puissance de travail et la résistance physique. Facilite les études et le travail intellectuel. Spécifique réel de la fatigue, du surmenage et des neurasthénies.

**Posologie.** — 1 comprimé ou 1 comprimé 1/2 au milieu de chaque repas (petit déjeuner du matin, midi et soir), soit 3 à 6 comprimés par jour. 1 cuillerée à café ou 1 cuillerée à café 1/2 dans les mêmes conditions, soit 3 à 6 cuillerées à café par jour, dans un liquide quelconque.

Supprimer la strychnine et l'arsenic.

Communication à l'Académie de Médecine.

**Les Laboratoires LEISYN**  
1 bis, rue Molitor, PARIS (XVI<sup>e</sup>)  
Adresse télégraphique : Laboleisyn Paris.  
Tél. Aut. 14-72.

# CÉRÉBRO-LIPASE

Comprimés.

Médication reconstituante opothérapique.

**Composition.** — Cerveau total de taureau fraîchement abattu, substances blanche et grise. Jusquiame. Méthylarsinate disodique.

En comprimés kératinisés et glutinisés solubles au contact de la sécrétion pancréatique et duodénale.

**Indications.** — États pré tuberculeux, Anémies, Asthénies, Grossesse, Dépression cérébrale, Surmenage, Convalescence, Déficiences sexuelles.

**Action.** — Stimulant général de l'organisme et de ses fonctions : circulation, nutrition, respiration. Excitant de l'assimilation et de l'hématopoïèse. Accroissement de résistance et d'euphorie.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 comprimés par jour, 10 jours par mois ; durée moyenne du traitement : 3 mois.

*Enfants* : (à partir de 10 ans seulement), 1 comprimé tous les deux jours.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires H. YVRARD**

17, rue Soufflot — PARIS.

Tél. : Odéon 56-67.

## CÉRÉBROSTHÉNINE DALIN

**Eléments actifs.** — Vanadium, Phosphore, Strychinine, Nucléines, Manganèse en combinaison stable et définie.

**Indications.** — Toutes les maladies déficitaires ou par carence organique, les Asthénies, Anémie, Lymphatisme, Neurasthénie, Maladies consomptives et anergissantes, Grippe, Convalescence, Tuberculose.

**Posologie.** — 1<sup>o</sup> *Cachets* : 1 cachet de Cérébrosthénine avant chacun des 2 principaux repas.

2<sup>o</sup> *Dragées* : 2 dragées le matin, à midi et le soir, avant les repas. De 12 à 18 ans : 1 dragée seulement avant les trois repas.

3<sup>o</sup> *Gouttes* : XX gouttes avant les deux principaux repas. De 12 à 18 ans : 1 goutte par année d'âge avant les 2 principaux repas.

Echantillons (modèles de vente) :

**O. DALIN**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
49, quai Saint-Vincent. — LYON.



## CERÉOSSINE DEHAUSSY

(Simple).

**Reconstituant physiologique.**

**Minéralisateur complet.**

*Os frais* : Os longs de l'animal en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance, contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. *Vitamines D naturelles*).

*Phytophosphine* : Élément phospho-organique extrait des graines de céréales.

*Sels minéraux* : Silice, Manganèse, Fer (hémoglobine).

*Extrait parathyroïdien* : Fixateur des sels minéraux.

*Aucune contre-indication* : Ni Adrénaline, ni Surrénale.

### Indications :

Etats pré-tuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescence, Surmenage.

### Posologie :

*Cachets* : Adultes, 2 cachets. Enfants, 1 cachet.

*Comprimés* : Adultes, 2. Enfants, 1.

*Granulé fondant* : Nourrissons : 1 cuillerée à café. Enfants : 2 cuillerées à café. Adultes : 4 cuillerées à café.

*Poudre* : Nourrissons : 1/2 cuill. à café. Enfants : 1 cuill. à café. Adultes : 2 cuill. à café.

**Prix** : 15 francs la boîte de 40 cachets.

**Granulé et Poudre** : 15 francs.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## CÉRÉOSSINE IRRADIÉE

**Ergostérine activée aux ultra-violets.**

*(Triple contrôle : chimique, spectrophotométrique, biologique ; 1.200 unités anti-rachitiques par cachet.)*

Associée au complexe organo-minéral  
« Céréossine ».

### Indications.

*Rachitisme, Pré-Rachitisme, Croissance, Déminéralisation accentuée chez la femme enceinte et la nourrice.*

### Posologie.

La même que celle de la Céréossine simple.

**Cachets.** — *Adultes* : 2 cachets.

*Enfants* : 1 cachet.

Prix : 22 francs.

### Granulé fondant :

*Nourrissons* : 1 cuillerée à café.

*Enfants* : 2 —

*Adultes* : 4 —

Prix : 20 francs.

## CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

par cachet : 0,020 de méthylarsinate de soude.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cachets.

*Enfants* : 1 cachet.

Prix : 15 francs.

## CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cachets.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

# CÉTHOCAL

**CÉRIUM — THORIUM — CALCIUM**

Toutes les applications des terres rares.

**Indications.** — Traitement externe des Dermatoses, Eczéma, Lupus, etc., Ulcères variqueux, Hygiène des Bébés :

## Poudre et Pâte CÉTHOCAL

Traitement interne des Dermatoses :

## Gouttes et Ampoules CÉTHOCAL

Dépression physique et nerveuse, Convalescence, Arthritisme, Infections intestinales.

## Gouttes CÉTHOCAL

Désensibilisation, traitement de l'asthme, des bronchites chroniques, de l'emphysème, de la coqueluche. Intra-dermo-réaction et Protéinothérapie de la Syphilis :

## Ampoules CÉTHOCAL

Gynécologie : Traitement des métrites :

## Poudre et Ovules CÉTHOCAL

**Mode d'emploi.** — *Poudre* : Employer la poudre telle quelle ou, mieux, délayée dans un peu d'eau bouillie, à consistance de crème ; l'appliquer sur la lésion et laisser sécher, faire tomber l'excès avec un coton ou un linge sec. Une application matin et soir.

**Pâte.** — Une application matin et soir.

**Gouttes.** — *Adultes* : XX gouttes, 2 fois par jour, au début des repas de midi et du soir.

*Enfants* : A partir de 6 ans, V à X gouttes.

**Ampoules.** — Voir instructions spéciales dans la notice intérieure des boîtes.

**Ovules.** — Un tous les soirs.

## Forme et prix :

*Poudre* : 10 fr. *Pâte* : 10 fr. *Gouttes* : 15 fr.

*Ampoules* : 25 fr. *Ovules* : 18 fr.

## Laboratoire du CÉTHOCAL

8 bis, rue J.-J.-Rousseau  
FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

## CÉTRAROSE GIGON

**Composition.** — Solution d'acide protocétrarique  $C^{30}H^{22}O^{16}$  à 0,016 milligr. par cm. c.

**Forme.** — Gouttes.

**Indications thérapeutiques.** — Médicament à électivité musculaire, Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse. Etats nauséux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

**Mode d'emploi et doses.** — XV à XX gouttes en une fois dans un peu d'eau sucrée. Jusqu'à CC gouttes par 24 heures.

**Laboratoires des Produits du Dr GIGON**

**A. FABRE, pharmacien**

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CHARBON FRAUDIN

**Composition.** — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés, doués d'une grande porosité.

**Forme pharmaceutique :**

1<sup>o</sup> Granulés sphériques aromatisés à la menthe. Avec naphtol B : Charbon naphtolé.

Sans naphtol B : Charbon simple.

2<sup>o</sup> Comprimés sans sucre à 0 gr. 75.

**Propriétés.** — Pouvoir absorbant et adsorbant très grand, grâce à la texture particulière des bois légers employés.

**Indications thérapeutiques.** — Gastro-entérites, Dyspepsies flatulentes, Fermentations intestinales, Intoxications de toute nature.

**Doses.** — 3 à 6 cuillerées à café par jour, à la fin des repas.

Prix : Charbon Fraudin naphtolé... 10 fr.

**Laboratoires des CHARBONS FRAUDIN**

4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

Téléph. : Molitor 02-62.

## CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

3 formes :

Anisés simples. — Anisés naphtolés. — Anisés magnésiens.

**Forme.** — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, simple ou magnésien.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable. *Divisent et expulsent mieux que les laxatifs.*

**Indications.** — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvois, Embarras et Fermentations intestinales. *Pour l'Estomac net et l'Intestin net.*

**Dose.** — 1 cuillerée à café, soit après chaque repas, ou le soir en se couchant, ce qui suffit habituellement.

**Nota.** — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible.

La forme des grains supprime le spasme intestinal. Ne contient ni atropine, ni belladone. Peut être donné à tous les âges et dans tous les états.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**

34, boulevard de Clichy — PARIS.

## CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante à base de Thiosinamine, salicylate de soude et stovaïne.

Dépourvue de toute toxicité.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

**Mode d'emploi.** — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>)

Tél. : Roquette 14-12.

## CHENANTHOL

(Vers intestinaux.)

**Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Tricho-céphale, etc.**

Seule présentation officinale, définitive et parfaite, inoffensive et sûre, de l'essence pure américaine de Chenopode, suivant les prescriptions de la *Fondation Rockefeller*.

**Posologie et mode d'emploi.** — Capsules dosées en volume et non en gouttes (1/4 de cent. cube par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge : maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purgé saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

**Régime.** — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos, comme cure radicale.

Prix de vente : 15 francs.

**Laboratoire L. HINGLAIS**  
EPERNAY (Marne).

---

## CHÉRALYS (Comprimés)

**Composition.** — Nickel catalytique Dufayard. Peroxyde de manganèse colloïdal. Cobalt catalytique.

Carbonate de calcium léger. Silicate d'alumine et de magnésie. (En comprimés agréables à croquer.)

**Propriétés.** — Basées sur les principes scientifiques les plus modernes. Activateurs des ferments digestifs normaux. Neutralisants. Antifermentescibles.

**Indications.** — Maladies de l'estomac, du foie, des intestins, Diabète.

2 comprimés après les repas et 2 autres ou plus 3 à 4 heures après.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires DUFAYARD**

12, rue des Saints-Pères — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## CHLOCCI

(Le chlore occit les coccl.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

**Composition.** — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25).

**Indications.** — Petite et grande chirurgie, Pansements humides, lavages. Gynécologie, Urologie.

**Doses.** — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections. 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

**Laboratoire ADAM**  
Docteur en pharmacie  
GRANVILLE (Manche).

## CHLORAL BROMURÉ du Dr DUBOIS

Sédatif nervin préféré aux uréides et opiacés, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac.

Liquide sucré représentant 0 gr. 40 chloral et 0 gr. 60 bromure par cuillerée à soupe.

1 à 6 cuillerées à soupe ou à café, selon l'âge, dans les 24 heures. — Flacon et demi-flacon.

Insomnie, Dysménorrhée, Névralgies, Névroses, Psychoses, Malaises des hypertendus, Tous troubles essentiels ou symptomatiques du système nerveux.

**DURIEZ**

20, place des Vosges — PARIS.

## CHLORALOSANE

Hypnotique non toxique, « l'hypnotique de choix des cardiaques et des dyspeptiques ».

**Composition.** — Chloralose pur, complètement exempt de parachloralose.

**Propriétés.** — Non toxique, sans intolérance, ni accumulation, ni accoutumance.

**Indications.** — Insomnies des cardiaques, des dyspeptiques et des neurasthéniques, des fatigués et surmenés. Agitation nocturne. Psychonévroses et anxiété.

**Mode d'emploi.** — A prendre une demi-heure avant le coucher dans une tasse de tisane ou dans un peu d'eau.

Dose moyenne usuelle : 1 à 3 comprimés.

Prix : le flacon de 20 comprimés de 0 gr. 15 : 12 fr.

**Etablissements KUHLMANN**

**Produits RAL**

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

**Forme.** — Pilules à enrobage de gluten recouvert d'un enduit inattaquable par le suc gastrique.

**Composition.** — Chloramine T 0 gr. 05.  
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

**Indications thérapeutiques.** — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc. D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection intestinale (Fétidité des selles, etc.).

**Posologie.** — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS.



## CHLORASEPTINE OPTIMA

Sodium paratoluène sulfochloramine (0,25 par comprimé.)

Agit à l'instar de la solution de Carrel-Dakin.

**Forme.** — Comprimés dosés à 25 cgr.

**Indications.** — Antisepsie générale. Affections buccale, urétrale, vésicale. Antisepsie hygiénique. Traitement d'affections septiques.

**Mode d'emploi.** — *Chirurgie générale* : 2 à 4 comprimés dans 100 cc. d'eau.

*Oculistique* : 1 à 2 comprimés pour 100 cc.

*Urologie et gynécologie* : 2 à 8 comprimés par litre.

*Stomatologie* : 1 comprimé par verre d'eau.

A dissoudre dans l'eau froide ou légèrement tiède.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

## CHLORÉTHYLE BENGUÉ

**Chloréthyle Bengué.** — Anesthésie locale, névralgies.

Flacons en métal et en verre. Fermeture à clapet très pratique.

**Anestile Bengué.** — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.

Anesthésie locale, névralgies.

**Narcotile Bengué.** — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.

Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

**Chlorure de méthyle pur.** — Bidons de 250, 500 grammes et 1 kilo.

**Docteur BENGUÉ**

Pharmacien,

16, rue Ballu — PARIS (IX°).

## CHLORHYDROL « FOUCHÉ »

**Composition.** — Association chlorhydro-peptique ; acide chlorhydrique naissant sous forme de chlorhydrate de bétaine cristallisé, ionisable par simple solution dans l'eau et pepsine du Codex.

Chaque comprimé correspond à :

Acide chlorhydrique .....	0,05 cgr.
Pepsine .....	0,05 cgr.

**Action thérapeutique et indications.** — Hypochlorhydrie, Hypopepsie, et les troubles Gastro-intestinaux qui en découlent : Pesanteurs, Insuffisance motrice de l'estomac, Dyspepsies duodénales et duodéno-pancréatiques, Diarrhées aiguës et chroniques, Nutrition retardée des anémiques et convalescents.

**Posologie.** — 3 à 4 comprimés par 24 heures (dose moyenne) et davantage selon les cas.

**Laboratoire R.-P. FOUCHÉ**

2, boulevard Pershing — PARIS

## CHLORIDIA

**Pepsine.** — Chlorhydro — Cocainée — Chloroformique.

**Indications.** — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

**Forme et dose.** — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

**Laboratoires des PRODUITS DANNEC'H**

**BRUN ET MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III<sup>e</sup>).

R. du C. Seine 218-670.

## CHLORINOL

Inhalant

**Forme pharmaceutique et composition.** — Huile végétale neutre et stérile avec chlorétone, orthoforme, camphre et essences.

**Propriétés.** — Sédatif, décongestionnant et antiseptique des voies respiratoires.

**Avantages.** — Huile de qualité *exceptionnelle* très *dif-fusible*, très *agréable*, associant à des médicaments actifs des essences dont le *choix* a été déterminé d'après leur *pouvoir antiseptique* et leur action *non irritante*.

**Indications.** — Toutes affections du rhinopharynx.

**Présentation et mode d'emploi.** — Deux formes :  
1° *Liquide* III à IV gouttes, 3 à 4 fois par jour, en instillations nasales ou en pulvérisations et en *injections intratrachéales*.

2° *Capsules* pour instillations nasales, 3 à 4 fois par jour.

**Prescription.** — Un flacon Chlorinol Falvy, ou une boîte capsules Chlorinol Falvy.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII°).

## CHLORMAGNÉSIUM FISCH

**Composition.** — Petits comprimés de chlorure de Magnésium pur anhydre, à 0,20 grammes, absorbables soit en les avalant entiers, soit en les dissolvant dans un demi-verre d'eau.

**Indications.** — Action cholagogue, régulatrice et antiputride des selles ; action dépurative sur les humeurs ; neurotonique, préventif du cancer. Dermatoses, verrues, etc...

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés par jour, aux trois principaux repas. Augmenter cette dose de 1 à 3 comprimés par jour, ou réduire à 3 comprimés par jour suivant indications médicales.

Prix : 9 francs.

**Laboratoires FISCH et Cie**

4, rue d'Ilzsch — MULHOUSE

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X°).

Tél. : Lamartine 92-52.

## CHLOROBACILLINE

**Composition.** — Chloramine T, Charbon de peuplier pulvérisé, Agar Agar pulvérisé.

**Forme.** — Comprimés glutinisés solubles dans l'intestin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Bactéricide, Désodorisation complète des selles, Désinfection de l'intestin sans irritation ni toxicité.

**Résultats cliniques concluants** dans les divers états intestinaux toxi-infectieux : entérites, dysenteries, paratyphoïdes, affections grippales.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 comprimés au début de chaque repas (2 à 6 par jour).

**Laboratoires TULIVET**

G. de Saint-Stéban, Docteur en pharmacie.

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

## CHLOROBYL

**Composition :**

Chloramine.....	0 gr. 05
Bile purifiée .....	0 gr. 10
Charbon .....	0 gr. 10

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 25.

**Propriétés thérapeutiques.** — Désinfection intestinale.

**Indications.** — Entérite, Dysenterie, Affections cutanées.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Prix de vente au public : 14 francs.

**Laboratoires « LOBICA »**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CHLORO-CALCION

**Forme** : Solution.

### Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr. Ca Cl<sup>2</sup>.

### Indications :

*Recalcifiant* : Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

*Hémostatique* : Toutes hémorragies ; et comme *préventif* des hémorragies post-opératoires.

*Diurétique déchlorurant* : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite.

### Mode d'emploi et Doses :

Dans de l'eau sucrée, avant les repas.

*Chez les enfants* au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;  
XX gouttes par année comme *hémostatique* ;  
X à C gouttes comme *anti-albuminurique* ;  
L à CC gouttes contre les *accidents sériques* ;  
3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

*Chez les adultes* :

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;  
LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;  
L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;  
3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;  
LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-sérique*.

**Laboratoires MICHELS**

9, rue Castex — PARIS.

Tél. : Archives 45-12.

## CHLORO-MAGNESION

**Composition.** — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes = 1 gr. 20  $\text{MgCl}^2$  + 0 gr. 50  $\text{CaCl}^2$ .

**Indications.** — Asthénie, Régulation de la sécrétion biliaire, Instabilité intestinale (notamment enfants et nourrissons), Désensibilisation, Urologie, Dermatologie (Verrues, Papillômes, Cancer), Tremblements.

**Emploi.** — Dix jours sur quinze :

*Adultes* : XV gouttes avant chacun des 2 principaux repas ou XXX gouttes le matin à jeun.

*Enfants* : 3 fois V gouttes.

*Nourrissons* : 3 fois III gouttes.

**Intoxications alimentaires.** — XC gouttes en une fois pendant 2 ou 3 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-1.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires **DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS

**DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens.**

Docteur en Pharmacie.

## CHLORUMAGÈNE

Formule du D<sup>r</sup> Martin du Theil.

**Forme.** — Poudre.

**Composition.** — Hydroxyde de magnésium pur  
Codex de densité constante sans odeur ni saveur.

**Propriétés.** — Au contact du suc gastrique *formation de chlorure de magnésium pur à l'état naissant à l'exclusion de tout autre sel halogène* (fluorure bromure, iodure); de ce fait aucune contre-indication.

Régulateur de l'intestin convenant à tous les âges.

**Indications.** — Toutes les indications du chlorure de magnésium. Déficience de la cellule nerveuse. Troubles du sympathique. Hypertension artérielle. Constipation habituelle, entérites, etc.

**Doses habituelles.** — Une cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou de lait.

Laboratoires **LACOMBE et Cie**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## CHLORURE D'AMMONIUM BRÉANT

**Comprimés.**

**Composition.** — Chlorure d'ammonium pur, comprimés à 0,25 et glutinisés.

**Indications.** — Acidifiant urinaire énergétique. Adjuvant de la vaccinothérapie.

**Posologie.** — Avaler sans croquer 4 à 5 comprimés à chacun des repas.

Prix du flacon : 15 francs.

**Laboratoires d'analyses BRÉANT**  
11, rue de Clichy — PARIS  
Tél. : Trinité 23-84.

## CHOCOLATE MILK C. G.

La boisson tonique naturelle.

**Analyse :**

Graisse.....	18	p. 100
Protéine.....	17,4	—
Lactose.....	20	—
Sucre.....	32	—
Hydrates de carbone divers.....	6	—
Matières minérales.....	4,2	—
Eau.....	2,4	—

« CHOCOLATE MILK C. G. » est à base du lait renommé des pâturages du « West Country » de l'Angleterre. Le lait est mélangé au chocolat fin et aux autres ingrédients et séché par le procédé spécial à rouleaux « Cow et Gate ». Cet aliment n'est pas simplement une saveur qui doit se joindre à du lait pour devenir d'une valeur nutritive. C'est un produit complet qui déjà contient du lait.

**Société de Spécialités diététiques et  
pharmaceutiques**  
22, rue des Belles-Feuilles — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

**W. P. WRATHALL**  
204, rue Royale — BRUXELLES

## CHOLAGOL

**Insuffisance Hépato-Intestinale.**

**Présentation.** — Granulé (Cholagogue antiseptique et antitoxique).

**Formule :**

Calomel.....	0,01
Peptone de Witte.....	5,50
Sulfate de magnésie.....	25 gr.

**Indications.** — Toutes les fois qu'à un titre quelconque il faudra drainer foie et tube digestif, produire une sécrétion et excrétion biliaire plus active, une exonération intestinale plus complète.

Ictères, Sub-ictères, Angiocholites, Cholémie.

Lithiase hépato-intestino-rénale, Constipation.

Migraines, Amaigrissements, Vertiges.

**Posologie.** — Une cuillerée à soupe, demi-heure avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau chaude. Rester couché sur le côté droit pendant ce temps.

Prix : 17 francs.

**Laboratoires REBOUL**

PONT-SAINT-MAXENCE (Oise).

**Au même Laboratoire :**

Vitalogène, Sanocure, Cardiobromine, Uribiline, Toni-Bronchique, Tanode, Créo-Suppo-Camphre.

## CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

*Réalisation en thérapeutique journalière  
de l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

**Forme.** — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

**Indications.** — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

**Doses.** — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

**VINCENT, pharmacien**

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.



## CHOLEFLUINE

**Forme.** — Granulé soluble, agréable au goût.

### Composition :

Sulfate de magnésie.....	28 gr. »
3 Peptones (Viande, Poisson, dite de Witte).....	9 gr. »
Hyposulfite de soude.....	4 gr. »
Extrait de Boldo.....	2 gr. 50
Sucre parfumé. Q. S. pour	100 gr. »

**Indications.** — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiase biliaire, Ictère, Insuffisance hépatique et ses conséquences, Intoxications alimentaires, Dermatoses récidivantes, Migraines, Urticaires, Troubles digestifs variés.

**Contre-indication** (temporaire). — Cholécyститes aiguës.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède. Se coucher ensuite 10 minutes sur le côté droit.

### Particularités :

Polyvalence peptonique sélectionnée au maximum :

- 1° Peptone de viande.
- 2° Peptone dite de Witte.
- 3° Peptone de Poisson.

Activité cholagogue renforcée par extrait de Boldo, Action antifloculente et anti-anaphylactique par Hyposulfite de soude.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires LECONTE**

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Louvre 53-16.

## **CHOLÉINE CAMUS**

Extrait inaltérable de fiel de bœuf,  
capsules dosées à 0 gr. 20.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

**Prop. thér.** — Opothérapie biliaire.

**Indications.** — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

**Laboratoires DARRASSE**

7 à 13, rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine).

---

## **CHOLÉINE LACTIQUE**

Opothérapie biliaire et ferments lactiques

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

**Indications.** — Congestion du foie, lithiase, cholécystite, acholie, ictères, hépatites, cirrhoses, cholémie, phénomènes gastro-intestinaux, constipation, colite muco-membraneuse, arthritisme.

**Laboratoires DARRASSE**

7 à 13, rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine).

## CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

**Composition.** — Extrait de Combretum, Extraits biliaires boldine et boldo.

**Propriétés.** — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique Eupeptique, Antitoxique, Laxatif.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

**Dose.** — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas.

Prix : le flacon, 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-3.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Invalides 12-63.

## CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003.

**Doses et mode d'emploi.** — 4 à 6 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir, en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

**Propriétés thérapeutiques.** — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

**Indications.** — *Entérocolite muco-membraneuse*, angiocholite, cholémie familiale.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires DURET et REMY**  
et du Dr Pierre ROLLAND  
ASNIÈRES (Seine).

# CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Formule du Dr L.-G. MARY

**Forme.** — Comprimés à enrobage de Kératine soluble dans l'intestin seulement.

**Composition.** — Boldine 1/2 milligr., incorporée avec :

Extraits biliaires dépigmentés.....	} aa 0,10
Pancréatine extractive.....	
Ferments lactiques purs.....	

par comprimé.

**Dose.** — Adultes : 4 à 6 par jour, aux repas.  
Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

**Indications.** — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques, Diarrhées estivales, Troubles de la peau.

*Echantillons sur demande aux*

**Etablissements DAGUIN**

à SAINT-MAUR (Seine).

## CHOLÉOPEPTINE

Le plus actif des Cholagogues.

**Présentation.** — Granulé soluble.

**Composition.** — Salicylate de soude, Peptone, Sulfate de Magnésie, Urotropine et Charbon activé.

**Propriétés.** — Augmente de plus de 50 p. 100 la sécrétion biliaire, facilite la dissolution des calculs vésiculaires.

**Indications.** — Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Rétention, Ictère; Herpès, Migraines rebelles, Urticaires, Nausées, Asthénie d'origine hépatique. Utilisé avec succès dans le Zona.

Pas de contre-indications. Pas d'intolérance.

**Posologie :**

**Adultes :** 2 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ; 10 jours par mois.

*Dans le Zona,* faire prendre en plus une cuillerée à café après les repas de midi et du soir.

**Enfants :** De 1/2 à 1 cuillerée à café, le matin à jeun.

Prix : 16 fr. 50.

**Laboratoires MARCEL LOGEIS**

24, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XIV<sup>e</sup>). Tél. : Suffren 03-38

## CHOLÉPAN LONGUET

Synergie pancréatique, hépatique, biliaire et duodénale.

Diabète, atonie intestinale, insuffisance hépato-pancréatique.

Comprimés glutinisés et dragéifiés d'extraits de pancréas, foie, duodénum et bile.

2 à 4 comprimés au milieu de chaque repas.

Le flacon : 13 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS

## CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoïdes  
Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous  
dans l'huile végétale.

*Société de Thérapeutique (janvier 1911)*

*Académie de Médecine (avril 1911)*

*Académie des Sciences (juin 1911)*

**Forme.** — Ampoules injectables de 2 cc.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection. Injecter lentement.

**Propriétés.** — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.

Admis aux Assurances Sociales.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-MER

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86.

(Précéd. : 8, rue de la Source, PARIS).

## CHOPHYTOL-ROSA

### Tonique du Foie et Puissant Diurétique

*à base d'extrait de feuilles d'artichaut (Cynara Scolymus)\**  
Communications à plusieurs Sociétés médicales.

**Forme.** — Dragées inaltérables et très assimilables.

**Composition.** — Chaque dragée contient 0 gr. 20 d'ext. sec de feuilles d'artichaut s.l.f.G. Edgard-Rosa.

**Indications.** — Toutes insuffisances hépatiques et biliaires et leurs nombreuses conséquences :

- a) *Troubles de l'excrétion biliaire* : Ictère, Cholécystite, Lithiase, Cholémie, Coliques hépatiques, etc.
- b) *Troubles d'origine hépatique* : Cirrhose, Urticaire, Maladies de la peau, Maladies de la nutrition, Urémie, Hypercholestérinémie, Sclérose, Hypertension, etc.
- c) *Troubles lésant toujours le Foie* : Grippe, Fièvres infectieuses, Maladies des pays chauds, etc.
- d) Et tous les cas où il est indispensable d'avoir un tonique hépatique ou un puissant diurétique.

**Posologie.** — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Peut s'administrer chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose), cure de 10 à 20 jours par mois.

**ROSA**, 1, place Champerret — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

« La feuille d'artichaut en Thérapeutique ».

---

## CHRYSEMINE

(Pyréthrines Carteret).

**Propriétés thérapeutiques.** — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

**Indications.** — Employée dans tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, ténias, trichocéphales, lamblias, amibes, etc.), elle est également indiquée dans le traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire : diarrhée à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, colibacillose et colibacillurie, occlusions intestinales à lombrics, troubles et accidents nerveux dus aux toxines vermineuses.

**Formes.** — Gouttes (*enfants*). Perles glutinisées (*adultes*).

**Administration.** — Les perles s'absorbent les unes après les autres dans une gorgée de liquide. Les gouttes se prennent dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits, des confitures, etc.

**Posologie.** — *Ascaris, tous Helminthes, Amibes, tous Protozoaires* — *Adultes* : 3 à 4 perles. *Enfants* : L à C gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos de 2 semaines.

*Trichocéphales.* — Même traitement que pour les *Ascaris* en prenant comme dose quotidienne : *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : C à CC gouttes.

*Oxyures.* — *Adultes* : 3 à 4 perles. *Enfants* : L à CL gouttes, à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeaisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysémine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

*Ténias.* — *Adultes* : 12 perles. *Enfants* : CC à CCC gouttes, à prendre le matin à jeun pendant 2 jours consécutifs. Supprimer le repas du soir le jour qui précède la cure et réduire le régime alimentaire les 2 jours suivants. Administrer une purgation légère (huileuse ou saline) le dernier jour, 1 heure après la dernière dose.

**Remarque importante.** — Les doses mentionnées peuvent être largement dépassées sans inconvénient, si le résultat de la première cure n'a pas été suffisant.

**Prix de vente au public :** *Perles* : 20 fr. *Gouttes* : 12 fr.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS (17).

## CIBALGINE

Diallylmalonylurée-diméthylaminophényl-diméthylpyrazolone.

Calmant du système nerveux. Analgésique et sédatif, sans opium, sans aucune substance du tableau B, atténue ou fait disparaître toute sensation douloureuse.

**Indications.** — Toutes les algies : Migraine, Névralgies, Courbature, Torticolis, Sciatiques, Douleurs dentaires, Angines, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc. Très efficace dans les douleurs dysménorrhéiques.

*Comprimés — Gouttes — Ampoules.*

**Doses.** — 1 à 4 comprimés par 24 heures. — XX à LX gouttes par 24 heures. — 1 à 2 ampoules par 24 heures.

Le flacon de 15 comprimés : 9 francs.

Le flacon (gouttes) : 13 francs.

La boîte de 5 ampoules : 13 francs.

La boîte de 20 ampoules : 40 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## CICABI « FOUCHÉ »

**Composition.** — Solution aqueuse d'Oxyde de Bismuth arsenical rigoureusement titrée à 3 centigrammes de Bismuth métal pour 2 cc.

Boîtes de 12 ampoules permettant un traitement complet.

**Action thérapeutique et indications.** — Rigoureusement indolore, il ne présente aucun des accidents généralement constatés avec les autres sels de bismuth, solubles ou non solubles ; l'injection est aussi facile qu'une simple piqûre de Cacodylate de soude.

Se présente sous forme de préparation soluble dans l'eau, mais se comporte dans les tissus comme un sel insoluble, d'absorption et d'élimination lente et régulière ; il résulte de recherches toxicologiques que le métal disparaît des urines seulement trente-cinq jours après l'injection (Prof. PICON, J. P. C. 16-4-28, tome VII, page 180)

**Posologie et mode d'emploi :**

*Adultes :* 2 ampoules de 2 centimètres cubes par semaine.

*Nourrissons :* 1/4 de centimètre cube 2 fois par semaine.

*De 1 à 3 ans :* 1/2 centimètre cube 2 fois par semaine.

*Au-dessus de 3 ans :* 1 centimètre cube 2 fois par semaine.

La série est de 12 injections.

**Laboratoire R.-P. FOUCHÉ**

2, boulevard Pershing — PARIS.



## CIMARSENYL

**Nouveau complexe organo-arsenical à noyau cinnamique. Teneur en As :** 24 p. 100. Le plus actif et le moins toxique des arsenicaux. Traitement mixte spécialement étudié et de conception entièrement nouvelle. Granules pour la voie buccale et ampoules pour injections intramusculaires.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, etc. Prétuberculose, Anémie profonde, Asthénie, Adénopathies trachéo-bronchiques, Convalescences, Etats pré- et post-opératoires. Toutes cicatrisations et Dermatoses rebelles.

### Posologie.

**Adultes :** 4 granules par jour et 1 injection de 1 à 2 cc. tous les 2 jours.  
**De 3 à 5 ans :** 1 granule par jour et 1 injection de 1/4 cc. tous les 2 jours.  
**De 5 à 8 ans :** 2 granules par jour et 1 injection de 1/2 cc. tous les 2 jours.  
**De 8 à 12 ans :** 3 granules par jour et 1 injection de 1/2 cc. tous les 2 jours.

Les granules se prennent au milieu du repas.

Les injections se font dans la région fessière.

### Prix :

Boîte de 60 granules.....	14 fr.
Boîte de 12 ampoules 1 cc.....	20 fr.

Echantillons, références médicales et tous renseignements :

**Laboratoires du CIMARSENYL**

68, avenue de Normandie — COLOMBES (Seine).

## CIMATRYL

**Composition.** — Saccharose, Jaborandi, Prêle, Acide borique, Borate de soude.

**Propriétés.** — Action remarquable sur les plaies atones, grâce au pouvoir osmotique considérable du saccharose qui provoque une diapédèse favorable à la réparation des tissus ; celle-ci est aidée par la silice, le Jaborandi favorisant lui-même leur action grâce à son pouvoir vaso-dilatateur périphérique.

**Indications.** — Affections aiguës et chroniques des fosses nasales, polypes récidivants, rhinites atrophiques, etc.

**Formes.** — Poudre impalpable en prises, 5 à 6 fois par jour.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoire du CIMATRYL**

**M. LE BONZEC**

4, place Royale — NANTES.

## CINALOSE

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules injectables de 3 cc.

**Composition.** — Chaque ampoule contient :

Cinnamate de Benzyle.....	0 gr. 03
Lécithine.....	0 gr. 10
Cholestérine .....	0 gr. 04
Lipoïdes spléniques.....	0 gr. 007
Lipoïdes hépatiques.....	0 gr. 007
Camphre. ....	0 gr. 09
Huile d'olive stérilisée cuvée à l'alcool..	3 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Modificateur du terrain, augmentation du processus de défense antibacillaire de l'organisme. Immunisation et vaccination artificielles para-spécifiques vis-à-vis du bacille de Koch.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire et osseuse, Adénopathies, Convalescences des Affections anergisantes, Lupus. Affections pulmonaires : Broncho-pneumonies, Bronchite chronique, Asthme, Emphyseme, Pleurésies, Péritonites bacillaires.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour en injections intramusculaires indolores. — *Enfants* : 1 par jour.

**Laboratoires du Docteur TAVERNIER**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

Tél. : Ségur 08-13.

## CINEYL

Médicament de défense antibacillaire,  
Affections pulmonaires chroniques,  
Bronchites récidivantes.

**Présentation.** — Comprimés (boîte de 100).

**Posologie.** — 3 à 9 comprimés par jour.

Prix : 16 francs.

**Produits chimiques du Maine.**

Laboratoires : 7, rue Saint-André

LE MANS.

## CIPROMAROL

**Composition.** — Cupressus semperv. Equisetum Arvense. Capsella Bursæ Pastoris. Æsculus Hippocastanum. Hamamelis V.

**Indications.** — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

**Mode d'emploi.** — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

**LANDRIN et C<sup>ie</sup>**

12, rue de la République  
PUTEAUX (Seine).

## CITRALIN

**Granulé entièrement soluble.**

**Composition :**

Citrate de soude trisodique..	21 gr. 40
Sulfate de magnésie.....	18 gr. 60
Boldine .....	0 gr. 004
Excipient..... Q. S. pour	100 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antivisqueux, anticoagulant, cholagogue laxatif, excitant de la sécrétion hépatique.

**Indications.** — Gastralgie, Dyspepsie, Insuffisance hépatique, Etats lithiasiques, Diathèse arthritique, Goutte, Diabète, Régulateur vasculaire, Etats pléthoriques, Pneumonie.

**Forme et mode d'emploi.** — Granulé : 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun ou 1 cuillerée à café avant chacun des trois repas.

Prix : 14 francs.

**Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD**  
**M. VIOLET, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## CITROCARBINE

Antisepsie digestive.

**Composition.** — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude.. 10      Charbon animal.. 90

**Action.** — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

**Avantages.** — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

**Indications.** — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.  
Se fait aussi en comprimés.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

**Forme.** — Granulés à saveur agréable. Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique-comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

**Dose.** — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

**Indications.** — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires G. WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CITROLARGOL

Argent sol et Citrate de Soude.

**Action.** — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude.

**Indications.** — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

**Mode d'emploi.** — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## CITROPAÏNE DU D<sup>r</sup> FONTAL

### Composition :

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal.

### Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

### Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

### Forme et Posologie :

<i>Granulé</i> : de 3 à 6 cuillerées à café par jour.	} 14 fr.
<i>Comprimés</i> : de 6 à 9 par jour.	
<i>Cachets</i> : de 2 à 3 par jour.	

**Laboratoires JICEM**

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>).

## CITROPHOS

**Granulé.** — 2 formes : simple et belladonné. Une cuillerée à café contient 1 gramme de Citrate trisodique pur associé aux : Phosphate disodique, Sel de Seignette et Lactose.

Le CITROPHOS belladonné contient en plus V gouttes de teinture de belladone titrée.

**Indications.** — *Simple* : Hypertension, Viscosité sanguine, Insuffisance hépatique, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements.

*Belladonné* : Hyperchlorhydrie, Constipation spasmodique.

**Doses.** — 1 à 4 cuillerées à café par jour dans une tasse à thé d'eau tiède.

Le flacon (simple ou belladonné) : 15 fr.

**Laboratoires H. NOE**

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord).

## CITROSODINE LONGUET

Hyperacidité (douleurs gastriques).

Antiémétique (vomissements des nourrissons).

Eupeptique (dyspepsies, gastro-entérites).

Action lithotriptique et diurétique.

Action sur la viscosité du sang.

(*Pneumonies — Broncho-pneumonies*

*Phlébites — Artérites.*)

Comprimés de 0 gr. 25 citrate trisodique.

Granulé à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

**Doses et mode d'emploi :**

*Nourrissons* : 1 comprimé à chaque tétée.

*Enfants* : 2 à 4 comprimés par jour.

*Adultes* : 3 à 4 comprimés (2 ou 3 fois par jour).

*Pneumonies* : 4 comprimés toutes les 2 heures, dans un demi-verre d'eau ; la médication étant continuée jour et nuit, jusqu'au 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> jour qui suit la crise.

Le flacon de comprimés : 13 francs.

Le flacon de granulé : 14 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## CLEAROL

Pour bains d'œil.

**Composition.** — Hydrolat d'Hamamélis boro-salicylé adréphédriné (sans caustique).

**Propriétés.** — Antiseptique, Calmant, Décongestionnant et tonique des conjonctives et des paupières.

**Indications.** — 1° *Toutes inflammations et injections oculaires externes, Conjonctivites, Blépharites, Dacryocystites, Orgelets, Kératites, etc.*

2° *Tous états inflammatoires professionnels (cinéastes et personnes exposées à des radiations lumineuses intenses ou prolongées).*

3° *Hygiène oculaire, Prophylaxie des poches palpébrales, Conservation de la blancheur de la sclérotique, de l'éclat et de la pureté du regard.*

**Mode d'emploi.** — Étendre le *Clearol* d'un ou deux volumes d'eau chaude. En remplir l'œillère qui accompagne chaque flacon et y baigner l'œil pendant quelques minutes.

Les bains d'œil au *Clearol* calment, décongestionnent et soulagent toujours.

Formuler : *Clearol*, un flacon.

**ROGER, pharmacien**

194, rue de Rivoli — PARIS

## CLISÉMINE LONGUET

Médication citratée injectable.

**Indications.** — **HÉMORRAGIES.**

Cancers (M. Renaud).

Tuberculose, Hémoptysies

Gynécologie.

Interventions chirurgicales (Neuhof et Hirschfeld).

Ampoules de 20 cc. de solution stabilisée renfermant 30 p. 100 de citrate de soude et 10 p. 100 de chlorure de magnésium.

**Dose et mode d'emploi.** — Injection intraveineuse de 15 à 30 cc. (20 cc. en moyenne), selon le poids du sujet.

*Enfants* : Injection intraveineuse de 10 cc.

La boîte de 2 ampoules de 20 cc. : 20 fr.

**Laboratoires LONGUET**

34 rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré  
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

**Composition.** — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

**Indications.** — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

**Posologie.** — *Usages médicaux* : 1 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

*Usages chirurgicaux* : 5 à 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Stérilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

**Avantages.** — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

*Comprimés* . tubes de 20 à 60 comprimés à 0 gr. 25.

*Poudre* : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Prix : 3 fr. 80 et 10 fr.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

*Echantillons médicaux sur demande :*

**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES  
CHLORÉS**

40, rue Thiers — LE HAVRE.



## CLUPEYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés faciles à avaler.

**Composition.** — Poudre intégrale de laitances de harengs, fraîches, desséchées dans le vide et à froid.

**Propriétés thérapeutiques.** — Par sa richesse en phosphore organique (acide nucléinique, lécithine, cérébrine), le Clupeyl est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent stimulant du système nerveux, sur lequel il agit sans le surexciter. C'est l'aliment phosphoré par excellence.

**Indications.** — Anorexie, Amaigrissement, Surmenage physique et intellectuel, Neurasthénie, Asthénie post-grippale, Tuberculose, Rachitisme et toutes adynamies et débilites.

**Posologie.** — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour.

*Enfants* : à partir de 7 ans, 3 à 4. A prendre aux repas. Avaler sans croquer ni sucer.

Prix : 16 francs.

**Lab<sup>re</sup> du CLUPEYL — Pharmacie PANIER**  
MALO-LES-BAINS (Nord).

## COAGULÈNE CIBA

**Hémostatique physiologique.**

(Extrait de plaquettes sanguines.)

Le Coagulène contient les substances coagulantes du sang et des organes hématopoïétiques. Il permet de juguler les hémorragies, même inaccessibles, en provoquant une accélération de la coagulation du sang total. Chez les hémophiles et dans les diathèses hémorragipares, il corrige la crase sanguine et permet à ces sujets de récupérer leur faculté de coagulation en cas de traumatisme ou d'intervention chirurgicale.

**Indications.** — Hémophilie, diathèses hémorragipares, Métrorragies, Hémoptysies, Purpura, etc., et toutes interventions sanglantes, en particulier amygdalectomie.

Voie buccale et hypodermique.

Les flacons de 2 et 5 gr. : 10 et 25 francs.

La boîte de 6 ampoules : 30 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND.**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

**Forme.** — Emulsion de Coaltar.

**Propriétés.** — Antiseptique, Cicatrisant, Désinfectant.

**Indications.** — Hygiène de la bouche, pansement des brûlures, furoncles, anthrax, plaies, traitement de la leucorrhée.

**Dose.** — *Leucorrhée* : 1 cuillère à soupe par litre d'eau.

**Pansement :** Parties égales eau et Coaltar Saponiné.

**Laboratoires LE PERDRIEL**  
11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## COCAÏNE MIDY

(Chloroborates.)

Chaque pastille contient :

Stovaïne .....	0 gr. 001
Chlorhydrate de cocaïne.....	0 gr. 001
Biborate de soude.....	0 gr. 025
Chlorate de potasse.....	0 gr. 075

**Doses et mode d'emploi.** — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

**Indications.** — Affections de la bouche, gorge, larynx : Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs, professeurs).

**Laboratoires MIDY**  
4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CODÉRAX

**Composition.** — Chaque comprimé renferme :  
Codéine, 2 centigr. Terpène et Sucrs résineux pul-  
vérisés de Styrax Benzoin, à à 0,10.

**Forme.** — Comprimés pouvant être absorbés par  
les diabétiques; conservation indéfinie.

**Indications.** — Sédatif des toux les plus rebelles :  
toux d'irritation, spasmodiques, quinteuses, ner-  
veuses, toux des fumeurs, laryngites, trachéites,  
bronchites.

*Insomnies* : 2 comprimés au coucher.

*Maladies d'estomac* : 1 comprimé après le repas  
contre la gastralgie.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans sucer ni croquer.

**Dose.** — 6 comprimés par 24 heures au maximum.

Prix : 11 francs.

**Laboratoire COIRIER**

69, avenue du Maine — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## CODOBROMYL

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Chaque comprimé contient :  
Codéine, 0,01 ; Bromoforme, 1 ; Goutte Thiocol, 0,10 ;  
Caféine, 0,03 ; Benzoate de soude, 0,08 ; Terpène,  
0,08 ; Sunoxol, 0,01 ; Extraits d'aconit, 0,005 ;  
de Grindélia, 0,005 ; d'Ail, 0,02 ; de Sauge, 0,005.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif des toux  
spasmodiques et rebelles. Antiseptique de l'appar-  
eil pulmonaire. Sans irritation gastrique.

**Indications.** — Bronchites aiguës et chroniques,  
Grippes, Trachéites, Toux sèches et rebelles,  
Toux des tuberculeux, Toutes affections de l'appar-  
eil respiratoire.

**Mode d'emploi.** — Avaler les comprimés à l'aide  
d'un peu d'eau, de tisane ou de lait, de préférence  
avant les repas.

*Adultes* : 5 comprimés par 24 heures.

*Enfants* au-dessus de 10 ans : 2 à 3 comprimés.

Prix : 10 fr. 50.

**Laboratoires SAUBA**

MONTREUIL (Seine).

## CODOCOL

### Calmant de la Toux

**Composition.** — Association de Thiophenolate de Codéine, Cinnamate de soude, Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

**Action thérapeutique.** — Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

**Avantages.** — Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gaïacol.

**Indications.** — Trachéites, Bronchites aiguës et chroniques, grippe, pré tuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

**Mode d'emploi.** — 4 à 8 comprimés par jour.

**Laboratoires COUSSINET**

20, rue des Martyrs — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## CODOFORME

**Composition.** — Comprimés enrobés constitués par une nouvelle combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent dans l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur.

Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme, IV gouttes ; teinture d'aconit et belladone, ââ V gouttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

**Indications.** — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropathes). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

**Posologie.** — 5 comprimés p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à partir de 5 ans) 2 à 3 compr. par 24 heures. Avaler sans sucer ni croquer.

**Laboratoires BOTTU**

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## COLARSENOL

**Collutoire inaltérable au Novarsénobenzol.**

### Indications :

Angines de Vincent, rouges, pultacées, lacunaires, à streptocoques, herpétiques, pseudo-membraneuses.

Diphthéries ; adjuvant du traitement par le sérum, désinfection du rhino-pharynx chez les porteurs de germes.

Pyorrhée alvéolo-dentaire, stomatites et gingivites.

**Mode d'emploi.** — En applications sur les amygdales ou les gencives. En gargarismes.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires René CARLIER**  
SAINT-FLORENTIN (Yonne).

## COLCHI-SAL

(Colchicine-Ess. de Wintergreen.)

Chaque capsule contient :

1/4 de mgr. colchicine pure dissoute dans 0 gr. 20 salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0 mgr. 25, salicylate de Soude.

**Dose.** — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

**Propriétés thérapeutiques de l'Ess. de Wintergreen.**

1° Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine ; 2° Calme la douleur ; 3° Liquéfie et augmente la sécrétion biliaire ; 4° Légèrement diurétique ; 5° Diaphorétique ; 6° Diminue la fièvre ; 7° Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée) ; 8° Action antiseptique sur le sang.

**Propriétés thérapeutiques de la Colchicine.**

1° Diminue la production d'acide urique ; 2° Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation ; 3° Soulage la douleur ; 4° Augmente la sécrétion biliaire ; 5° Légèrement diurétique ; 6° Diaphorétique ; 7° Purgatif.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII°).

## COLITIQUE

Vaccin curatif anti-colibacillaire

Adopté par les Hôpitaux de Paris  
et par le Ministère des Colonies.

**Indications.** — Toutes les manifestations du syndrome provoqué **uniquement** par le colibacille.

*Double action* par son émulsion microbienne et par son principe lysant.

**Formes :** Buccale, *la plus active* (10 ampoules de 3 cc.). Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré. — Injectable (10 ampoules de 1 cc.). — Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 25 fr.

Boîte de 50 ampoules pour cliniques et hôpitaux.

**Laboratoires du Dr P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS

## COLI-VACLYDUN

**Lysats vaccins du Docteur Duchon.**

2 formes : Injectable, buvable.

**Composition.** — Lysat de Colibacilles (souches variées).

**Indications.** — Pyélonéphrites, Colibacilloses.

**Posologie.** — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.)

1<sup>re</sup> injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours, puis tous les deux jours. *Coli voie buccale* (non injectable) ampoules de 3 cc. 1<sup>er</sup> jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée; 2<sup>e</sup> jour : 3/4 d'ampoule; ensuite une ampoule par jour pendant huit à dix jours.

**Présentation.** — 1° Coli-Vaclydun injectable en boîtes de 6 ampoules de un centicube. 2° Coli-Vaclydun buvable. — En boîtes de 10 ampoules de 3 centicubes.

Prix : 25 francs.

**Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Carnot 78-11.

## COLLOÏDINE LALEUF

Dragées.

### Composition :

Extrait total pluriglandulaire associé à l'*Iodalbumine*.

### Propriétés et indications thérapeutiques :

Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'*Iodalbumine*, favorise la combustion intra-organique.

Toutes les affections dûes à une carence endocrinienne, et principalement l'obésité, sont justifiables du traitement à la *Colloïdine*.

### Doses et Mode d'emploi :

De 2 à 4 dragées par jour suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Etui de 100 dragées : 24 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## COLLOÏDOGÉNINE du Docteur BAYLE

*Opothérapie splénique intégrale.*

**Nature.** — Extrait total de rate.

**Formes.** — 1° Colloïdogénine injectable (ampoules de 5 cc.). La boîte de 6 : 20 francs.

2° Colloïdogénine sirop. Le flacon : 20 francs.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale). La boîte de 6 : 20 francs.

**Indications.** — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

*Anémies*, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.

*Convalescences, grossesses pénibles, amaigrissement, rachitisme, neurasthénie, déminéralisation, déficiences organiques.*

**Action.** — Augmentation rapide des hématies (50 p. 100) et des leucocytes.

Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100).

Progression rapide des forces et du poids.

Cicatrisation des lésions (visible à la radio), disparition des bacilles de Koch.

**Emploi et doses.** — Séries de 12 injections (intramusculaires dans la fesse ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Après chaque série 8 jours de repos. Pendant les 22 jours de chaque série le sirop de colloïdogénine est donné en même temps (4 cuillerées à soupe par jour aux repas). Dans les anémies et les convalescences le sirop suffit.

**Doses chez l'enfant.** — Au-dessus de 5 ans injecter 5 cc. Au-dessous de 5 ans injecter 1 cc. par année d'âge.

Colloïdogénine sirop : 1 cuillerée à café par jour jusqu'à 3 ans, 2 jusqu'à 5 ans, 1 à 2 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 à 3 jusqu'à 10 ans, ensuite 3 à 4.

**Laboratoires CHAIX**

8 et 10, rue de l'Orne — PARIS (XV<sup>e</sup>).



## COLLOÏL LEISYN

Adoucissant, calmant immédiat du Pyrosis, cicatrisant des ulcérations de la muqueuse stomacale. Régulateur de la sécrétion chlorhydrique, ramenant constamment à son taux normal la valeur d'Hcl du suc gastrique.

**Composition.** — Ferments digestibles, Fluor, Magnésium, Liège de Condor, saturants à proportionabilité rigoureuse de l'Hcl. Exempt de Pepsine et d'Alcaloïdes.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, Ulcus géant, Ulcère rond, Ulcérations disséminées de la muqueuse stomacale, Cancer de l'estomac (voir *Anéo*), Pyrosis, Digestions lentes ou trop rapides, Gastro-succorrhées, Stase alimentaire, Affections gastriques nerveuses, Stricture spasmodique du Pyloré.

**Action.** — Panse et adoucit les ulcérations et les cicatrise doucement. Calme immédiatement les douleurs. Toxicité nulle.

**Posologie.** — Comprimés à croquer : un ou plusieurs comprimés au moment où la brûlure va se faire sentir, de façon à éviter qu'elle se produise. Un ou deux comprimés après les repas. Aucune contre-indication.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Adr. tél. : Laboleisyn Paris.

Tél. : Auteuil 14-73.

---

# COLLO-IODE DUBOIS

## GOUTTES

**Composition.** — Solution titrée d'*Iodhydrates d'acides aminés* à 5 % d'iode pur.

**Action.** — Suractive le tissu lymphoïde (*Lortat*), stimule les glandes endocrines (*Henno*) et exalte les moyens de défense de l'organisme. La présence d'*amines* lui confère une *activité spéciale* dans certaines diathèses.

**Indications.** — Toutes les indications de l'iode, des iodures et leurs diverses préparations. Son champ d'activité est très étendu et s'exerce tout particulièrement dans la carence de la nutrition et des fonctions glandulaires, l'artério-sclérose et les affections du cœur, l'obésité, l'asthme, la goutte et les rhumatismes, la syphilis, l'hyperthyroïdie, la tuberculose pulmonaire à évolution lente et les bacillooses diverses (osseuses, ganglionnaires, etc.), les mycoses, les états infectieux, etc.

**Mode d'emploi.** — *Adultes*: de XX à C gouttes par jour suivant les cas. Il peut se prendre avant, pendant ou après les repas, mélangé à un liquide quelconque.

*Enfants*: de V à L gouttes par jour.

Il n'est pas désagréable à prendre et sa tolérance est parfaite même à hautes doses prolongées. Sa dissociation se fait dans l'intestin et il ne donne pas d'*iodisme*.

## DRAGÉES

**Composition.** — Chaque dragée représente 2 centigr. d'*Iode* combinés à 1 centigr. de *Caféine* et à 10 centigr. de *Théobromine* pure. Dragées à noyaux facilement dissociables et assimilables.

**Indications.** — Asthme, emphysème, artério-sclérose, affections du cœur et des vaisseaux, troubles de l'hypertension, troubles vasculaires, de la ménopause, maladies infectieuses et intoxications, hydropysies, etc.

**Action.** — Cardio-tonique et vaso-dilatateur efficaces. Diurétique puissant et fidèle.

**Mode d'emploi.** — Sauf avis du médecin, la dose est de 1 à 5 dragées par jour chez les adultes, mais il reste seul juge de la médication chez les enfants et les hypertendus artériels.

Ces dragées peuvent être à volonté avalées entières, divisées en plusieurs morceaux ou même dissoutes dans un peu d'eau ou de vin, après les avoir écrasées grossièrement pour en faciliter la désagrégation.

Leur conservation est assurée par un enrobage spécial, mais nous recommandons néanmoins de tenir le flacon à l'abri de l'humidité.

## LABORATOIRES DUBOIS

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## COLLUBLEU

**Collutoire concentré au bleu de méthylène.**

**Composition.** — Actuellement une seule formule.  
Bleu de méthylène chimiquement pur. Borate de soude, Perborate soude. Menthol et auchol, Q. S. pour aromatiser. Excipient glycériné épais.

**Action.** — Antiseptique des formes spirillaires par le bleu, des bactéries banales par le borax et les essences, des anaérobies par l'oxygène naissant (Perborate).

**Indications.** — Angines aiguës, Angines de Vincent, Pharyngites, Rhino-pharyngites, Végétations adénoïdes, Amygdalites, Stomatites, Gingivites, Muguet, Ulcérations de la bouche, Stomatites médicamenteuses, Hydrargyrisme, Saturnisme.

**Mode d'emploi.** — Attouchements tri-quotidiens des parties à traiter.

Littérature et échantillons :

**Laboratoire PERICHON**

11, rue Lepic — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## COLLUTOIRE V. E. DOUMER

### Formule :

Bleu de méthylène V. E.

Doumer .....	1 gr.
Résorcine .....	0 gr. 20
Glycérine .....	30 gr.
Eau distillée .....	70 gr.

**Indications.** — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

**Laboratoires BOMEL**

ANNONAY (Ardèche) — France.

## COLLYRES CHIBRET

“ Optima ”

En ampoules compte-gouttes (supprimant le compte-gouttes et donnant ainsi toute sécurité comme aseptie) au Bleu de Méthylène, Argyrol, Atropine, Atropine et Cocaïne, Pilocarpine, Pilocarpine et Adrénaline, Borate de Soude et Adrénaline, Esérine, Adrénaline, Fluorescéine, Iodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Sulfate de zinc, Sulfate de zinc et Novocaïne, Cyanure de mercure, etc.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à Laboratoires Chibret, 5, rue St-Herem, Clermont-Ferrand (P.-de-D.), France.

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.)

### Laboratoires CHIBRET

5, rue St-Herem, CLERMONT-FERRAND  
(Puy-de-Dôme) (France).

Marque déposée “ OPTIMA ”

## COMBROSMOL

### Phytothérapie hépatobiliaire.

**Composition.** — Préparation *exclusivement végétale* présentée en comprimés dragéifiés, renfermant :

Extrait Buchu .....	0 gr. 05
— Combretum.....	0 gr. 03
— Saponaire .....	0 gr. 08

(Pour 1 comprimé.)

**Propriétés.** — Excite les fonctions de la cellule hépatique par le *Combretum* ; antiseptise les voies biliaires, stimule la diurèse par le *Buchu* ; désintoxique l'organisme par la *Saponaire*.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, Congestion du foie, Cholécystite, Cholélithiase, *Colibacillose*.

**Posologie.** — 4 à 6 dragées par jour.

### Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE

Docteur en pharmacie,

Licencié ès Sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. : Kléber 88-70.

## COMITIOL

**Formules.** — Faible. Normale. Forte.

Chaque comprimé contient : Tartrate-borico-potassique, 0 gr. 50 + Phényl-éthyl-Malonylurée (Synonyme : Gardénal Luminal).

0 gr. 01 par comprimé, formule faible.

0 gr. 02 par comprimé, formule normale.

0 gr. 03 par comprimé, formule forte.

**Indications.** — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Angor Pectoris, Angoisses.

**Avantages.** — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Ethyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

**Doses.** — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

*Enfants* : 1/3 de comprimé par année d'âge et par jour. Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITIOL.

Prix.	Formule faible.	Formule normale.	Formule forte.
Boîte de 10 jours.	12 fr.	16 fr.	18 fr.
— 30 —	30 —	40 —	50 —

**Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments**  
sous les n<sup>os</sup> 309-1, 309-2, 309-3, 309-4.

**Pharmacie GRORICHARD**

12, place de la Révolution — BESANÇON.

## COMPLEXTRAITS

**Phytothérapie intégrale.**

**Condurango.** — Toutes les gastralgies.  
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**Kola fraîche.** — Toutes les asthénies,  
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**G. P. V.** — Toutes les affections utérines,  
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**Marron.** — Toutes les affections veineuses,  
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**Valériane.** — Toutes les excitations, 1 à 3 cuillerées à café par jour.

• Littérature et échantillons :

**Laboratoire des COMPLEXTRAITS**  
**HÉRICOURT (Haute-Saône).**

## COMPOSÉ GMET

**Tonique aux effets précoces et durables.**

**Composition.** — Kola - coca - quinquina, sans addition d'alcool ni de caféine, ni de strychnine.

**Propriétés.** — Tonique général et nerveux. Effets *immédiats* mais *durables*.

**Indications.** — Anémie, Neurasthénie, convalescences, suites de couches, d'opérations, fatigue, surmenage, pré tuberculose, **Asthénies**

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant les repas, une ou deux fois par jour. (En cas de tachycardie, ajouter une cuillerée à café de Crataegus Gmet (régulateur cardiaque).)

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant  
DIGOIN.**

## COMPRIMÉS D'ALIBOUR

**Composition.** — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre. —

**Indications.** — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des flueurs blanches, impétigo, ecthyma.

**Action.** — Antiseptique d'usage courant prophylactique, hygiénique, anti-catarrhal.

**Dose.** — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

**Prix :** 10 francs la boîte de 56 comprimés.

**Laboratoires DURET et RÉMY**  
**et du Docteur Pierre ROLLAND**  
 ASNIÈRES (Seine)

## COMPRIMÉS DE PANTOLAXINE

du Docteur BOVEIL.

**Traitement de la Constipation.**

Ainsi que leur nom l'indique, ces comprimés renferment tous les principes actifs de tous les laxatifs reconnus les plus efficaces et doivent, par conséquent, agir dans tous les cas de constipation.

**Composition.** — Bourdaine, Cuscute, Chardon-Marie, Cascara, Rhubarbe, Aloïne, Evonymine, Belladone, Extraits biliaires, Extraits de glandes intestinales.

**Indications.** — Constipation et ses conséquences (vertige, tension artérielle, éruptions, démangeaisons, haleine fétide, etc.).

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés pris au repas du soir, tous les jours, ou deux à trois fois par semaine suivant les besoins. Demi-dose pour les enfants.

Echantillon et Littérature sur demande.

**Prix :** 6 francs la boîte de 40 comprimés.

**Enregistré** au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 346-4.

**Marc PARIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
 1, rue Lassalle. — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

## COMPRIMÉS « GALAC »

Ferment lactique titrant 50 % de culture pure de Bacille bulgare.

Antiseptique gastro-intestinal.

Traitement spécifique et inoffensif des Gastro-Entérites infantiles, Infections Gastro-intestinales, Dermatoses.

Chaque flacon de 60 comprimés porte UNE ÉTIQUETTE PRÉCISANT LA DATE DE FABRICATION, GARANTISSANT AINSI LA DURÉE D'ACTIVITÉ RÉELLE ET INCONTESTABLE DU MÉDICAMENT.

Adultes : 2 à 3 comprimés; Enfants : 1 à 2 comprimés. Trois fois par jour, délayés dans un peu d'eau bouillie, avant les repas.

Prix du flacon de 60 comprimés : 10 fr.

Laboratoires LAMBERT

Place du Châtelet — ORLÉANS

---

## COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

**Composition.** — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

**Propriétés.** — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

**Indications.** — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, flueurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

**Mode d'emploi.** — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Prix : 9 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.



## COMPRIMÉS KLÉOS

**Indications.** — Maladies nerveuses infantiles (épilepsie, convulsions, douleurs de dentition, terreurs nocturnes).

**Forme.** — Comprimés solubles.

Comprimés Kléos aux polybromures n° 1.

Comprimés Kléos à la Phényléthylmalonylurée, n° 2.

Comprimés Kléos aux tartrates borico-potassiques et sodiques n° 3.

**Posologie.** — 1 comprimé par jour et par année d'âge.

**Avantages.** — Dosage rigoureux, produits purs et stables.

Prix : 12 fr. 50.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires GUÉRET**

2, rue des Cordeliers

MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret).

## COMPRIMÉS LEVURE MYCETA

**Composition.** — Levure de bière active, sélectionnée stabilisée selon le procédé RAPP.

**Propriétés.** — Par ses enzymes entravent le développement des putréfactions intestinales.

Par ses vitamines exercent une influence heureuse sur toutes les fonctions de la nutrition.

**Indications.** — Affections de la peau (furoncle, anthrax, acné, eczéma, dermatose).

Troubles du métabolisme et de l'utilisation nutritive (avitaminose, carences, anémies).

**Mode d'emploi :**

*Adultes* : 3 comprimés, 3 fois par jour ;

*Enfants* : 1 à 2 comprimés, 3 fois par jour délayés dans un peu d'eau qu'on peut ensuite ajouter à un peu de lait ou potage, soit une 1/2 heure avant les repas, soit immédiatement au début.

**Laboratoire ZYMA**

4, rue Bellart — PARIS (XV°).

## COMPRIMÉS « ROCHE » DE THIOCOL

1 comprimé « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. gaïacol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 4 par jour et plus.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupéptique et Orexique.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, etc.

**Avis très important.** — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

*Comprimés « Roche » de Thiocol.*

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## COMPRIMÉS VAGINAUX LEISYN

Remplacent les ovules et n'en présentent pas les inconvénients. Ne coulent pas. Ne tachent pas.

**Action.** — Provoquent les sécrétions favorables, aseptisent les moindres replis du vagin, remplacent avec avantage la glycérine et la gélatine, puissamment décongestionnants, microbicides puissants, anti-blennorrhagiques, anti-syphilitiques, anti-leucorrhéiques, adoucissants.

**Emploi.** — Introduire dans le vagin un comprimé. Observer si possible la position couchée ou se garnir d'une serviette périodique.

**Composition.** — Sous-Gallate de Bismuth, Bucchu, Kawa-Kawa, Quinoléine, Salicylate, Thymolate.

**Indications.** — Vaginites, Vulvites, Métrites, Salpingites, Leucorrhée, Bleunorrhagies et tous états microbiens des organes féminins.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Adr. télégr. : Laboleisyn Paris.

Tél. : Auteuil 14-73.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents

Au sel Vichy-État.

Médication Alcaline pratique et économique.

**Mode de présentation.** — Les « Comprimés Vichy-État » présentés sous forme de pastilles effervescentes permettent de préparer, par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

**Indications.** — L'usage des « Comprimés Vichy-État » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

**Posologie.** — 3 à 4 Comprimés Vichy-État pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

**Georges PRUNIER et C<sup>ie</sup>**

4, rue de la Coutellerie — PARIS  
et Pharmacies.

---

## CONDURANGO GMET

**Composition.** — Extrait total, liquide, sans alcool ni sucre, du Condurango blanco, correspond à 2 grammes d'écorce fraîche par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Amer, apéritif, *sédatif*, de la muqueuse gastrique.

**Indications.** — Toutes les algies gastriques. Principalement : Ulcères, Cancer, Gastralgies réflexes consécutives aux troubles utéro-annexiels.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas ou au moment des crises douloureuses.

**Laboratoire GMET**

27, rue du Faubourg-Montmartre  
PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CONJONCTOL

Collyre nouveau à base de :

1° *Borosalicyl* (acide salicylique dissimulé et naissant). Antiseptique puissant ;

2° *Hamamélis virginica* (200 gr. pour 1 000). A haute dose est un vaso-constricteur qui (différence avec l'adrénaline) ne donne pas de vaso-dilatation réactionnelle. De plus, l'hamamélis virginica est un topique de tout premier ordre et sans danger (différence avec cocaïne).

**Indications.** — Toutes les conjonctivites (aiguës ou chroniques). Adulte ou nourrisson. Se prescrit également dans le cas de : surmenage des yeux.

**Présentation.** — 1° Ampoule-collyre de 5 centimètres cubes. En lavage de l'œil (œillère ou coton imbibé du contenu). Une ou deux fois par jour ;

2° Flacon compte-gouttes, soit en lavage (comme avec ampoule), soit en collyre (II à III gouttes dans l'œil matin et soir).

Littérature et échantillons au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## COPREX

**Laxatif**, doux, efficacité inépuisable, cholagogue sans brutalité garanti exempt de phénolphthaléine et de tous produits synthétiques.

### Composition :

1° Son de grains d'orge.

2° Sulfate de magnésie (à cette dose, il agit en provoquant un léger flux de bile).

3° Chlorure de magnésium (principe rééducateur des eaux de Châtel-Guyon).

4° Extrait spécial de Cascara.

**Dose.** — 1 ou 2 dragées, 1/2 heure de préférence avant l'un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit.

**Laboratoire du COPREX**

39, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CORAMINE CIBA

**Toni-cardiaque stimulant.**

Diéthylamide de l'acide pyridine-b-carbonique. Soluble dans l'eau et pouvant être administré par voie buccale, sous-cutanée ou intraveineuse. Se substitue toujours à l'huile camphrée et parfois aux autres toniques du cœur avec de grands avantages. Pas de contre-indications. Aucune toxicité. Grande marge thérapeutique, possibilité de traitements prolongés.

**Indications.** — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

*Gouttes. — Ampoules.*

**Doses.** — XXV à C gouttes par 24 heures ou 1 à 12 cc. par voie sous-cutanée ou intraveineuse.

Le flacon (gouttes) : 12 francs.

La boîte de 5 ampoules de 1 cc. : 12 francs.

La boîte de 20 ampoules de 1 cc. : 36 francs.

La boîte de 5 ampoules de 3 cc. : 20 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109 à 113, boulevard de la Part-Dieu — LYON

---



## CORÉÏNE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Taillandier.)

La **Coréïne** n'est pas de l'agar-agar.

La **Coréïne** n'est pas extraite de l'agar-agar.

C'est du mucilage pur, indigestible.

**Propriété unique.** — Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

**Indications.** — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

La **Coréïne** constitue un traitement remarquable, souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

**Formes.** — Granulé et paillettes.

« **La Coréïne** est admise par l'Assistance publique. »

### *Pour absorber la Coréïne :*

Mettre la **Coréïne** en paillettes à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La **Coréïne** en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

Le matin, mettez dans un bol la quantité de **Coréïne** en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber tout de suite **comme un potage.**

Aux repas de midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin.

Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

Quant aux nourrissons et aux bébés, une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettre directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avaler un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

**Bibliographie.** — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

L'ouvrage du Dr O. Taillandier, *Le Mucilage pur en Thérapeutique*, — publié en avril 1930, — est en vente au prix de 12 fr. à la librairie Maloine, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, et à la librairie Le François, 91, boulevard Saint-Germain.

Il est adressé gracieusement aux médecins, sur simple demande aux :

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86.

(Précéd. : 8, rue de la Source. — PARIS).



## CORIZOL

**Composition et forme.** — Ephédrine naturelle, Cocaïne (dose légale), Résorcine, Antipyrine, Solution aqueuse, flacons de 24 cc. (Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 668-1).

**Propriétés.** — Emploi en oto-rhino-laryngologie, vaso-constricteur non irritant et non huileux, sédatif, antiseptique, antinévralgique.

**Avantages.** — Décongestionnement durable de la muqueuse nasale. Facilite la respiration et éclaircit la voix. Emploi très facile au moyen du bouchon compte-gouttes à bout arrondi.

**Indications.** — Spécifique des affections de la gorge et du nez. Préventif des affections des voies respiratoires. Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza spasmodique, rhinites congestives, sinusites, asthme.

**Mode d'emploi.** — En instillations dans chaque narine, trois fois par jour, à titre préventif et curatif, au moyen du bouchon compte-gouttes spécial à bout arrondi.

**Prescription.** — Un flacon Corizol.

Prix : 12 fr. 75.

**Laboratoires RENAULT**

24, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

Tél. : Turbigo 64-26.

## CORTIODE

**Régulateur des fonctions cardio-vasculaires.**

**Composition.** — Association d'iodaseptine (43 p. 100 d'iode) et d'iodure de sodium (84, 6 p. 100 d'iode) réalisant une dose d'iode élevée, sans risques d'intolérance.

**Propriétés thérapeutiques.** — Fait baisser la tension artérielle, tonifie le cœur dont elle régularise et intensifie les contractions. Modifie rapidement le pouls bref et tardif.

**Indications.** — Angine de poitrine, Hypertension, Cardiosclérose, Ozène, Emphysème, Micose. Toutes les indications de la thérapeutique iodée intensive.

**Préparation. — Posologie :**

Ampoules de 5 cc (0 gr. 250 d'Iodaseptine, 0 gr. 221 d'Iodure de sodium). 1 à 2 ampoules par 24 heures, en injection intraveineuse ; exceptionnellement intramusculaire. Jamais d'intolérance.

**Solution.** — XX gouttes = 0,050 d'Iodaseptine et 0,0443 d'Iodure de Sodium.

**Dose.** — XXX à L gouttes 2 fois par jour au début du repas. Série de 12 jours par mois.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS

## CORYPHÉDRINE

Association d'acide acétylsalicylique (0 gr. 50) et de Sanédrine (0 gr. 015 Voir p. 931) pour un comprimé.

### Indications :

Affections saisonnières des voies respiratoires supérieures.

Coryza aigu. Rhume des foins. Trachéo-bronchite grippale ou non.

### Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 comprimés par jour par doses régulièrement espacées ; faire déliter les comprimés dans 1/2 verre d'eau.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

### « SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## CRATÆGINE

A base de fleurs fraîches d'aubépine stabilisées (non toxique).

**Propriétés thérapeutiques.** — **Tonique et régulateur cardio-vasculaire.** — Si elle ne peut être considérée comme un succédané de la digitale, elle maintient utilement l'action obtenue avec ce médicament cardiaque comme elle doit maintenir celle que l'on obtient avec l'ouabaïne. — **Vasodilatateur, Hypotenseur** par action vasculaire périphérique.

**Indications thérapeutiques.** — Eréthisme cardiaque. Palpitations des nerveux et des neurasthéniques. Troubles congestifs de la ménopause. Tachycardie paroxystique essentielle. Goitre exophtalmique.

**Doses et mode d'emploi.** — XV à XX gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée. — Dose maxima : XXX gouttes 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

**P. BOUSQUET et E. LEROUX**

Anciens internes des Hôpitaux

46, rue de la Barrière — ELBEUF.

## CRATÆGUS GMET

Très agréable au goût.

**Composition.** — Extrait *total* de la fleur du *crataegus oxyacantha*; sans alcool ni sucre. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Régulateur du sympathique. Cardio-tonique.

**Indications.** — Tachycardie, Arythmie, Erethisme cardiaque, Plexalgies, Cardialgies, Prurit, Insomnie, Angoisse, Gastralgie, et tous les troubles nerveux d'origine réflexe.

**Posologie.** — Une cuillerée à dessert un peu avant l'heure du coucher, dans un peu d'eau ou de lait. (La dose peut être doublée.)

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CRAYONS ANTIFISSURE DOMERGUE

**Principes actifs.** — Acide aniline parasulfonique. Masse spéciale.

**Propriétés.** — Antiseptique. Cicatrisant.

**Indications.** — Fissures anales : « pas d'insuccès ». Hémorroïdes ulcérées. Hémorroïdes.

**Emploi.** — Un crayon à demeure jusqu'à guérison.

**Nota.** — L'application du premier et quelquefois du deuxième est un peu douloureuse.

La boîte de 10 crayons : 20 francs.

**Laboratoires DOMERGUE**

AGEN (Lot-et-Garonne).

## CREAGENOL

Médication reconstituante et tonique.

**Composition.** — Inositolphosphate de chaux et de magnésie. Acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux et hypophosphite de manganèse, en granulé sucré.

**Indications.** — Convalescences et état: anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme. Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

### Mode d'emploi :

**Adultes :** une à deux mesures, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

**Enfants :** 1/2 mesure, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût très agréable.

Prix : 16 fr.

**Laboratoires CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Carnot 78-11.

## CREDONE DEHAUSSY

Méthyl-acétyl-phényl-diméthyl-oxamyl-hydrazide.

*Nouvel analgésique neutre soluble.*

Communication à l'Acad. des Sciences du 12 nov. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 23 déc. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 6 janv. 1930.

Communication à la Soc. chimique de France du 24 janvier 1930.

### Indications :

**Algies :** Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Algies cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.

**Etats infectieux :** Grippe, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

**Nervosisme :** Insomnie, Agitation, Anxiété.

### Posologie :

**Adultes :** 2 à 4 cachets par jour.

**Enfants :** 1 à 2 cachets par jour.

De préférence avec une infusion ou un verre d'eau.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## CRÈME RÉSOLUTIVE du D<sup>r</sup> RAP

**Composition.** — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à action fortement vasoconstrictive et analgésique :

(Hamamelis, Noix vomique, Arnica, etc.)

**Propriétés.** — Calme la Phlébalgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

**Indications.** — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique, entorses, fractures.

**Mode d'emploi.** — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en pulvérisation.

Prix : 11 fr. et 15 fr.

**Laboratoire du D<sup>r</sup> R. CAVAILLÈS**  
29, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CRÉOFORMINE

**Spécifique de la toux et de l'expectoration.**

**Composition.** — Tannocréosoforme, 0,20. Phosphate de gaïacol, 0,05. Bromoforme, III gouttes. Codéine, 0,01.

**Forme.** — Comprimés glutinisés, digérés seulement dans l'intestin.

**Indications.** — Grippe, Toux catarrhales, nerveuses et spasmodiques, Coqueluche, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Ectasie bronchique, Entérite tuberculeuse.

**Mode d'emploi.** — De 4 à 8 comprimés par jour.

*Enfants* : Demi-doses.

Avaler sans croquer.

**Laboratoire de la CRÉOFORMINE**  
18, rue de Jouvence  
DIJON (Côte-d'Or).

## CRÉOSAL DUBOIS

Sirop, Comprimés, Solution.

### Composition :

Le CRÉOSAL réunit dans sa composition le *Gaïacol*, l'*Acide Phosphorique* et le *Calcium* que la Thérapeutique a toujours associés.

### Propriétés et Indications thérapeutiques:

Recalcifiant puissant, antibacillaire, accélérateur de la nutrition. Employé avec succès dans : la Tuberculose pulmonaire, osseuse ou cutanée, les Bronchites aiguës ou chroniques, les Toux rebelles, le Lymphatisme, la Scrofule, le Rachitisme, etc., etc.

*Sirop* : 12 fr. le flacon.

*Comprimés* : 10 fr. l'étui de 50.

*Solution* : 12 fr. 50 le flacon.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>)

## CRÉOSITOIRES

Nouvelle méthode d'imprégnation créosotée.

Actifs. — Indolores. — Non caustiques.

### Composition :

*Pour Adultes :*

Créosote pure. 0 gr. 50

Extr. d'opium. 0 gr. 015

*Infantiles :*

Créosote pure. 0 gr. 125

**Indications.** — Tuberculoses pulmonaires, Carminatif chez les opérés, Prophylaxie des accidents pulmonaires anesthésiques et des complications pulmonaires grippales ou rubéoliques, Curatif de la Coqueluche et de toutes les affections pulmonaires aiguës.

**Posologie.** — 1 à 2 par jour.

**Prix :** *Pour Adultes* : 15 fr. — *Infantiles* : 12 fr.

Echantillons et littérature :

**Laboratoire JOLLY**

1, rue Christine — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. Danton 49-39.

## CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

**Méthylène-Créosote.** Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (95 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

**Indications.** — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

**Mode d'emploi.** — Existe sous quatre formes :

- 1° *Créosoforme-Poudre*, pour saupoudrage des plaies.
- 2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
- 4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI°).  
124, avenue Rogier — BRUXELLES.



## CRÉOSOTE SOLUBLE VACHERON

**Contient :** 0 gr. 15 par cuillerée à soupe ; 0 gr. 05 par cuillerée à café de créosote de hêtre chimiquement pure, riche en gaiacol, et complètement absorbable. Une partie est en solution, le reste est émulsionné à l'aide d'un mucilage qui permet de passer de l'état émulsif à celui de solution (en ajoutant un liquide aqueux quelconque) sans que la créosote se sépare.

**Indications.** — Bronchites chroniques et spécifiques, catarrhe pulmonaire, pneumonie, laryngites chroniques et tuberculeuse.

**Modes d'emploi :**

**Par voie stomacale :** 1 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée, de tisane, de lait ou de vin.

**En lavements :** 1 ou 2 cuillerées à soupe dans un grand verre d'eau.

**En pulvérisations et inhalations :** 1 cuillerée à soupe dans un bol d'eau.

Prix : 14 francs.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**  
14, rue Victor-Hugo — LYON.

# CREO-SUPPO-CAMPBRE

Traitement des affections bronchiques.

## Formule :

<i>Adultes</i> :	Créosote.....	10 gouttes.
	Camphre.....	0 gr. 05
	Véhicule spécial .....	Q. S. pour 2 suppositoires.
<i>Enfants</i> :	Créosote.....	2 gouttes.
	Camphre.....	0 gr. 01
	Véhicule spécial .....	Q. S. pour 1 suppositoire.

**Indications.** — Dans les affections respiratoires, toutes les Hyper-sécrétions bronchiques, et toutes les fois qu'il s'agira de tarir un élément catarrhal en soutenant le cœur trop souvent fatigué par une toux incessante.

Préventif des complications pulmonaires, anté et post-opératoires.

Bronchites aiguës en fin d'évolution, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysème pulmonaire.

Antisepsie respiratoire, si utile après toute infection, Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie.

Dans la pré-tuberculose et la tuberculose non évolutive.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires REBOUL**

PONT-SAINT-MAXENCE (Oise).

**Au même laboratoire :**

Vitalogène, Cholagol, Sanocure, Uribiline, Cardiobromine, Tonic-Bronchique, Tanode.





## CRESENTYL

Le CRESENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr. Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminitique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité.*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRESENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (*Lamblia*, *Balan-tidium*, etc.) Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRESENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin.

### MODE D'EMPLOI. — Désinfection intestinale:

4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas, pendant 10 jours.

**Vermifuge :** *Adultes*, 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

*Enfants*, 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2-3 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours.

Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 12 francs.

### Laboratoire des ANTIGENINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr  
PARIS (V°).

(Anciennement, 43, rue Tournefort.)


Tél. : Gobelins 26-21.

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI°).

# CRÉSOPIRINE

des Professeurs G. CARRIÈRE & E. GÉRARD

Acide Acétyl Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

**Indications.** — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

**Posologie.** — *Douleurs rhumatismales, névralgies :* Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets dans la journée.

*Insomnie :* Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets dans une tasse d'infusion de tilleul.

*Rhumatisme articulaire aigu, fébrile :* Se conformer à l'avis du médecin, qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 8 grammes par jour.

*Grippe :* 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

La boîte de 30 cachets ou comprimés à 0 gr. 50 : 14 francs. Prix public.

La boîte de 30 cachets à 1 gramme, ou 30 comprimés à 1 gramme : 18 fr. Prix public.

Flacon vrac de 500 grammes : 125 francs net à MM. les Pharmaciens.

Flacon vrac de 50 grammes de poudre de Crésopirine : 17 fr. net le flacon à MM. les Pharmaciens.

Laboratoires " STÉNÉ "

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CRINEX

**Gouttes. — Ampoules.**

**Composition.** — Extrait ovarien total désalbuminé en solution alcoolique. Contient, outre la folliculine, toutes les hormones ovariennes.

**Gouttes :** Solution alcoolique. V gouttes (50 par cc.) = 3 unités physiologiques souris.

**Ampoules :** injectables, indolores. 20 unités souris en solution aqueuse isotonique.

**Indications.** — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne. Troubles de la puberté, menstruation, ménopause, castration, obésité.

**Avantages.** — Seule Folliculine ovarienne active à faibles doses.

Provient exclusivement d'ovaires frais d'animaux jeunes.

Garantie exempte de folliculine extraite d'urine ou de placenta.

**Posologie.** — Prescrire CRINEX pendant les 20 jours qui suivent les règles ; par exception (oligoménorrhées, dysménorrhées) dans les 10 jours qui précèdent.

**Gouttes :** dose moyenne optima : 15 à 30 gouttes par jour.

Faire absorber en 2 ou 3 prises, *loin des repas*, dans demi-verre d'eau.

Suivant le résultat obtenu, maintenir la dose initiale, l'augmenter progressivement jusqu'à 45, 60 ou 90 gouttes, ou la ramener à 5 ou 10 gouttes.

**Ampoules :** Injecter 1 ampoule tous les 1, 2 ou 3 jours, suivant les cas.

**Prix :** le flacon de 400 gouttes environ (12 à 25 jours : 18 francs.

Le double flacon, 800 gouttes environ : 30 francs.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires UVÉ-CRINEX**

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV°).

## CRINOCARDINE LALEUF

Ampoules buvables.

**Composition.** — Extraits concentrés spéciaux de Myocarde, Pancréas, Foie, Rein, Muscle strié.

**Indications thérapeutiques.** — Troubles cardiovasculaires de toute origine, Insuffisances cardiaques, Oppressions, Œdèmes, Spasmes, Angines de poitrine, etc. Tous états de déficience organique complexe : Anémies, Surmenage, Convalescences, Dépressions physiques et nerveuses, etc. Insuffisances hépatiques.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 ampoule le matin à jeun, dans un peu d'eau. Si nécessaire, 2 et même 3 ampoules réparties dans la journée.

Boîte de 10 ampoules de 12 cc. : 30 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue de Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## CRINO-STHÉNYL

**Complexe endocrinien des glandes dites « de l'énergie ».**

(Surrénale; hypophyse; orchitine; foie; parathyroïde; thyroïde).

**Comprimés :** étuis de 45.

**Posologie :** 2 à 4 comprimés par jour.

**Ampoules pour injections hypodermiques.**

Boîtes de 6 ampoules.

**Posologie :** 1 injection par jour.

*Pour les enfants :*

**Sirop :** 1 cuillerée à café (correspondant à un comprimé). Dose suivant âge.

**Indications :** chez les enfants retardataires, inattentifs, etc...; chez les adultes: asthénies diverses, surmenage.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS

## CRISALBINE

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Teneur en or : 37 p. 100.

*Indications :*

**Tuberculose pulmonaire.**

Adénopathies tuberculeuses, Lupus, Arthrites infectieuses.

**Présentation :** ampoules contenant 0 gr. 02, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20, 0 gr. 25, 0 gr. 35, 0 gr. 50 de poudre cristalline ; une ampoule d'eau bi-distillée est jointe à chaque dose.

**Posologie et mode d'emploi.** — Injections intraveineuses d'une solution à 5 p. 100 préparée extemporanément, en débutant par 0 gr. 05 ou 0 gr. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## CRISTOLAX WANDER

**Nouvelle formule.**

Huile de paraffine.....	50 p. 100
Extrait de malt.....	40 p. 100
Agar-Agar.....	10 p. 100
Le plus efficace parmi les laxatifs doux, sans action drastique.	

**Forme.** — Paillettes.

**Indications.** — Tous les cas de constipation : nourrissons, femmes en couches, vieillards, opérés, grabataires et personnes délicates en général.

**Doses.** — *Nourrissons :* 1 cuillerée à café 3-4 fois par jour dans le lait ou la bouillie. *Enfants :* 2 cuillerées à café 3-4 fois par jour. *Adultes :* 1 cuillerée à soupe 3-4 fois par jour aux repas, tel quel ou dissous dans un liquide.

Le résultat atteint, continuer un traitement à faible dose : 1 cuillerée à café ou à soupe aux repas principaux.

Le flacon : 12 fr. Le grand flacon : 18 fr.

**Établissements WANDER**

**P. BASTIEN, pharmacien**

CHAMPIGNY (Seine).

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

**Antipyrétique, Analgésique.**

**Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.**

**L'usage de la Cryogénine peut être prolongé sans danger.**

**Constitution.** — Semi-carbamide de formule :  $C^7H^9Az^3O$ , en comprimés et cachets de 0 gr. 25 et 0 gr. 50. Toxicité très faible. Les animaux en expérience supportent impunément des doses considérables : plus de 2 gr. par kilog. d'animal.

**Propriétés.** — La CRYOGÉNINE LUMIÈRE ne ferme pas le rein, ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus. Elle ne provoque pas de vertiges, ni de troubles nerveux ou digestifs. La CRYOGÉNINE LUMIÈRE représente le médicament antipyrétique et analgésique type.

Aucune contre-indication. Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.

**Indications.** — Grippe, fièvre au cours des maladies graves (fièvre des tuberculeux), fièvre typhoïde (permet d'éviter les bains froids), maux de tête, douleurs rhumatismales des membres, goutte, courbature, douleurs erratiques chez les tuberculeux, migraines, etc.

Chez les enfants, la CRYOGÉNINE LUMIÈRE est employée de préférence dans toutes les pyrexies, du fait de son absolue innocuité.

**Doses.** — Chez l'enfant : de 0 gr. 25 à 1 gr. 50 par jour. Chez l'adulte : de 0 gr. 50 à 3 gr. par jour et davantage au cas de besoin.

### LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

## CRYPTARGOL LUMIÈRE

**Antiseptique argentique, stable, atoxique.**

**Constitution.** — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

**Propriétés.** — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrisme. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

**Indications.** — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas).

Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antiseptie générale.

**DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNÉCOLOGIE, OPHTALMOLOGIE.**

#### Formuler :

**Usage interne :** Epuis de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

**Usage externe :** Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

**Gynécologie :** Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

**Ophthalmologie :** Ampoules collyre dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100 de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

### LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

# CRYPTHERMOL DEHAUSSY

Médication anti-syphilitique dissimulée.

Préparation à base de mercure permettant le traitement masqué ou ambulatoire de la syphilis et de l'hérédosyphilis sans troubles gastro-intestinaux, même en cas d'intolérance hydrargyrique (Sirop et granulés de goût agréable, pilules glutinisées).

## Dosage :

*Sirop* : par cuillerée à soupe.

Iodure de potassium..... 1 gr.

Biodure de mercure..... 0 gr. 01

*Pilules* : par pilule.

Iodure de potassium..... 0 gr. 20

Biodure de mercure..... 0 gr. 002

*Granulé fondant* : par cuillerée à café.

Iodure de potassium..... 0 gr. 005

Biodure de mercure..... 0 gr. 0005

## Posologie :

*Adultes* : *Sirop* : 2 cuillerées à soupe par jour. — *Pilules* : 5 à 10 par jour.

*Enfants* : *Granulé* : 1 an : 1 ou 2 cuillerées à café par jour.

5 ans : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

10 ans : 5 à 10 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE

## CRYPTHIOL

**Composition.** — Nouveau composé organique soufré, dérivé de la série aromatique, ni toxique, ni irritant.

**Forme.** — Capsulines glutinisées.

**Action.** — *a.* Par le pouvoir catalytique du soufre non oxydé, le CRYPTHIOL active la désintégration des albuminoïdes jusqu'à leur terme final: l'urée, et accélère l'oxydation des déchets nuisibles de l'organisme.

*b.* Par son action élective sur la cellule hépatique, le CRYPTHIOL constitue un puissant cholagogue et stimule les fonctions uropoïétique et glycémique du foie.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, États congestifs du foie, Lithiases biliaire et rénale, Goutte, Obésité, Rhumatisme chronique, et en général toutes les affections provenant d'une carence soufrée de l'organisme ou d'un métabolisme défectueux.

**Posologie.** — 2 à 4 capsulines par jour, un peu avant les repas.

**Prix :** l'étui de 30 capsulines, 15 francs.

---

Laboratoires **RENARD**

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).



## CRYSIODAL

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

**Indications.** — Pré-tuberculose et tuberculose.

**Présentation.** — Deux sortes de solutions réparatrices en ampoules de 5 cc. :

1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;

2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

**Doses et mode d'emploi.** — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

Prix : intraveineux, 30 fr. la boîte de 6 amp. ; intramusculaire, 25 fr. la boîte de 6 amp.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

5, rue Paul-Barruel, PARIS. — Tél. : Vaug. 11-23.

## CUPREMONE « F »

**Médication Hormonique (folliculine) associée au complexe végétal CUPREMONE**

**Composition.** — Extraits Anémone, Cupressus, Cratægeus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sèneçon, Viburnum.

*Folliculine cristallisée rigoureusement* titrée : 2 500 unités physiologiques par 100 cc. de préparation.

Deux gouttes de *Cuprémone F* correspondent à une unité physiologique de Folliculine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement de choix des désordres génitaux et des troubles de la circulation sanguine.

Activité par voie buccale.

**Forme et mode d'emploi.** — Prendre XL à LXXX gouttes par jour loin des principaux repas (au moins une demi-heure avant) dans un peu d'eau sucrée, 10 jours après les règles et 20 jours par mois.

Prix : 20 francs.

**Laboratoires R. GOUIN**

20, rue des Ecoles — PARIS (V°).

## CUPREMONE SIMPLE

**Composition.** — Extraits fluides préparés dans le vide et d'action toujours égale et constante (Anémone, Cupressus, Cratægus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sénéçon, Viburnum).

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement des troubles de la circulation sanguine.

**Indications.** — Régulateur et stimulant circulatoire. Inflammations et dilatations veineuses : Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Ulcères variqueux. Dépresseur et sédatif vasculaire : disparition des réactions douloureuses dues aux phénomènes congestifs. Sédatif utérin.

**Forme et mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes avant les deux principaux repas dans un peu d'eau sucrée. Hémorroïdes : L gouttes.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires R. GOUIN**

20, rue des Ecoles — PARIS (V°).

---

## CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

**Composition.** — Association rationnelle de : Phénacétine, Théine, Analgésine bicarbonatée.

**Indications.** — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

**Posologie.** — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 1 franc. — 6 cachets : 5 fr. 50.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 32-1.

---

Laboratoire

de la **CURATINE BRUNET**

23, rue des Ecouffles — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CURIODE

**Composition.** — Combinaison organique d'iode et d'un dérivé protéique d'origine animale.

**Avantages.** — Entièrement assimilable, plus efficace que les iodures alcalins et jamais aucun phénomène d'intolérance ou d'iodisme. — Elimination régulière.

**Propriétés.** — Le *Curiode* est :

- a) *Vaso-Dilatateur* (Artériosclérose, Hypertension, etc.).
- b) *Stimulateur des organes lymphoïdes et des Séreuses* (Adénopathies, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie).
- c) *Donne de la fluidité au sang et aux sécrétions* (Asthme, Emphysème, Toux spasmodique, Coqueluche).
- d) *Indispensable au traitement de la Syphilis.*

### Indications :

- 1° *Affections cardio-vasculaires* : Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Péricardite.
- 2° *Affections respiratoires* : Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche, Laryngite chronique, Bronchites anciennes.
- 3° *Affections des organes lymphoïdes* : Adénopathies de la scrofule et de la Tuberculose. Gourme. Végétations adénoïdes. Goitre, Arthropathies, Hydarthroses.
- 4° *Syphilis et toutes ses complications.*

**Posologie.** — XX gouttes correspondent à : 1 gramme de KI ou à 4 centigr. d'iode métalloïdique. Doses moyennes : XX à XL gouttes par jour, à prendre en deux fois (aux repas).

**Remarque.** — Quand les doses atteignent LX gouttes, il est préférable de commencer par X gouttes à chaque repas (XX gouttes par jour) et d'augmenter d'une goutte par repas tous les jours jusqu'à XXX gouttes par repas. Repos une semaine par mois.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

## CURIODE ARSÉNIÉ

**Composition.** — Combinaison organique d'iode, d'arsenic et d'un dérivé protéique d'origine animale.

**Indications.** — Les mêmes que celles du *Curiode* et de l'arsenic. Recommandé chez les enfants et les adultes atteints d'affections pré-tuberculeuses et d'adénopathies simples ou trachéo-bronchiques.

**Posologie.** — XX gouttes correspondant à : 1 gramme d'iodure de potassium : 5 milligr. d'acide arsénieux ; 5 centigr. de méthylarsinate de soude (arrhéнал), 2 cuill. à soupe de sirop iodotannique.

**Doses moyennes.** — *Adultes*, XX à L gouttes par jour. *Enfants* : II à III gouttes par année d'âge.

**Mode d'emploi.** — A prendre en 2 fois pendant les repas. Commencer par des doses faibles et augmenter tous les jours d'une goutte par repas. Repos une semaine par mois.

### TOLERANCE ET INNOCUITÉ ABSOLUES

Prix : 12 francs.

Echantillon gratuit à MM. les Docteurs.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS.

## CUROGÈNE

*Elixir* antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

**Indications.** — Sédation de la douleur : Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes, Sciatiques, Dysménorrhée, Grippe, etc.

**Doses et modes d'emploi.** — *Adultes* : 2 cuillerées à café; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

*Enfants* au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 14 francs.

Le flacon d'essai : 3 francs.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD, \*~~19~~.

145, rue Yves-le-Coz — VERSAILLES.

## CURORAISIN

Extrait concentré de raisin frais stabilisé par électroïonisation (Brevet N° 319.427).

Énergétique, Alcalinisant, Diurétique, Laxatif, Cardio-tonique, Croissance des enfants.

**Posologie.** — *Adultes* : Une cuillerée à soupe dans 1/2 verre d'eau, le matin à jeun.

*Enfants* : Une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau ou pur, ou selon l'indication du médecin.

R. COLAS, pharmacien

133, rue Lecourbe — PARIS

Tél. : Vaugirard 48-10.

Dépositaire Général : O. C. P. Paris.

## CUROXYURE

Traitement efficace des oxyures.

**Forme.** — Pommade en tube muni d'une canule en os.

**Composition.** — Acide thymique, naphthaline; savon médicinal; extraits d'absinthe et de tanaïsie.

S'applique aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes, *sans aucun danger.*

**Laboratoires B. E. A.**

Ch. BEHA, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
BELFORT.

---

## CUSCUTINE FOULON

**Indications.** — Laxatif doux, très actif. Stimule les sécrétions intestinales et décongestionne le foie.

La Cuscutine peut être prise pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes menstruelles, etc...

**Composition.** — La CUSCUTINE est composée d'extraits végétaux : Cuscuta, Séné, Aloïne, etc.

**Posologie.** — Une à 2 pilules au repas du soir.

Echantillons gratuits.

L'étui de 50 pilules : 5 fr.

**Pharmacie Rationnelle**

20, faubourg Poissonnière. — PARIS (X<sup>e</sup>).

## **CYANHERMINE**

**pour traitements antisyphilitiques**  
à base de Cyanure de mercure.

**Ampoules pour injections intraveineuses.**

### **Composition :**

Cyanure de mercure (chimiquement pur) .....	0 gr. 01 cgr.
Sérum isotonique .....	2 cc.

### **Propriétés :**

**La Cyanhermine, étant une solution à 1/200 en sérum isotonique, réalise le maximum de tolérance.**

### **Mode d'emploi :**

**Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.**

**La boîte de 12 ampoules : 10 francs.**

**Laboratoires CAILLAUD**

**37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).**

**Tél. : Invalides 12-63.**

---

## **CYNHÉPATIL**

**Essore le foie, draine la bile, active la diurèse.**

Association d'extrait de feuilles d'artichaut, poudre de foie stabilisée.

**Il essore le foie hypertrophié** de façon si manifeste qu'on peut en percevoir de jour en jour la diminution de volume et le retour à la normale.

**Il draine la bile** au point de faire disparaître en quelques jours un ictère aigu.

**Il provoque une véritable débâcle urinaire**, éliminant ainsi toxines et composés xanthiques qui encrassent le foie et entravent le fonctionnement du filtre rénal.

**Le Cynhépatil** rend au foie son activité en tonifiant la cellule hépatique.

### **Mode d'emploi :**

6 à 10 comprimés par jour. Ces doses peuvent être augmentées. Pas de contre-indications.

Le flacon de 80 comprimés : 18 francs au public.

Littérature, échantillons :

**Laboratoires BENDERITTER & C<sup>ie</sup>**  
**VENDOME (Loir-et-Cher).**



## CYNUROL-ROSA

**Antiurique, antiseptique et diurétique.**

« Dragée la boue urique. »

« Sauvegarde l'appareil urinaire. »

- Il assure la véritable cure de diurèse et d'élimination urique et abaisse le taux de l'urée, de l'acide urique, et de la cholestérine chez les rénaux et les arthritiques, dont il améliore la tension. »

**Forme.** — Dragées inaltérables et très assimilables.

**Composition.** — *Extrait de feuilles d'artichaut* (Cynara Scolymus), Uva-Ursi, Urotropine et Salicylate double de Phenyle-Pipérazine.

**Indications.** — a. *Dialhèse urique*: Rhumatisme, Arthritisme, Maladies de la nutrition, Urémie, Uricémie, Hypercholestérinémie, Lithiase biliaire et urinaire, etc.

b. *Affections vésico-rénales*: Cystite, Uréthrite, Pyurie, Colibacillurie, Oxalurie, etc.

c. *Maladies infectieuses* (parallèlement au traitement spécifique): Grippe, Angine, Fièvres diverses.

**Posologie.** — De 6 à 12 dragées par jour au cours des repas, cure de 10 à 20 jours par mois.

**Contre-indications.** — Albuminurie fonctionnelle et lésions de l'appareil vésico-rénal.

**ROSA**, 1, place Champerret — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

« La feuille d'artichaut en Thérapeutique ».

## CYPROVEINOL

**Millefeuille-Ficaire-Cupressus**

**sans Hamamélis ni Marrons d'Inde.**

**Indications.** — Congestions prostatiques, Congestions veineuses; Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Ulcères variqueux, Troubles de la Puberté et de la Ménopause.

**Mode d'emploi.** — XXX gouttes 2 fois par jour dans un quart de verre d'eau sucrée au milieu des principaux repas.

**Laboratoire DEPRUNEAUX**

18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue.

(Vitamines A et D.)

### Formes :

- 1<sup>o</sup> Gouttes : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.)
- 2<sup>o</sup> Granulé : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

### Action :

Fixe la chaux par son cholestérol. Stimule les défenses organiques.

### Indications :

Anémies, avitaminoses, adénopathies, croissances, rachitisme, inappétence.

### Posologie :

#### *Gouttes. Enfants :*

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

#### *Gouttes. Adultes :*

XXX à XL gouttes.

A prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

#### *Granulé. Enfants :*

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

#### *Granulé. Adultes :*

2 cuillerées à soupe par jour.

**Laboratoires MARTIN**

24, rue de Charenton — PARIS.

## CYTO-CHOLINE

### Composition :

Chlorhydrate de Choline pur.....	2 centigr.
Sérum chloruré isotonisant.....	2 centicub.

**Indications.** — L'injection de **Cyto-Choline** peut être associée aux divers traitements chimiothérapiques et collapsothérapiques de la tuberculose.

Elle est indiquée chaque fois qu'une lésion tuberculeuse est en cause, que la localisation soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, que l'évolution soit aiguë ou chronique.

**Mode d'emploi.** — La **Cyto-Choline** s'emploie en injections sous-cutanées, pratiquées avec les précautions aseptiques habituelles, au niveau de la cuisse, tous les deux jours.

Comme il s'agit d'une médication ayant pour but de modifier le terrain, elle doit être poursuivie pendant plusieurs mois, sans interruption.

**Résultats.** — Associée à la cure hygiéno-diététique, la **Cyto-Choline** favorise le développement du processus de sclérose cicatricielle chez les tuberculeux pulmonaires, et détermine chez ces malades une amélioration des symptômes fonctionnels.

Dans les tuberculoses extra-pulmonaires, les résultats de ce traitement ne sont pas moins remarquables.

Boîte de 12 ampoules : 20 francs.

Laboratoires pharmaceutiques **CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes, 27 — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone Carnot 78-11.

## CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arseniée.

Le **CYTO-MANGANOL** constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

**Indications.** — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

**Mode d'emploi.** — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

**Dose.** — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les deux jours pour les adultes ; une ampoule de 2 centicubes pour les enfants.

### Présentation :

*Cyto-manganol pour adultes.*

Boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 fr.

*Cyto-manganol infantile.*

Boîte de 12 ampoules de 2 cc.

Prix : 15 fr.

Laboratoires pharmaceutiques **CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes. — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Carnot 78-11.

## CYTOPAN

**Forme.** — Vin composé de goût agréable.

**Composition.** — Acide phosphorique, teinture de noix vomique.

*Cytopan F* : Même composition que le Cytopan avec extrait fluide de fénugrec désodorisé.

**Indications.** — Toute décalcification, pré-tuberculose, faiblesse générale, asthénie de toute nature, surmenage physique et intellectuel.

*Cytopan F* : Amaigrissement.

**Doses.** — 1 cuillère à soupe avant les repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire LAROZE**

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

---

## CYTOPHÉDRINE

**Médication préventive et curative de l'asthme.**

**Composition :**

Ephédrine naturelle .....	0,02
Iodhydrate de codéine.....	0,01
Belladone .....	0,03

En comprimés enrobés.

**Indications.** — Asthme bronchique, emphyseme pulmonaire, dyspnée.

**Mode d'emploi.** — 2 à 5 comprimés par 24 heures en prises espacées, suivant la tolérance du malade.

**Présentation.** — En boîte métallique.

Prix : 16 francs.

(Voir Sérum antiasthmaticum de Heckel, page 1066).

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS

Tél. : Carnot 78-11.

## CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

### Composition :

<i>Carodylate de soude chimiquement pur.</i>	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine .....</i>	<i>Un milligramme</i>
<i>Sérum isotonisant chloruré .....</i>	<i>Cinq centicubes,</i>

**Mode d'emploi.** — Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

**Action.** — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

**Indications.** — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose, Neurasthénie. Asthénie post-grippale, Convalescences.

**Présentation.** — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 20 francs.

Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Carnot 78-11.

---

## DECORPA

**Mucilage spécial contre la faim.**

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

**Action.** — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

**Indications.** — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

**Doses.** — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

**Laboratoires NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). Tél. : Lab. 03-00.

## DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium

Stimulant biologique général

par hyperminéralisation magnésienne.

Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

**Indications thérapeutiques particulières.** — Asthénie et fatigue générale. Surmenage, Convalescence des maladies infectieuses. Dépression de certains malades devant être opérés.

Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires. Tremblements séniles ou autres : Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes.

Troubles cardiaques par hypervagotonie.

Affections de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné chronique, Verrues.

Adénome prostatique.

Lésions de type précancéreux et prophylaxie du cancer.

**Mode d'emploi et doses.** — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

**Laboratoire de PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE**

8, rue Vivienne — PARIS.

## DELCAÏNE ROQUES

**Chlorhydrate de pseudococaïne droite**

*Cocaïne aneuphorique* par double isomérisation stéréochimique.

Trois fois plus active, trois fois moins toxique que la cocaïne officinale. N'est pas **un** stupéfiant, ne figure pas au tableau « B ».

**Emploi.** — Anesthésie locale, régionale, rachidienne. Anesthésie par instillations, badigeonnages.

**Forme.** — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 % en ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. pour anesthésie locale, régionale. Dispositif pour préparation extemporanée pour injection rachidienne.

Ampoules de Delcaïne crist. pour rachidelcaïnisation.

Flacons de 15 cc. et 50 cc. à 5 % et 10 % et

Bonain à la Delcaïne pour anesthésie par contact. Delcaïne en poudre, flacon de 2 gr.

### Etablissements ROQUES

36, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## DEMALGON

Un comprimé équivaut à 0 gr. 18 de Bromédiéthylacétylcarbamide et 0 gr. 27 de diméthylaminophényldiméthylpyrazolone.

**Indications.** — Tous les maux de tête, douleurs névralgiques, règles douloureuses, maux de dents, fatigue, neurasthénie, états fébriles, rhumatisme, arthrite.

**Forme.** — Comprimés à 0 gr. 45.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés pour les adultes ; 1/4-1 comprimé pour les enfants.

**P. BASUYAUX, pharmacien**

94, rue Pasteur — FONTENAY-SOUS-BOIS  
(Seine).

## DENISOLINE

**Lotion colloïdale au Soufre électro-négatif.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionne les tissus sanguins sous-épidermiques ; apporte au derme le soufre déficitaire et rend la peau souple, ferme et saine.

**Indications.** — Acné sous toutes ses formes. Etats séborrhéïques, Pityriasis.

**Mode d'emploi.** — Une application le soir à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Laisser sécher.

**Laboratoires BRISSON**

**D<sup>r</sup> DEDET ET Cie, Pharmaciens.**

**Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.**  
157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

## DÉPURATIF-ROB LECHAUX

Aux sucres végétaux concentrés et KI.  
Publicité uniquement médicale. Le Rob Lechaux est prescrit par le médecin.

**Indications.** — *Cure de désintoxication générale.* Printemps et automne.

**Action.** — Immédiate. Augmentation de toutes les sécrétions des glandes externes et internes. Abaissement de la tension sanguine. Désintoxication.

**Dose.** — Une cuillerée à soupe le matin à jeun pendant 2 mois. Une autre cuillerée à soupe le soir si nécessaire.

Le flacon : 14 fr.

Dépôt général :

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
Echantillons sur demande.



# DÉPURIODE

du D<sup>r</sup> Roger Weber.

**Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.**

Une cuillerée à soupe contient  
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

**Formule.** — Extraits de bardane stabilisée, de fume-terre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé : à à 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium 16 gr. 70. Pour 1 000 cnc.

**Indications.** — Furonculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses.

**Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité.**

**Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstitielle albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.**

**Mode d'emploi et posologie.** — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

**Adultes** (dose moyenne) : 1 cuillerée à soupe. Contre artériosclérose et hypertension : 1 cuillerée à dessert.

**Enfants** : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 cuillerée à café.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoire ANGELINI

61, rue de Seine — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Téléphone : Danton 92-73.

## DERMATYOL GODART

Onguent dermatologique.

Pommade sans vaccin.

*Toutes les affections et irritations du derme.*

Blessures, Brûlures, Eczémas, Démangeaisons, Rougeurs des bébés, etc.

**Formule.** — Bithiol, Borax, *Benjoin*, Eau de lavande, Eau d'Hamamélis, Oxyde de zinc, Beurre de cacao, Onguent simple.

Prix :

Le tube de 55 gr.....	14 fr. Belges.
Le demi-tube.....	8 fr. —

Littérature et échantillons :

Laboratoire de la Meuse,

**ANDENNE (Belgique)**

**LEON GODART, Pharmacien.**

## DERMODULCIS LAGOUTTE

**Composition et forme.** — Pâte neutre en tube aseptique à base de : oxyde de zinc, amidon, huile de noyaux, lanoline et vaseline pure : à à p. e.

**Actions thérapeutiques.** — Isolante, adoucissante, astringente, siccatrice. S'étend facilement et s'enlève aisément.

**Indications.** — Erythèmes, Eczémas aigus ou chroniques, Dermites aiguës de natures diverses. Radio-dermites, Prurigo, Impétigo, Herpès, Séborrhée, Dartres, Ulcères des jambes, Crevasses, Pansements chirurgicaux, Fistules, Anus artificiel.

**Mode d'emploi.** — En onction matin et soir.

Prix du tube de 60 gr. : 10 francs.

Son efficacité est heureusement complétée par la **DERMODULCIS** (Poudre) adhérente, infermentescible, adoucissante.

Prix de la boîte : 6 francs.

Laboratoire **LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube.  
(Extr. de hêtre.)

**Propriétés.** — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

**Indications.** — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres); du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards (verruques plates séniles).

Impétigo, Herpès : Tricophyties (herpès circinné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 12 francs.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (cholagogue et diurétique), le *Raitoryl* (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 francs.

**Laboratoires de la DERMOFAGINE**

15, pl. Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER  
(Pas-de-Calais).

## DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil.)

**Forme avec le Zébo-Plastol et le Crémo-Plastol** le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

**Propriétés.** — Le Dermo-Plastol est la préparation qui convient au plus grand nombre de cas ; il calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

**Indications.** — Les *Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres ; eczéma de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

Enregistrés au Laboratoire national de Contrôle sous les nos 1-1, 1-2 et 1-8.

**Laboratoires DUMESNIL**

10, rue du Plâtre — PARIS.

## DERMORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

**Composition.** — Pommade à base de **Bromure de Radium** associé aux meilleurs topiques usuels (soufre, camphre, Pix betulina, oxyde de Zn).

**Propriétés.** — Action particulière du **Radium** sur les réactions inflammatoires locales.

Accentuation des propriétés de chacun des topiques, par radioactivité induite.

Le **DERMORADOL** calme l'irritation et la douleur dès la première application. Cicatrise rapidement toutes les dermatoses.

**Indications.** — Acné, brûlures, eczémas, érythèmes, furoncles, herpès, impétigo, prurits, plaies atones, psoriasis, ulcères variqueux.

**Mode d'emploi.** — Appliquer 2 ou 3 fois par jour la quantité de pommade nécessaire pour recouvrir complètement la partie malade.

**Établissements LABORADIUM**

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

---

# DERMO-RHINHISTOL

## TOPIQUE MIXTE GRAS

### OPOTHÉRAPIQUE ET CHIMIOTHÉRAPIQUE

à base de poudre d'embryon total

**RÉGÉNÉRATEUR CELLULAIRE DES TISSUS**de la  
**PEAU DE TOUTES RÉGIONS ANATOMIQUES**  
et de la**MUQUEUSE DU RHINO-PHARYNX**

— PRÉSENTATION —

**PRÉSENTÉ SOUS FORME DE POMMADE STABLE**

— COMPOSITION —

Poudre d'embryon total.....	2 gr.
Calomel.....	4 gr.
Camphre des Laurinées.....	1 gr. 50
Goménol.....	1 gr.
Essence de pin sylvestre.....	1 gr.
Eucalyptol.....	0 gr. 30
Menthol.....	0 gr. 20
pour 100 gr.	

Essence aromatique..... q. s.

**Excipient : vaseline et lanoline pures, neutres et stérilisées.**  
**N. B.**— La préparation opothérapique de poudre d'embryon total employée est faite à partir de fœtus frais provenant d'animaux récemment abattus, rigoureusement sélectionnés et contrôlés. Chaque fœtus ou embryon est desséché dans le vide et à froid avant d'être pulvérisé. La poudre d'embryon total ainsi obtenue est garantie pure et sans odeur. Sa conservation est indéfinie.

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

**DERMATOLOGIE — TRAUMATOLOGIE**

(Toutes les dermatoses) (Toutes plaies et brûlures)

**OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE**

Rhinites — Pharyngites — Otites

Coryza — Rhume de cerveau — Ozène

Antisepsie nasale indirecte par stimulation des tissus  
etAntisepsie nasale directe microbicide par action chimique  
prophylactiques  
contre certaines infections  
(grippe, diphtérie, tuberculose, etc...)**CONVIENT A TOUS LES AGES****AUCUNE CONTRE-INDICATION**

— MODE D'EMPLOI —

Pansements divers — Onctions — Aspirations nasales  
(Applications renouvelées plusieurs fois par jour.)

— PRIX DE VENTE IMPOSÉ —

Le tube de 40 gr. (Modèle unique) : 16 fr.

**LABORATOIRE DU DOCTEUR L. DELALBRE****PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS**

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

**DÉPOT GÉNÉRAL**

Service Commercial et Service Médical

**2, R. CLAUDE MATRAT - ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)**G. R. LANG, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE**

## DERMOSPLÉNINE

**Extrait désalbuminé aqueux de rate.**

Communication à la Société Médicale des Hôpitaux  
(Paris, 5 décembre 1930).

**Eczémas secs et suintants, aigus et chroniques.**

**Prurits — Urticaires — Œdème de Quincke.**

Ampoules de 2 centicubes correspondant à 50 gr.  
de rate fraîche de veau.

**Mode d'emploi. — Injection intramusculaire. —**

Commencer le traitement par l'injection de  
2 ou 3 ampoules à la fois ; une injection tous les  
2 jours ; dès que le prurit est nettement atténué  
et que les lésions cutanées commencent à s'effacer,  
l'on peut réduire la dose à une ampoule, égale-  
ment tous les 2 jours.

**Références cliniques : Lipospléninine du Dr Groc,**  
14, rue des Minimes, Paris (III<sup>e</sup>).

**Vente :**

**J. OLIVE, pharmacien**

14, rue des Minimes — PARIS (III<sup>e</sup>).

Tél. : Archives 03-94.

---

# DERMO-STALYS

du Docteur Wagon

(Pommade renfermant du Bactériophage).

## But et principe :

Application pratique aux affections cutanées des propriétés d'un Bactériophage antistaphylococcique multivalent.

## Composition :

Filtrat bactériophage antistaphylococcique .....	100 cc.
Orthoquinoléine sulfonate de potasse.....	0 gr. 25
Excipient. Q. S. pour.....	1 kg.

## Indications :

Toutes *Staphylococcies cutanées*. Furoncles, Anthrax, Acné, Sycosis, Impétigo, et affections ou lésions aggravées par le *Staphylocoque* : Eczémas suintants, intertrigo, Pyodermites, Ulcères, Plaies suppurées atones. Otites externes, Crevasses, Fissures anales.

Emploi sans danger.

Contre-indications. — Néant.

## Mode d'emploi :

Pour Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies, étaler une bonne couche sur la zone malade, enflammée, suintante ou purulente ; compresse stérile, bande ou bandelettes agglutinatives.

Sur la face (Acné, Sycosis), appliquer une mince couche matin et soir avec léger massage, sans pansement.

Eviter l'emploi concomitant de tout antiseptique.

## Résultats :

Disparition des phénomènes inflammatoires en 2-4 jours.

## Remarques :

a) Pour l'acné et le sycosis, faire suivre les premières applications d'un traitement d'entretien durant plusieurs jours en utilisant la pommade à la manière d'une crème de beauté.

b) Pour les vastes placards eczémateux, tâter la susceptibilité des malades en n'appliquant au début le produit que sur une surface de la dimension d'une pièce de 2 francs et augmenter ensuite progressivement.

Prix : Tube de 25 grammes : 18 francs.

Echantillons et littérature sur demande :

**SOCIÉTÉ DES PRODUITS STALYS**

Laboratoire SIDEPAI

64, rue La Boétie — PARIS.

Téléph. : Elysées 98-82.

## DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du D<sup>r</sup> Paul Cantonnet).

### Traitement principal d'attaque :

1<sup>o</sup> Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 40 francs.

### Traitements adjuvants et de maintien :

Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : Le flacon avec pulvérisateur : 60 francs.

Le flacon de rechange : 25 francs.

Trachéol : Le flacon : 20 francs.

2<sup>o</sup> Pilules de Pilo-chlorine.

Pilo-chlorine : Le flacon : 25 francs.

### Traitement forme bronchitique :

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 40 francs.

### Laboratoires BÉLIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## DÉTENSYL

Hypotenseur végétopolyhormonique.

**Composition.** — Gui, Hépatine, Pancréine, Pulmine.

**Dose.** — 3 ou 4 dragées par jour (de préférence avant les repas) amènent un abaissement rapide et durable de la tension artérielle.

**Indications.** — Hypertension artérielle, troubles de la ménopause, menaces d'hémorragie cérébrale chez les pléthoriques, troubles oculaires et auditifs provoqués par l'hypertension.

**Prix :** Le tube de 36 dragées, 16 fr.

**Laboratoire du DÉTENSYL**

8, avenue Walkanaer — NICE



## DÉTERGINE

du Docteur BOURDEAU

(pommade aux peroxydes, persulfate de soude, gaiacol, terpinol).

### TRAITEMENT des PLAIES

Plaies en général.

Plaies post-opératoires : appendicite à chaud, cystostomie, ostéomyélite, fistule, mastoïdectomie.

Déterge rapidement les plaies les plus infectées, c'est là son originalité.

Convient également dans l'eczéma consécutif aux plaies post-opératoires.

Nombreuses références médicales et chirurgicales.

Laboratoire du Docteur BOURDEAU

PARTHENAY (Deux-Sèvres).

## DIABÉTALIM

~~DIASANA~~

Sucre pour diabétiques.

Ne contient ni saccharine, ni autre produit de synthèse.

Ses dérivés : CHOCOLAT et CONFITURE.

**Mode d'action.** — Très nutritif (92 p. 100 d'hydrocarbures). Goût délicieux, bien toléré.

**Mode d'emploi.** — Doses variables selon les cas, en moyenne de 20 à 60 grammes par jour.

**Formes.** — *Sucre* : Boîtes de 500 gr. (22 fr.) ; 250 gr. (12 fr. 50) ; 50 gr. (5 fr.).

*Chocolat* : Ordinaire à la noisette, la tablette (8 fr.) ; Napolitaine (8 fr. 75).

*Confitures* : Oranges, Prunes, Abricots. Le pot de 450 gr. : 18 fr.

Laboratoire DIABÉTALIM

61, rue Vandamme — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 64-24.

## DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

**Doses.** — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix au public : 25 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien  
21, rue Chaptal — PARIS. (IX<sup>e</sup>).

---

## DIADERMINE

Excipient pour pommade.

**Définition.** — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

**Indications.** — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure*. *Touchers*, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.

*Massages, Soins de la peau*, Brûlures, Engelûres, Gerçures du sein. Préviend et guérit l'érythème fessier du nouveau-né.

Prix de vente au public : Pot : 6 fr. 50 ; Tube : 4 fr. 75

Conditions spéciales au Corps Médical.

**BONETTI Frères**

12, rue Vavin — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## DIAGNOTHORINE

**Solution colloïdale à 25 p. 100 d'Oxyde de Thorium pour l'exploration radiologique du tube digestif.**

**Indications.** — L'étude des contours des segments du tube digestif est obtenu par l'emploi de la GELOBARINE (voir p. 483). La DIAGNOTHORINE révèle les *plis de la muqueuse* dans tous leurs détails.

**Posologie et mode d'emploi.** — Pour un examen : en général 2 cuillerées à soupe, à faire ingérer par petites gorgées au moment de l'examen, le malade n'ayant rien absorbé dans les 8 heures précédentes.

La Diagnothorine peut également s'administrer par voie rectale pour l'examen des plis de la muqueuse du gros intestin.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## DIALACETINE CIBA

**Sédatif — analgésique.**

Diallylmalonylurée et éther allylique du paracétaminophénol. Action sédatrice, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

**Indications.** — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, Hystérie, Névroses diverses, Angine de poitrine, Névralgies, Lumbago, Insomnie des tuberculeux.

**Doses.** — Dose sédatrice : 1 à 3 comprimés par 24 heures, par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique : 1/2 à 2 comprimés au maximum.

Le tube de 15 comprimés : 13 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**  
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## DIAL CIBA

### Hypnotique antinerveux.

Diallylmalonylurée. Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, même par son usage prolongé.

**Indications.** — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. Etats démentiels.

*Comprimés, Gouttes et Ampoules (Dial soluble).*

**Doses.** — 1 ou 2 comprimés au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit. XXX à LX gouttes, 1 ou 2 ampoules.

**Prix :** le tube de 12 comprimés, 8 fr. — Le flacon Dial Soluble, 11 francs. — La boîte de 5 ampoules, 10 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## DIALINE

### Définition :

*Dialine = Cire + Huile + Eau.*

La Dialine est un cerat semi-fluide, inaltérable, neutre et non parfumé, présenté en un tube.

### Indications :

*Fluide*, grâce à la forte proportion d'huile, la Dialine remplace l'eau et le savon irritants dans la toilette quotidienne des peaux délicates.

*Protective*, grâce à la cire.

*Décongestive*, grâce à l'eau, la Dialine est particulièrement indiquée pour la nuit, le massage, les soins de la peau et, en général, pour l'hygiène cutanée des peaux délicates.

Le tube de 100 gr. environ : 18 francs.

**Etablissements C. I. P.**

128, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## DIALYL

Dissolvant urique.

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

**Indications.** — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Posologie.** — Deux cuillerées à café par jour chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

**Laboratoire ALPHONSE BRUNOT**

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

## DIASCLÉROL

du Docteur GUERSANT

**Composition.** — Association Sédobenzyl ( $C^6 H^5 CH^2 SO^3 K$ ) (antispasmodique, hypotenseur), hydrate de pipérazine, salicylate de lithine et hexaméthylènetétramine en milieu citraté.

**Indications.** — Diathèse urique, Hypertension, Artério-sclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité.

**Dose et mode d'emploi.** — Granulé effervescent, 2 à 6 cuil. à café par jour, dans un peu d'eau, vingt minutes avant les repas.

Le **DIASCLÉROL** n'étant pas toxique, son emploi peut être prolongé.

**LABORATOIRE du DIASCLÉROL**

**D. DONNAT**, pharmacien

26, rue Norvins — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Téléph. : Marcadet 78-36.

## DIASES

**Composition.** — Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses renfermant toutes leurs vitamines.

**Propriétés.** — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber. Grâce à une pré-digestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité.

Sans aucun surmenage des organes digestifs, elles assurent une suralimentation rationnelle.

**Indications.** — Nourrissons (particulièrement au moment difficile du sevrage), Enfants, Malades, Convalescents, Vieillards. Tous les malades à régime : Cardiaques brightiques, Rhumatisants, Dyspeptiques, Tuberculeux, Cachectiques.

**Mode d'emploi.** — Délayer parfaitement et à froid 3 cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diase dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant ; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit. Elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

### Nomenclature.

**DIASE CACAO :** Déjeuners et goûters pour adultes et enfants. La boîte de 1/3 de kilo : 8 fr. ; de 1 kilo : 22 fr.

**DIASE CÉRÉALE** sans sucre : Bouillies très fluides pour bébés au biberon, enfants et adultes délicats. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

**DIASE CÉRÉALE** sucrée : Diase complète aromatisée, recommandée pour les enfants en bas âge. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

**DIASE LÉGUMINEUSE :** Potages excellents instantanés. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

**Laboratoires PROGIL**

77. rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

## DIASTÉNINE GRÉMY

**Principe actif de la glande interstitielle du testicule.**

- 1° *Pendant l'établissement de la puberté*, permet de lutter contre les troubles de cette période : croissance trop rapide, douleurs articulaires dues au travail ostéogénique trop intense des cartilages de conjugaison, anémie, faiblesse musculaire.
- 2° *Chez l'adulte*, permet de lutter contre tous les signes d'insuffisance testiculaire, ralentissement général de la nutrition, obésité, faiblesse musculaire, neurasthénie.
- 3° *Chez le vieillard*, invigoration générale de l'organisme.

En pilules, gouttes et ampoules.

**Laboratoires G. GRÉMY**  
14, rue de Clichy — PARIS

---

## DIASLOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant intensif.

### Composition.

*Arsines*, stimulant de la nutrition.

*Nucléine manganésifère*, catalyseur nutritif, excitant des centres hématopoïétiques.

*Kola fraîche stabilisée*, toni-cardiaque, éliminateur des toxines et des déchets de la nutrition.

### Indications.

Chaque fois qu'il faut stimuler un organisme affaibli, une nutrition ralentie.

### Formes.

*Diaslogène Elixir* (légèrement alcoolisé).

*Adultes* : 2 verres à liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

*Diaslogène granulé*. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à café, 10 ans, 2 ; 5 ans, 1.

*Diaslogène comprimés*. — Le Reconstituant des Diabétiques : 6 par jour.

## DIASLOGÈNE F

Poudre de **Fenugrec**, associée au complexe Diaslogène. Le **Fenugrec**, en un comprimé glutinisé (tolérance parfaite), est incorporé au milieu du cachet.

### Indications.

Amaigrissement, asthénies, convalescences.

2 à 3 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.



## DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Elixir (très agréable).

Contiennent toutes les vitamines  
et hormone des glandes fraîches.

L'activité des ferments digestifs : *Pepsine, Pancréatine* et *Diastase* dépend de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : viandes, graisse, légumes, féculents, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du foie, du pancréas et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

**Doses.** — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'élixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'élixir dans de l'eau sucrée.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**

34, boulevard de Clichy — PARIS.

## DIATHERMIE

A. — Diathermie médicale.

- 1° *Troubles de la circulation artérielle et veineuse ;*
- 2° *Douleurs thoraciques d'origine pleurale, et Douleurs abdominales : gastralgies, entéro-colite, épiploïtes et périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;*
- 3° *Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies ;*
- 4° *Névralgies et névrites ;*
- 5° *Trophicité des tissus ; paralysies, poliomyélite.*

B. — Diathermie chirurgicale.

**Diathermo-coagulation.**

*Utilisée pour la destruction de nombreuses lésions, en dermatologie, en gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en ophtalmie ainsi qu'en chirurgie générale.*

Vente et location de tous appareils et accessoires à :

**La Verrerie Scientifique,**  
12, avenue du Maine — PARIS (XV°).  
Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

## DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

Médicament de choix pour l'administration de doses massives d'*iode libre*.

**Composition et forme.** — Suspension aqueuse titrant 4 p. 100 d'iode total dont 3 p. 100 d'*iode libre, métallique*, en petits grains.

**Avantages.** — Beaucoup plus rapidement qu'avec la teinture d'iode, on peut arriver à des doses importantes d'*iode libre* (0,50 à 1 gr. par j. ur). On institue pour cela une posologie par progression arithmétique.

**Mode d'emploi.** — Prescrire toujours le dicaliode en cc. (une mesure graduée accompagne chaque flacon) et *dans du lait froid* (de préférence avant les repas).

**Indications.** — *Dicaliode à petites doses* : 1 à 2 cc. par jour. Goitre. *Enfants* : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

*Dicaliode à doses moyennes* : 2 à 5 cc. par jour. Affections du cœur et des vaisseaux : **Hypertension** ; de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphyseme, coqueluche, tuberculose). *Affections de la peau* : eczéma, psoriasis.

*Dicaliode à hautes doses* : 10 à 30 cc. par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : **LE MARINEL**, pharmacien  
273, rue Victor-Rauter.

## DIDIAL CIBA

### Hypnotique — Analgésique.

Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indication toutes les fois que l'insomnie est sous la dépendance de la douleur.

**Indications.** — Toutes les insomnies relevant de la douleur : névralgies, traumatismes, tabes, cancers, etc. Agitation maniaque, excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas dans les autres cas.

Le tube de 12 comprimés : 14 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## DIEMENAL

**Indications.** — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobinurique.

**Composition.** — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

**Forme.** — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

**Mode d'emploi.** — Dans le Paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinurique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 16 fr. 50 (en France).

**Laboratoire J. DEPRUNEAUX**

18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## DIENOL

**Indications.** — Broncho-pneumonie, Infections septicémiques. Toutes septicémies (grippe, pneumonie, broncho-pneumonie) et tous états toxi-infectieux médicaux et chirurgicaux.

**Composition.** — Métaux colloïdaux, FeMn, obtenus par électrolyse.

**Forme.** — 1<sup>o</sup> Ampoules isotoniques de 10 cc., en boîtes de 6 ampoules pour injections. — 2<sup>o</sup> Tubes-doses isotoniques, de 40 cc., en boîtes de 3 tubes, pour emploi par voie rectale.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule toutes les 12 heures, en injection hypodermique (indolente) ou intraveineuse. Pour la voie rectale : 3 tubes-doses par jour, généralement suffisants pour un traitement.

Quand on ne veut pas employer le DIENOL en injection hypodermique, surtout chez les enfants, on peut opérer par voie rectale.

Dans ce cas, on se servira des tubes-doses spéciaux à grande capacité, qui donneront des effets encore plus rapides et aussi puissants.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 14 francs.

Prix de la boîte de 3 tubes-doses : 15 francs.

**J. DEPRUNEAUX**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

---

## DIGALÈNE " ROCHE "

**Digitale injectable  
étalonnée physiologiquement.**

**Glucosides totaux de la feuille de Digitale pourpre  
titrée d'après les prescriptions du Comité d'Hy-  
giène de la Société des Nations.**

### **Posologie et modes d'emploi :**

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 ampoule de 1 cc. = 75 unités-grenouille =  
0 gr. 05 de feuille de Digitale titrée (standard de  
la S. D. N.).

1 cc. de Solution = 150 unités-grenouille = 0 gr. 10  
de feuille de Digitale titrée.

1 Comprimé = 75 unités-grenouille = 0 gr. 05 de  
feuille de Digitale titrée.

**Doses faibles ou d'entretien cardiotonique :**

*Adultes* : XX gouttes. *Enfants* : I à V gouttes.

**Doses moyennes ou sédatives :**

*Adultes* : XX à LX gouttes ; 1 à 2 comprimés ou  
1 à 2 ampoules (voie intramusculaire). *Enfants* :  
V à X ou XV gouttes.

**Doses fortes ou antiasystoliques :**

*Adultes* : LX à CLXXX gouttes ; 3 à 6 ampoules  
(Voie intramusculaire ou endoveineuse). *Enfants* :  
V à XX gouttes et même 1 à 2 ampoules (cas déses-  
pérés).

**Propriétés thérapeutiques.** — Action très rapide,  
tolérance parfaite, pas d'accumulation.

**Indications thérapeutiques.** — Chaque fois que  
le cœur faiblit.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>.**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## DIGASTRINE

(Cachets)

**Composition.** — Benzoate de naphтол, Charbon spécial, Pepsine, Poudre de belladone stabilisée.

**Mode d'action.** — Sédatif, absorbant, antiseptique intestinal; stimulant de la sécrétion gastrique, antispasmodique.

**Indications.** — Aérophagie, dyspepsies, embarras gastrique, fermentations intestinales, entérocolite, crampes de l'estomac, spasmes du cardia, de l'estomac, du pylore. Entéropasmes, constipation spasmodique.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cachets à la fin de chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de la **DIGASTRINE**

**M. DELORME**, pharmacien

11, rue Saint-Agricol — **AVIGNON** (Vaucluse).

## DIGESTIF HARVEY

**Composition :**

Benzonaphтол .....	50 centigr.
Carbonate de chaux.....	25 —
Salicylate de bismuth .....	25 —
Hydrate de magnésie.....	50 —
Pepsine extractive .....	10 —
Maltine.....	05 —
Sucre anisé .....	6 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur de l'acidité gastrique et des fonctions digestives.

**Formes.** — Granulé d'un goût agréable, pouvant être croqué.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, hyperchlorhydrie, fermentations acides, Entérites.

**Posologie.** — Une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau, après chaque repas. Avant d'absorber le granulé, le laisser pendant vingt minutes en contact avec l'eau.

Prix au public : 10 francs la boîte.

Laboratoire **MALMANCHE**

Pharmacien. Docteur ès sciences.

101, avenue de Paris.

**RUEIL-MALMAISON** (Seine-et-Oise).

## DIGESTONIC

**Composition.** Citrate de soude, Phosphate de Bismuth, Fluorure d'Ammonium, Macération hydro-glycérique de sedum telephum et de gonolobus condurango.

**Forme.** — Elixir.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action sédative s'exerçant sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse gastrique. Calme le spasme, Action anti-émétique. Pouvoir antiseptique s'opposant aux fermentations. Supprime la constipation.

**Indications.** — Dyspepsies hypersthéniques, hyperchlorhydrie, spasme du pylore, irritations gastriques douloureuses, motrices et sécrétoires, vomissements du début de l'ulcus, fermentations gastriques par stase, constipation.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un peu d'eau ou de tisane. Répéter la dose jusqu'à cessation de la douleur. Adjonction d'un régime le cas échéant.

Prix : 17 fr. le flacon de 250 cc. environ.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA.**

21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque.  
Association digitaline-ouabaïne.

**Présentation et posologie.** — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. : Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) : X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours.)

**Indications.** — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres toni-cardiaques ont échoué.

**Remarques importantes.** — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

### Laboratoires DEGLAUDE

*Médicaments cardiaques spécialisés,*

(Cardibaïne,

Spasmosédine, Théoxanthine, etc.)

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 31-85.

Belgique : *Agent général* : L. Prunières.  
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.



## DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant l'ensemble des glucosides cardioactifs de la feuille de digitale.

*Stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.*

**Indications.** — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

**Posologie.** — Celle de la poudre de feuille de digitale, à laquelle elle correspond poids pour poids.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm<sup>3</sup>. = 10 cgr. poudre de feuille.

Le tube de 25 comprimés : 14 francs.

La boîte de 5 ampoules : 15 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## DIGIMIALBAÏNE

### Composition :

Cent gouttes contiennent :

1/3 de mmgr. de digitaline Mialhe ;

2/3 de mmgr. d'ouabaïne Mialhe.

### Posologie :

**Cardiotonique.** — X à XV gouttes par 24 heures.

**Sédatif.** — XXX gouttes, 2 fois par 24 heures pendant 7 jours.

**Antisystolique.** — XL à L gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 5 jours.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8. rue Favart — PARIS.

## DIGISTABILINE

Gouttes.

*Alcoolature stabilisée de digitale.*

Ne peut être pris que sur prescription et sous contrôle médical.

**Indications.** — Déficiences du myocarde, Arythmie complète, Hyposystolie et asystolie, Asthénie des pyrexies infectieuses générales et pulmonaires

**Composition.** — La *Digistabiline* « gouttes » renferme, non altéré, le complexe glucosidique de la digitale fraîche.

**Mode d'emploi.** — La préparation, logée en compte-gouttes, peut être facilement dosée. — 7 gouttes de *Digistabiline* correspondent à 1/10 de gr. de feuilles de digitale fraîches, ou 1/10 de milligr. de digitaline.

**Pharmacie Centrale de Belgique**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## DIGITALINE CRISTALLISÉE MIALHE-PETIT

La plus fidèle  
de toutes les préparations de digitale.

Titrage chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0,001 digitaline cristallisée.

Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.  
(Employée dans les hôpitaux depuis 1889).

**Dose.** — Cardiotonique : III à IV gouttes par jour. — Sédatif : V à X gouttes. — Anti-asystolique jusqu'à L gouttes dans les 24 heures.

**Laboratoire du Docteur MIALHE**  
8, rue Favart — PARIS.

## DIGITALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

**Action.** — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

**Indications.** — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

**Formes.** — Granules roses au 1/10<sup>e</sup> de milligr. flacons de 50. Solution au 1/1000<sup>e</sup>, flacons de 10 et 5 cc.

Le demi-flacon .....	au public.....	11 fr.
L'étui de 50 granules..	— .....	11 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila, 1872. Prix Desportes, 1904.  
Décernés par l'Académie de Médecine de Paris.

**La Digitaline Nativelle** ralentit, renforce, régularise le cœur, provoque la diurèse, réduit les œdèmes.

**Formes.** — *Granules* au 1/10 de mgr. *Solution* au 1/1000. *Ampoules* au 1/4 de mgr pour injections intramusculaires. *Ampoules* au 1/5 de mgr. pour injections intraveineuses.

### Indications :

Insuffisances cardiaques, Cardiopathies valvulaires, Endocardite, Myocardite, Myocardie, Péricardite, Arythmies, Tachycardies, Asthénie anté- et post-opératoire, États infectieux (pour soutenir le cœur).

### Doses :

*Per os* : Dose faible (d'entretien) : 1/2 mgr. en 5 jours.

Dose moyenne (de soutien) : 1 mgr. en 5 jours.

Dose forte (d'attaque) : 1 mgr. 1/2 à 3 mgr. en 10 jours (jusqu'à saturation)

*Injections* : 1 cc. d'une ampoule matin et soir le premier jour, puis : 1 cc. d'une ampoule par jour les 4 jours suivants.

### Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (15<sup>e</sup>)

## DIIODOTYROSINE « ROCHE »

Médicament biochimique synthétique  
de la maladie de Basedow.

Médicament stable possédant toutes les propriétés essentielles et directement utiles de l'iode inorganique (solution de Lugol) et n'offrant aucun risque d'iodisme.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les états hyperthyroïdiens ; tous les symptômes basedowiens.

**Posologie.** — 1 à 3 comprimés dosés à 0 gr. 10 par jour.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE  
ET Cie**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## DINITRA DYN

Animateur des combustions cellulaires.

α Dinitrophénol 1. 2. 4. (Nitrophénine).

Comprimés de 3 centigrammes.

**Toutes les Obésités.**

Hypothermies. Anidroses. Hypométabolismes.

Tous les ralentissements de la nutrition.

**Simple. Puissant.** — *Dépourvu des effets secondaires de la thyroxine.*

**Posologie.** — Les comprimés se prennent une seule fois par jour  
à la fin du repas du midi.

Le premier jour, un comprimé par 20 kgs de poids (soit 3 comprimés pour un sujet de 50 à 70 kgs.)

Les jours suivants, un comprimé par 10 kgs de poids

(soit 6 comprimés pour 60 kgs, 8 pour 80 kgs, etc...)

Traitement quotidien régulier pendant 8 à 10 semaines.

Ne pas dépasser ces doses en dehors de la surveillance du Médecin.  
Diminuer les doses chez les diabétiques, les albuminuriques et  
en cas d'apparition de sueurs abondantes ou de fièvre élevée.

La boîte de 60 comprimés : 15 francs.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII<sup>e</sup>)

Téléph. : Diderot 37-93.

## DIORADIN

**Combinaison** radio-active. — Médication anti-bacillaire.

**Composition.** — Sels d'iode, camphre mentholé, terpènes et Bromure de Radium.

**Présentation.** — Ampoules de 1 cc., 12 ampoules.

**Propriétés.** — Bactéricide, exaltant la phagocytose.

**Indications.** — Tuberculose. Tous états infectieux.

**Mode d'emploi et doses.** — En injections intramusculaires ou sous-cutanées, région supérieure du bras et de préférence dans la région musculaire des fesses. — On injectera aux adultes une ampoule de 1 cc. et aux enfants au-dessous de 10 ans 1/2 ampoule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes consécutives ; continuer jusqu'à la 40<sup>e</sup>, avec une injection tous les deux jours. On peut recommencer une seconde série après un intervalle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : 22 francs.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Invalides 12-63.

---

## DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine.

**Mode de présentation.** — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0 gr. 25.

**Mode d'action.** — La « Dioséine Prunier » diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

**Indications.** — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

**Dépositaires généraux :**

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

## DISMINE FAVROT

### Capsules glutinisées

**Composition.** — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma betulina*) et 0,05 de Salicylate de Phényle.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — *Antiseptique, urinaire, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

**Mode d'emploi.** — Prendre dans un peu d'eau, sauf indication du médecin, 3 capsules le matin, 3 au déjeuner, 3 au coucher.

*La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.*

Prix : 17 francs.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires Docteur H. FERRÉ**

Docteur en médecine

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Membre de la Société de Médecine de Paris

6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## DISOLURANE

**Composition.** — Granulé à base de :

Pipérazine, Hétraline (Dioxybenzohexaméthylentétramine), Benz. de soude, Benz. de lithine, Citrate de lithine.

**Indications.** — Antiseptique urinaire, uricémie, urisolvant énergique, antiseptie hépato-rénale, diurétique doux, arthritisme, acidification de l'urine.

**Posologie.** — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures une demi-heure avant les repas, dans un demi-verre d'eau.

**Laboratoires des Produits Vely**  
132, avenue Victor-Hugo — PARIS.  
Tél. : Passy 87-85.

---

## DISONYL

### EX-NIDYL

**Composition :**

Extrait pancréatique désinsuliné, Phényl-éthyl-malonyl-urée, Trinitrine.

**Indications :**

- 1° Troubles fonctionnels cardiovasculaires (Tachycardies, Extra-systoles, Algies cardiothoraciques, petits Spasmes artériels).
- 2° Dystonies neuro - végétatives (Anxiétés, Insomnies nerveuses, Vertiges).

**Forme.** — Boîte de 60 dragées.

**Posologie.** — 2 à 6 dragées par jour, à prendre un quart d'heure avant les repas.

**Laboratoires du Dr ROUSSEL**  
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).



## DIUREGAN LEO

**Composition.** — Complexe mercuriel de salicylallylamido-acétate de soude en solution à 10 p. 100.

**Propriétés.** — Diurétique énergique. Est employé en injections.

**Indications.** — Œdème cardiaque et rénal, toutes les lésions hydropiques, sauf la néphrite aiguë. Effet favorable dans la syphilis, mais sans exclure un traitement spécifique parallèle.

**Présentation :**

1° Ampoules de 1 cmc. en boîte de 5 amp.

2° Ampoules de 2 cmc. — 5 —

**Mode d'emploi.** — Injections intramusculaires ou intraveineuses (ne pas faire des injections sous-cutanées) de 1/2, 1 et 2 cmc., à intervalles de 2 jours au moins.

Représentant Dépositaire-Général :

**ED. JUST**

11, Square Marie-Louise — BRUXELLES

Tél. : 12.28-04.

## DIURÈNE

(Extrait total d'Adonis Vernalis.)

**Formes.** — Liquide. Pilules.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique cardiaque et diurétique. Adjuvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Contient tous les principes actifs de l'Adonis.

**Indications.** — Indiqué dans tous les cas d'Arythmie, d'Asystolie, d'Œdème, dans toutes les Affections du foie, Néphrites, Artério-Sclérose.

**Posologie.** — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

Prix de vente au public :

Liquide : 15 francs ; pilules : 12 francs.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

## DIURÉPHÉDRINE

Elixir.

Chl. Ephédrine naturelle..... 2 cgr.  
Iodure de Sodium et Caféine. 30 cgr.  
Teinture Adonis Vernalis.... X gouttes.

Par cuillerée à café.

**Action.** — Antispasmodique, Bronchodilatateur, Bronchosécréteur, Toni-cardiaque, Diurétique.

**Indications.** — Traitement de fond. Asthme bronchique, Emphysème, Asthme intriqué, Oppression, Bronchites chroniques, Catarrhe, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Suites de grippe, Insuffisance cardiaque, Urémie.

**Posologie.** — Trois cuillerées à café par jour, matinée, après-midi, soir.

Voir également : **Gardéphédrine**, page 470 et : **Ephédrasmine**, page 392.

Echantillons et littérature sur demande :

**Laboratoires THORAL**

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

## DIURÉTIQUE GMET

**Composition.** — Extrait *total*, liquide et sans alcool de la pulpe d'oignon cru.

**Propriétés.** — Diurétique puissant et jamais contre-indiqué.

**Indications.** — Oliguries diverses : Pneumoniques, cardio-rénaux, brightiques, grippés, etc.

**Posologie.** — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu de liquide. Ces doses en général suffisantes peuvent être augmentées.

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## DIUROBROMINE

### Composition :

Théobromine pure isotonisée.

### Forme :

Cachets de 0<sup>gr</sup>,50.

### Indications :

Toutes affections où l'on doit assurer la diurèse.

### Laboratoires

**L. BOIZE et G. ALLIOT**

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

---

## DIUROCALCINE GROS

**Association Calcium-Théobromine.**

**Indications.** — Diurétique cardio-rénal.

**Propriétés.** — Pouvoir diurétique exalté.  
Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité  
et tolérance parfaites.

**Posologie.** — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 10 fr. les 24 comprimés à 0 gr. 50.

## DIUROCALCINE IODURÉE

**Indications.** — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

**Dose.** — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de Potassium, 0 gr. 10  
associé à 0 gr. 50 de DIUROCALCINE.

### Laboratoire GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

## DIUROCARDINE

**Composition.** — Digitale titrée et stabilisée totale, Scille décathartiquée, Théobromine isotonisée, Buchu.

**Propriétés.** — Diurétique puissant et sûr. Affections cardiaques et rénales.

**Forme.** — *Cachets* : chaque cachet correspond à 1/20 de milligr. de *Digitaline cristallisée*.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques, Cardiopathies, Tachycardie, Arythmie, Myocardite, Œdèmes, Albuminurie, Ascite, Urémie.

**Doses.** — Cas aigus : 2 à 5 cachets par 24 heures.

**Dose cardiotonique.** — 2 cachets par jour pendant 10 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

**Dose cardiotonique d'entretien.** — 1 cachet tous les 2 jours, pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

**Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT**  
9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

---

## DIUROCYSTINE

**Composition.** — Benzo-camphorate, de Lithine, Terpene, Castoreum.

**Forme.** — Cachets.

**Indications.** — Antisepsie des voies urinaires, Cystites aiguës ou chroniques, Urétrites, Catarrhe vésical, draine vessie et canal en fin de blennorragie. Aucune contre-indication.

**Doses.** — 2 à 6 cachets par jour selon les cas.

**Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT**  
9, avenue Jean-Jaurès — LYON

## DMELCOS

Stock-vaccin anti-chancrelleux.

Emulsion de bacilles de Ducrey, injectable exclusivement par la voie veineuse.

*Indications.* — **Chancres mou et ses complications : Bubon, Phagédénisme, Diagnostic de l'affection par cuti-réaction, Paralyse générale (pyrétothérapie).**

*Présentation et mode d'emploi.* — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intraveineuse tous les trois ou quatre jours.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## DOHYFRAL

### Vitamine D. cristallisée.

**Composition.** — Vitamine D., cristallisée, incorporée au beurre de cacao dans des pastilles de chocolat. Chaque pastille renferme 0,04 mgr. (4 centièmes de milligramme) de Vitamine D. cristallisée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action catalytique puissante du calcium et du phosphore. Médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme calcique.

**Indications.** — Prévient et guérit les différentes formes du rachitisme. Troubles et retard de l'ossification. Déformations squelettiques : genu valgum, genu varum, ostéomalacie. Consolidation des fractures.

Rachitisme dentaire, trouble et retard de la dentition, carie dentaire.

Et en général tous les troubles par déficience phosphocalcaire (prétuberculose, grossesse), ainsi que les accidents d'ordre convulsif (tétanie) qui accompagnent souvent le rachitisme.

A titre prophylactique, on obtient les meilleurs résultats contre le rachitisme de l'enfant en prescrivant le DOHYFRAL pendant la grossesse et l'allaitement.

**Avantages.** — Traitement rapide et rationnel. Pureté absolue et sûreté du produit. Dosage rigoureux et facile. Innocuité, conservation pratiquement indéfinie. Facilité d'absorption et d'administration.

**Posologie.** — Les pastilles de chocolat DOHYFRAL présentent un trait central qui permet facilement leur division.

On conseillera à titre préventif : 1/2 à 1 pastille par jour. A titre curatif : 1 à 2 pastilles par jour.

**Mode d'emploi.** — Croquer la pastille (goût agréable). Pour les nourrissons l'écraser et la dissoudre dans du lait tiède (ne jamais porter à l'ébullition).

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS

## DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

**Composition.** — Carbone-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

**Formes.** — Poudre, granulé et comprimés.

**Propriétés.** — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

**Indications.** — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

**Cure antidyspeptique.** — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

**Cures reminéralisantes, simple ou intensive.** — Voir fiche *Œnophos*.

## DOLOMA INJECTABLE

**Composition.** — Citrophosphite Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

**Propriétés.** — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

**Indications.** — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récurrence post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

**Prix.**

La boîte de poudre <i>Doloma</i> .....	14. »
— granulé <i>Doloma</i> .....	15. »
— 10 ampoules <i>Doloma</i> ....	15. »
— 100 comprimés <i>Doloma</i> ..	16. »

**Communications :** à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à

**Laboratoire général d'Études Biologiques**

S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

## DOLOPHOS

**Composition.** — Anhydroinositophosphate de Chaux et de Magnésie, Chlorure de Magnésium, Carbonate de Manganèse, Carbonate de Magnésie.

**Mode d'action et avantages.** — Le *Dolophos* constitue un médicament d'ionisation magnésienne renforcée, de conservation parfaite, se présentant sous forme de *granulé sucré agréable au goût*.

**Indications thérapeutiques.** — Affections gastro-intestinales et hépatiques, déminéralisation et asthénie, *arthritisme*, tumeurs bénignes et malignes, prophylaxie du cancer, *médication post-opératoire du cancer*. Affections de la peau.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour ; enfants : 1 à 3 cuillerées par jour.

Prix : 12 fr. 50

### Laboratoires du DOLOPHOS

59, 61, rue de Saint-Quentin — CAUDRY (Nord).

## DOLYSINE

**Goutte. — Rhumatismes. — Névralgies.**

1° *Cachets.* — Acide phénylcinchoninique, 0 gr. 50. Puissant dissolvant de l'acide urique.

**Doses.** — De 1 à 4 grammes par 24 heures, puis doses décroissantes. Pas d'accoutumance. A prendre aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline (eau de Vichy).

La boîte de 12 : 9 fr.

2° *Topique.* — Chloral, Chloroforme, Menthol, Ether amyalsalicylique en solution éthérée aromatisée.

Badigeonnages suivis d'enveloppements.

Le flacon : 9 fr.

3° *Pommade.* — Même formule que ci-dessus avec excipient gras pour onctions douces et applications.

Le tube : 9 fr.

**M. ROCHEREAU, Pharmacien**  
ex-interne des Hôpitaux de Paris  
SALBRIS (Loir-et-Cher).



## DO.SA.NO.SAL

**D**ouce amère, **S**aponaire, **N**oyer, **S**ALse-  
pareille.

**Formule du D<sup>r</sup> MARTIN DU THEIL**

**Forme.** — *Granulé soluble.*

**Composition.** — Ce granulé contient par cuillerée à café :

Extraits de douce amère, 0 gr. 09696 ; de saponaire, 0 gr. 04848 ; de noyer, 0 gr. 07272 ; de salsepareille, 0 gr. 19292.

Dosage constant, titrage toujours identique.

**Propriétés.** — Diaphorétique, diurétique.

**Indications.** — Tous états congestifs et troubles circulatoires : Hypertension, Ménopause, Varices, suites de Phlébite.

**Doses habituelles.** — 1 cuillerée à café 2 fois par jour en se levant et en se couchant dans eau ou tisane.

Cures de 2 mois environ à prolonger suivant le cas.

**Laboratoires LACOMBE et Cie**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## DOSURINE (TROUSSES)

**LES EXAMENS D'URINES ET LE DOSAGE DES  
ÉLÉMENTS ANORMAUX (Sucre-Albumine)**  
sont grandement facilités par l'emploi des

**« Trousse Dosurine »**

qui assurent à ces examens la plus grande précision scientifique, permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousse, sous la forme d'un petit livre facilement transportable, se présentent sous 3 modèles :

- 1<sup>o</sup> **Trousse Index** « *La Dosurine* » qui permet de décélérer la présence de l'Albumine ou du Sucre.
- 2<sup>o</sup> **Trousse A** « *La Dosurine* » destinée à doser l'Albumine contenue dans l'urine.
- 3<sup>o</sup> **Trousse D** « *La Dosurine* » destinée à doser la quantité de Sucre (Glucose).

Prix de chaque Trousse : 25 fr. (franco par poste : 26 fr. 50).

*Ampoules de renouvellement :*

La boîte de 10 : 10 fr. (par poste, 11 fr. 30).

La boîte de 20 : 18 fr. (par poste, 19 fr. 50).

Remise de 25 % à MM. les Docteurs.

Envoi franco notice sur demande.

**LA DOSURINE, 16, rue Charlemagne — PARIS.**

Chèques postaux n<sup>o</sup> 1352.39 Paris.

## DRAGÉCALCION

Dragées de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosées à 0 gr. 25 par dragée. 4 dragées = 1 gr. de Chlorure de Calcium.

**Avantages.** — 1° Efficacité accrue par absorption *progressive*. 2° Agréables à prendre, elles évitent le goût écœurant des solutions et des gouttes. 3° Tolérance parfaite de l'estomac.

**Indications.** — Toutes les indications du Chlorure de calcium.

**Posologie et mode d'emploi.** — Comme *recalcifiant*, *antispasmodique*, *antianaphylactique*, contre les engelles, on préfère les *doses faibles* : 2 dragées au début de chaque repas avec une gorgée d'eau (6 par jour) pendant 20 jours par mois, à continuer longtemps. Comme *hémostatique*, *antialbuminurique*, *déchlorurant*, *antisérique*, on préfère les *doses fortes* : 20 dragées par jour pendant 5 jours avec repos de 10 jours. Non toxique, son emploi peut être continué avec avantage pendant des mois.

**Pharmacie DUO**

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII°).

Tél. : Etoile 11-96.

---

## DRAGÉES BENGUÉ AU MENTHOL

**Composition.** — Menthococaïne et borate de soude ou menthol-borate de soude (sans cocaïne).

**Indications.** — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antiseptisme de la bouche.

**Mode d'emploi.** — 8 à 10 dragées par jour. Laisser fondre dans la bouche.

**Docteur BENGUÉ**

Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX°).

## DRAGÉES BLAGNY

### Composition :

Dionine .....	2 mgr.
Codéine .....	5 —
Bromoforme .....	5 cgr.
Chlorhydrate d'éphédrine.....	1 —
Poudre d'Aconit .....	2 —
Poudre de Droséra.....	5 —
Thiocol.....	5 —

**Propriétés thérapeutiques.** — Asthme, Emphysème, Rhume des foins. Sédatif des Toux nerveuses, spasmodiques, coqueluchoïdes, Toux des fumeurs bronchiteux.

**Mode d'emploi.** — Avaler les dragées sans les sucer ni les croquer entre les repas et le soir au coucher.

*Adultes* : 6 à 8 dragées par 24 heures.

*Enfants* : à partir de 10 ans, 3 à 5 dragées.

### Laboratoires PAMELA

#### Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

22, rue de la République — FORGES-LES-EAUX (S.-I.).

## DRAGÉES DU Dr GELINEAU

Flacons de 100 et de 50 dragées.

### Composition :

Bromure de potassium associé à l'arsenic et à la Picrotoxine.

### Indications thérapeutiques :

Epilepsie, Affections nerveuses.

### Posologie :

Par dragée :

Kbr.....	1 gramme.
Arsenic.....	1 milligr.
Picrotoxine.....	1/2 milligr.

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.

(Doses supplémentaires en cas de besoin.)

*Littérature et échantillons sur demande*

**Laboratoire J. MOUSNIER-DELERME**

9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).

## **DRAGÉES FERRO-ERGOTÉES MANNET**

### **Composition :**

Ergot de Seigle .....	5 centigr.
Fer .....	10 —

Par dragée.

**Indications.** — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause. Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

**Posologie.** — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

**Laboratoire MANNET**  
**LOUDUN (Vienne)**

---

## **DRAGÉES HECQUET**

(Sesqui-Bromure de Fer).

**Propriétés.** — Associent les qualités anti-spasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

**Indications.** — Chloro-Anémie, Nervosisme.

**Dose.** — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de « Sirop ».)

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## DRAGÉES LEBRUN TONI-CARDIAQUES

### Composition.

Strophantus .....	0,01	pour une dragée.
Spartéine.....	0,01	— —
Caféine.....	0,06	— —
Ext. de Scille .....	0,04	— —

**Propriétés thérapeutiques.** — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

**Indications.** — Insuffisance cardiaque, Asystolie, Maladies mitrales, Œdèmes cardiaques, Myocardites.

**Posologie.** — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

**Laboratoire LEBRUN**

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Téléphone : Trudaine 50-34.

## DRAGÉES LUMEVAL

Sédatives, antispasmodiques.

**Composition.** — Pilules glutinisées renfermant :

Extrait stab. de Valériane.....	}	0 gr. 03
— — Passiflore.....		
— — Crataegus .....		
Butylethylmalonylurée (Syn. Soneryl) ...		

**Indications.** — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

**Posologie.** — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne, 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N<sup>o</sup> 27-2.

Prix : 15 francs l'étui de 42 pilules.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS.

**Descouraux et Fils, Pharmaciens.**

Docteur en Pharmacie.

## DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

### Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, du surmenage intellectuel, des dépressions physique, cérébrale et des états adynamiques et asthéniques.

**Mode d'emploi** (sauf avis du médecin). —

Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Les dragées névrosthéniques « Yse » se font sans sucre pour les diabétiques. *Formule B.*

60 dragées par flacon. Prix : 13 fr.

**Laboratoire « YSE »**

**H. Chatelut, pharmacien**

65, rue Louis-Blanc — PARIS (Xe).

## DRYCO

**Lait sec.**

Activé par les rayons ultra-violets.

### Analyse approximative :

Matières grasses.....	12	p. 100.
Sucre de lait.....	46	—
Matières azotées.....	32	—
Sels.....	7	—
Eau.....	3	—

**Indications.** — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

**Pour nourrissons :** digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

**Pour adultes :** régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

**Doses.** — Dilution normale : une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée dans 50 centilitres d'eau bouillie chaude.

**A modifier** suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

*Préparer sans cuisson.*

**Société Française du Lait Sec DRYCO**

5, rue Saint-Roch — Paris (1<sup>er</sup>). — Central : 25-29.

## DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,  
extrait de porc vivant.

Procédé du Dr HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

**Indications.** — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

*Enfants* : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

Adresser toutes demandes :

**Laboratoire**

**de Physiologie du Puits d'ANGLE**

Le Puits d'Angle — LE CHESNAY (S.-et-O.).

*Représentant pour la Belgique :*

**M. MICHAUD**

23, rue Plantin — BRUXELLES.

## DYSTHÈNE

**Médication tonique et régulatrice, complexe phosphorique et magnésien.**

**Indications.** — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale, Inaptitude au travail.

**1° Forme gouttes :**

**Emploi et doses.** — *Adultes* : XL gouttes au total par jour, en deux fois, aux repas, dans un peu d'eau.

*Vieillards* : XXX gouttes au total par jour.

*Enfants* : de 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour.

— 12 à 16 ans : XII — —

— 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 18 francs.

**2° Forme élixir :**

**Emploi et doses.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe à chacun des repas de midi et du soir.

*Vieillards* : 1 cuillerée à dessert.

*Enfants* : de 16 à 18 ans : 1 cuillerée à café. Au-dessous de cet âge, prendre uniquement le DYSTHÈNE-GOUTTES.

L'élixir peut être absorbé pur ou partie égale d'eau.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquée**  
17, rue Bokanowski — ASNIERES (Seine).

## ECZÉDA

### **Ichtyosulfosalicylée.**

Pommade polyréductrice, ne déterminant jamais de poussées secondaires. C'est à son excipient spécialement étudié qu'elle doit son grand pouvoir absorbant et ses qualités d'épidermisation.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dermatoses suintantes et aiguës et plus spécialement Dermatoses prurigineuses, qui sont améliorées presque immédiatement.

**Indications.** — Eczémas sous leurs différentes formes ; Dermatoses des nourrissons, Prurits, Erythèmes, Dartres, Brûlures, Intertrigo.

### **Laboratoires PORCHER**

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## ECZOSEC PORCHER

### **Pâte adhésive sans corps gras.**

**Propriétés.** — Sèche en quelques instants, pansement souple et adhésif, ne nécessitant l'emploi d'aucune bande, ni tarlatane. Ne tache pas, s'enlève à l'eau.

Étendue en couche mince, elle permet la perspiration et la pigmentation tout en protégeant la peau.

**Eczosec spéciaux :** Ichtyolé, salicylé, sulfo-camphré.

**Indications.** — Dermatoses sèches. Eczémas. Prurits. Dartres. Erythèmes.

### **Laboratoires PORCHER**

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## EDISTOL

**Composition.** — Acide borique, tartrique, citrique: menthol, huile de *Pinus sylv.*, gaiacol, terpinéol, pinéol, cinéol, *Styrax benz.*

**Indications.** — Toutes affections et antiseptie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

**Mode d'emploi.** — *Gargarismes* et bains de gorge: 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

*Fumigations*; 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

*Vaporisations*; 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

*Bain nasal*; 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Echantillon sur demande.

Prix: G. M., 13 fr.; P. M., 8 fr. 75  
(exempt d'impôt).

Laboratoire R. O. L.

(Spécialités oto-rhino-laryngologiques).

**H. DUFOUR**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
Anc. interne des hôp. de Paris,  
40, rue des Carmes — ORLEANS (Loiret).

## EDRICAMPBRE

**Forme pharmaceutique et composition.** — Ampoules de 2 cc. de solution aqueuse correspondant à 2 cgr. d'*Ephédrine naturelle* et 20 cgr. de *Camphre*.

**Propriétés et avantages.** — L'EDRICAMPBRE est le médicament type de la *défaillance du cœur périphérique*. Facilité de l'injection sous-cutanée. Indolence absolue, diffusion et absorption rapide, Pas de rétention ni d'abcédation.

**Indications thérapeutiques.** — Tous états *hypotensifs* (choc toxique, infectieux ou traumatique).

Avant, pendant et après les *interventions chirurgicales*.

Accidents sériques et post-opératoires.

**Mode d'emploi.** — 1, 2 ou 3 ampoules par jour en injections *sous-cutanées* ou *intramusculaires*.

**Prescription.** — 1 boîte ampoules EDRICAMPBRE FALVY.  
L'EDRICAMPBRE existe également sous la forme *gouttes* (même composition) pour instillations et pulvérisations nasales et pour l'usage interne (XX à XL gouttes 3 à 5 fois par jour) dans l'asthme, le coryza spasmodique et les états allergiques.

Les Laboratoires FALVY

Licencié ès Sciences

Ex-Interne Lauréat des Hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## EKTOGAN-BOCQUILLON

A base de  $\text{ZnO}^2$ , l'Ektogan-Bocquillon (formule exacte  $2 (\text{Zn}^9\text{C}^{12}\text{O}^{25}\text{H}^{32})$ ) dégage, d'une façon lente et continue de l'Oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec les tissus ou les sécrétions organiques (sang, pus, transpiration, etc...).

**Indications.** — Chirurgie, Obstétrique, Gynécologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Dermatologie.

**Formes.** — **EKTOGAN-POUDRE** pour désinfection, désodorisation avec action desséchante de toute plaie.

**EKTOGAN-POMMADE** pour désinfection, cicatrisation et traitement des dermatoses.

Pansements à l'**EKTOGAN** (gazes, méchettes, plurabande, ekto-plaste, ovules, pâte occlusive pour ulcères variqueux).

**Laboratoire des PEROXYDES MÉDICINAUX**

12-18, rue Lamartine — PARIS.

## ELASTOPLASTE

**Forme essentielle.** — Bandes de 1 et 2 m.  $1/2$  de long et de 3 à 30 centimètres de large.

**Composition.** — Sparadrap adhésif, élastique, résultant de l'association d'une bande élastique (genre crêpe), et d'une masse adhésive au  $\text{ZnO}$ .

*Formule A* : Entièrement enduite (occlusive).

*Formule B* : Partiellement enduite (perméable à l'air).

*Formule C* : Perforée.

*Formule S* : Bandes enduites sur la moitié de leur largeur.

### Indications

Contention des plaies. Pansements aux articulations (toutes largeurs).

Extensions continues (formule A ou B : 2 m  $1/2 \times 6$  et 8 cm).

Traitements des ulcères variqueux (formule A : 2 m  $1/2 \times 8$  cm).

Redressement des pieds bots (formule A ou B : 2 m  $1/2 \times 3$  cm).

Luxations, entorses, bandages de soutien, etc...

### Autres présentations :

*Elastodoigts* : noir ou chair.

*Elastoplaies* : existe en 4 x 4 cm. — 6 x 4 cm — 6 x 6 cm, etc...

*Elastovaccin* : Protecteur après vaccination.

*Elasto-yeux* : S'adapte à la forme de la tête.

*Elastocapsil* : Emplâtre élastique au capsicum.

*Elastofuron* : Emplâtre au Vigo. élastique et poreux.

**Laboratoires FISCH et Cie**

4, rue d'Illzach, MULHOUSE

Agence : 104, Frg Poissonnière — PARIS (X<sup>e</sup>)

Tél. : Lamartine 92-52

## ÉLATINE BOUIN

Provient du traitement du Goudron de Sapin de Norvège

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

**Dose et mode d'emploi.** — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

**A titre préventif.** — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

**Indications thérapeutiques.** — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme); de la vessie et des reins (cystites, pyérites, gravelle).

**Laboratoire FAGARD**

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
Pharmacie Derneville, 66, boulevard de Waterloo,  
BRUXELLES.

---

## ELBON CIBA

(Cinnamoyl-p-oxyphénylurée.)

Antipyrétique doux, d'action durable, pour le traitement des pyrexies tuberculeuses et des catarrhes infectieux des voies respiratoires par mise en liberté d'acide benzoïque réalisant la benzoïlisation continue de l'arbre broncho-pulmonaire. Non diaphorétique.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire fébrile. Catarrhes pulmonaires et toutes affections bronchiques fébriles.

**Doses.** — 2 à 4 comprimés par jour. Commencer par la dose forte pour l'abaisser ensuite progressivement à mesure que la courbe thermique descend.

Le tube de 20 comprimés : 18 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**  
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## ELEDON

**Babeurre sec Nestlé.**

**Babeurre acidifié, en poudre, préparé par Nestlé, destiné à la diététique et à l'alimentation normale des nourrissons, enfants et adultes atteints de troubles digestifs.**

### Composition :

Matière grasse.....	14,0 p. 100.
Matières protéiques .....	29,5 —
Lactose.....	40,0 —
Cendres .....	6,5 —
Acide lactique.....	6,0 —
Eau .....	4,0 —

*Pureté absolue (ne contient à l'avance ni sucre, ni farine).*

*Composition constante, conservation parfaite, bonne valeur nutritive.*

**Indications.** — Diarrhées banales ou graves de l'enfant ou de l'adulte. Dermatoses du nourrisson, Alimentation des intolérants au lait des prématurés et des enfants menacés par les troubles digestifs (colonie.)

**Posologie.** — (Voir tableau sur l'étiquette de la boîte).

**Société NESTLÉ**

6, avenue Portalis — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## ELGINE JULIEN

**Comprimés.**

### Composition :

Collargol argent colloïdal ....	0,05 cent.
Benzoate de soude .....	0,40 —
Urotropine française.....	0,20 —

En comprimés se dissociant rapidement.

**Indications.** — Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour.  
*Enfants* : 1/2 dose. Avaler avec une infusion ou dissoudre dans de l'eau.

**Prix** : 12 fr. 50. — Boîte gratuite sur demande

**Louis JULIEN**

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris  
105, rue de Rennes — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## ELIXIR BONJEAN

**Composition.** — Ether et plantes aromatiques.

**Mode d'action.** — Tonique puissant des voies digestives.

**Indications.** — Troubles de la digestion par hypofonction, gastropathies d'origine nerveuse, diarrhée de l'adulte et des enfants, choléra infantile, grippe intestinale.

**Mode d'emploi.** — Un verre à liqueur après les repas ou au moment des douleurs. Renouveler une demi-heure après.

*Enfants* : Demi-dose.

Prix :

Le flacon : 16 fr. Le demi-flacon : 8 fr. 50.

**Docteurs FAURE et DUSSUEL**

**Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe**

**AIX-LES-BAINS**

## ÉLIXIR DUCRO

Ecorces d'oranges amères. Hypophosphite : 10 cgr. par 15 gr. d'élixir.

Tonique *antianorexique* très agréable : asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuil. à soupe ou 1 verre à liq., selon l'âge, étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

*Eupeptique*, euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

Action *d'épargne* : pneumonie, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuil. à café ou à soupe, selon l'âge, chaque 2 heures.

**DURIEZ**

**20, place des Vosges — PARIS.**

## ÉLIXIR DU D<sup>r</sup> MIALHE

**Préparation.** — Suc gastrique complet.  
— Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années.

(*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

**Indications thérapeutiques.** — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

**Laboratoire du D<sup>r</sup> MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## ÉLIXIR DUSSAUD

Véritable suc digestif.

*Aliment complet de surassimilation.*

**Composition.** — Pepsine, diastase, pancréatine, en milieu alcalin de lactates et de sels de Vichy.

**Propriétés.** — Transforme les albuminoïdes en peptones assimilables, les matières amylacées en glucoses ; émulsionne et saponifie les corps gras.

**Indications.** — *Eupeptique puissant*, réveille l'appétit et facilite la digestion. *Régulateur parfait* des fonctions intestinales, combat la constipation et la diarrhée, même chez les enfants. *Agent d'une assimilation intégrale*, se prescrit dans tous les états de carence : anémie, convalescences, athrepsie infantile, hypogalactie.

**Mode d'emploi.** — 1° *Premier âge* : 1, 2 ou 3 cuillerées à café (dans un peu d'eau bouillie sucrée). — 2° *Enfants* : 2 ou 3 demi-verres à liqueur. — 3° *Adultes* : 4 à 5 verres à liqueur.

Par jour et après le repas ou les tétées.

Prix du flacon :

A Marseille : 15 fr. - Hors Marseille : 18 fr.

**Laboratoire de l'ÉLIXIR DUSSAUD**

52, rue de Rome — MARSEILLE.

## ELIXIR EUPEPTIQUE TISY

**Composition.** — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

**Avantages.** — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

**Indications thérapeutiques.** — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements.

**Posologie.** — Un à deux verres à liqueur au début, ou à la fin de chaque repas.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires VAUDIN et GUILLAUMIN**

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS.

---

## ÉLIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

**Composition :**

Ergot de Seigle ..... 5 centigr.

Fer ..... 10 centigr.

Par cuillerée à café.

**Indications.** — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

**Posologie.** — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

**Laboratoires MANNET**

LOUDUN (Vienne).

## ÉLIXIR GABAIL

**Association Valériane désodorisée-  
Bromure.**

**Composition.** — Extrait de Valériane, Acide valérianique, Bromure de Strontium, Sirop d'écorce d'orange.

**Indications.** — Toutes affections nerveuses, Neurasthénie, Insomnies, Epilepsie, Spasmes, etc.

**Dose.** — 2 à 3 cuillerées à soupe par jour aux repas.

*Enfants* : 1/2 dose.

Prix : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

**Laboratoires S. GABAIL**  
5, rue Lefebvre — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## ÉLIXIR GODFRIN

**Formule.** — Teinture de simarouba, 7 gr. 50 ; Teinture de grenadier, 7 gr. 50 ; Elixir parégorique, 12 gr. ; Sirop de cachou, 40 gr. pour 125 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-dysentérique, astringent, sédatif.

**Indications.** — Diarrhées de toute nature, Entérites et entéro-colites, Dysentéries amibienne et bacillaire.

**Mode d'emploi.** — *Cas aigus.* — Prendre toutes les 2 heures : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe. — *Enfants de plus de 10 ans* : 1 cuillerée à dessert. — *Enfants de 6 à 10 ans* : 1 cuillerée à café. Ne pas donner au-dessous de 6 ans.

*Cas chroniques.* — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, loin des repas.

**H. PERIGNON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

6, rue de Paris — JOINVILLE-LE-PONT

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 117-1.



## ELIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

**Spécialement préparé pour combattre l'insuffisance gastrique dans toutes les formes de l'Hypochlorhydrie.**

**A** base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs. Son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Joignant l'utile à l'agréable.

Il est employé dans le monde entier et universellement apprécié par le corps médical. Le nombre des Docteurs qui emploient l'Elixir Grez chlorhydropepsique pour leur usage personnel augmente de jour en jour. C'est pour nous la meilleure preuve de la qualité de notre produit et de son efficacité.

**Posologie.** — Un verre à liqueur après chaque repas.  
Prix : 18 francs.

Dépôt général :

**Laboratoire de l'ELIXIR GREZ**  
49, rue de Maubeuge — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

**Titrage.** — Par cuillerée à soupe : 0,007 Bi-iodure de mercure. — 0,075 Iodure de potassium.

**Originalité.** — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un goût très agréable, et une parfaite tolérance pour l'estomac.

**Présentation dissimulée.** — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe au début ou au milieu des repas.

*Enfants* de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.  
— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.  
— de 2 à 4 — 1 à 2 — —

**A prescrire.** — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

**Indications.** — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

**Laboratoires A. DUTEIL**  
90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

## ELIXIR IODÉPURATIF PÉPIN

Médication mercurielle active préparée sous une forme à la fois tonique et agréable permettant de remédier en grande partie aux effets débilants de la médication mercurielle.

**Composition.** — Bi-iodure de mercure solubilisé par l'Iodure de sodium, Teinture de cacao, Teinture de vanille.

**Indications.** — Traitement d'usure. Traitement de l'hérédo-syphilis chez les enfants et les adolescents. Le traitement par excellence pour la femme enceinte.

Médication infantile. — Sirop iodépuratif PÉPIN, parfumé aux sucres de fruits (mêmes caractéristiques).

### Mode d'emploi :

*Adultes :* Une cuiller à soupe, soit 1 cgr. de bi-iodure.

*Adolescents :* Une cuiller à entremets, soit 1/2 cgr. de bi-iodure.

*Enfants :* Une cuiller à café, soit 1/4 cgr. de bi-iodure.

**Administration.** — Toujours au début du repas (condition la plus favorable à une tolérance parfaite).

Prix : 18 francs.

**Nota.** — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,  
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## ELIXIR SPARK

**Composition.** — Extrait fluide composé d'espèces amères stomachiques et digestives. Au complexe végétal obtenu par des lixiviations successives il est ajouté une quantité de glycérine et d'alcool strictement suffisante pour assurer une stabilité et une conservation parfaites ; le produit final, d'une amertume aromatique, possède une saveur agréable et franchement apéritive.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Affections du foie :* gastro-hépatite, insuffisance biliaire, congestion du foie, lithiase biliaire.

*Affections de l'estomac :* dyspepsies, stases gastriques, dilatations stomacales ; atonie des voies digestives.

*Affections de l'intestin :* entérites, ballonnement abdominal ; constipation et ses conséquences.

Pas de contre-indications.

**Doses.** — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau pure ou sucrée, avant ou après les deux principaux repas.

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE :

LABORATOIRES NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

# ELIXIR SPES DU D<sup>r</sup> GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

**Composition de l'Elixir.** — Iodure double d'Arsenic et de Mercure. Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au *Sirop de Gibert*.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

I .....	0,008	} correspondant à	{	0,01	Biiodure Hg.
Hg.....	0,006			0,005	Iodure As.
As.....	0,001				

Très agréable à prendre.

**Indications.** — *Syphilis et Hérédosyphilis*. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

**Doses :** { *Nourrissons* : 1 demi-cuillerée à café par jour.  
*De 1 à 3 ans* : 2 demi-cuillerées à café par jour.  
*De 3 à 7 ans* : 2 cuillerées à café par jour.  
*De 7 à 15 ans* : 2 cuillerées à dessert par jour.  
*De 15 à 20 ans* : 3 cuillerées à dessert par jour.  
*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

A prendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du verre gradué qui accompagne chaque flacon.

**Observation importante.** — Présenté comme tonique et modificateur, l'**Elixir Spes** ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 18 francs.

**Laboratoire SPES GUIRAUD**

10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>) — Tél. Marcadet 37-98.

## ELIXIR THIOGAIACOLÉ ARQUEVAUX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 439-1, en vue de la possibilité de prescription aux Assurés Sociaux.

**Composition.** — Thiogaiacol crist. pur, 0,15 ; Extrait Thébaïque, 0,0025 ; Codéine, 0,01 ; Bromoforme, solut. offic., 0,20 ; Teint. Rac. Aconit et Teint. Belladone titre int., àà XI gouttes = 0,20 ; Benz. Sodique et Drosera, àà 0,25 ; E. d. Laur.-Cerise t. int., 1 gr. ; véhicule : Elixir de Polygala au Garus, Q. S. pour 15 cc.

**Forme.** — Liquide.

**Indications.** — Antiseptique eupnéique cicatrisant des voies respiratoires. Enrouement. Bronchite et Toux chroniques. Tuberculose, Asthme. Catarrhes.

**Posologie.** — Adultes : selon les cas, 3 à 5 cuillerées à dessert ou à soupe par jour, entre les repas, pures, suivies d'une tasse de tisane très chaude.

Prix du flacon de 210 cc. : 15 francs sans impôt.

**Laboratoires ARQUEVAUX & Co.**

Pharmacien à Etampes (S.-et-O.).

## **ELKIN (Dragées)** **ELKIN (Granules)**

**Digestives — Cholagogues — Laxatives.**  
(Sans aucun drastique.)

### **Composition :**

#### **Adultes.**

Bile.....	} ââ 0 gr. 05.
Soufre .....	
Pancréatine.....	

Par pilule dragéifiée.

#### **Enfants.**

Bile.....	} ââ 0 gr. 01.
Soufre .....	
Pancréatine.....	

Par granule.

### **Indications thérapeutiques :**

**Digestions incomplètes.** Somnolence. Ballonnement. **Douleurs post-prandiales.** Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépato-biliaire. Insuffisance pancréatique. Dermatoses hémoclasiques. Rougeurs de la face. Urticaire. Eczéma. Acné juvénile.

### **Présentation :**

**Deux formes pharmaceutiques :**

**Pour les adultes : forme Dragées.**

Une ou deux pendant ou après les deux principaux repas (avaler sans croquer).

**Pour les enfants : forme Granules.**

Deux à quatre par repas (à prendre dans un dessert, compote, confiture, etc.).

**Remarque.** — Par procédé spécial de fabrication, les Dragées et Granules Elkin sont inaltérables à l'air et solubles dans l'estomac.

**Laboratoires DEPRUNEAUX**  
18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## ELZÉVIR-DENTITION

Collutoire spécifique et puissant de la première dentition.

**Composition.** — 1° Borate de soude (antiseptique et astringent), drosera et safran (sédatifs locaux);

2° *Hamamelis virginica*. Base de l'Elzévir-dentition (1/5 du poids total). A cette dose l'*Hamamelis Virginica* est un *vaso-constricteur puissant* (muqueuse congestionnée) et un topique remarquable (douleurs de la poussée dentaire).

**Mode d'emploi.** — En frictions douces avec la pulpe du doigt sur les gencives douloureuses. Adopté dans les services d'enfants des hôpitaux. Littérature et échantillons au Corps médical et à M<sup>mes</sup> les sages-femmes.

**Laboratoire H. SALLE**  
4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## **EMERSON'S BROMO-SELTZER**

(The Emerson drug Company, Baltimore).

### **Indications :**

Céphalalgies, Névralgies, Action rapide.

### **Composition :**

Citrate de soude, Acétanilide, Bromure de Sodium, Caféine.

### **Posologie :**

Une cuillerée à café dans un verre d'eau, et boire de préférence quand le liquide est en effervescence.

Prix : 10 fr., 20 fr. et 40 fr.

---

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice, sur demande adressée au Dépôt général :

**PHARMACIE ANGLAISE  
DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées  
PARIS (VIII<sup>e</sup>)

Téléph. : Élysées 22-52.

## EMGÉ LUMIÈRE

**Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale.**

**Constitution.** — Thiosulfate magnésien ( $S^2O^3Mg$ ).

**Propriétés.** — L'Emgé Lumière tonifie le système nerveux central et le système neuro-végétatif ; il est un antiseptique pulmonaire et bronchique.

Dès son contact avec le suc gastrique, il se décompose en : chlorure de magnésium, sulfuryle et soufre naissant.

L'Emgé Lumière, sous forme de comprimés, est un régulateur des fonctions digestives. Il combat les diarrhées du type lienterie post-prandiale, toutes les constipations, les toxémies d'origine intestinale ; l'anaphylaxie digestive et ses manifestations.

L'Emgé Lumière, sous forme de solution injectable, est aussi un stimulant des fonctions endo et exocriniennes du foie et surtout un médicament antichoc (tous phénomènes anaphylactiques lui sont justiciables).

**Doses.** — Ampoules : d'une injection intramusculaire quo idienne à trois et quatre par semaine.

Comprimés : de 2 à 4 par jour, les avaler au milieu des repas.

**Formuler :** Boîte de comprimés d'Emgé Lumière.

— Boîte de 3 ampoules d'Emgé Lumière.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON.

## EMPLATRES ROGÉ-CAVAILLÈS

**Caoutchoutés, Adhésifs** (formule de l'hôpital St-Louis).

**Oxyde de zinc :** Eczémas torpides, Lichénisation.

**De Vidal :** Furoncles, Impétigo, Folliculites.

**Huile de cade :** Psoriasis, Dermatoses squameuses.

Le tube : 10 francs.

**Colopastre.** — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

**Gaze anadhère.** — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

La boîte de 25 compresses : 18 fr. 50.

**Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS**

**29, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).**

Détail : Ph<sup>ie</sup> 116, boulevard Haussmann, et toutes pharmacies.

## L'ENDODERMOL

### Nouveau traitement du Rhumatisme

**Composition.** — L'Endodermol est composé : a) d'un complexe d'huiles étherées : acides abiétiques, acétate de bornyle, dipentène, camphre, camphène, terpènes ; — b) d'un concentré de sels minéraux : chlorure de calcium, chlorure de magnésium, chlorure ferreux, bromure de lithium.

**Action** lente, mais persistante.

Ce complexe médicamenteux dissout les lipoides de la surface du corps, traverse la peau, pénètre dans la profondeur des tissus, dont il modifie les échanges nutritifs. Il provoque une excitation du système neuro-végétatif déclenchant les sécrétions endocriniennes déficientes et rétablissant l'équilibre vago-sympathique.

C'est un analgésique remarquable, grâce à son action physiologique.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire et musculaire chronique. — Rhumatisme gonococcique et tuberculeux, — Sciatique. — Goutte. — Lumbago. — Rhumatisme vaso-moteur. — Engelures. D'une façon générale l'Endodermobalnothérapie sera instituée chaque fois que les autres médications auront échoué.

**Contre-indications.** — Affections cardiaques à la période d'asystolie, Fébricitants, Grossesse jusqu'au troisième mois, Maladies de la peau.

#### Mode d'emploi :

1° BAINS : N° I faible.	} Prescrire dans cet ordre
N° II concentré.	
N° III sulfureux.	

Le bain est absolument sans action sur les baignoires.

2° POMMADES (même composition chimique que le Bain N° II, même action). A prescrire dans les affections localisées et aux malades qui ne peuvent pas prendre de bains.

L'Endodermol peut être prescrit aux assurés sociaux.

#### Prix au public :

Bains : 20 francs le flacon pour bains.

Pommade : 16 francs le tube de 50 grammes.

#### Laboratoires Français de Pharmacie

A. PERROY, pharmacien, 42, Avenue de Draveil

VIGNEUX-SUR SEINE (S.-et-O.)

Tél. 74 CORBEIL. — R. C. 15.043 Corbeil.



## ENDOPANCRINE

Insuline Française.

Forme et composition :

ENDOPANCRINE : Tube de 5 cc. chaque cc. titré à 20 unités cliniques.

ENDOPANCRINE 40 : — — — — — 40 — —

ENDOPANCRINE 5 : Boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unit. clin.

ENDOPANCRINE 10 : — — — — — 10 d —

**Avantages.** — La présentation en tubes permet de prélever le nombre exact d'unités que l'on désire injecter, le reste du tube conservant toutes ses propriétés.

La présentation en ampoules est d'un emploi plus commode pour l'Insulinothérapie à faible dose.

**Indications.** — Diabète et ses complications. Acidose, Affections hépatiques, Angine de poitrine, Anémies pernicieuses, Artériosclérose, Artérites oblitérantes, Dénutrition chez l'adulte, Insuffisances cardiaques, Ménorragies d'origine ovarienne, Troubles parkinsoniens, Troubles trophiques des nourrissons, Ulcérations chroniques.

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses.

**Dose du début dans le diabète.** 20 unités cliniques. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Demandez nos notices :

La Thérapeutique du Diabète par l'Insuline.

Les applications de l'Insuline en dehors du Diabète.

Pour recevoir à titre d'échantillon le modèle de vente, en faire la demande en indiquant exactement le dosage que l'on désire recevoir.

Laboratoire de Thérapeutique Générale

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 26-87.

## ENERGINE IODÉE DE BERCK

Bardane — Iode — Noyer — Arsenic.

**Forme.** — Sirop agréable.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

**Indications.** — Croissance, lymphatisme, scrofule, ganglions.

## ÉNERGINE PHOSPHORÉE DE BERCK

Complexe opo-minéral nucléine.

**Forme.** — Granulée.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

**Indications.** — Convalescence, prétuberculose, faiblesse osseuse, asthénie, etc...

Laboratoire du Professeur PANCIER

G. RUIN, docteur en pharmacie,

21, rue Saint-Leu — AMIENS (Somme).

## ENIODE LEFEBVRE

**Composition.** — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

**Forme.** — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

**Doses et mode d'emploi.** — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

*Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

**Pharmacie GRIGNON**

2, rue Duphot — PARIS.

---

## ENTERARGOL

**Puissant bactéricide et antiseptique  
de l'intestin.**

**Formes.** — Dragées et granulés solubles.

**Composition.** — Argent colloïdal irradié à l'U. V. Sélecté. Dragées à 0,015 ; granulés à 0,50 pour 100 grammes.

**Indications.** — Toutes affections intestinales et à Colibacilles : Entérite, Diarrhée, Dysenterie, Grippe intestinale, Typhoïde, Para-Typhoïde...

**Doses et mode d'emploi.** — *Dragées* : *Adultes* : 5 à 6 par jour. — *Enfants* : 3 à 4 dragées par jour.

*Granulés solubles et sucrés* : Pour nourrissons et enfants : 4 à 5 cuillerées à café par jour à dissoudre dans l'eau ou le lait, avant ou pendant les tétées.

**Laboratoire PHOSMA**

68, rue de la Chaussée-d'Antin — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ENTERIODE

Comprimés combinés d'IODE et d'hydrocarbures de Carbone donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'IODE NAISSANT.

**Propriétés thérapeutiques.**— Puissant désinfectant intestinal.

Facile à absorber, ne provoquant ni irritations ni iodisme. Spécifique de toutes les entérites et plus particulièrement des entérites infantiles.

### Posologie.

**Nourrissons :** 3 fois par jour 1 comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

**Enfants :** 3 fois par jour 2 comprimés à la fin des repas.

**Adultes :** 3 fois par jour 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de 3 semaines à 1 mois, renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire.

**Laboratoires de l'Entériode**  
39, rue de Clichy — PARIS.  
Tél. : Trinité 65-16.

## ENTÉRO-ANTIGÈNES

du prof. DANYSZ, de l'Institut Pasteur.

### Indications.

**Maladies des voies digestives :** Pharyngites chroniques, dyspepsies de sensibilisation, Constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, colites, entérocolites, dysenteries microbiennes (Shiga, Fleixner, etc.). Appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

**Asthme, Rhume des foies, Emphysème, Dyspnée** provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

**Migraines, Neurasthénies.**

**Affections du foie :** Insuffisances hépatiques. Cholécystites aiguës ou chroniques non lithiasiques.

**Maladies de la peau :** Eczémas chroniques, Eczéma variqueux, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), Maladie de Quincke, Psoriasis. Prurigo de Hébra, Furunculose, Acné juvénile, Folliculites, Sclérodermie, etc.

**Rhumatismes chroniques. Troubles de la ménopause.**

**Colibacillose, Cystites à colibacille.**

Et dans tous les cas de *Dysharmonie endocrinienne*, soit par excès, soit par insuffisance.

**Deux formes.** — 1° Ampoules à injecter ; 2° Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature et échantillons sur demande.

**Lab. F. DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).**

## ENTEROBYL DEHAUSSY

Médication entéro-hépatique rationnelle.

### Composition :

*Cholérétiques* : Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Polypeptones (Drainage biliaire).

*Antiseptiques* : Héxaméthylènetétramine, Charbon animal pur (Désinfection intestinale et biliaire).

**Indications.** — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme), Ictère, Cholémie familiale.

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire : Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit.

**Posologie et Formes.** — Cachets. Granulé.

*Drainage biliaire* : 1 à 4 cuillerées à café, 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

*Cure d'entretien* : 1 à 2 cuillerées à café, 1 ou 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

Prix : 15 francs.

---

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## ENTÉROCARBINE LAGOUTTE

**Composition et forme.** — Cachets et granulés contenant par cachet ou par cuillerée à café :

Salicylate aluminique basique.....	0,20
Charbon activé pulv.....	0,60
Benzonaphtol.....	0,20

**Actions thérapeutiques.** — Absorbantes et antiputrides désodorisantes, antiseptiques remarquables de l'intestin dont il neutralise les toxines.

**Indications.** — Entérites aiguës et chroniques. Diarrhées estivales, Entérocolite muco-membraneuse, Fermentations intestinales, Auto-intoxications.

**Mode d'emploi.** — Cas aigus : 2 cachets ou 2 cuillerées à café de granulés 4 fois par jour. Cas chroniques : 3 cachets ou 3 cuillerées à café de granulés par jour, loin des repas.

Prix :

<i>Cachets</i> : La boîte de 30 cachets .....	10 fr. 50
— : La double boîte .....	20 fr. »
<i>Granulés</i> : La boîte de 100 grammes.....	9 fr. 50
— : La double boîte.....	18 fr. »

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## ENTÉROFAGOS

**Bactériophages intestinaux polyvalents.**

**Composition.** — Bouillon filtrat de bactériophages actifs contre les microbes que l'on trouve dans les infections intestinales.

**Dose.** — Ampoules à ingérer, 2 par jour, dans un peu d'eau bicarbonatée de préférence.

1 ampoule par jour pour les *enfants*.

Les bactériophages se distinguent par la rapidité de leur action et leur innocuité absolue.

Pas de réaction thermique, pas de choc.

**Indications.** — Entérites, colites, dysentéries bacillaires, typhoïdes, paratyphoïdes, diarrhées de type varié, constipation, fermentations intestinales, colibacilloses diverses, syndrome entéro-rénal d'Heitz-Boyer.

Remplace avantageusement les ferments lactiques pour le traitement des nourrissons.

Prix : la boîte de 10 ampoules : 18 francs.  
la boîte de 5 ampoules : 10 francs.

**Laboratoire de Biologie Médicale**

7, Avenue des Sources — NICE.

## ENTÉROHÉPATINE

Rééducateur opo-physiologique de l'Intestin.

**Composition.** — Ext. fl. intestinal, Extr. fl. pancréatique, Extr. fl. hépatique, Extrait salicaire, Teinture Belladone, Acide lactique.

**Indications.** — Toutes formes d'Entérites, Diarrhées, Dysenteries indigènes ou exotiques. Atonie intestinale.

### Mode d'emploi et présentation :

Flacon pour *adultes* : 3 cuillerées-mesure par jour.

Flacon pour *enfants* (compte-gouttes) : 11 gouttes par année d'âge, 3 fois par jour.

### ENTÉROHÉPATINE SB.

Même formule, moins la Teinture de Belladone.

Mêmes indications, mêmes doses.

Le flacon : 15 francs.

**Laboratoires Henri FOUCHER**

77, boulevard de Grenelle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## ENTÉROMUCINE

**Régulateur naturel et protecteur idéal de l'Intestin.**

**Constitution.** — L'ENTÉROMUCINE ROBERT et CARRIERE est une mucine pure, neutre et stérile obtenue à partir des muqueuses intestinales, et adaptée à la thérapeutique de la constipation et des entéro-colites.

**Action physiologique.** — 1° ENTÉROMUCINE = REGULATEUR NATUREL : c'est le laxatif idéal.

*Le seul lubrifiant réellement physiologique*, car à l'état normal c'est le mucus qui permet l'hydratation et le cheminement des fèces.

2° ENTEROMUCINE = PROTECTEUR IDEAL : protecteur mécanique et protecteur chimique par suite de son adaptation à fixer les ions acides ou alcalins pouvant nuire au bon fonctionnement de l'intestin ou irriter la muqueuse.

**Avantages.** — L'ENTÉROMUCINE est :

- 1° SUPERIEURE aux LAXATIFS DRASTIQUES ou salins très irritants.
- 2° SUPERIEURE aux MUCILAGES VEGETAUX qui se digèrent et augmentent les fermentations.
- 3° SUPERIEURE aux POUDRES INERTES et à l'HUILE DE PARAFFINE qui gênent considérablement l'assimilation et provoquent à la longue des irritations graves.
- 4° SUPERIEURE aux celluloses indigestibles (son) qui râclent l'intestin, d'où des désastres chez les colitiques.

L'ENTÉROMUCINE est particulièrement remarquable par la *DOUCEUR* de son action.

**Indications.** — CONSTIPATION simple, à tous les âges, Constipation des colitiques. COLITES diverses, : Entérites, Entérocolites.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café à chacun des 2 principaux repas. Le granulé est mis sur la langue, croqué et avalé avec un peu de liquide.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

## ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Vaccin antitypho-colique polyvalent  
Vaccination antityphique par voie gastro-intestinale.

**Constitution.** — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-coli-bacille, paratyphique A et B.) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants.

### Propriétés :

**Préventives :** La durée de l'immunité est variable selon les individus, efficacité de même ordre que celle des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée.

**Pas de contre-indication, pas de réaction.**

**Curatives :** Etats typhiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution.

**Doses.** — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.

Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

**Formuler :** Une boîte de 28 pilules d'Enterovaccin Lumière.

Les personnes soumises à la vaccination par l'Enterovaccin n'ont rien à changer à leurs occupations habituelles ni à leur régime normal.

### LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON

## ENTÉRO-VACLYDUN

Lysat vaccin du Docteur DUCHON

**Composition.** — Entérocoques, Colibacilles, Staphylocoques et Streptocoques, Lysat-vaccin intestinal à employer par voie *buccale*.

**Indications.** — Infections intestinales communes, Entérites, Colites, Diarrhées estivales, Diarrhées infantiles, Syndrome enterorénal, états appendiculaires, auto-intoxications intestinales, etc.

**Posologie.** — *Adultes :* 1 ampoule par jour dans 1/2 verre d'eau sucrée le matin à jeun.

*Enfants :* 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre en 3 fois dans la journée.

*Nourrissons :* 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre par cuillerée 1/2 heure avant les tétées.

Prix : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS.



## ENTÉROXIN LECLERC

Vaccin buccal polyvalent contre l'infection intestinale.

**Composition.** — Mélange de cultures atténuées de B. Coli, Entérocoque, Staphylocoque, autrement dit « bouillon vacciné », tenant en suspension les corps microbiens ci-dessus.

**Présentation.** — Ampoules de 10 cc. (boîtes de 8 ampoules).

### Mode d'emploi et dose :

Le matin à jeun, 3/4 d'heure avant toute alimentation, bien agiter une ampoule et en absorber le contenu dans un demi-verre d'eau froide sucrée.

Aucune réaction à craindre. On peut donner 1 ampoule à un nourrisson, 2 à 3 ampoules à un adulte pour agir plus énergiquement, sans aucun inconvénient.

Durée du traitement : 10 à 20 jours par mois, à renouveler plusieurs mois de suite.

Il est recommandé de faire précéder l'Entéroxin d'un cholagogue léger (Magnétone).

Prix : 25 francs.

Littérature, échantillon sur demande:

**Etablissements T. LECLERC**

Docteur P. Lemeland, pharmacien  
10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ENZYPAN

**Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs :**

Pepsine, Diastase, Trypsine, Lipase et Bile associées.  
Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, ou se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particule par particule pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique que détruit par le suc intestinal, dès leur arrivée dans le duodénum.

**Doses.** — 2 ou 3 dragées au début ou pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie, certaine ou probable, prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin des repas.

**Laboratoire NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). Tél. Laborde 08-00.

## ÉPHÉDRAFÉINE BÉRAL

**Deux formes : comprimés et ampoules.**

3 centigrammes d'Ephédrine naturelle et 5 centigrammes de Caféine par comprimé et par ampoule.

**Propriétés.** — Toutes les propriétés de l'Éphédrine et des Éphédroïdes, mais avec, en plus, l'action toni-cardiaque de la Caféine, d'où suppression des palpitations et de toute action déprimante sur le myocarde.

Les comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE sont particulièrement indiqués :

Chez les sujets hypocardiotoniques enclins aux palpitations.

Mêmes **Posologie et Mode d'Emploi** que les Éphédroïdes (Voir Éphédroïdes Béral).

Les ampoules d'EPHEDRAFÉINE, pour injections sous-cutanées ou veineuses sont particulièrement indiquées, avant les interventions et les rachi-anesthésies pour éviter les chocs et crises hypotensives.

Prescrire :

Comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte.

Ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte.

**Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL**

194, rue de Rivoli — PARIS.

## EPHÉDRASMINÉ

**Pulvérisations nasales.**

**Solution aqueuse glycerinée.**

Sulfate éphédrine naturelle.... 2 p. 100

Adrénaline physiologique..... 1 p. 10 000

**Action.** — Décongestion prolongée de la muqueuse nasale.

**Indications.** — Obstruction nasale, Asthme, Rhume des foins, Rhinite, Sinusites, Coryza, Coryza spasmodique, Catarrhe, Laryngites, Affections congestives du rhinopharynx.

**Mode d'emploi.** — Pulvérisations, tamponnements ou instillations.

Voir également : **Gardéphédrine**, page 470  
et : **Diuréphédrine**, page 351.

Echantillons et littérature sur demande.

**Laboratoires THORAL**

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

---

# ÉPHÉDRINE naturelle BÉRAL

Alcaloïde des Ephédras asiatiques.

**Indications.** — Asthme, Crises asthmatiformes du Catarrhe chronique et de l'Emphysème, Rhume des Foins, Skeptophylaxie et Skeptothérapie (Chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), Hoquet, Mal de mer et des Rayons, Enurésis, Hyposympathicotonies, Hypervagotonies, États allergiques, Rhinites, Sinusites, Obstructions nasales, etc.

## FORMES PHARMACEUTIQUES

### ÉPHÉDROÏDES BÉRAL

Comprimés à 3 centigrammes d'Ephédrine naturelle.  
Pour posologie et mode d'emploi, voir plus loin :  
EPHEDROÏDES.

### GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL

Grains dosés à 1 centigramme d'Ephédrine par grain.  
Particulièrement indiqués pour l'éphédrinothérapie à doses fractionnées chez les intolérants et pour préserver des chocs causés par les injections intraveineuses, arsenicales ou autres. Un grain toutes les 3 ou 4 heures, le jour et le lendemain de l'injection.

Prescrire : GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL, un flacon.

### ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL

Ampoules pour injections sous-cutanées ou veineuses à 3 centigrammes d'Ephédrine par centicube. 1 à 3 par jour.

Prescrire : ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL, une boîte.

### ÉPHÉDROMEL BÉRAL

Sirop mellité à 1/2 centigr. d'Ephédrine par cuillerée à café.

Pour posologie infantile. Voir ÉPHÉDROMEL.

### ÉPHÉDRISOL BÉRAL

Hydrolat d'Ephédra à 3 p. 100 ou 5 p. 100 d'Ephédrine pour usage externe et en particulier pour pulvérisations nasales avec l'Ephédriseur, contre l'asthme et le rhume des foins.

Prescrire : ÉPHÉDRISOL, un flacon.

### OLÉOPHÉDRINE BÉRAL

Huile d'Ephédra à 2 p. 100 d'Ephédrine pour instillations et pulvérisations nasales.

Prescrire : OLÉOPHÉDRINE, un flacon.

### MYDRIÉDRINE BÉRAL

Collyre à 4 p. 100 d'Ephédrine.

Prescrire : MYDRIÉDRINE, un flacon.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

## EPHÉDROCAMPHRE

**Solution d'Ephédrine naturelle associée au camphre et à l'Acétone chloroforme.**

**Avantages.** — L'Ephédrocamphre possède une triple action décongestionnante. Antiseptique, sans irritation et anesthésique.

**Indications.** — L'Ephédrocamphre est indiqué dans toutes les affections du nez : le Coryza, le Catarrhe nasopharyngien, le Rhume des foins, la Sinusite et enfin l'Asthme.

**Présentations.** — *Solution aqueuse* isotonique, contenant 3 p. 100 d'Ephédrine, 1 p. 100 de Camphre et d'Acétone chloroforme.

*Capsules nasales*, contenant une solution huileuse à 1 p. 100 d'Ephédrine de camphre et d'Acétone chloroforme.

**Mode d'emploi.** — L'Ephédrocamphre en solution s'emploie en pulvérisation ou en instillation 1 à 5 fois par jour.

En capsules, l'Ephédrocamphre s'emploie en instillation dans les deux narines, 2 à 3 fois par jour.

RIX : Solution 12 fr. — Capsules 15 fr.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

**Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

## ÉPHÉDROÏDES BÉRAL

Comprimés à 3 centigrammes d'Ephédrine naturelle Béral.

**Indications.** — Toutes celles de l'Ephédrine naturelle Béral (Voir *Ephédrine*).

**Posologie et mode d'emploi.** — Débuter par un Ephédroïde pris dès les premiers symptômes avant-coureurs de l'accès d'asthme ou dans les 2 heures précédant cet accès. Renouveler la dose si l'effet est insuffisant. La dose utile une fois établie (elle est souvent de 2 Ephédroïdes), donner cette dose en une fois lors des accès ultérieurs.

En période de crise, prendre préventivement un Ephédroïde le matin.

Chez les hypocardiotoniques et les sujets enclins aux palpitations, remplacer les Ephédroïdes par les comprimés d'Ephédraféine qui évitent les palpitations.

En cas d'insomnie ou d'agitation, remplacer les Ephédroïdes par les comprimés d'Ephétropine qui contiennent les correctifs appropriés.

Prescrire : Ephédroïdes Béral, un flacon.

**Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL**

194, rue de Rivoli — PARIS



## ÉPHÉDROLÉNOL

### Composition :

Ephédrine base.....	1 p. 100.
Ess. Eucalyptus.....	1 —
Ess. Anis.....	1 —
Ess. Géranium.....	1 —
Ess. Pin.....	1 —
Camphre .....	2 —
Huile Olive.....	93 —

Exactement neutralisée et stérilisée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aseptise et décongestionne la muqueuse nasale.

**Indications.** — Coryza, Rhume des foins, Rhinites atrophiques ou hypertrophiques, Ozène, Sinusites, Pharyngite, Végétations adénoïdes et en général toutes les altérations aiguës ou chroniques de la muqueuse nasale.

**Asthme :** Action rapide et sûre dans toutes les gênes respiratoires nasales.

Augmente la résonance de la voix chez les chanteurs.

### Formes et mode d'emploi.

- 1) flacon pour instillation ou pulvérisation.
- 2) capsules gélatineuses pour instillations nasales.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le N° 845-1.

Prix : 15 francs.

## ÉPHÉDROLÉNOL DÉDOUBLÉ

### Composition :

Ephédrine base .....	0,50 p. 100.
Ess. Eucalyptus.....	0,50 —
Ess. Anis .....	0,50 —
Ess. Géranium .....	0,50 —
Ess. Pin .....	0,50 —
Camphre .....	1 —
Huile d'Olive.....	96,50 —

Exactement neutralisée et stérilisée.

**Indications.** — Toutes celles de l'EPHEDROLENOL en médecine infantile. Injections intratrachéales (2 à 4 cc.) dans tous les états trachéaux ou trachéo-bronchiques. Troubles de la voix, Asthme.

**Formes et mode d'emploi.**

- 1) flacon pour instillations, pulvérisations, injections intratrachéales.
  - 2) ampoules de 5 cc. pour injections intratrachéales.
  - 3) capsules gélatineuses pour instillations nasales.
- Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le N° 845-2.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire de l'EPHEDROLENOL**

24, boulevard Jean-Jaurès  
BOULOGNE-SUR-SEINE

---

**ÉPHÉDROMEL BÉRAL**

*Sirop mellité contenant un demi-centigramme seulement d'Éphédrine naturelle par cuillerée à café.*

**Indications.** — Application de l'éphédrinothérapie à la médecine infantile, notamment contre l'Asthme infantile, la Trachéite spasmodique, la Coqueluche et l'Énurésie.

**Posologie.** — 2 à 8 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Prescrire : ÉPHÉDROMEL, un flacon.

**Laboratoire BÉRAL**

194, rue de Rivoli — PARIS



## ÉPHÉDRO-RHINOL

**Pommade à l'Ephédrine végétale lévogyre.**

**Composition.** — Ephédrine végétale chl., Novocaïne, Linalol du Bois de Rose, Excipient aromatisé.

**Indications.** — Coryza et Coryza spasmodique, Rhinites congestives, Sinusites, Rhumes des foins, Céphalée d'origine nasale.

**Mode d'emploi.** — 3 fois par jour ou plus, gros comme un pois dans chaque narine.

**Laboratoire des VASO-RHINOL**  
20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

---

## ÉPHÉIODINE BÉRAL

*Elixir de Lobélie à 3 centigr. d'Ephédrine et 25 centigr. NaI par cuillerée à café.*

La meilleure de toutes les préparations éphédriniques dans les Périodes intercalaires de l'asthme et contre les Bouffées asthmatiformes des Catarrheux bronchiques et des Emphysémateux.

Dilate les bronches, facilite l'expectoration, soulage toujours. Pas d'iodisme.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une cuillerée à café le matin et au début des accès.

Prescrire : ÉPHÉIODINE, un flacon.

**Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL**  
194, rue de Rivoli — PARIS

## ÉPHÉTROPINE BÉRAL

*Comprimés contenant chacun 3 centigr. d'Éphédrine associés à hyosciamine, caféine et acide barbiturique.*

Contiennent tous les correctifs électifs des effets secondaires de l'Ephédrine.

Sont particulièrement indiqués contre l'asthme rebelle avec agitation et insomnie.

Constituent la préparation de choix pour administrer l'Ephédrine le soir, en prévision d'accès nocturnes.

**Posologie et mode d'emploi.** — Comme les Ephédroïdes (Voir Ephédroïdes Béral), Prescrire : Comprimés d'ÉPHÉTROPINE, une boîte.

**Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL**  
194, rue de Rivoli — PARIS

## ÉPHOLÉINE

Inhalant.

**Forme pharmaceutique et composition.** — Huile éphédrinée au centième (éphédrine *naturelle* chimiquement pure) avec addition d'acétone chloroforme et orthoforme.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur local à action non irritante, diffusible et durable.

**Avantages.** — *Décongestionnant* de la muqueuse nasale, outre ses indications particulières, l'Epholéine remplace l'adrénoléine dans les cas d'intolérance individuelle à l'adrénaline.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Rhume des foins, Coryza spasmodique, Rhinites congestives.

**Mode d'emploi.** — En instillations (III ou IV gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour ou en pulvérisations). Chez l'asthmatique, l'ordonner *préventivement*.

**Prescription.** — Un flacon *Épholéine Falvy*.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## EPICRAL

Solution Iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée.

Antisymphilitique et tonique très actif, de goût très agréable, bien toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

**Composition.** — Arséniate de soude 0 gr. 001, Iode en combinaisons iodotanniques 0 gr. 002, Iodure Potassium 0 gr. 010, Lactate mercurique 0 gr. 006, Citrate de soude 0 gr. 150, Extraits fl. de Salsepareille Fumeterre, Douce-amère, Chicorée, Ec. Orange amère à à... 0 gr. 150, pour une cuillerée à soupe.

**Originalité.** — Emploi du lactate mercurique (sel de mercure bien toléré, surtout par les enfants) associé à l'arsenic et à l'iode en présence de citrate de soude et d'extraits de plantes dépuratives, ce qui donne un produit très actif, à action à la fois spécifique et tonique, ayant aussi de bons effets sur la circulation.

**Indications.** — Toutes les manifestations de l'Hérédo-syphilis à tous les âges, prophylaxie pendant la grossesse, traitement d'entretien. Se recommande en Pédiatrie. (troubles de croissance, cauchemars et frayeurs nocturnes dans la première enfance, troubles nerveux, de la vision et de la circulation, eczémas rebelles, dermatoses, états d'anémie, etc...)

**Posologie habituelle :**

*Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

*Adolescents* : 2 cuillerées à dessert à 2 cuillerées à soupe par jour.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle  
des Médicaments sous le N° 699-2

**Laboratoires G. LAMBERT \***

Docteur en Pharmacie

6, rue de Longchamp, 6 — VICHY (Allier)

---

## ERANOL

Iode en milieu aqueux colloïdal.

L'*Eranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode non combiné, en milieu aqueux, à l'état colloïdal (mouvements browniens), non caustique ni toxique même aux doses thérapeutiques élevées.

**Propriétés.** — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Eranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa teneur en iode (10 p. 1 000), sa parfaite tolérance et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

**Indications.** — Lymphatisme, Hypertension, Rhumatismes, Prétuberculose, Tuberculoses torpides, mycoses, etc.

**Forme.** — Flacon, avec compte-gouttes.

**Mode d'emploi et Posologie.** — Au moment des repas ou entre les repas, dans une boisson quelconque : eau, vin, bière, etc.

*Adultes* : XX à L gouttes et plus, deux fois par jour. *Enfants* : V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

Prix au public : 13 fr. 75.

**Laboratoire de L'ERANOL**  
45, rue de l'Echiquier — PARIS.

## ERCERHINOL

Ampoule nasale à l'Argent Colloïdal.

**Avantages.** — Bactéricide puissant, Traitement *pratique*, rapide et propre.

**Indications.** — *Grippe*, infections broncho-pulmonaires, Catarrhe nasopharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

**Mode d'emploi.** — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

## ERGORONE

Solution huileuse de vitamine D antirachitique titrée à 6.000 unités physiologiques par cent, cube, soit 200 unités pour une goutte.

**Indications.** — Rachitisme, Spasmophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse. Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant. Etats précaires accompagnant les croissances déficientes.

**Présentation et posologie.** — Flacons de 15 cc:  
*Nourrissons* : III à IV gouttes par 24 heures.  
*Enfants* : VI à X gouttes par 24 heures.  
*Adultes* : X à XX gouttes par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## ERGOTINE LAMANTE

### Traitement des hémorragies

**Forme.** — Gouttes et ampoules pour injections hypodermiques.

**Composition.** — Solution stabilisée et inaltérable de tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle, obtenue par le procédé de fabrication spéciale de Lamante.

**Indications.** — Hémorragies de toute nature. Hémorragies utérines. Accouchements. Fausses-couches, Fibromes, Accidents de la Ménopause, Hémorroïdes, Crachements de sang, Saignements de nez, Leucorrhée, Troubles de la Puberté. Incontinence d'urine chez les enfants. Contre l'Asthme bronchique et la Toux quinteuse, en injections hypodermiques.

**Doses et mode d'emploi.** — XXX à XL gouttes par 24 heures chez les adultes en deux fois dans un peu d'eau sucrée XXX gouttes à la fois, 3 à 4 fois dans les 24 heures dans les très fortes hémorragies.

**Enfants :** 1/3 des doses ci-dessus.

**Ampoules.** — En injections hypodermiques : 1 ampoule comme préventif d'hémorragie après l'accouchement, ou dans les hémorragies légères. Deux ampoules consécutives dans les hémorragies abondantes. A répéter au besoin 2 à 3 fois dans les 24 heures.

Echantillon et littérature sur demande.

Le flacon gouttes : 12 fr. — La boîte 6 ampoules : 12 fr.

Enregistrés au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous les n<sup>os</sup> 346-5 et 346-6.

Marc PARIS, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

## ERYTHRA

### DYN

Chimiothérapie élective de la ROUGEOLE

Amidopyrine lactique pure à pH=3,2

Solution titrée : une goutte = un centigramme.

Antithermique puissant, bien toléré par les nourrissons et les enfants, même à doses élevées.

**Indications :** Médicament de choix de la Rougeole :

Traitement abortif aux stades de début ;

Médication adjuvante à la période d'état ;

Thérapeutique préventive des complications.

**Pyrexies aiguës :** Fièvres éruptives, saisonnières et de croissance.

**Algies :** Migraines, névralgies, zona, tabès, grippe.

**Posologie :** 1<sup>o</sup> Dans la Rougeole :

faire prendre, sans interruption, toutes les 4 heures exactement :

*Enfants :* IV gouttes par année d'âge.

*Adultes :* L à LXXX gouttes.

2<sup>o</sup> Dans les autres fièvres et névralgies :

mêmes doses 3 à 4 fois par jour en dehors des repas.

Le flacon compte-gouttes : 18 francs

Remboursable par les caisses d'assurances sociales (n<sup>o</sup> 734-1).

Société d'Applications Pharmacodynamiques

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Diderot 37-93.

## ESCULÉOL

**Composition.** — Alcoolé concentré de Marron d'Inde frais, stabilisé.

**Indications et propriétés.** — Action vaso-constrictive sur le système nerveux périphérique et en particulier dans les cas d'hémorroïdes, varices, varicocèles, phlébites, stase veineuse, etc.

**Supérieur aux préparations médicinales** parce que concentré, stable et d'action constante.

**Mode d'emploi.** — **Hémorroïdes** : Administrer 2 fois par j. dans l'intervalle des repas XV gouttes d'Esculéol dans un peu d'eau. Dans les cas rebelles, graduer la dose suivant l'intensité des douleurs, en augmentant de V gouttes par jour. **Varices, varicocèles**, etc., toutes les fois que la médication devra être continuée pendant un certain temps administrer XV gouttes 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas, 20 jours par mois.

Prix : 14 francs.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

## ESSOFORME

**Essoforme simple.** — Essences végétales antiseptiques *non caustiques*, solubilisées dans l'huile d'amandes douces.

Flacon de 45 gr. avec compte-gouttes... 9 fr.

Boîte de rhino-capsules ..... 10 fr.

**Essoforme éphédriné.** — Essoforme simple additionné de 1 p. 100 d'éphédrine.

Flacon de 20 gr. avec compte-gouttes... 18 fr.

Boîte de rhino-capsules ..... 12 fr.

**Indications.** — Rhinorrhées, rhinites, sinusites. La forme éphédrinée sera réservée aux cas aigus ainsi qu'au traitement de l'*asthme* et du *rhume des foins*.

**Mode d'emploi.** — En gouttes ou en pulvérisations nasales.

Echantillons sur demande :

**Laboratoires GUY SIMON**

44, rue d'Inkermann — LILLE (Nord);

## ETHYL-PNEUMINE " LERSAM "

Spécifique des affections pulmonaires aiguës.

**Composition.** — Solution d'alcool-éthylrique pur à 33 p. 100 en milieu glucosé isotonique.

**Forme pharmaceutique.** — Ampoules de 10 cc.

**Indications thérapeutiques.** — *Traitement efficace de toutes les pneumopathies les plus graves : pneumoniës, broncho-pneumonies, congestions pulmonaires, bronchites, abcès du poulmon, gangrène pulmonaire.*

Maladies infectieuses et complications pulmonaires : septicémies, fièvres puerpérales, coqueluche, grippe, etc

*Communications scientifiques des Professeurs Landau, Laignel-Lavastine, Rist, Burnand, Hamburger, etc*

**Doses.** — *Cas graves :* 20 à 40 cc. par voie intra-veineuse ou intra-musculaire, répétées tous les jours.

*Cas moyens ou légers :* 10 cc. par voie intra-musculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours.

**Prix.** — La boîte de 6 ampoules : 20 fr. Admis aux A. S.

*Echantillons, Littérature :*

**Laboratoires. LERSAM**

17, rue Saint-Saëns — PARIS (XV•).

---



## EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique pulmonaire)

**Composition.** — Eucalyptol 0,12 cgr.; Gaïacol, 0,05 cgr.; Acide phénique, 0,02 cgr.; Camphre, 0,05 cgr.; pour une ampoule de 1 cc., le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant *l'injection absolument indolore.*

**Formes.** — Amp. de 1, 2 et 5 cc. gaïacolées ou non gaïacolées. — Caps. glutinisées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique pulmonaire. Anti-oxydant. Antithermique. Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

**Indications.** — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses, Coqueluche

**Posologie et mode d'emploi.** — Sous la forme capsules : 6 par jour, 2 à chaque repas. En injections intra musculaires. Adultes : 1 à 5 cc. par jour. Enfants de 5 à 12 ans :  $\frac{3}{4}$  de cc.; 2 mois à 5 ans,  $\frac{1}{2}$  de cc. Le flacon de 42 capsules : 11 francs. La boîte d'amp. : 18 francs

Dans le traitement de la Coqueluche, émulsionner le contenu d'une ampoule dans  $\frac{1}{2}$  verre de lait et donner chaque jour en lavement à conserver.

**Laboratoire LEBRUN**

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Téléphone : Trudaine 50-34.

## EUFOSFYL

**Composition.** — 1° *Ampoules à 1 cc. à base de :* Méthars. de soude, Phosphonuclease, Magn. Cacod. Glycéro-Phosphate, Caféine (Méthars. de Strychn. 1/2 milligramme). Phosph. de manganèse (ampoules avec et sans Strychnine). Indolores.

2° *Cachets, à base de* Splénine, Méthylarsin. sodique, Phosphonuclease de Chaux, Dragées, Glycéro-phosph. calcique, Phosphate tricalcique, Phosph. magnésium. Phosph. de manganèse.

3° *Dragées. même composition que cachets.*  
Deux Dragées égalent un cachet.

**Indications.** — Remineralisateur nerveux et tonique, surmenage, neurasthénie, asthénie, régénérateur des centres nerveux, impuissance, débilité sénile, hypotension artérielle et ses conséquences, stimulant des glandes endocrines.

**Posologie.** — *Ampoules :* 1 injection sous-cutanée par jour, pendant 24 jours.

*Cachets :* 1 à 4 cachets par jour aux deux principaux repas. Cesser pendant 8 jours et recommencer une nouvelle cure.

Laboratoire des Produits Vely  
132, avenue Victor-Hugo — PARIS.  
Tél. : Passy 87-85.

## EUGALINE

Hygiène intime de la femme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Comprimés anti-septiques et décongestifs.

**Formule.** — Sulfate de zinc, Acide salicylique, Naphtalate de soude, Trioxyméthylène, Oxycyanure de Mercure, Fluorure de Sodium, Acide benzoïque, Tanin à l'alcool, Chlorure de sodium, Acide citrique, Acide tartrique, Carbonate acide de Sodium, q. s. p. un comprimé de 3 gr., Essence de Géranium rosat, q. s. p. parfumer, Colorant rouge, q. s.

**Doses et mode d'emploi.** — *Comprimés :* 2 comprimés par 2 litres d'eau bouillie chaude pour injections vaginales.

Enregistré au Laboratoire National  
du Contrôle des Médicaments sous le n° 882-3.

Laboratoire COUSIN  
Rue Albert-1<sup>er</sup> — BEAUMONT-SUR-OISE.

## EUGASTROL

Charbon animal.

Purifié à l'alcool exempt de cyanure.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement spécifique des maladies de l'estomac, de l'intestin et du foie.

**Indications.** — Combat avec une efficacité certaine toutes les maladies de l'appareil digestif, Gastrites, Dyspepsies, Gastro-entérites, Cholécystite pure ou associée, Colite muco-membraneuse, Migraines d'origine gastrique, Ulcères digestifs.

**Formule.** — Charbon animal pur lavé à l'alcool exempt de toute trace de cyanure, carbonate de chaux pur léger, hydrocarbonate de magnésium, sucre de lait, acide acétylsalicylique, mélangé, étuvé, tamisé, suivant procédé spécial.

**Dose et mode d'emploi.** — *En poudre* : 1 à 2 cuillerées à café après chacun des principaux repas.

*En cachets* : Un à la fin des repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 655-3.

**Laboratoires BOUTROY**

8, rue de Passy — PARIS.

## EUGLYMA

**Forme.** — Solution titrée de chlorure de magnésium pur, de goût agréable.

**Composition.** — XXXV gouttes renferment 0 gr. 60 de chlorure de magnésium pur.

**Indications.** — Asthénies, Dépressions neuromusculaires, Dermatoses, Lésions du type pré-cancéreux, Prophylaxie du cancer, Affections dues au mauvais fonctionnement des voies digestives, biliaires et rénales.

**Particularités.** — Mauvais goût du chlorure de magnésium absolument masqué.

**Posologie.** — XXXV gouttes midi et soir, avant le repas dans un demi-verre d'eau.

Echantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires LECONTE**

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Louvre 53-16.

## EUGYNOL GRANDVAL

### Composition :

Association d'extraits d'Hydrastis-Hamamélis-Viburnum Gossypium.

**Propriétés thérapeutiques.** — Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les palpitations et provoque l'élimination des toxines.

Vaso-constricteur par excellence ; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la femme.

**L'Eugynol** permet d'enrayer la formation des Varices ; soit au moment de la grossesse, soit au retour d'âge. Il rétablit la régularité des règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

**Indications thérapeutiques.** — Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorragies, Flux sanguins de toute nature, Eruptions diverses, etc.

**Dose.** — XV à XX gouttes avant chaque repas. On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 10 fr. (toutes pharmacies).

**LABORATOIRES GRANDVAL**

12, 14, rue Féry — REIMS.

## EUMICTINE

### Indications thérapeutiques :

Antigonococcique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Traitement complet, sans aucun retentissement sur les organes, estomac en particulier.

### Doses et mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène-Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas, ce qui constitue un traitement complet des affections urogénitales et prostatiques.

Prix de vente au public : 20 francs.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

## EUONYMINE PAUL THIBAUT

*Pilules d'Evonymine purifiée*, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Evonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

**Indications.** — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

**Posologie.** — Pilules dosées à 0,06 d'Evonymine et à 0,06 d'extrait de boldo. 1 à 3 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe. — Ex-interne des Hôpitaux de Paris.  
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>)

**Nota.** — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours *Pilules d'Evonymine Paul Thibault*. Enregistré au Laboratoire National n° 218-2.

## EUPAVERYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine  
chimiquement pur.

**Indications.** — Spasmes viscéraux, Asthme, Coqueluche, Déséquilibres vago-sympathiques.

**Présentations :**

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.

Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.

Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

**Posologie :**

**Adultes :** de 0 gr. 05 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

**Enfants :** 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

**Laboratoires PACHAUT**

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Tél. : Laborde 16-72.

## EUPEPTIQUE MONAVON

**Composition.** — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

Pepsine pure .....	0 gr. 12
Diastase.....	0 gr. 15

**Propriétés thérapeutiques.** — Digère les viandes et les féculents.

**Avantages.** — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

**Indications.** — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

**Posologie.** — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau.

Prix : 18 francs.

**Produits GONNON**

**J. et O. GONNON, Pharmaciens**

14, rue Victor Hugo — LYON.

## EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

**Composition et forme.** — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : codeïne 0,02 + Teinture rac. aconit, 0 gr. 20 ; formiate sodique, 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

**Indications thérapeutiques et posologie.** — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonie, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants, ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien,  
273, rue Victor-Rauter.

## EUPHORYL

(Cachets — Dragées — Intraveineux.)

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des **dermatoses** prurigineuses et affections anaphylactiques.

**Formule.** — Hyposulfite de soude et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

**Indications.** — a) *Dermatoses prurigineuses* : Eczémas secs et suintants. Prurits, érythrodermies, dermites médicamenteuses et professionnelles, Psoriasis, toxidermatoses.

b) *Manifestations anaphylactiques* : Urticaire, migraines, œdème de Quincke, maladies sériques.

**Posologie.** — *Cas moyens* : 3 cachets ou 6 dragées par 24 heures, combinés à un traitement local approprié.

*Casaigus* : Une injection intraveineuse bi-hebdomadaire, avec prise de 2 cachets ou 4 dragées, les jours intercalaires.

**Nota.** — Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

Prix : Cachets : 18 francs. — Dragées : 15 francs.

Intraveineux : 38 fr., 34 fr., 18 fr.

## EUPHORYL-INFANTILE

(Granulé soluble.)

Traitement des troubles digestifs de l'enfance et de leurs complications cutanées.

**Formule.** — Hyposulfites alcalins, Citrate de sodium, Lactate de magnésium, en combinaison bromurée silicatée.

**Présentation.** — Granulé soluble de goût agréable facilement accepté par les enfants les plus jeunes.

**Indications.** — L'EUPHORYL-INFANTILE est particulièrement indiqué dans trois groupes d'affections infantiles.

1° *Dermatoses prurigineuses.* — Eczémas secs ou suintants, eczémas dysidrosiformes, eczémas séborrhéiques, séborrhée, dermites médicamenteuses, érythrodermies, toxi-dermatoses.

Prurits, strophulus, herpès, trycophyties, pityriasis.

2° *Troubles digestifs.* — Anorexies, Vomissements. Etat saburral des voies digestives, Intoxications alimentaires, Constipation des nourrissons, Petite insuffisance hépatique.

3° *Anaphylaxies.* — Urticaires, Migraines, Œdèmes de Quincke, Accidents sériques.

**Posologie et mode d'administration.** — L'EUPHORYL-INFANTILE doit être prescrit à la dose de 1 cuillerée à café par année d'âge.

Il peut être croqué ou dissous dans une petite quantité d'eau ou de lait.

Chez les nourrissons, il se dissout aisément dans les biberons.

Prix : 18 francs.

### LABORATOIRES « ANA »

Anciennement : Laboratoire de Dermatologie de Paris.

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Dorian 52-12.

## EUPHYSOL

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Bronchites, Arthritisme, Scléroses, Rhumatismes, Troubles de la nutrition, Lithiase biliaire et rénale, Troubles visuels et auriculaires, Médication anti-choc, Destructeur de la cholestérine, des Carbonates, Urates et Oxalates, s'oppose aux fermentations microbiennes, sans entraver l'action des diastases, manifestation du retour d'âge.

### Présentation sous trois formes.

*Tisane* { Calmante, euphorique.

*Pastilles* { Expectorantes.

*Cachets* : Médicament curatif, désintoxicant et modificateur de l'état arthritique.

### Mode d'emploi :

*Tisane* { Calmante, 2 à 3 tasses par jour dans l'intervalle des repas ou en se couchant.

*Pastilles* { 8 à 10. Le paquet ou la boîte : 6 fr. 40.

*Cachets* : curatifs. *Adultes* : 2 à 6 par jour après les repas suivant les cas.

*Enfants* : demi-dose dans compote ou confiture.

La boîte de 40 cachets : 21 fr. 20.

Le traitement sera fait 10 jours par mois pendant 6 mois, arrêt 2 mois et recommencer chaque mois demi-dose.

Aucune contre-indication.

### Laboratoire de l'EUPHYSOL

22 bis, avenue de Saint-Cloud — VERSAILLES (Seine-et-Oise).

Tél. : 91 Versailles.

---



## EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux  
et des Dystonies du sympathique.

**Forme.** — Solution.

**Composition.** — Une cuillerée à café contient :

Cratægus oxyacantha.....	31 centigr.
Extrait fluide passiflora incarnata	50 —
Alcoolature Ballota marrubium nigrum .....	98 —
Extrait fluide de Paullinia sorbilis	16 —
Extrait mou de Valeriana officinalis .....	12 —

**Posologie.** — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

**Indications.** — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie,angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses,angoisse de la ménopause.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Euphytose est antispasmodique par la Ballotte. Elle est tonique cardiaque par le Cratægus oxyacantha. Par la passiflore, elle est sédative de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au Paullinia sorbilis (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'Euphytose, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin, elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'Euphytose représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

Prix de vente au public : 15 francs.

**Laboratoire MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

## EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

**Doses et mode d'emploi.** — Une cuillerée à café matin et soir, au commencement des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage d'eau, de lait ou de bière.

**Propriétés thérapeutiques.** — Diurétique, toni-cardiaque et respiratoire.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Oppressions, Bronchite chronique, maladies du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropisies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suites de la Grippe.

**Laboratoires DARRASSE**

7 à 13, rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine).

---

## EUPNOGÉNOL

**Forme.** — Élixir.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

**Doses.** — 4 cuillerées à café par 24 heures pour les adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

Prix du flacon : 16 fr.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par le laboratoire de  
l'Eupnogénol.

**F. VELLAY**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

116, Avenue Berthelot  
VIENNE (Isère).

## EURECTOL

Deux formes : Pommade et Suppositoires.

**Indications.** — Hémorroïdes, Prurit anal, Rectite, etc.

**Composition.** — Marron d'Inde frais stabilisé. Hamamélis. Orthoforme. Extraits biliaires et Nouveauté absolue : Extrait spécial d'*Arum triphyllum*, un spécifique de premier ordre.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionnant. Calmant. Vaso-constricteur analgésique, antiseptique. Action rapide et sûre *loco dolenti*.

**Dose et mode d'emploi.** — Chaque soir, étant couché, introduire dans le rectum, soit de la pommade ou mieux de préférence un suppositoire. Continuer pendant 8 jours. Interrompre une semaine. Terminer le traitement par une nouvelle cure de 8 jours.

**Crises aiguës :** Traitement matin et soir.

Prix : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande :

**Laboratoires J. PERROCHON**

57, rue Origet — TOURS.

## EUSKINE

1° *Crème EUSKINE* (Crème au Stéarate neutre). Dermatoses irritables. Constitue une crème excellente d'entretien pour les peaux grasses. Remplace avantageusement la vaseline dans ses applications.

2° *Baume EUSKINE faible* (Pommade à l'Ichtyol et goudroline).

Dermatoses subaiguës, eczéma subaigu, eczématides, eczéma variqueux, eczéma anal et vulvaire, eczéma artificiel des mains.

3° *Baume EUSKINE fort* (Pommade au camphre, soufre, goudroline et ichtyol).

Dermatoses sèches, torpides, non inflammatoires. Eczéma chronique plus ou moins lichénifié.

Tubes de 10 fr.

**Laboratoire RICHER**

**Docteur en pharmacie**

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien  
PARIS.

## EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée).

**Forme.** — Comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hypnotique, sédatif, antialgique.

**Indications.** — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

**Mode d'emploi et dose.** — *Comme sédatif* : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

*Comme hypnotique* : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 francs.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle.

**Formule.** — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Corps thyroïde .....	0 gr. 02
Muscle cardiaque .....	0 gr. 50
Parenchyme rénal ....	0 gr. 50
Iodotyrosine.....	0 gr. 05
Scille.....	0 gr. 06
Scammonée .....	0 gr. 04

pour une pilule.

**Doses et mode d'emploi.** — Deux à quatre pilules par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

**Indications.** — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, athéromateux, néphrite chronique hypertensive, cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension mesurable au sphygmomanomètre, et il compense cette hypotension en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

14, rue de Clichy — PARIS (IX°).

## ÉVINE

### Poudre soluble Evine.

Antiseptique, parfumée, alcaline, détersive, décongestionnante, sédative, cicatrisante, non caustique. Ne tache pas.

**Indications.** — Hygiène intime et journalière de la femme. Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, suivant doses.

**Posologie.** — 1° Hygiène féminine ; 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède, en injections et lotions ; 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres eau bouillie (injections, lotions, compresses), précieux adjuvant aux pansements médicaux ; 3° Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie) ; 4° Hygiène masculine : 1 paquet pour 1 litre d'eau bouillie en bains et lotions ; 5° Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 litre d'eau bouillie tiède (bains, lotions, compresses).

### Ovules Evine.

Puissamment antiseptiques et non irritants, cicatrisants, décongestionnants, désodorisants, fondent à 36°,5. Ne tachent pas.

**Indications.** — Toutes affections Gynécologiques.

**Posologie.** — Un ovule le soir au coucher. Au préalable, prendre une injection avec une solution de Poudre Evine dans de l'eau bouillie tiède. Renouveler cette injection le matin au lever.

### Laboratoires ÉVINE

16, rue Barbette — PARIS (III°).

Tél. : Turbigo 90-47.

## EVOBILINE

### Dragées plates Inaltérables.

Association d'extraits végétaux (feuilles d'artichaut, boldo, combretum, evonymus) et de poudre de foie et sels biliaires.

**Propriétés.** — Cholagogue, tonique du foie, réducteur des fonctions entérohépatiques, diurétique, antitoxique, laxatif.

**Indications.** — Toutes insuffisances hépatiques et leurs conséquences : cholécystite, ictères, cirrhose, lithiase biliaire, constipation, urticaire, troubles hépatiques consécutifs à certaines maladies infectieuses.

**Dose et mode d'emploi.** — Trois fois par jour, une à deux dragées au début ou la fin des repas.

*Autorisé par les Assurances Sociales.*

**Laboratoires L. LAFFORT, Pharmacien**

Licencié ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (I.-et-L.).

## ÉVOLAXINE

(Le Laxatif de la Femme.)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses lipoides ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son mucilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaire, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

**Indications.** — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatose, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 12 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> LAURENT-GERARD**

Docteur ès sciences,

Ancien-Chef de Laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris,

40, rue de Bellechasse — PARIS. Tél.: Littré 97-95.

## EVONYL

**Composition.** — Extraits biliaires, de glandes intestinales, Evonymine, Fucus, agar-agar, ferments lactiques, podophyllin, phénolphthaléine, etc., en milieu ergostérique irradié suivant notre méthode de vivification des végétaux donnant à la synergie médicamenteuse un coefficient supérieur pour sa valeur thérapeutique.

**Propriétés.** — Laxatif doux, absolument certain. Cholagogue de premier ordre. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

**Indications.** — Constipation aiguë ou chronique. Insuffisance hépatique, cholécystites, lithiases biliaires, hypertension.

**Forme.** — Tablettes dragéifiées.

**Posologie.** — Une à deux tablettes le soir au repas (à avaler sans mâcher).

Prix au public : 15 francs pour un mois.

**Laboratoires FLUXINE**

**J. BONTHOUX, Pharmacien**

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

## EXHEPA

**Extrait de foie en poudre.**

**Indications.** — Anémie pernicieuse et autres genres d'anémie grave, Tuberculose, Convalescences.

**Forme.** — Tubes contenant l'équivalent de 100 grammes de foie frais.

Boîtes de 5, 10, 20 et 100 tubes.

**Mode d'emploi.** — Délayer la poudre dans un liquide froid ou mieux tiède, mais jamais bouillant.

**Posologie.** — De 1 à 4 tubes par jour suivant les cas.

L'EXHEPA est présenté sous deux formes : l'une, « goût naturel », l'autre « goût de bouillon ».

**Valentin AAGE MOLLER**

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire pour la France : **Jean DEDIEU**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

---

## EXOBOL

**Guérison de la Constipation.**

Nouvelle émulsion à 50 p. 100 d'huile de paraffine. Goût très agréable.

**Indications.** — Constipation simple. Constipation compliquée de colite, Constipation consécutive à un obstacle mécanique adjuvant à un traitement chirurgical.

**Forme.** — Emulsion.

**Posologie :**

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe par jour *au milieu du repas* ; parfois 2.

*Enfants* : La moitié ou le  $\frac{1}{3}$  de ces doses.

**Etablissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).



## EXONEROL

**Propriétés thérapeutiques.** — Désintoxication de l'organisme, traitement de la constipation.

**Indications.** — Stase intestinale chronique, constipation atonique et spasmodique, désintoxication à la suite de maladies infectieuses.

**Formule.** — Magnésie calcinée légère Codex., Magnésie lourde anglaise, Hydrate de magnésie, Peroxyde de magnésium, chacun des produits étuvés séparément mélangés, finement pulvérisés et tamisés, suivant procédé spécial.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le N<sup>o</sup> 655-4.

**Laboratoires BOUTROY**

8, rue de Passy — PARIS.

---

## EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

**Indications.** — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés. Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

**Posologie.** — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

*Pour les enfants :* Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 3 fr. 30, verre compris.

**Établissements DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## EXTRAIT HAMYD

**Composition.** — Mélange en proportions définies de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Condurango Gmet.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur. Décongestif pelvien et vasculaire, Sédatif gastrique.

**Indications.** — Tous les troubles de la circulation veineuse. Tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.). Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies réflexes.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau une ou deux fois par jour.

**Laboratoire GMET**

27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## FACMINE LONGUET

**Agent puissant et facilement maniable de désinfection et désintoxication intestinales.**

**Indications thérapeutiques.** — Entérites glaireuses et muco-membraneuses ; constipation chronique et toutes maladies et troubles fonctionnels reconnaissant pour cause

L'AUTO-INTOXICATION intestinale, principalement dans les maladies de la peau :

Eczémas, Furonculose, Acnès, Urticaires, Herpès, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — 3 à 4 comprimés après les repas du matin, de midi et du soir. Chaque comprimé correspond à 0 gr. 30 d'alumine lactique et 0 gr. 05 de phosphate de chaux. Pour les enfants : 1/2 dose.

Les comprimés peuvent être avalés à la façon d'une pilule ou délayés dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## FA-NER-VAL

**Facit-nervum-validum.**

Formule du D<sup>r</sup> Martin du Theil.

**Forme.** — Granulé.

**Composition.** — Ce granulé contient par cuillère à café : Arrhéнал, 0,025 ; teinture de noix vomique, 0,10 ; glycérophosphate de soude, 0,333 ; extrait hyd. alcool. de quinquina jaune, 0,0666 ; extrait aq. de quinquina rouge, 0,0666.

**Indications.** — Toutes les dépressions du système nerveux et les troubles du grand sympathique.

**Doses habituelles.** — 1 cuillère à café, 2 fois par jour avant les repas. Cures de 4 semaines séparées par un intervalle de 8 jours.

**Laboratoires LACOMBE et Cie**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## FANGO FISCH ET C<sup>ie</sup>

**Forme.** — Boue volcanique radioactive en poudre.

**Mode d'emploi.** — Application sous forme de cataplasme de 44° à 54°.

**Indications.** — Affections chroniques douloureuses, musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

**Contre-indications.** — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Prix : Paquet de 1 kg. 500 : 12 fr. 50.

— de 4 kg. 500 : 33 fr.

Pour hôpitaux : Prix sur demande, par 100, 1 000 kilos et par wagon.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

## FANTYL

**Manseau.**

**Forme.** — Sirop. (L'étiquette ne porte aucune autre indication que le dosage.)

**Composition.** — Bromolactucinate de chaux ; Sirop de fleur d'oranger.

**Caractéristiques.** — Aucun toxique, aucun stupéfiant.

Tolérance absolue à toutes doses.

Suppression complète du bromisme.

**Indications.** — Troubles du premier âge. Affections nerveuses, Insomnies, Coliques des nouveau-nés, Troubles de la dentition.

**Mode d'emploi :**

*Nourrissons* : 1 à 2 cuillerées à café.

*Petits enfants* : 2 à 3 cuillerées à café.

*Enfants* : 3 à 4 cuillerées à café.

Prix : 8 fr. 50

**Laboratoire MANSEAU**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ancien préparateur et lauréat de la Faculté de médecine et pharmacie de Bordeaux.

MARGAUX (Gironde).

## FARINE DE MALT HEUDEBERT

**Composition.** — La Farine de malt HEUDEBERT produit de la mouture de l'orge germée, est à la fois riche en diastases et en vitamines.

**Avantages.** — Une bouillie bien maltée est à moitié digérée. La farine de malt doit être employée de préférence aux extraits liquides, pâteux ou secs, dont une partie importante des ferments est détruite pendant la fabrication.

**Indications.** — Troubles de la nutrition et tous désordres du tube digestif amenant un ralentissement de l'assimilation des substances amylacées.

**Mode d'emploi.** — On peut en saupoudrer tous les aliments. Les bouillies ou purées, préparées avec une cuillerée à soupe de farine (de céréales ou de légumineuses), seront maltées, avec une cuillerée à farine de malt, 2 à 3 minutes après cuisson. Laisser un quart d'heure en contact et faire suivre d'une courte ébullition.

### Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## FARINE MONT BLANC

### Composition moyenne :

Hydrates de carbone solubles.....	32.	pour 100
Hydrates de carbone transformés.....	52.	—
Matières azotées.....	10.	—
Matières grasses.....	0.50	—
Phosphates en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .....	0.80	—
Cendres totales.....	2.20	—
Humidité.....	2.50	—
	100.	pour 100

**Nature et caractéristiques.** — Extraite des meilleurs blés de France. Après pétrissage, sous l'influence de la chaleur humide, les ferments du grain de blé transforment l'amidon en une pâte diastasée et dextrinée éminemment digestible. Un grillage et un blutage consécutifs permettent de la présenter sous forme de poudre impalpable, très facilement assimilable et de goût agréable, grâce à sa saveur biscuitée.

**Propriétés et indications.** — Chez les nourrissons normaux, constitue dans l'allaitement mixte ou artificiel le complément physiologique du lait dès le 7<sup>e</sup> mois et même beaucoup plus tôt, sur avis médical.

*Dans les cas pathologiques :* débilité congénitale, athrepsie, troubles gastro-intestinaux, intolérance lactée, peut être conseillée comme aliment d'exception ou comme complément de régime.

Chez les adultes dyspeptiques ou entéritiques, rend de grands services comme aliment diététique.

**Posologie.** — Voir l'étiquette des boîtes.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc de 375 grammes net.

**COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT**  
RUMILLY (Haute-Savoie)

## FARINES DE RÉGIME BLOCH

Pures, Variées, Riches en Phosphates-Blutage minimum.

### Farines de Céréales :

Crème de Riz, d'Orge, d'Avoine, de Blé vert.

### Farines de Légumes :

Farine de Pois, de Lentilles, de Haricots.

### Farines de Fruits :

Farine de Châtaignes. Farine de Bananes.

Semoules : de Blé, de Riz, d'Avoine.

Flocons : d'Avoine, d'orge.

### Rapidoats.

Petits flocons d'Avoine. Cuisson cinq minutes.

### Blokao.

Déjeuner de suralimentation à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone aromatisés au cacao.

### Riz — Tapiocas — Féculs — Arrow-Root

Indications thérapeutiques. — Alimentation des enfants, régime des Dyspeptiques et Entéritiques, Constipés, Nerveux, Anémiés et Surmenés.

Laboratoire des Etabl. **AUG. BLOCH et FILS.**

à TOMBLAINE, près NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Maison fondée en 1811.

## FARINES MALTÉES FAVRICHON

(Maltases).

### Dyspepsie et suralimentation.

**Composition.** — Céréales et légumineuses. Par un début de germination on provoque en elles la formation de diastases (amylase).

**Propriétés.** — L'amylase, pendant la préparation du potage, solubilise les amidons, opérant ainsi préliminairement le travail des amylases salivaire et pancréatique. Cette solubilisation facilite le travail des autres ferments digestifs (sur les albuminoïdes et graisses, plus accessibles puisque débarrassés de l'enrobage amylicé). Enfin elle évite l'encombrement ou l'inutilisation en cas de suralimentation, car elle permet une absorption rapide et entière.

**Formes.** — *Quatre Farines Maltées Favrichon (Maltases).*

**MALTASE-CÉRÉALE** (Céréales maltées 100 %). La plus légère.

**MALTASE-LÉGUMINEUSE** (Légumineuses maltées 100 %). La plus nourrissante.

**MALTASE-CACAO** (Cacao, Avoine maltée, Féculs). Pour les malades qui tiennent au cacao.

**FERRO-MALTASE** (Avoine et lentilles maltées). La plus riche en fer, la plus stimulante, celle qu'on choisira pour remonter un convalescent.

**Emploi.** — 1° Dyspeptiques : potages clairs (1 cuillerée à bouche rase par 100 gr. de lait ou liquide).

2° Suralimentation : potage, crème (1 et 1/2 à 2 cuillerées à bouche rases par 100 gr. de lait).

*Littérature et échantillon sur demande.*

**Produits diététiques FAVRICHON**

Pharmacien-chimiste.

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

## FÉLAMINE « SANDOZ »

Association de l'acide cholique cristallisé pur et de l'hexaméthylène tétramine.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 30.

**Propriétés thérapeutiques.** — Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

**Indications.** — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par hypocholie, insuffisances hépatiques.

**Posologie.** — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1° Cas sub-aigus : 2 à 6 comprimés : 2° Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

### PRODUITS SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

---

## FÉMINADÈNE

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phénylethylmalonylurée.

**Indications :** *Nervosité féminine*, dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale.

Anxiété, émotivité, dépression, subagitation, insomnies, palpitations.

Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches.

Époques difficiles, irrégulières, douloureuses. Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

**Doses :** 4 dragées par jour, en moyenne.

### Laboratoires du FÉMINADÈNE

120, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## FENUCALCIUM

**Forme.** — Cachets.

**Formule.** — Hémoglobine, Phytosphosphine, Proxalate de fer, Carbonate de Manganèse, Poudre de Colombo, Poudre de Quassia, Poudre de Prêle, Lactate de chaux, Poudre de Rhubarbe, Magnésie hydratée, Fluorure de calcium, Poudre de noix vomique, Poudre de gentiane, Phosphate tricalcique, Arrhénal, 0,015, Poudre de Fénugrec.

**Indications.** — Anémie, Amaigrissement, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Manque d'appétit, Tuberculose, Etats pré-tuberculeux.

**Posologie.** — Un cachet au début des trois repas.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 04-71.

## FENUCINE

Fénugrec traité spécialement et

sans odeur . . . . .	0,90 par cachet.
Cééalophosphates de Ca et Mg . . . . .	0,15 —
Poudre d'os frais total . . . . .	0,15 —
Nucléinate de Manganèse . . . . .	0,02 —

**Propriétés.** — Stimulation de l'appétit. Action puissante sur le métabolisme. Fonction hématopoïétique. Recalcification.

**Indications.** — Anémies, Asthénies, Perte de poids, Diabète, Grossesse, Lactation.

*Aucun produit toxique, aucun extrait glandulaire. Donc aucune contre-indication.*

**Présentation.** — Boîte de 30 cachets.

**Posologie.** — 3 cachets par jour au milieu des repas. Dose pouvant être doublée.

Prix des 30 cachets : 15 fr.

**Laboratoires LAMBERT**

Place du Châtelet — ORLÉANS



## FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuillée et désodorisée. Contenant tous ses principes actifs : phosphates organiques, lécithine, calcium, fer et manganèse organiques.

**Propriétés.** — Stimulant puissant de l'appétit, Agent d'augmentation de poids, Producteur d'énergie et de forces.

**Indications.** — Tous les cas d'amaigrissement, Maigreur habituelle, Amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, Amaigrissement chez les nerveux, Stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

**Mode d'emploi.** — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulé et d'élixir.

**Dose journalière moyenne :** 4 cachets ou dragées pour les adultes. Elixir : 2 à 3 cuillerées à soupe pour adultes. Deux à quatre cuillerées à café de granulé pour les enfants.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

## FER INTRA VEINEUX FRAISSE

### Composition :

Cac. de fer.....	0,01
Formiate de cuivre .....	0,001
Cac. de soude .....	0,02
Solution isotonique .....	5 cc..

**Indications.** — Solution Ferro-arsénocuprique injectable dans la veine, sans crainte de choc hémoclasique.

Ampoules de 5 cent. cubes.

Boîte de 6 ampoules : 16 fr.

**Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin, PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## FER LARCADE

**Composition.** — Combinaison d'hydrate ferrique et d'acide organique, associée au manganèse, qui renforce son action par l'apport d'oxygène et aux principes toni-aromatiques des oranges amères qui en masquent la saveur styptique.

**Forme.** — Liqueur d'un goût agréable et d'une très faible teneur en alcool.

**Action.** — Favorise la formation des hématies, augmente leur richesse en hémoglobine.

**Indications.** — Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques.

**Mode d'emploi.** — Un verre à liqueur (2 cuillerées à soupe) au commencement des deux repas.

Prix : la bouteille, 22 fr.

(traitement d'une quinzaine).

La demi-bouteille : 13 fr.

Concessionnaires pour la France et les Colonies :

**Établissements GOY**

23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>)

## FERMENT PUR DE RAISIN du Prof. Jacquemin.

(Exposition Pasteur, Strasbourg 1923.

Hors Concours, Membre du Jury.)

**Immunisation et Désintoxication Générale de l'organisme.**

Source de *Diastases* et de *Vitamines*.

**Indications physiologiques.** — Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la Nutrition et de la Croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

**Thérapeutique.** — Furonculose, Maladies de peau, Dyspepsie, Entérite, Diabète, Grippe, Rhumatismes, Insuffisances endocriniennes et nutrition.

**Posologie.** — 1 flacon pour une cure de 3 semaines à prendre 1/2 heure avant les repas.

Littérature et échantillons à :

**INSTITUT JACQUEMIN**

à MALZEVILLE-NANCY (Meurthe-et-Moselle).

**FERMENT PUR DE RAISINS****« MÉDICOFERMENT »**

des

**Laboratoires pour la culture  
des Ferments de Raisins****G. CESAR et B. BOSS, Directeurs,**10, rue de la Viotte,  
**BESANÇON (Doubs).**Voir à **Médicoferment**, page 715.

---

**FER-OVARINE VITALIS**

contre anémie et insuffisance ovarienne.

**Composition.** — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.**Propriétés thérapeutiques.** — Excitant de la sécrétion interne de l'ovaire déficient, régénérateur des globules rouges.**Indications.** — Anémie, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée.

2 pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois.

*Echantillons et Notice documentaire  
sur demande.*

Prix de la boîte : 14 fr. 50.

**Laboratoire  
de la FER-OVARINE VITALIS**

38, boulevard de Charonne — PARIS.

BEAULIEU, pharmacien,  
ancien interne des hôpitaux.

## FERROCODILE ET FERRICODILE

Cacodylate Ferreux — Cacodylate Ferrique.

**Indications thérapeutiques.** — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc. Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Cacodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques, qui, faites intramusculaires, ne sont pas douloureuses.

Préparations réellement supérieures dans les infections des pays chauds.

**Doses et mode d'emploi.** — *Ferrocodile* : Pilules à 0,025 : 4 par jour aux repas.

*Ferricodile* : Ampoules à 0,05. Une injection par jour pendant huit jours ; repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Prix de vente au public : Pilules, 11 fr. 25 ;

Ampoules, 12 fr. 50.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## FERROCOL

**Composition.** — Complexe colloïdal fer-rugineux marin :



organo-phosphate de calcium.

**Indications.** — Anémie, chlorose, neurasthénie, surmenage, faiblesse générale, croissance, convalescence, prétuberculose, paludisme chronique et en général tous les états consomptifs.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés, 2 fois par jour.

## PROTHERAPIA

**Laboratoire G. CHAMAGNE**

Docteur ès sciences, Docteur en Pharmacie.

Lauréat de l'Académie de Médecine.

132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## FERROPHYTINE CIBA

Phosphate et Fer colloïdal.

Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, c'est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition. Médicament d'une remarquable tolérance.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofulose, Croissance défectueuse.

**Doses.** — *Adultes* : 3 cachets ou 3 cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

La boîte de 30 cachets : 14 francs.

Le flacon de granulé : 16 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## FERYDAL

**Composition.** — Fer colloïdal assimilable.

**Deux formes.** — *Enfants, Adultes.*

### Indications :

*Enfants* : Anémie du nourrisson et de la seconde enfance, Anorexie, Nervosisme, Insomnie, Convalescences.

*Adultes* : Anémies, Paludisme, Hémorragies, Grossesse, Traitement ferrique pré-natal, Convalescences, Dépressions nerveuses.

### Doses :

*Enfants.* — A donner aux tétées ou aux repas : de 6 mois à 18 mois : 2 à 3 cuillerées à café ; de 18 mois à 3 ans : 3 à 4 cuillerées à café. A partir de 3 ans : 2 cuillerées à dessert.

*Adultes.* — Adolescents : 2 cuillerées à dessert ; Adultes : 2 cuillerées à soupe.

Le FERYDAL se prend pur, ou dans un peu d'eau gazeuse (eau de Seltz, limonade) au début des repas.

**Laboratoire L. ROY**

29, avenue Charras — CLERMONT-FERRAND

## FIXASE

**Reminéralisateur effectif.**

**Présentation.** — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

**Composition.** — Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice sous forme utilisable.

**Posologie.** — *Adultes et enfants* : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : 1/4 de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

**Indications.** — **Enfants, Adolescents, Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.**

Prix : 12 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-1.

## FIXASE IRRADIÉE

(Fixase + Ergostérine irradiée.)

Titrée physiologiquement à 400 unités antirachitiques par *Cachet* ou cuillerée à café de *Poudre*.

*Poudre* : Même posologie que la FIXASE.

*Cachets* : *Adultes et Adolescents* : 3 par jour.

*Enfants* : 1 à 2 par jour.

Prix :

*Poudre* : 18 francs.

*Cachets* : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n°s 342-3 et 4.

**Laboratoire PARET**

22, rue Guibal — MARSEILLE

## FLAVUROL

**Dibromoxymercuri fluorescéine**

**Antiseptique puissant.**

**Pommade à 1 %.** — Intertrigo, Impétigo, Ecthyma, Eczémas infectés, Staphylococcies cutanées, Sycosis, Balanites, Ulcérations de toute nature.

**Solution à 2 %.** — Désinfection pré-opératoire, Abscesses, furoncle, anthrax, ulcérations de toute nature, plaies opératoires suppurantes, phlegmons, fistules, otorrhées aiguës et chroniques, suppurations auriculaires, etc...

**Solution à 1 %.** — Traitement des uréthrites, cystites, pyélonéphrites, vaginites, métrites, antiseptie obstétricale, Ophtalmologie.

**Crayons, bougies et ovules à 1 %.** — Traitement des métrites et des vaginites.

**Bougies à 1 %.** — Traitement des uréthrites aiguës et chroniques, des rétrécissements de l'urèthre, des prostatites.

Le tube de pommade à 1 % .....	Prix public	9 fr. 50
Le flacon solution 1 % .....	—	18 fr. »
Le flacon solution 2 % .....	—	10 fr. »
La boîte de 6 crayons 1 % .....	—	18 fr. »
La boîte de 6 bougies 1 % .....	—	18 fr. »
La boîte de 6 ovules 1 % .....	—	20 fr. »

**Laboratoires STÉNÉ**

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## FLORHÉPATINE

**Calmant et antispasmodique, puissant diurétique, sans toxique, à base d'extraits végétaux.**

**Composition.** — Ether amyvalérianique, Boldo, Artichaut, Arénaria, Uva-Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana, Genièvre, Menthe dans solution alcalinée glycinée.

**Indications.** — Etats d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie), Règles douloureuses, Gastralgies, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections du foie en général (Insuffisance hépatique, ictères du foie, paludisme, etc.).

**Mode d'emploi.** — *Crises légères* : 1 à 4 verres à madère par 24 heures ; se prend pure ou additionnée d'eau simple ou minérale avant ou après les repas.

*Crises aiguës* : Il est indispensable de prendre 1 verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à cessation des douleurs.

*Enfants* : 1/2 dose.

Flacon de 500 cc. Prix : 16 fr. 75.

**Laboratoire RICHER**

Docteur en Pharmacie

45 Faubourg Saint-Denis, — 1, rue d'Enghien — PARIS

## FLUDIOSE

### à l'Iodure de Manganèse.

**Composition.** — Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

**Forme pharmaceutique.** — Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

**Indications.** — Lymphatisme, Rachitisme, Pré-tuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo, Engelures.

**Mode d'emploi et doses.** — En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 cgr. 25 d'Iodure de Manganèse pur et 2 mmgr. 5 de Méthylarsinate de soude.

*Enfants de 1 à 3 ans :* 2 cuillerées à café par jour.

*3 à 6 ans :* 2 cuillerées à dessert par jour.

*6 à 12 ans :* 2 cuillerées à potage par jour.

*12 à 16 ans :* 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

La *Fludiose* est le plus puissant succédané de l'huile de Foie de Morue.

*Par son Iodure de Manganèse, la Fludiose dépasse toutes les préparations iodotanniques.*

**Prescrire.** — *Fludiose* : 1 flacon.

Prix, le flacon : 15 francs.

---

**Laboratoire de MÉDECINE  
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).

Téléph. : 4-84.

Echantillons et littératures à la disposition  
de MM. les Docteurs.



## FLUOBYL

### Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Le *Fluobyl*, dépourvu de toute action irritante sur l'épithélium intestinal, provoque une chasse biliaire importante sans effet drastique fâcheux.

Granulé de goût agréable à base de *Lacto-sérum*, *Citrate de magnésie*, *Peptone de fibrine sèche*.

Le *Fluobyl* réalise le « drainage » des voies biliaires en stimulant le flux de la bile. Il favorise la migration du bol fécal, en rendant ainsi à l'intestin son excitant normal. Il exerce également une action excito-sécrétoire sur le parenchyme rénal, provoquant la diurèse et l'accroissement de la sécrétion des sels et de l'urée.

### Indications.

*Maladies du Foie* : Ictères, Cholécystites, Coliques hépatiques.

*Dyspepsies réflexes* : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

*Maladies rénales*.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher 10 minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Le traitement doit être suivi environ deux semaines par mois.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléph. : Maillot 17-75

## FLUOCHOLINE

**Granulé soluble.**

**Spécifique des maladies du foie.**

**Formule.** — Phosphate de soude, Sulfate de magnésie. Peptone pure, Chlorure de magnésium. Hexaméthylènetétramine.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau.

**Pharmacie BLOUIN**

50, rue de Turenne — Paris.

## FLUODYLE

**Forme : Ampoules.**

Chaque ampoule renferme :

Fluorure de sodium .....	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude.....	0,15
Sulfate de strychnine.....	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

**Mode d'emploi.** — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 12 fr.

**Forme : Granulé.**

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie.

**Doses.** — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

**Indications.** — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 12 fr. plus impôt 0.75

**Établissements SABATIER**

**A. EMPTOZ, Pharmacien.**

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## FLUOGANESE

(Cachets).

Régénérateur globulaire, Reconstituant du stock minéral.

### Composition :

Fluorure de calcium.....	0,01
Formiate de chaux.....	0,20
Glycérophosphate de chaux.....	0,40
Nucléinate de manganèse.....	0,01
Protoxalate de fer.....	0.05

**Indications.** — Faiblesses, Etats adynamiques et asthéniques consécutifs à certaines maladies infectieuses, Troubles de la croissance, Grossesse et allaitement.

**Posologie.** — 2 à 3 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire de Thérapeutique normale**

**Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

## FLUOKOL

Granulé entièrement soluble, aromatisé à la menthe.

Association de cinq peptones (viande, poisson, œuf, lait et blé) et d'hyposulfite et sulfate de magnésie.

**Propriétés.** — Cholagogue, antianaphylactique complet et cytophylactique.

**Indications.** — Toutes affections du foie (cholécystite, lithiase biliaire, etc.), Troubles digestifs d'origine hépatique, Anaphylaxie (hyposulfite de magnésie et 5 peptones différentes), Urticaires, Prurits, Migraines, Constipation.

**Doses et mode d'emploi.** — Comme cholagogue : 1 à 3 cuillerées à café de granulé dans un peu d'eau le matin à jeun.

Comme désensibilisant : Une demi-cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

**Entants :** moitié de ces doses.

*Autorisé par les Assurances Sociales.*

**Laboratoires L. LAFFORT, Pharmacien,**

Licencié-ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (I.-et-L.).

## FLUOSALYL BEAUGOURDON

**Formule.** — Solution de fluorures alcalins préparée en partant de l'acide fluorhydrique, soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

**Propriétés.** — Détruit le tartre dentaire. Antiseptique buccal de premier ordre, ne coagulant pas l'albumine et ne détruisant pas les cellules vivantes.

**Usages.** — Dans toutes les affections de la bouche et particulièrement dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire* à tous les degrés. Dans les gingivites mercurielles ou bismuthiques les accidents ont un arrêt si rapide que le traitement peut être repris et continué deux ou trois jours après que le FLUOSALYL aura été employé.

**Emploi.** — A la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède en bains de bouche de cinq minutes.

Dans les cas aigus et en cas d'abcès les séances de bains de bouche devront être répétées 4 à 5 fois par jour.

Employé pour les pulvérisations suivant la méthode Joyeux.

Pour le détartrage mécanique on emploie FLUOSALYL'S PASTE, et brosse à dents FLUOSALYL.

Laboratoire de FLUOSALYL

M. BEAUGOURDON, pharmacien,  
43, avenue Kléber — PARIS (XVI<sup>e</sup>).



## FLUSAN

**Formes.** — Elixir, Gouttes.

**Composition.** — Teinture de noix vomique, Extrait de marron d'Inde, Extrait d'Hamamélis, Viburnum, Extrait glycéринé de surrénale et de lobe antérieure d'hypophyse, Chlorure de calcium, Extrait vitaminique A et D d'algues marines, Glycérine hydratée.

**Indications.** — Troubles de la puberté, Règles douloureuses et tous états variqueux (varices, hémorroïdes).

**Mode d'emploi.** — 2 cuillerées à soupe et II à XXX gouttes, aux repas.

« PROTHERAPIA »

Laboratoire G. CHAMAGNE

Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie,

Lauréat de l'Académie de médecine,

132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

**Principes actifs.** — Sulfate double du benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : Yohimbehe, marron d'Inde, hamamélis, séneçon, armoise.

**Indications.** — Troubles propres de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies, hémorroïdes, hypertension artérielle, tendance aux néoplasies, affaiblissement provoqué par l'âge.

**Dose.** — XXV gouttes 3 fois par jour.

**Laboratoire MAUCHANT**  
14, rue de Birague — PARIS.

## FLUXINE (gouttes)

XX gouttes =

0,01 centigr. d'intrait de marron d'Inde Dausse.

IV gouttes d'alcoolat concentré, d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable, radio-activée par les rayons ultra-violets.

**Propriétés.** — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

**Indications.** — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

**Mode d'emploi.** — X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 francs pour 1 mois.

**Laboratoires FLUXINE**

**J. BONTHOUX**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

## FOKIENYL

Capsules de Fokienol (0 gr. 10).

**Le Fokienol.** — Alcool sesquiterpénique  $C^{15}H^{26}O$  est retiré de l'huile essentielle du *Fokienia Hodgensii*.

*Nouveau balsamique*, diurétique, antiseptique et modificateur des sécrétions, non toxique, il est indiqué dans le traitement des affections de l'arbre génito-urinaire.

Balsamique très efficace, parfaitement toléré, sans contre-indications.

**Références.** — 1. Communication à l'Académie des Sciences, le 26 décembre 1931 par M. le professeur P Sabatier, doyen de la Faculté de Toulouse.

2. Thèse par M. le Dr Pham-Ba-Vien, interne des hôpitaux, sous la présidence de M. le professeur Carnot, membre de l'Académie de Médecine.

**Indications.** — Blennorrhagie, Pyélo-néphrites, Cystites, Congestion rénale, Rétention urinaire.

**Doses.** — 2 à 4 capsules par jour avant les repas ou au début.

Le FOKIENYL permet des prescriptions peu onéreuses. (La boîte, 18 fr. 50, pour traitement de 12 à 24 jours.

**Laboratoire :**

94, rue Pasteur. — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

---

## FOLLESTRINE GRÉMY

Hormone folliculaire  
physiologiquement titrée.

1<sup>o</sup> En *Granules*, pour traitement par *voie buccale*.

2<sup>o</sup> En *Ampoules*, pour traitement par *voie sous-cutanée*.

### Indications thérapeutiques :

1<sup>o</sup> Chez la *jeune fille* :

Aménorrhées de la formation, hypoménorrhées, dysménorrhées. Contribue à rendre normal l'établissement de la puberté par son action dans toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne de la puberté.

Contribue à la disparition des phénomènes d'ordre extra-génital de l'insuffisance ovarienne : troubles nerveux, dermatoses, obésité de la puberté, symptômes ostéo-musculaires douloureux, etc...

2<sup>o</sup> Chez la *femme adulte et dans la ménopause*.

Disparition des troubles vaso-moteurs. Rend les règles douloureuses, indolores et régulières.

Disparition des troubles cataméniaux cutanés.

Combat efficacement l'empâtement.

Diabète ovarien. Hypoplasies utérines.

### Posologie :

Pendant la quinzaine qui précède les règles, une injection tous les deux jours, ou 4 à 10 granules par jour en plusieurs fois et à distance des repas.

Continuer le traitement par l'ingestion d'ocréine (Voir **OCRÉINE**).

**Laboratoires G. GRÉMY**

14, rue de Clichy — PARIS.

## FOLLICORMONE BUCCALE HINGLAIS

Première préparation d'hormone ovarienne active par voie buccale.

Activité buccale contrôlée

(Acad. Méd., 27 Janvier 1931).

Soc. belge de gynécologie et obstétrique,  
Mars 1931.

**Composition.** — Solution huileuse, concentrée, d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

Boîte de 40 capsules.

**Mode d'emploi.** — Trois doses par jour à intervalles de quatre heures au minimum, en augmentant progressivement les doses :

### Traitement type :

40 capsules réparties sur 7 jours.

1 <sup>er</sup> jour : 1+1+1	5 <sup>e</sup> jour : 2+2+2
2 <sup>e</sup> jour : 1+1+1	6 <sup>e</sup> jour : 3+3+3
3 <sup>e</sup> jour : 1+1+2	7 <sup>e</sup> jour : 3+3+3
4 <sup>e</sup> jour : 2+2+2	

Le traitement peut être intensifié ou réduit suivant les nécessités.

**Indications.** — Toutes déficiences ovariennes :

*Hypoménorrhée, dysménorrhée :* Une série dans la semaine précédant les règles.

*Puberté, Ménopause ; Castration chirurgicale ou radiothérapique ; Aménorrhées,* une série tous les 28 jours.

*Cas spéciaux de stérilité, sclérodermie, diabète ovarien, épilepsie menstruelle, etc...*

### Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS.

Tél. : Elysées 37-14.



## FOLLICULINE CHOAY

**Nature.** — Extrait purifié retiré du liquide folliculaire ovarien et considéré comme l'« hormone sexuelle femelle ».

**Indications.** — Hypoplasie utérine, Infantilisme génital, Insuffisance ovarienne, Aménorrhée, Troubles de la ménopause naturelle ou opératoire.

**Forme pharmaceutique.** — Ampoules de 2 cc., contenant, en solution huileuse neutre et stérilisée, 10 unités-rat (50 unités-souris) de folliculine.

**Posologie.** — 3 à 12 injections intramusculaires, suivant le cas, de 2 jours en 2 jours.

**Prix :** 40 fr. la boîte de 6 ampoules.

**Laboratoire CHOAY**

48, aven. Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

---

## FOLLICULINE CRINEX

(Voir : CRINEX)

Extrait ovarien total désalbuminé, dosé en Folliculine.

Autres produits opothérapiques des

Laboratoires UVÉ-CRINEX :

OREX (extrait testiculaire),

**SISTEX**

(extrait mammaire et corps jaune).

## FOLLICULINE CRISTALLISÉE

du Docteur ROUSSEL

Voir GYNŒSTRYL

---

## FOLLI-LOBINE

Du Docteur FRAYSSE

Pilules.

(Voir aussi Opothérapie du Docteur Frayssé).

*Folliculine ovarienne associée aux Hormones du Lobe antérieur de l'Hypophyse (Prolan A et B) (le Lobe antérieur renforce l'action de la Folliculine).*

*Pilules glutinisées, actives par voie buccale, parce que non détruites par l'activité des sucs digestifs.*

*(L'oxydation et l'acidité détruisent la Folliculine ; notre enrobage spécial évite cet inconvénient).*

Une pilule correspond à 5 unités physiologiques.

**Doses.** — 2 à 5 pilules par jour, espacées les unes des autres.

**Indications.** — Déficiences ovariennes en général, troubles de la Puberté, Ménopause, Castration chirurgicale ou radiologique, etc.

Le flacon de 50 pilules de 250 unités : 20 francs.

Le grand flacon de 100 pilules de 500 unités : 30 francs.

Laboratoires du Docteur FRAYSSE

47, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine).

Tél. : 12-88.

## FONDANT DE COLA DAUSSE

(Saccharolé-Fondant) titré à 0 gr. 50 d'Extrait de Cola stabilisée par dose (ou 5 gr. de saccharolé). *Toni-nervin* et *toni-musculaire* présentant l'activité entière de la noix de cola fraîche (stabilisée par le procédé **PERROT-GORIS**).

**Indications.** — *Adynamie, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence des maladies infectieuses.*

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à café par jour en moyenne et davantage si nécessaire. En cas d'effort à exécuter, ingérer la cola une heure au préalable et répéter la dose si l'effort doit durer.

## FONDANT IODOTANNIQUE DAUSSE

Granulé à base d'iode associé au *Tormentillo-tanin*, tanin facilement absorbable. Remplace avantageusement l'huile de foie de morue et les préparations antiscorbutiques.

**Indications.** — *Lymphatisme, scrofule, arthritisme, emphysème, rhumatismes, obésité, eczéma, impétigo.*

**Posologie.** — La teneur en iode dissimulé du Fondant iodotannique étant identique à celle du sirop iodotannique du Codex, sa posologie est la même.

*Adultes* : 5 à 6 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : jusqu'à 15 mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par jour ; 3 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour ; 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour ; 12 ans : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

## FONDANT MANGANO-FERREUX

Puissant excitant cytoplasmique et nucléaire par le *Manganèse*, vecteur d'oxygène et stimulant de l'hématopoïèse par le *fer*, ce saccharolé active les phénomènes de nutrition et favorise la régénération du sang.

**Indications.** — Tous les états anémiques : *anémie, chlorose, convalescences, pertes sanguines.*

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café par jour. *Enfants* : de 1/2 à 2 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

**Laboratoires DAUSSE**  
4, rue Aubriot — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## FORCIVAL

Aliment nutritif et fortifiant.

**Composition.** — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

**Forme.** — Farine d'un goût très agréable.

**Mode d'emploi.** — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait.

**Propriétés.** — Aliment léger et substantiel, reconstituant, reminéralisateur, d'une grande digestibilité.

**Indications.** — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

La boîte de 250 gr. : 6 fr.

La boîte de 1 kg. : 20 fr.

**Laboratoires du FORCIVAL**

6, rue Bridaine — PARIS.

## FORIOD

Tétraiodophénolphtaléinate de Sodium.

Matière colorante, opaque aux rayons X, s'éliminant par les voies biliaires.

**Indications.** — **Cholécystographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.**

**Posologie et mode d'emploi.** — Employer l'une des méthodes suivantes :

1° *Voie buccale* : Faire prendre 13 heures avant l'examen, soit : 1 flacon de 20 gr. de poudre composée ; soit : 15 dragées à 0 gr. 30.

2° *Voie intraveineuse* : Solution aqueuse à préparer extemporanément avec le contenu d'une ampoule de poudre cristallisée (2 gr. 40) et 50 à 60 cc. d'eau distillée stérile. Examen de la 8<sup>e</sup> à la 24<sup>e</sup> heure après l'injection.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

# FORMOCARBINE

## Composition :

Association de Charbon Animal pur, ultradivisé, absolument privé de Cyanogène, à la Formine (Hexaméthylènetétramine cristallisée).

## Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût, avec ou sans addition de Benzonaphtol :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Les granulés de Formocarbine ne sont pas durs à la dent, fondent très bien dans la bouche, se désagrègent instantanément dans l'eau.

## Propriétés :

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

## Indications thérapeutiques :

*Injections gastro-intestinales.* — Dyspepsie, Fermentations, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales, Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose.

*Injections biliaires.* — Désinfecte par la Formine la Vésicule et les canaux, en même temps que son Charbon animal absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la veine-porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Tuberculose des voies biliaires, Hépatisme.

*Injections urinaires.* — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, cystite, Pyélonéphrites, Urétrites, Prostatites.

## Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau. Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

## Prescrire :

Formocarbine simple ou Formocarbine naphtolée :  
1 flacon.

Il est à remarquer que la Forme Naphtolée ne provoque jamais de constipation.

Prix, le flacon : 12 francs.

**Laboratoire de MÉDECINE  
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue Malherbe — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 484

Echantillons et littérature à la disposition de  
MM. les Docteurs.

## FORMOCARBOS

**Composition.** — Charbon animal chimiquement pur (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson, d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie.

**Forme.** — Granulé rond anisé.

**Indications.** — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie. Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines. Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général toutes les manifestations anaphylactiques.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café.  
*Enfants* : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge.  
 Avant (de préférence) ou après chaque repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires E. MILLET**  
 RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

## FORMOCITRINE

**Composition.** — Hexaméthylène-tétramine à l'état pur et citrate acide de soude.

**Forme.** — Granulé effervescent soluble extemporanément.

**Propriétés.** — Antiseptique interne à réaction acide, indispensable à la transformation en formol de l'hexaméthylène-tétramine.

Eupeptique, Cholagogue.

Antivisqueux et anti-agglutinant (ion citrique) ; prévient les coagulations et les concrétions pathologiques.

Antispasmodique vasculaire (citrate), par action sur le système nerveux sympathique.

**Indications.** — *Reins et Voies urinaires* (Urétrites, Cystites, Pyélonéphrites, Lithiases).

*Foie et Voies biliaires* (Insuffisance, Ictères, Cholécystites, Lithiases).

*Sang et Vaisseaux* (Hyperviscosité, Artérites, Phlébites, Hyposphysie).

*Maladies infectieuses* (Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde).

*Accidents post-opératoires* (Thromboses, Embolies).

**Doses.** — 1 cuill. à café de granulé contient 0 gr. 25 d'hexaméthylène-tétramine et 1 gr. 50 de citrate de soude.

2 à 4 cuill. à café en solution étendue.

4 à 6 cuill. à café et plus dans les maladies des vaisseaux.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> BAREY**  
 37, avenue Jules-Coutant — IVRY-SUR-SEINE.

## FORNOSE

La plus fondante des pommades nasales. Novocaïne, Adrénaline, Baume du Pérou, Ichtyol, Huile de vaseline et Lanovaseline geraniée, Désodorisante, Non irritante.

Tous états congestifs du nez et de la gorge. Soins préopératoires et post-opératoires. Antisepsie respiratoire, Ozène.

Etaler soigneusement à l'intérieur de chaque narine gros comme un pois de pommade matin et soir.

Toutes Pharmacies, le tube : 6 fr.

Echantillons :

**Laboratoire CHAVIALLE**

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

Enreg. au Lab. nat. de Contrôle des Médicaments, n° 155-3.

---

## FORTOSSAN CIBA

Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique, principe phospho-organique végétal de la Phytine.

Médicament phosphoré très assimilable et très bien toléré, spécialement préparé pour la pratique infantile.

**Indications.** — Retard du développement et de la dentition, scrofuleuse et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

**Doses.** — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de 1 à 3 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

La boîte : 8 fr. 50.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## FORTOSSAN IRRADIÉ

Même composition que le Fortossan ordinaire mais avec, en plus, une adjonction d'ergostérine irradiée, correspondant à une dose quotidienne de 400 à 2000 unités physiologiques.

Le Fortossan irradié est soumis à un contrôle chimique et biologique lui assurant une activité constante. L'ergostérine irradiée s'y trouve sous une forme absolument inoffensive et, unie à l'élément phosphoré végétal, elle donne son maximum d'action thérapeutique. Jamais d'anorexie.

**Indications.** — Rachitisme, Ostéomalacie, Tuberculose, Prétuberculose, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, etc.

**Doses.** — Chez l'enfant : 1 à 3 cuillerées à café par jour ; chez l'adulte : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

La boîte : 12 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.



## FORXOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-1.

**Forme.** — Elixir.

**Composition.** — Acide glycérophosphorique, Nucleïnates de Manganèse, de Fe et de Ca., Méthylarsinate de soude.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Reconstituant complet pour tout organisme, Dynamogénique. Stimulant hématogène, Antidéperditeur, Régulateur des échanges cellulaires.

**Indications.** — Etats de dépression. — Faiblesse générale. — Troubles de croissance et de formation. — Neurasthénie. — Anémie. — Débilité sénile. — Convalescences.

**Mode d'emploi.** — Une à deux cuillerées à café, suivant l'âge, au milieu des deux principaux repas, dans un peu d'eau, de vin ou liquide quelconque autre que le lait.

Le flacon : 14 francs. (En France.)

**Laboratoires A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

---

## **FOSFOMAGNYL DU D<sup>r</sup> CHURCHILL**

**Cytophylaxie leucogène. Association de  
phosphore et de chlorure de  
magnésium.**

**Forme. — Comprimés.**

### **Composition :**

Chlorure de Magnésium chimi- quement pur.....	0 gr. 30
Hypophosphite de Magnésie.....	0 gr. 10
Hypophosphite de Chaux.....	0 gr. 05
Hypophosphite de Manganèse...	0 gr. 02

**Posologie. —** 4 comprimés par jour. Deux  
avant le petit déjeuner du matin et un  
autre avant chacun des deux autres repas.

Si le comprimé est trop gros pour être avalé  
en entier, le partager en deux. Pour en faci-  
liter l'absorption, il est préférable de  
l'écraser et de le mélanger avec un peu de  
café, de potage, ou tout autre liquide,  
ou mieux encore, dans une cuillerée de  
confitures ou de miel.

**Indications. —** Asthénie, Régulateur des  
fonctions hépatiques, Préventif de l'arté-  
rio-sclérose, Anémies, Faiblesse générale,  
Stimulant de l'activité cellulaire.

**Produit français.**

**Laboratoire des Produits du  
D<sup>r</sup> CHURCHILL**

**12, rue Castiglione — PARIS (1<sup>er</sup>).**

# FOSFOXYL CARRON

## PHOSPHORE COLLOIDAL

Colloïde chimiquement défini par Carron, Bourcet et Chevalier. CR. Société thérapeutique, 11 novembre 1925.

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

**Formes.** — Fosfoxyll *sirop* : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyll *pilules* : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Fosfoxyll *liqueur* : liquide opalin glycérimé menthé spécialement destiné aux diabétiques.

**Dosage.** — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif. Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium.

**Indications.** — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales. Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

**Contre-indication.** — Etat congestif aigu.

**Mode d'emploi.** — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

*Prescrire :*

**Sirop de FOSFOXYL CARRON (14 fr.)**  
ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON (12 fr.)**  
ou **FOSFOXYL LIQUEUR (13 fr.)**

afin d'éviter les substitutions

**Laboratoires du FOSFOXYL**

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

**CARRON**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
ancien Pharmacien-Chimiste de la Marine.

## FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques assimilables directement.

Modificateurs de la Nutrition et de la Composition chimique des Tissus.

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électricité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

Dénomination.	Titre.	Mode d'emploi.
CALCOFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>18</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Ca Terpénolhypophosphite de Calcium.	13,19 % de Phosphore. 8,51 % de Calcium	4 à 8 comprimés par jour. (Sirop pour enfants.)
MAGNÉSOFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>18</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Mg Terpénolhypophosphite de Magnésium.	13,65 % de Phosphore. 5,28 % de Magnésium.	4 à 8 comprimés par jour.
MANGANOFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>18</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Mn Terpénolhypophosphite de Manganèse.	12,57 % de Phosphore. 11,34 % de Manganèse.	4 à 6 comprimés par jour.
CUPROFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>18</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Cu Terpénolhypophosphite de Cuivre.	12,57 % de Phosphore. 12,77 % de Cuivre.	2 à 4 comprimés par jour.

Prix de l'unité : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande aux

**Laboratoires CARRON**

Rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Uran, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON.

## FRANCOPLASTE

**Composition.** — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

**Avantages.** — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

**Indications.** — Fixation des pansements.

**Dimensions.** — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10. 18 cm. de larg. — 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche ; uni ou perforé, ou sur tissu élastique. Réduction de 50 p. 100 au Corps médical.

**A. KRAUS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix-Rouge.

37, r. Godot-de-Mauroy — Usine à Courbevoie.

## FREINOSPASMYL

Ephédrine.....	0 gr. 02
Phénylméthylmalonylurée .....	0 gr. 03
Bromhydrate de quinine .....	0 gr. 06
Belladone.....	0 gr. 01

Médication élective de tous états spasmodiques,  
Régulatrice du système nerveux sympathique.

**Indications thérapeutiques.** — Asthme, Dyspnées, Eréthisme cardiaque, Hypertension artérielle, Aérophagie, Syndromes solaires, Epilepsie, Migraines, États névralgiques, Affections ovariennes et thyroïdiennes. Préparation pré-opératoire.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par 24 heures.

Cure d'attaque : Périodes de 10 jours à 4 comprimés par jour.

Cures d'entretien : 2 ou 3 comprimés deux ou trois fois par semaine.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## FRÉNASMA

**Eupnélique phyto-hormonique.**

**Composition.** — Ephédrine, Dionine, Pulmine, Surrénine, Spartéine, Lobélie.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés rigoureusement dosés.

**Indications.** — Asthme bronchique, Bronchites chroniques, Dyspnées, Emphysème, Sclérose pulmonaire, Toux spasmodiques, Rhumes des foies, Rhinites spasmodiques, Etats allergiques (urticaire, migraine). Accidents sériques et anaphylactiques.

**Posologie.** — Sans contre-indications : 3 à 4 comprimés par jour et plus.

*Enfants* à partir de 5 ans : 1 à 3 comprimés.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-2.

**Laboratoires du FRÉNASMA**

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX<sup>e</sup>).

---

## FUCOGLYCINE DU D<sup>r</sup> GRESSY

**Forme.** — Sirop.

**Composition.** — Principes iodo-phosphorés naturels et hydrocarbonés du fucus.

**Indication.** — Scrofule, Lymphatisme, Tuberculose, etc.

**Posologie.** — Mêmes doses que l'huile de foie de morue.

**Laboratoires LE PERDRIEL**

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## FUCOIODINE

**Composition.** — Iode organique en suspension colloïdale dans l'eau de mer isotonique, associé à l'extrait frais et concentré d'Hamamélis Virginica.

**Indications.** — Maladies du cœur et des vaisseaux, artério-sclérose, goutte, rhumatisme, goitre, obésité, syphilis, asthme, emphysème, troubles de la circulation du sang, maladies des femmes, varices, dysménorrhée, fibrome, ménopause, etc...

**Mode d'emploi.** — V à LX gouttes à chaque repas.

### « PROTHERAPIA »

**Laboratoire G. CHAMAGNE**

Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie,  
Lauréat de l'Académie de Médecine,  
132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## FUCOSINE

*Traitement efficace de la Constipation habituelle.*

**Composition.** — Agar-agar, extrait de rhamnées.

**Propriétés.** — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

**Formes et Posologie :**

*Paillettes.* 1 à 3 cuillerées à café.

*Poudres..* 1 à 3 mesures.

*Cachets ..* 1 à 3 cachets.

A chaque repas régulièrement.

**Indications.** — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Prix : 11 francs la boîte.

**Laboratoire L. PROTHIÈRE**  
55, rue Auguste-Comte — LYON.

## **FUCUS GMET**

**Composition.** — Extrait total, sans alcool, du fucus vesiculosus. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Par son iode naturel régularise la sécrétion thyroïdienne et combat l'obésité.

**Indications.** — Obésité, Scrofule.

**Posologie.** — De 1 à 8 cuillerées à café par jour, *progressivement* dans eau ou vin blanc sec de préférence.

**Laboratoire GMET**

27, Faub. Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---



## FURONCULASE

Médication interne actuellement la plus efficace contre toutes les suppurations à staphylocoques dont elle empêche les récidives.

**Composition.** — Combinaison de chloro-lactate de potassium ferrique associé à une forte proportion de *Coculus palmatus* (colombo). Pilules enrobées dans une mince enveloppe de gluten, de manière à assurer la désagrégation de la masse dans le milieu intestinal sans provoquer la moindre action irritante sur une portion quelconque du tube digestif.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agit :

- 1° Par une action spécifique sur le foie.
- 2° Par son pouvoir oxygénant sur les globules en activant l'action phagocytaire.
- 3° Par une action nettement antiputride sur le tube digestif.

**Indications.** — Anthrax, Acné, Orgelets, Abscess, Furoncles, Phlegmons, certaines Dermatoses, toutes les Staphylococcies et les diverses intoxications d'origine gastro-intestinale.

**Posologie.** — Dose journalière :

*Adultes* : 6 pilules, 2 avant chaque repas.

*Enfants* : 2 à 3 pilules, une avant chaque repas.

Complément indispensable à la méthode des vaccins, la FURONCULASE ne présente aucune contre-indication. Elle ne contient ni sucre, ni alcool, ni produit toxique.

Prix de vente au public : 15 fr.

**Laboratoires DALET**

24, av. Mathurin-Moreau — PARIS (XIX<sup>e</sup>).  
(Anciennement 94, bd des Batignolles).

## GADUAMINE

La GADUAMINE est un extrait opothérapique de foies frais de morue renfermant outre les parties hydro-solubles de la glande vivante, la totalité de l'insaponifiable de l'huile. LA GADUAMINE se caractérise plus spécialement par ses *procédés scientifiques* de fabrication qui en font un produit sans goût ni odeur désagréable, et privé de tous produits de décomposition plus ou moins nocifs.

**Action :** — La GADUAMINE agit :

*Par les principes hydro-solubles du foie,* comme anti-anémique et antitoxique.

*Par les vitamines naturelles A et D,* comme stimulant de la croissance et fixateur du calcium.

**Principales indications.** — *Anémies :* anémies pernicieuses, toxiques, post-hémorragiques, infantile; chlorose. *Etats d'infection chronique :* Adénites, scrofules, lymphatisme, prétuberculose et tuberculose. *Avitaminoses :* Rachitisme, allaitement, suites de couche, croissance.

**Mode d'emploi.** — *Enfants :* X à XL gouttes. *Adultes :* XL à LX gouttes. A prendre en 2 fois, avant les principaux repas, dans un liquide quelconque (eau sucrée, tisane, bouillon, vin, etc.).

Prix : 13 fr. 50

**Laboratoires RENARD**

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

## GADUASE

*Tonique et stimulant général d'action rapide et durable.* Succédané classique et agréable (sirop framboisé) de l'huile de foie de morue.

### Composition :

*Hypophosphites de sodium et de calcium* (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

*Méthylarsinate disodique* (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins.

*Iode* (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable), régulateur du métabolisme et anti-infectieux de premier ordre.

### Convient à tous les âges.

La GADUASE active les échanges, réveille les fonctions, prévient et fait cesser rapidement les carences organiques. Ni incompatibilité, ni contre-indication, ni accoutumance.

**Indications.** — Anémie, Anorexie, Lymphatisme, Asthénie, Déminéralisations, Convalescences et toutes les insuffisances fonctionnelles.

**Posologie.** — Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

*Nourrissons* : 1/2 à 1 cuillerée à café *pro die*.  
*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café.

*Adolescents et adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Flacon (210 cc. environ) : 8 francs.

Grand flacon (400 cc. environ) : 15 francs.

### Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLEANS.

## GAIACAMPHRE

(Ampoules de 2 cc.)

Solution aqueuse de Camphre (Campho sulfonate : 0,34),  
et de Gaïacol (glycéryl gaïacol 0,10).

**Indolore**, se résorbant rapidement, non toxique.

**Indications.** — Toutes les affections bronchiques ou  
pulmonaires aiguës ; toutes les suppurations chroniques  
pulmonaires.

Préventif des complications pulmonaires d'origine médi-  
cale ou chirurgicale.

**Mode d'emploi** — *Adultes* : de 1 à 4 ampoules par jour.

*Enfants* : 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Prix : 20 francs la boîte de 10 ampoules.

Se fait aussi en comprimés.

*Adultes* : de 3 à 6 comprimés par jour.

*Enfants* à partir de 10 ans : 1 à 4 comprimés par jour

### Formule des comprimés :

Dionine .....	0,005
Glycéryl gaïacol .....	0,10
Camphosulfonate.....	0,05
Alcoolature de racine d'Aconit.....	III gouttes.

Prix : 12 francs.

Ces comprimés, enrobés d'une façon spéciale, se dissolvent  
dans l'intestin seulement.

### Laboratoires PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES.

## GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries  
lactiques sélectionnées en milieu protéino-  
lacto-sérique.

**Forme.** — Présentée en tubes scellés de 10 cc.

**Indications.** — Toutes infections intesti-  
nales et autres intoxications d'origine diges-  
tive, métrites, vaginites, pansement des  
plaies.

**Mode d'emploi.** — 1° Prendre le contenu  
de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse  
d'eau sucrée ;

2° *Enfants* jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau  
sucrée par la bouche ou en petit lavement ;

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une  
infection externe.

Prix de vente : 12 francs.

### Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE.

## GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.  
Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil, etc.

### Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

### Mode d'emploi :

Trois fois par jour, une ou deux cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte de 250 grammes : 16 fr. 30.

### Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

*Pastilles à l'Aldéhyde formique.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2<sup>o</sup> Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3<sup>o</sup> Hygiène de la voix.

**Mode d'emploi.** — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## GALLIODINE

**Forme.** — Bonbon à sucer, absorption per-linguale instantanée.

**Composition.** — Iode, tanin, acide phosphorique.

**Avantages.** — Permet de « macher » de l'iode sans fatiguer l'estomac.

**Indications.** — Angines, Stomatites, Rhinopharyngites, Adénites, Laryngites, Lymphatisme, Pyorrhée alvéolodentaire.

S'emploie également après tous soins dentaires et opérations d'amygdales et végétations adénoïdes.

**Posologie.** — Six à huit bonbons par jour.

Prix : 10 francs la boîte.

**Laboratoires SCHMIT**

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

---

## GAMBÉOL

Adopté par le Ministère de la Santé Publique.

**Principe actif.** — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier).

**Propriétés.** — Antiseptique, Résolutif, Cholagogue, Diurétique, Antiparasitaire, Antisymphilitique.

**Mode d'action.** — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

**Indications.** — Toutes celles du calomel sans ses inconvénients. Insuffisances hépatiques et biliaires. Infections intestinales. Antiparasitaire (oxyures). Syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes.

### Formes et posologie :

1° Cachets à 1 centigr., 2 ou 3 ch. jour.  
Prix : 20 francs.

2° Cartouches de pommade pour frictions à 50 %. Prix : 20 francs.

*Adultes* : 1 chaque jour.

*Enfants* : Fractions suivant l'âge.

3° Suppositoires adultes à 10 cent., 1 ch. jour.  
Prix : 18 francs.

Suppositoires enfants à 5 centigr., 1 ch. jour.  
Prix : 16 fr. 80.

**Laboratoire du Gambéol**

42, rue Emile-Deschanel  
COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 17-68.

## GAMÉTOXYL

**Nouvel antimalarique particulièrement puissant.**

Le GamétoxyL associe au chlorhydrate de quinine un composé synthétique : la dihydroquinamine qui agit sur les formes sexuées de l'hématozoaire alors que la quinine a sur elles une action pratiquement nulle (Comm. à la Soc. de Méd. Tropicale le 26 Janvier 1933).

Deux formes :

Toutes deux parfaitement tolérées par l'organisme.

*Comprimés* (dosés à 0,30 de produit actif) pour le traitement préventif — 1 comprimé par jour — et le traitement des formes chroniques et des petits accès — 2 à 4 comprimés par jour.

*Ampoules injectables* pour le traitement des formes plus sévères  
Les ampoules de GamétoxyL répondent à la formule :

Chlorhydrate de dihydroquinamine uranyle .....	0,01
Benzylène éthyl-arsianilate de dihydroquinamine.....	0,05
Chlorhydrate neutre de quinine. ....	0,35
Uréthane .....	0,175

Solution glucosée Q. S. pour 5 cc.

Elles s'emploient par voie intramusculaire ou avec précaution par voie veineuse.

1 à 2 injections par jour au moment des accès suivies de 1 injection tous les deux jours après la cessation de ceux-ci.

Le GamétoxyL peut s'employer même dans la bilieuse hémoglobinurique.

### Présentation et prix :

Le flacon de 20 comprimés à 0 gr. 30.....	25 fr.
La boîte de 8 ampoules de 5 cc.....	25 fr.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Calulienne — SAINT-DENIS (Seine)

## GANDERMA

Pommade renfermant les principes actifs de l'eau d'Alibour associés au Gambéol et à l'oxyde de zinc.

### Formule :

Protochlorure de mercure léger et dissociable .....	8 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Sulfate de zinc .....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	18 gr.
Excipient (Lanoline et Vaseline)....	72 gr. 50

**Indications.** — Toutes affections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne : Acnés, Dartres, Ecthyas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigos, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites, etc...

**Présentation.** — En tubes étain imprimés de 30 gr. environ.

Prix : Le tube : 12 francs au public.

Littératures et échantillons sur demande à :

**Laboratoire du GANDERMA**

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).



## GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

*Indications :*

**ÉPILEPSIE,**

**Chorée, Convulsions, États anxieux, etc.**

Antispasmodique à doses répétées.

*Présentation et posologie.* — Comprimés à 10, 5, et 1 centigr.

*Doses par 24 heures :*

*Adultes :* 0 gr. 05 à 0 gr. 30.

*Enfants :* 0 gr. 02 à 0 gr. 10.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPECIA »**

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## GARDÉPHÉDRINE

**Comprimés.**

Chl. Ephédrine naturelle.....	3 cgr.
Gardénal.....	1 cgr.

**Action.** — Sédatif nerveux, antichoc.

**Indications.** — Spécifique de la crise, Asthme essentiel, Asthme nerveux, Asthme infantile, Emphysème, Asthme rebelle, Accès avec insomnie, Rhume des foins, États dyspnéiques, États allergiques, Hypotension.

**Posologie.** — Un comprimé avant ou au début de la crise.

Répéter après une demi-heure si nécessaire.

De 8 à 14 ans : 1/2 comprimé.

De 2 à 8 ans : 1/4 de comprimé.

Voir également : **Diuréphédrine**, page 351 et :

**Ephédrasmine**, page 392.

Echantillons et littérature sur demande.

**Laboratoires THORAL**

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

## GASTÉOSE

Comprimés effervescents à base de Sulfate de Magnésie, Sulfate de Soude, Citrate de Soude, Azotate de Potasse.

Dyspepsie, Gastralgie, Infections du tube digestif, Insuffisance hépato-rénale, Fermentations, Constipation, Urticaire, Dermatose.

### Posologie :

4 à 6 comprimés par jour dans un grand verre d'eau le matin à jeun et aux repas.

### Dépôt général :

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>)

---

## GASTIASE

Régulateur des fonctions gastriques, intestinales et hépatiques.

A base de sels sodiques et de sels magnésiens desséchés et chimiquement purs. En comprimés effervescents parfumés au citron.

**Posologie.** — Laisser dissoudre dans un verre d'eau 2 comprimés le matin à jeun et 2 le soir avant le repas.

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS.

## GASTRÉPATINE

Sulfate, citrate, phosphate, bicarbonate de soude,  
Sels rigoureusement anhydres.

En faisant dissoudre 2 paquets dans une bouteille  
d'Eau d'Evian on réalise la solution de Bourget.

Prescrire un verre à bordeaux le matin à jeun.  
La solution est d'absorption facile.

**Indications.** — Insuffisances glandulaires du tube  
digestif ; prescription courante dans la théra-  
peutique du foie, de l'estomac, de l'intestin :  
hyperchlorhydrie, insuffisance hépatique, dys-  
pepsie, entérites, etc. Contribue au traitement  
des dermatoses et intoxications intestinales.

Prix : 5 francs.

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

**Laboratoires B. C. L.**

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

## GASTRHÉMA

**Méthode de Castle.**

**Composition.** — Extrait de muqueuse d'an-  
tre pylorique de porc.

**Forme.** — Ampoules buvables de 5 cc. rigoureuse-  
ment dosées, d'une saveur agréable, contenant  
toutes les hormones de l'organe frais.

**Indications.** — Toutes les Anémies, Asthénies,  
Anorexies, Hémorragies, Déficiences organiques,  
Convalescences.

Sans contre-indications.

**Posologie.** — 1 à 3 ampoules par jour dans un  
liquide froid, avant les repas.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-1.

**Laboratoire du GASTRHÉMA**

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## **GASTRICINE**

### **DU Dr E. DUHOURCAU**

**Composition.** — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillettes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab, pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

**Indications.** — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut). Anémie pernicieuse, anémies en général (méthode de Castle).

**Mode d'emploi.** — A un 1/2 verre d'eau ajouter 1 cuillerée à café de GASTRICINE.

Prendre une gorgée de *temps en temps pendant le repas*.

**Doses.** — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires du Dr E. DUHOURCAU**

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS (IV<sup>e</sup>).

N<sup>o</sup> d'inscription au Laboratoire de Contrôle, 146-1.

---

## GASTROCALCINE

**Affections de l'estomac, Dyspepsies,  
Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Dilatations  
de l'Estomac, Ulcères.**

### GASTROCALCINE GRANULÉE

1 cuillerée à café contient environ :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
— de magnésie.....	0 gr. 20
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 20
Sucre anisé, Q. s. pour.....	5 gr.

Par cuillerée à café après les repas et au moment des crises.

Flacon de 40 à 50 cuillerées à café.

Prix : 12 fr. 50.

### GASTROCALCINE BISMUTHÉE

Par dose moyenne (une mesure).

Carbonate de bismuth.....	2 gr. 50
— de magnésie.....	0 gr. 30
— de chaux.....	0 gr. 30
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 25
Kaolin.....	5 gr.
Gelose Q. s.	
Bromure de sodium.....	0 gr. 25
Codéine.....	0 gr. 005
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02
Sucre.....	6 gr.

Essence d'anis Q. s. p. aromatiser.

Une mesure ou 1/2 mesure selon les cas ou les besoins. 1, 2 ou 3 fois par jour au maximum après les repas ou au moment des douleurs, délayée dans 1/3 ou 1/2 verre d'eau environ.

Prix : 20 fr.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
de la Faculté de Pharmacie de Paris  
17, rue Cadet — PARIS

## GASTROCAOL

### Pansement gastrique.

**Composition.** — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés-porphyrisés.

**Forme.** — Poudre insoluble, en sachets de 20 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, *peut et doit* remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications — Plus efficace.

Mêmes doses — Jamais toxique.

Même mode d'emploi — 6 fois moins coûteux.

**Indications.** — Pansement gastrique. — Hyperchlorhydrie. — Ulcères de l'estomac et du Duodénum. — Spasmes du Pylore. — Aérophagie. — Dyspepsies douloureuses. — Hémorragies du Tube digestif. — Diarrhées aiguës. — Diarrhée des tuberculeux. — Dysenteries bacillaires et amibiennes. — Etats cholériformes.

**Doses.** — 1<sup>o</sup> Moyennes : 20 gr. par jour (un sachet) en une ou trois fois.

2<sup>o</sup> D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3<sup>o</sup> Exceptionnelles : 100, 150, 200 grammes par jour dans les états cholériformes.

**Mode d'emploi.** — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en 3 fois, avant chacun des repas principaux.

**Prix.** — 12 fr. pour un minimum de traitement de 12 jours.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET  
BENDERITTER ET C<sup>ie</sup>, à VENDOME  
(Loir-et-Cher).

## GASTROCARBONE

Charbon végétal, Charbon animal  
Charbon minéral (graphite)

Carbonate de chaux, Magnésie Hydratée

**Deux formes :** *Pastilles* : sucer 3 ou 4 pastilles par jour. *Granulé* : croquer 3 ou 4 cuillers à café de granulé par jour.

Régularise les fonctions intestinales sans provoquer la constipation.

Pyrosis, Spasmes, Aérophagie, Diarrhées, Infections intestinales.

**Laboratoire du  
GASTROCARBONE**

SAINT-LOUIS (Bouches-du-Rhône).

## GASTROCLEAN

**Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins.**

Préconisé par tous les spécialistes de l'estomac, des intestins et du foie.

**Gastroclean** est le remède spécifique et souverain des Dyspepsies, des Affections gastro-intestinales, de la congestion hépatique et des infections biliaires et auto-intoxications.

**Gastroclean** neutralise l'hyperacidité gastrique, calme les douleurs stomacales et régularise la digestion.

**Dose et mode d'emploi.**

(Sans autre indication du Médecin.)

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau de Châtel-Guyon.

Dépôt principal :

**Laboratoires ADLER**

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (III<sup>e</sup>).

En vente chez tous les Droguistes et Pharmaciens.

## GASTROLUËS

Nouveau dérivé de l'acide para-amino-phényl-arsinique possédant une activité spirillicide optima et permettant d'obtenir, par voie digestive, les résultats thérapeutiques des injections d'arsénobenzènes.

A utiliser également dans le traitement des dysenteries, diarrhées, etc.

**Posologie.** — *Syphilis.* — 4 comprimés par jour pendant les 4 premiers jours de la semaine et, ce, pendant 8 semaines.

*Dysenteries et diarrhées aiguës*, mêmes doses, mais seulement pendant 2 semaines.

*Dysenteries et diarrhées chroniques*, 2 comprimés par jour pendant les 4 premiers jours de la semaine et, ce, pendant 6 semaines.

**Nota.** — 1° Tâter la susceptibilité du malade en mettant 2 à 4 jours à atteindre la dose conseillée ;

2° En thérapeutique infantile prescrire de la même manière les comprimés correspondant à l'âge ou mieux donner le nombre de comprimés nécessaire pour que la dose quotidienne soit en moyenne de 0,015 par kg.

### Présentation et prix :

Flacon	30 comprimés	Gastroluës adultes à 0,25.....	20 fr.
—	40 —	— enfants à 0,10.....	12 fr.
—	100 —	— nourrissons à 0,02.....	10 fr.

### Littérature et échantillons :

#### Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## GASTRONALDINE

**Estomac, Foie, Intestin.**

**Forme.** — Paquets.

**Formule.** — Hépatine, Gastérine, Belladone, Kaolin, Carbonate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate acide de Sodium.

Produits opothérapiques en milieu alcalin bien dosé.)

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, Hypersécrétion gastrique, Pyrosis, Brûlures d'estomac, Troubles gastriques d'origine alimentaire ou nerveuse, Ulcération de l'estomac et du duodénum, Insuffisance motrice de l'estomac, Maux de tête, Insomnie, Congestion du foie et des reins.

**Mode d'emploi.** — Suivant avis du docteur, 2 à 4 paquets par jour au milieu, à la fin ou entre les repas.

Prix : 15 francs la boîte de 28 paquets.

**Laboratoire GASTRONALDINE**

**A. ROUX, Pharmacien**

58, rue de Maubeuge — PARIS (IX°).



# GASTROPANSEMENT

du Dr ZIZINE

Pansement polyvalent à base de charbon activé, réalisant la protection intégrale de la muqueuse gastrique.

**Forme.** — Paquets.

**Composition.** — Charbon polyvalent activé, très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement des ulcères gastriques et des gastropathies douloureuses.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie.

Gastrites.

Spasmes du pylore.

Atonie gastrique.

Dyspepsies réflexes.

Ulcères.

**Posologie.** — Prendre le matin à jeûn, et au besoin le soir, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires du Docteur ZIZINE**

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## GASTROPEPTYL

**Formes pharmaceutiques.** — 1° Granulé; 2° Comprimés.

**Composition.** — Peroxyde de magnésie, Carbonate de magnésie, Carbonate de calcium, Deuto-carbonate de soude (saturants formule Robin), Papaine et Diastase (ferments végétaux).

**Propriétés et avantages.** — Calme les douleurs gastriques et facilite la digestion. Il neutralise les acides de fermentation et agit en même temps sur la musculature gastrique en amorçant l'action des glandes stomacales.

**Indications.** — Dyspepsies gastriques et duodénales, pesanteurs, acidités, brûlures, aigreurs.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café de granulé ou 3 comprimés avant, pendant ou après le repas, dans un peu d'eau, mais de préférence après les repas.

**Prescription.** — 1 boîte granulé ou 1 boîte comprimés Gastropeptyl.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## GASTRO-SODINE

**Forme : Granulé.**

Trois formules :

GASTRO-SODINE normale ;

GASTRO-SODINE S, sulfatée ;

GASTRO-SODINE B, bromurée.

**Indications.** — Gastro-entérites simples, Gastro-entéro-hépatites, Gastro-entérites neuro-arthritiques.

**Doses.** — Une cuiller à café le matin dans un verre d'eau de préférence chaude.

Prix : 10 fr. 75.

**Laboratoires Gastro-entérologiques  
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 69-13.

## GASTROZYMASE

**Composition.** — Ferments gastriques naturels (opothérapie du suc gastrique de porc),

**Action thérapeutique.** — En plus du simple pouvoir de substitution, utilisable uniquement en cas d'hypo-pepsie ou d'apepsie, le système de ferments gastriques (zymases) rassemblés dans la GASTROZYMASE a la propriété : de stimuler les fonctions gastriques déficientes, et, ce qui est le plus généralement intéressant, de régulariser et d'harmoniser ces fonctions digestives, défendant ainsi l'intestin contre l'envahissement des germes ou toxines pathogènes.

**Forme.** — Comprimés effervescents.

**Indications.** — Les troubles gastriques (qu'ils proviennent d'hypo ou d'hyperchlorhydrie, d'hypo ou d'hyperpepsie).

**Posologie.** — Comme médicament de substitution : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau au milieu du repas.

Comme stimulant gastrique : 1 à 2 comprimés dissous dans l'eau, 1 heure avant chaque repas.

Comme régulateur gastrique : 3 à 4 comprimés dissous dans l'eau au cours de chaque repas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

## GATERCODÉINE DOMERGUE

**Principes actifs.** — Gaïacol, Terpinol, Codéine.

**Propriétés.** — Antiseptique des Bronches. S'éliminant surtout par les voies respiratoires.

**Présentation.** — Capsules (boîte de 40).

**Indications.** — Enrouement, Pharyngites, Laryngites, Toux quinteuses, Catarrhes. Spécifique de la Coqueluche.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 capsules par jour  
2 par 2. Enfants : 2 à 4.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DOMERGUE  
AGEN (Lot-et-Garonne).

## GATRAN

**Composition.** — Le GATRAN désigne soit un *Savon* liquide médicamenteux, soit un *Baume* soluble dans l'eau, à base de Goudron de Norvège et de Ricinoléate de soude.

Le Savon Cadique et le Baume Cadique contiennent en plus de l'Huile de Cade.

**Indications.** — Pityriasis simplex ; Eczéma séborrhéique, Séborrhée. Calvitie séborrhéique.

Desquamations pelliculaires, Psoriasis, Acné, Séborrhée huileuse de la poitrine et du dos.

**Mode d'emploi.** — En principe, applications chaque soir sur le cuir chevelu de Baume, le matin, lavage au savon.

Le savonnage quotidien au GATRAN est recommandé, à titre préventif, contre toutes les affections séborrhéiques.

**Présentation.** — *Baume* : flacon de 90 cc.

*Savon* : flacon de 500 cc.

**Prix de vente :**

Le flacon de Baume GATRAN : 15 francs.

Le flacon de Savon GATRAN : 25 francs.

**Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND**

14, rue Gravel — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt :

**Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND**

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

---

## GAUROL

**Nouveau sel phosphoré, calcique et magnésien entièrement assimilable.**

**Présentation.** — 3 formes : ampoules injectables de 1 cc. — Comprimés. — Granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique général de l'organisme. — Reminéralisateur. — Recalcifiant.

**Indications thérapeutiques.** — Asthénie, Anémie, Convalescence, Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Affections dentaires, Rachitisme, Troubles de l'ossification, Lymphatisme, Consolidation des fractures.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule injectable par jour, 1 à 3 comprimés par jour ; 1 à 3 cuillerées à café de granulé par jour.

---

## GAUROL INTRAVEINEUX

**Présentation.** — Ampoules de 5 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hémostatique puissant, Recalcifiant, Reminéralisant.

N'est pas caustique comme le Chlorure de Calcium.

### **Indications thérapeutiques.**

#### *En Médecine :*

Hémorragies et Anémies qui en résultent.

Épanchements des séreuses.

Tuberculose pulmonaire (Traitement symptomatique de l'asthénie, de l'anorexie, de l'amaigrissement).

#### *En Chirurgie :*

Hémorragies : à titre curatif et à titre préventif.

Consolidation des fractures.

Tuberculoses osseuses ou articulaires.

**Mode d'emploi.** — Injecter 10 cc. en cas d'urgence.

**Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC**

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 09-71.

## GÉLICURINE

**Composition.** — Teintures balsamiques additionnées de 3 p. 100 de camphre droit et de 1 p. 100 d'acide acétique, tenant en suspension 6 p. 100 de chlorure de plomb amorphe.

**Indications.** — Décongestionne et raffermir les tissus tuméfiés, calme les cuissons des engelures.

Non caustique. S'emploie sur les engelures même ulcérées, et cicatrise les crevasses.

Soulage et entrave les éruptions anaphylactiques.

**Emploi.** — Appliquer 2 à 3 fois par jour la Gélicurine avec le pinceau contenu dans le flacon, sur la partie congestionnée par l'engelure. Laisser sécher sans frotter; aider l'évaporation en soufflant sur la peau. N'appliquer aucun pansement.

Le flacon : 6 francs.

**Laboratoire M. AUDIBERT**

**Docteur en pharmacie**

**BAYONNE (B.-P.).**

---

## GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

Préparation non toxique, très opaque, de bonne conservation.

**Exploration radiologique du tube digestif.**

*Mode d'emploi :*

Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient (chocolat par exemple).

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
**« SPÉCIA »**

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.  
Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

**Posologie.** — *Traitement des douleurs de l'estomac :* 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

*Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulçère gastrique :* 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.  
Téléphone : Maillot 17-75.

## GÉLO-PANSEMENTS GASTRO-INTESTINAUX

1° *Gélo-kaol-belladoné* pour pansements gastriques et intestinaux.

**Indications.** — *Estomac.* Hyperchlorhydrie avec ses manifestations (brûlures, aigreurs, crampes).

*Intestin.* Coliques, Gaz, Tranchées, Diarrhées de fermentations.

2° *Gélo-carbone-bismuthé* pour pansements intestinaux,

**Indications.** — Spasmes douloureux de l'intestin, Coliques, Gargouillements, Intoxication alimentaire, Fermentations.

**Mode d'emploi.** — Verser le 1/2 contenu du couvercle-mesure dans une 1/2 tasse d'infusion très chaude un quart d'heure avant les 2 grands repas. 1/2 dose pour les enfants.

Prix : 12 fr. 50.

Dépôt général :

**Laboratoire LAMBERT**

8, avenue de Grammont — TOURS.

## GÉLOR

Lubrifiant et régulateur de l'intestin.

**Composition.** — Emulsion solidifiée d'une finesse microscopique et de stabilité parfaite, de 60 p. 100 d'*huile de paraffine* chimiquement pure et de haute viscosité dans de l'*agar-agar* et du *suc d'oranges douces*.

**Propriétés.** — Gélor cumule les avantages de l'huile de paraffine et du mucilage sans en avoir les inconvénients ; suintements, saveur huileuse, digestion pénible.

**Indications.** — Traitement de la constipation sous toutes ses formes.

*Son goût très agréable*, sans aucune saveur huileuse, permet au malade d'absorber l'huile de paraffine *sans s'en douter*.

**Posologie.** — Doses quotidiennes à prendre aux repas :  
*Bébés* : 1/2 cuillerée à café.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.

*Adultes* : 2 à 6 cuillerées à café.

Prix en France : 13 fr. 50.

**Laboratoires A. CESBRON**

63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## GELOTANIN CHOAY

**Nature.** — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissociable, dans l'intestin, en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.

**Indications.** — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

**Formes pharmaceutiques et posologie :**

1<sup>o</sup> Pour *nourrissons et jeunes enfants* : Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud.

2<sup>o</sup> Pour *adultes* : Cachets dosés à 50 cgr., 4 à 8 par jour.

**Prix** : 8 fr. la boîte de 20 paquets.

10 fr. la boîte de 24 cachets.

**Laboratoire CHOAY**

48, aven. Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.



## GÉNACIDE

**Composition.** — Granulé acigène contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique...	12 gr.	75 %
Chlorure ammonique.....	5 gr.	%
Ac. phosphorique officinal..	1 gr.	35 %

Cinq grammes représentent comme coefficient d'acidité en  $\frac{N}{10}$  150 cc.

**Indications.** — Alcalose (détectée par le *Papier Réactif Génacide* donnant le pH.)  
Colibacillose, Asthénie.

**Forme.** — Granulé.

**Dose.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.  
Prix : 15 francs.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## GENATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux. Entérite muco-membraneuse.

**Formes.** — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.  
Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 16 francs.

**Laboratoire AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GÉNERGOSINE

Tonique et reconstituant du Système nerveux. (Phosphure de zinc, Métavanadate de Soude, Kola, Caféine, Quassia).

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique Nervin, médication phosphorée parfaite par le Phosphure de Zinc. La présence du Métavanadate de Soude complète l'action du médicament en stimulant l'appétit et les fonctions digestives.

**Indications thérapeutiques.** — Etats neurasthéniques, dépression nerveuse, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences difficiles, etc.

**Forme.** — Comprimés-pastilles.

**Dose.** — 1 à 3 par jour.

(Conforme aux prescriptions légales, la Générgosine peut être prescrite aux assurés sociaux.)

Le flacon : 14 fr.

**Laboratoire JONIDS**  
DIJON.

## GENESERINE

Polonovski et Nitzberg  
Salicylate de Gènesérine.

**Formes.** — Granules et dragées au 1/2 milligr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 milligrammes.

**Indications.** — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

**Mode d'emploi.** — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses, contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours. Le flacon ou la boîte. Prix au public : 16 francs.

**LABORATOIRE AMIDO**

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

## GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueurs des tuberculeux.

**Formes.** — *Gouttes* : XX gouttes = 1 milligr. *Granules* au 1/2 milligr. *Ampoules* à 2 milligr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour. Prix au public : le flacon ou la boîte, 16 francs.

Laboratoire **AMIDO**

**A. BEAUGONIN**, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg.

**Formes.** — Comprimés dosés à 2 centigrammes. Ampoules à 4 centigrammes.

**Indications :**

**La douleur :** Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies. Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation.

**Mode d'emploi.** — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

**Comprimés :** 2 à 4 par jour.

**Ampoules :** 1 à 2 par jour.

Laboratoire des Produits Amido

**A. BEAUGONIN**, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GENOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

### Indications.

ETATS PARKINSONIENS, Paralysie agitante, Syndromes post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

**Formes.** — Gouttes : XX gouttes = 1 milligr.

Granules au 1/2 milligr.

Ampoules dosées à 3 milligr. et à 1 milligr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération.

Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopolamine suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 20 fr.

La boîte d'ampoules : 30 fr.

**Laboratoire AMIDO**

A. BEAUGONIN, Pharmacien  
4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>)

**Ampoules. Granules. Gouttes.**

## GENOSTHÉNIQUES

Cacodylate de Genostrychnine et de Génésérine  
Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémies.

**Formes.** — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

**Ampoules.** — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix au public : 18 francs.

**Laboratoire AMIDO**

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges.

PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GENOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

**Formes.** — *Gouttes* : XXX gouttes = 5 milligr. *Granules* à 0 gr. 002. *Ampoules* à 0,01.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

**Dose injectable** : une ampoule par jour.

Le flacon ou la boîte : 14 fr.

Laboratoire **AMIDO**

**A. BEAUGONIN**, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GÉRANINE

(Vermicide universel)

**Composition.** — Diméthylcyclooctodiéanol, essence de melaleuca viridiflora.

**Action thérapeutique.** — Agit sur tous les parasites intestinaux (tænia, oxyures, tricocéphales, ascaris, protozaires, etc.).

**Avantages.** — Médicament non toxique, sans aucun danger, n'incommodant pas le malade.

**Présentation.** — Capsules gélatineuses : 16 par boîte.

**Mode d'emploi :**

*Contre le tænia* : deux fois 8 capsules à 1/2 heure d'intervalle.

*Contre les oxyures* : 2 capsules à chaque repas pendant 4 jours. Recommencer huit jours plus tard.

**E. BOULLÉ**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-Interne des Hôpitaux

Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé dans des extraits végétaux. Non toxique. Goût agréable.

**Indications.** — Employée contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émetisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Gripes pulmonaires, etc, etc.

**Propriétés.** — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif, Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc., dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

**Forme.** — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane

**Nota.** — Le médecin peut prescrire, sans inconvénient, la *Germose* à des doses plus élevées; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux ou trois heures, par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre-indication.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GERNAL

**Indications.** — Traitement des affections des voies respiratoires.

**Composition.** — Huile d'olive neutre et stérile adrénalinée à 1/5000<sup>e</sup>, géranium, eucalyptol, essence de menthe.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionne et lubrifie la muqueuse nasale sans aucune irritation, antiseptique et désodorisant.

**Mode d'emploi.** — En badigeonnages fréquents à l'aide d'un tampon de coton monté sur une tige métallique contenue dans la boîte.

**Laboratoires P. SOULIÉ**  
333, rue de Vaugirard — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## GLANDEX PHOSCALCIQUE

**Forme.** — Granulé.

**Formule.** — Ergostérine irradié, Parathyroïdine, Thymusine, Splénine, Hépatine, Surrénine, Gluconate de Chaux, Poudre d'os frais, Moelle osseuse, Acide anhydroxyméthylène diphosphorique (sel phospho-organique).

**Indications.** — Surmenage, Faiblesse générale, Neurasthénie, Déminéralisation, Prétuberculose, Carence calcique.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour.  
*Enfants* : 2 cuillerées à café.

### Autres GLANDEX :

Glandex Orchitique, Ovarien, Pluriglandulaire, Thyroïdien, Entéroglandex.

**Laboratoire ROUX**  
58, rue de Maubeuge — PARIS.

## GLANDOCALCYL

**Recalcifiant. — Réminéralisateur.**

**Composition.** — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, di-phosphate tricalcique et poudre d'os frais.

**Indications.** — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédité et pré tuberculose.

**Formes.** — Pour *adultes* : cachets ; pour *enfants* : granulé.

**Doses.** — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : *Cachets*, 12 fr. ; *Granulé*, 15 fr.

**Laboratoire Moderne**  
**d'Opothérapie et Biologie médicale**  
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

## GLESOL COUTURIEUX

**Médication Antistaphylococcique.**

**Description.** — Capsules glutinisées contenant :

Etain colloïdal .....	0 gr. 03
Levurine Extractive .....	0 gr. 12
Soufre colloïdal .....	0 gr. 03
Ferments lactiques.....	0 gr. 06

En flacon de 50 capsules.

**Action thérapeutique.** — L'*étain colloïdal* est un puissant antistaphylococcique, très bien toléré ; la **LEVURINE EXTRACTIVE** agit comme anti-infectieux polyvalent et augmente notablement la leucocytose ; le *soufre colloïdal* modifie les réactions cutanées et renforce l'action de l'étain ; enfin les *ferments lactiques* transforment le milieu intestinal et s'opposent aux fermentations putrides.

**Indications.** — Le **GLESOL**, groupant dans sa formule les meilleurs anti-staphylococciques connus, trouve son emploi dans le traitement des furoncles, anthrax, abcès, phlegmons, annexites, acné, folliculites, et en un mot dans toutes les affections dues au staphylocoque.

La dose est de 4 à 10 capsules par jour pour les adultes, selon la gravité des cas à traiter. Pour les enfants, doses proportionnelles suivant l'âge.

**Laboratoires COUTURIEUX**  
18, avenue Hoche — PARIS.



## LOBEXINE

### Les Analbumines

**Conception nouvelle de l'opothérapie hématique spécifique. Extrait aqueux total du globule sanguin privé de ses albumines, directement et complètement assimilable. Jamais d'anaphylaxie.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Régénération globulaire intensive.

**Indications.** — Anémies, croissance, grossesse, états infectieux, hémorragies de toutes natures.

**Forme.** — Ampoules buvables 10 cc.

**Dose moyenne :**

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 ampoules par jour.

*Enfants :* 1/2 dose.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 10 cc. : 16 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien  
21, rue Chaptal — PARIS

## GLOBULES FUMOUBE

Iodure de Potassium.

**Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac, et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.**

**Doses.** — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

*Globules Fumouze KI*, à 0 gr. 25 par globule.

*Globules Fumouze KI*, à 0 gr. 10 par globule.

**Indications.** — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

**Établissements FUMOUBE**

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

## GLOBULES ROMON

**Forme.** — Globules glutinisés.

**Composition.** — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphore de zinc pur.

**Indications.** — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

**Dose.** — 4 à 6 globules par jour.

**Observation.** — La même formule existe également en ampoules : *Ampoules Romon*.

**Dose.** — Une injection tous les 2 jours.

La boîte de 10 ampoules : 40 fr.

Le flacon de 40 globules : 25 fr.

**Laboratoires ROMON**

6, rue Bridaine — PARIS.

---

## GLOTTYL

**Composition.** — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

**Formes pharmaceutiques.** — Gouttes et Dragées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

**Indications.** — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Coqueluches, Toux coqueluchoïdes, Toux spasmodiques et réflexes.

**Posologie.** — Gouttes : *Jeunes enfants* : X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises).

*Enfants* : XX à XXX gouttes, chaque fois, 4 à 5 fois par jour.

*Adultes* : XL à LX gouttes, chaque fois, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane.

Dragées : *Enfants* : faire sucer 3 à 6 par jour.

*Adultes* : sucer 6 à 12 par jour.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires DENIS**

85 bis, rue du Ranelagh  
PARIS (XVI<sup>e</sup>). — Tél. : Auteuil 13-89.

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

# LES GLOXINES

**Protéinothérapie spécifique des cancers.**

**Méthode du Docteur Rubens-Duval.**

**Formes.** — Ampoules buvables de 1 cc.

**Composition.** — Globulines spécifiques extraites de tissus néoplasiques par la méthode et sous le contrôle scientifique du Docteur Rubens-Duval, et diluées en solution physiologique au taux de 10-21.

**Propriétés.** — Elles renforcent les réactions de l'organisme contre le cancer, dans la mesure où ces réactions, tant locales que générales, existent et peuvent être développées.

Les tumeurs peuvent régresser et même exceptionnellement disparaître ; le plus souvent, leur évolution est ralentie et leur malignité diminuée.

Les Gloxines peuvent être associées :

**Aux traitements chirurgicaux :** Diminution des risques de récurrence et de métastase ;

**Aux traitements radiothérapiques (radium, rayons X) :** Augmentation de la radiosensibilité des cellules cancéreuses. Achèvement de leur destruction.

**Durée du traitement.** — Il peut être prolongé sans interruption pendant des années. Il est utile tant qu'il existe des lésions cancéreuses manifestes ou une suspicion de foyers cancéreux latents.

**Choix des Gloxines.** — Les **Gloxines** étant spécifiques de la variété des tissus dont elles proviennent, il convient d'employer les **Gloxines** provenant d'une tumeur semblable à celle qui doit être traitée ou, à défaut, d'une tumeur de type voisin.

**Remarque importante :**

A défaut de **Gloxines** de type correspondant à la tumeur à traiter, une ou plusieurs **Gloxines** peuvent être utilement employées.

Ainsi pour les tumeurs :

du foie : prescrire les **Gloxines** N° 16.

de l'œsophage : prescrire les **Gloxines** N°s 1 et 2 (alternées).

du pancréas : prescrire les **Gloxines** N°s 3 et 16 (alternées).

du poumon : prescrire les **Gloxines** N°s 1 et 11 (alternées).

Les boîtes ne portent aucune indication susceptible de révéler au malade la nature de son affection.

Les formules sont conventionnelles.

Les médecins, sur leurs ordonnances, ne devront donc désigner les **Gloxines** qu'ils désirent utiliser que par leur numéro d'ordre pour les **Gloxines** de vente courante, ou par leur lettre de reconnaissance, pour les **Gloxines** spéciales.

**Exemples :**

Pour le traitement d'un épithélioma du sein, type ordinaire, prescrire sur l'ordonnance : **Gloxines** N° 9.

Pour le traitement d'un épithélioma de la vessie : **Gloxines** N° 15.

Pour le traitement d'un sarcome du sein : **Gloxines** spéciales K, etc...

Cette indication sera suffisante pour que le pharmacien puisse délivrer, sans erreur possible, le produit correspondant.

## LISTE DES GLOXINES

en vente dans les pharmacies.

O. C. P. Dépositaire général.

(L'indication du numéro de référence est nécessaire sur l'ordonnance).

- N° 1. Epithéliomas épidermoïdes de la bouche, langue et lèvres et des orifices naturels.
- N° 2. Cancers épithéliaux de l'estomac.
- N° 3. Epithélioma cylindrique du gros intestin et du rectum.
- N° 4. Epithélioma Wolffien de l'ovaire.
- N° 5. Epithélioma germinatif de l'ovaire.
- N° 6. Epithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes cornés de la peau.
- N° 7. Epithélioma basocellulaire de la peau.
- N° 8. Adénomes et épithéliomas de la prostate.
- N° 9. Epithélioma du sein type ordinaire.
- N° 10. Epithélioma du corps thyroïde.
- N° 11. Epithéliomas du col de l'utérus à cellules cylindriques et basocellulaires.
- N° 12. Epithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes du col de l'utérus.
- N° 13. Epithélioma à cellules cylindriques du corps de l'utérus.
- N° 14. Chondrosarcome.
- N° 15. Epithélioma de la vessie.
- N° 16. Epithélioma de la vésicule biliaire.
- N° 17. Epithélioma à cellules claires du rein.
- N° 18. Lymphocytome.
- N° 19. Sarcomes à petites cellules et sarcomes à cellules polymorphes.
- N° 20. Séminome du testicule.

## LISTE DES GLOXINES SPÉCIALES

qui ne sont livrées directement que par le Laboratoire.

(L'indication de la lettre de référence est nécessaire sur l'ordonnance.)

- A Léiomyome malin.
- B Tumeur mixte de la parotide.
- D Séminome de l'ovaire.
- E Sarcome de l'ovaire provenant des cellules à lutéine.
- G Fibrosarcome.
- H Maladie de Hodgkin.
- K Sarcome du sein.
- L Epithélioma du sein à grosses cellules.
- M Epithélioma du sein à cellules cylindriques.
- N Epithélioma Wolffien du testicule.
- O Nævome achromique.
- P Nævome mélanique.

## LABORATOIRE DES GLOXINES

133, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVII<sup>e</sup>). Tél. : Marcadet 51-87.

Prix de la boîte de 20 ampoules buvables : 24 francs.

## GLUCOLACTOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous les N<sup>os</sup> 363-21-22 et 23.

**Formes.** — Solution. — Ovules. — Topique.

**Composition.** — Acide lactique, glucose, Extrait de matricaire, Extrait de sauge.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Restitue à la cavité vaginale ses moyens naturels de défense : Acide lactique et Glycogène.

**Indications.** — Hygiène des muqueuses, Toilette quotidienne, Leucorrhées (Métrite, Vaginite, Salpingite).

### Mode d'emploi :

*Solution* : 3 cuill. à café pour 1 litre d'eau (injection).

*Ovules* : 1 par jour.

*Topique* : Pour pansements gynécologiques.

Solution (le flacon)..... 10 fr. (en France).

Ovules (la boîte)..... 10 fr. —

Topique (le flacon)..... 10 fr. —

### Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## GLUPHOSOL

### Granulé sucré, soluble.

**Composition.** — Phosphore, Calcium, sous forme de composés spéciaux en présence d'Ergostérol irradié fixateur.

**Indications.** — Carence phospho-calcique : Maladies des Os, de Croissance, Rachitisme, Ostéo malacie, Tétanie. Egalement fractures, troubles dentaires, Rhumatisme chronique.

Indiqué de plus pendant la grossesse et l'allaitement.

**Posologie.** — 2 bouchons-mesure avant chacun des 2 repas, 20 jours par mois, 10 jours de repos. —

*Enfants* : 1/2 dose.

Prix : 25 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments.

### Laboratoires S. GABAIL

5, rue Lefebvre — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## **GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ**

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

**Indications.** — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants ; des mères pendant la période de l'allaitement ; des déprimés.

**Dose.** — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 fr. 50.

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## **GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN**

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure.

Ampoules injections dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés : 2 fois par jour dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

**Indications.** — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

**Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.



## GLYCOCARPINE

**Éléments actifs.** — Nitrate de pilocarpine (2 mmgr. par pilule) ou par X gouttes, associé à de faibles doses d'hamamélis et cimicifuga, et à 0,02 de caféine.

**A. — Médication vaso-dilatatrice.**

Céphalées et vertiges des artérioscléreux, Hypertension artérielle et ses conséquences, Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. Maladie de Raynaud, Claudication intermittente par spasme artériel, Angor par spasme des coronaires, Glaucome, Mouches volantes, Bourdonnements d'origine circulatoire (seulement).

**B. — Troubles vago-sympathiques.**

Insuffisance du vague, Freinage du sympathique, Asthme, Coqueluche, Basedow fruste, Pelade.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 pilules ou XX gouttes au début des trois repas.

Echantillons (modèles de vente) :

**C. DALIN**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.  
49, quai Saint-Vincent. — LYON.

## GLYCO-LACTIMASE

**Description.** — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

**Action thérapeutique.** — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**  
18, avenue Hoche — PARIS.

## GLYCO-M.

**Composition.** — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution du Thymolate de soude (dose à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol, 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria, Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

**Propriétés particulières.** — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

**Indications.** — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite** : 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des foins et végétations adénoïdes** : Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie** : injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

**Gencives spongieuses et maladies buccales.** — En bains de bouche prolongés, pure, en brassant toutes les parties de la bouche (pendant un quart d'heure). Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

**A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur l'antiseptique acide :**

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. » attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang, et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

LA GLYCO-M. est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant. Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

Se vend dans toutes les Pharmacies :

En flacons de 100 grammes : 6 francs, modèle de poche.

En flacons de 200 grammes : 10 francs, modèle stilligoutte.

En flacons de 500 grammes : 20 francs, demi-litre.

En bocaux de 3 litres..... : 90 francs, modèle familial.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le N° 333-2.

Laboratoire GLYCO-M.

Etablissements GEO-MIQUEL

3, avenue Lowendal

PARIS — (VII).

## GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRES3 et OWEN Co.

**Traitement des affections de toutes les muqueuses.**

### Composition :

Biborate de soude. ....	2,010	p. 100
Thymol .....	0,037	—
Menthol.....	0,037	—
Acide benzoïque.....	1,689	—
Bicarbonate de soude....	2,346	—
Cajeputol .....	0,075	—
Acide orthoxybenzoïque.	0,074	—
Huile de pin.....	0,037	—
Huile de bouleau.....	0,030	—
Glycérine, Colorant, Al- cool, Eau distillée.....	93,665	—

**Avantages.** — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humoral et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

**Action thérapeutique.** — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel des sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

**Indications.** — *Voies digestives:* Catarrhe gastrique et intestinal, Fermentations,

Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

*Cavité buccale* : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

*Pharynx et gorge* : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

*Voies nasales* : Coryza aigu ou chronique, Rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

*Yeux* : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

*Maladies de la peau* : Erysipèle, Furonculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

*Rectum et région anale* : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

*Gynécologie et Obstétrique* : Pertes blanches, Vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

*Plaies de toute nature.*

**Mode d'emploi.** — a) Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Prix :

100 cc. ....	6 francs.
250 cc. ....	12 —
500 cc. ....	20 —
Modèle Hôpital (3 litres)....	90 —

Remise spéciale au corps Médical.

**Etablissements WEBER**

**A. GUILLAUME, Pharmacien**

5 bis, rue des Haudriettes — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GLYCTONE PHOSPHATÉE CHARRIÈRE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 439-3, en vue de la possibilité de prescription aux Assurés sociaux.

### Zomo-Chimiothérapie.

Nous réclamons près du Corps Médical le bénéfice de la priorité de l'idée et de la première application thérapeutique de la Zomochimiothérapie, ayant été les créateurs de cette association médicamenteuse et de sa mise commerciale à la disposition du médecin.

**Forme.** — Liquide.

### Composition :

Arséniate de soude . . . . .	5 centigr.
Glycérophosphate de soude.	5 grammes.
Sulfate de strychnine . . . . .	8 milligr.

Ferments musculaires, Corps Immunisants, Albuminoïdes spécifiques et Vitamines des muscles frais, Matériaux salins vitalisés phosphatiques, Hémoglobine du Plasma de bœuf additionné de sucres de cerise et de framboise, Saccharose, 500 cc.

### Dose. — Après les repas :

*Enfants* : 1 à 6 cuillerées à café ou à dessert par jour suivant âge.

*Adultes* : 1 à 6 cuillerées à soupe pure ou non, de préférence dans de l'eau froide gazeuse ou du lait froid.

### Indications :

Anémie, Chlorose, Convalescence, Post-opérations, Grossesse et Allaitement, Epuisement musculaire, Surmenage, Rachitisme, Tuberculose, Misère physiologique et Déchéances physiques carenciales. Post-hémorragies.

### Contre-indications :

Albuminurie, Diabète et Artério-sclérose.

### Prix :

Le flacon de 500 cc. : 35 fr.  
Le 1/2 flacon de 250 cc. : 20 fr.  
Sans impôt.

**Laboratoires L. ARQUEVAUX**   
Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

## **GLYKOLAÏNE ROBIN**

Association de la kola  
aux glycérophosphates.

**Granulé.**

**Dose et mode d'emploi :**

1 à 2 cuillerées à café par repas.

**Indications :**

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

**Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy  
PARIS.

---

**GMET****(Extraits Gmet.)**

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial Gimbert qui permet d'obtenir une *extraction complète sans altérer la plante.*

**Correspondent** tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Se prescrivent** tous : de 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas ou un peu avant.

Le Diurétique Gmet est prescrit par cuillerées à soupe.

Boldo, v. page 169	Kola.
Composé, v. page 275.	Piscidia.
Condurango, v. p. 280	Quinquina, v. p. 981.
Crataegus, v. p. 288.	Sauge.
Frêne.	Ulmaire.
Fucus.	Valériane, v. p. 1280.
Gui, v. page 529	Viburnum.
Hamamelis, v. p. 536.	Diurétique, v. p. 351.
Hydrastis.	Extrait Hamyd, v. page 423.
Jugland.	

Littérature sur chaque produit et échantillons sur demande adressée au :

**Laboratoire GMET**27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 43-10.

## GOBEROL

Poudre complètement soluble dans l'eau chaude et donnant une *solution oxygénée, alcaline, isotonique et analgésique.*

Perborate de soude, Métaborate de soude, Menthol.

*En poudre et comprimés.*

1 paquet ou 1 comprimé pour 2 litres d'eau (plus si cela est nécessaire).

**Affections gynécologiques :**

Prophylaxie, Obstétrique, Hygiène intime. Toilette, Leucorrhées.

En gargarismes : Toutes les Angines.

Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide.

**Alphonse CHARMAISON**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de l'Université de Paris,

26, avenue de Royat  
CLERMONT-FERRAND

## GOBILLETES HYPNOS

**Lutte contre le bruit.**

**Mode d'action.** — Obstruent le conduit auditif et permettent l'isolement des bruits extérieurs : sifflet et passage des trains, roulement et avertissement des automobiles, bruit des hôtels, passage des autobus, tramways, etc... Préviennent les effets funestes de notre vie trépidante et assourdissante sur le système nerveux.

**Indications.** — Assurent le repos des malades sans hypnotiques, suppriment tout bruit ; permettent de dormir malgré les vibrations sonores les plus intenses.

Indispensables aux nageurs, artilleurs, aviateurs, à tous ceux qui vivent au milieu du vacarme et sont exposés à la surdité.

**Laboratoires HYPNOS**

CHABEUIL (Drôme);

Téléph. 14.



## GOMENOL

**Nom et Marque déposés**

Essence provenant d'une variété sélectionnée  
de *Melaleuca viridiflora*.

**Propriétés.** — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

**Action thérapeutique et usages.** — Préconisé, à l'intérieur, comme balsamique et anticatarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'urétrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche : en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons ; en pansements vaginaux dans les métrites. — Le GOMENOLEO à 5 % est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme de GOMENOLEO, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fétide, tuberculose pulmonaire); en instillations intravésicales (cystites). Contre les infections généralisées, tendre à l'imprégnation goménolée.

**Laboratoire du GOMENOL**

48, rue des Petites-Ecuries — PARIS (X<sup>e</sup>).]

## GONACRINE

Chlorure de 3-6-di-amino-10-méthyl-acridinium (sel neutre).

Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

**Indications.** — Affections gonococciques et leurs complications, Septicémies, Fièvre ondulante (*M. Melitensis*).

**Posologie et mode d'emploi.** — Lavages de l'urètre ; solutions extemporanées de 1/8.000 à 1/1.000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à 2 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>),

## GONAGONE

Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté par les hôpitaux de Paris et de l'armée.  
Stock vaccin polymicrobien renfermant :  
Corps microbiens + Lysat microbien + *Anatoxine*.

**Indications.** — *Toutes les infections génito-urinaires de l'homme et de la femme.*

**Posologie.** — Une injection sous-cutanée tous les 3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. progressivement.

**Ovules au Gonagone pour pansements vaginaux (Modèle spécial pour enfants).**

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél. : Elysées 36-64 et 36-45.

## GONO-VACLYDUN ET GONARTHRI VACLYDUN

**Lysats vaccins du Docteur Duchon.**

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

### GONO-VACLYDUN

**Composition.** — Gonocoques, Entérocoques, Colibacilles, Streptocoques et Saphylocoques.

**Indications.** — Urétrites, Métrites. Complications de la blennorrhagie : Epididymite, Prostatite, etc.

**Posologie.** — En injections sous-cutanées, 3/4 de centicube le 1<sup>er</sup> jour, ensuite injections quotidiennes de 1 centicube jusqu'à 12 injections, puis 1 cc. tous les 2 jours.

**Présentation.** — En boîte de 6 ampoules de 1 centicube.

### GONARTHRI-VACLYDUN

**Lysat de gonocoques.**

Lysat vaccin riche en antigène, exclusivement destiné au traitement de toutes les formes du rhumatisme spécifiquement déterminé.

Prix : 25 francs.

**Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XXII<sup>e</sup>).

Tél. : Carnot 78-11.

**GOSIERINE DALLOZ**

Formule p. 100 :

Cocaïne.....	0,05
Menthol .....	0,40
Borate de soude.....	4,00

**Forme.**

Dragées.

**Propriétés.** — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

**Action.** — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

**Doses.** — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

La boîte : 6 fr. 25.

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de la Chapelle — PARIS.

---

## GOUTTES ANTISPASMODIQUES DAUSSE

A base de benzoate de benzyle et de Gelsémium.

X gouttes = 0 gr. 04 de Benzoate de Benzyle  
et II gouttes de gelsémium Dausse.

**Indications.** — Tous les états spasmodiques : *asthme vrai, coqueluche, hoquet persistant, affections spasmodiques du tube digestif, coliques utérines, vomissements de la grossesse, crises vasculaires des hypertendus.*

**Posologie.** — *Adultes* : XX à XL gouttes par prise, répétées, suivant les cas, 4 ou 5 fois par jour à prendre dans un peu d'eau sucrée ou de lait.

*Enfants* : X gouttes par jour et par année d'âge

## GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :

I milligramme de sulfate de strychnine ;

III gouttes d'acide phosphorique officinal ;

2 centigr. d'extrait de quina ;

2 centigr. d'extrait de Coca.

**Indications.** — *Asthénie, atonie nerveuse, neurasthénie, adynamie des convalescents, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.*

**Posologie.** — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

## GOUTTES ARSÉNOSTHÉNIQUES DAUSSE

Association de la Strychnine par voie gastrique à doses progressives avec le méthylarsinate de soude.

XX gouttes renferment :

Un milligramme de sulfate de strychnine ;

Cinq milligrammes de méthylarsinate de soude ;

Deux centigr. d'extrait de quina ;

Deux centigr. d'extrait de cola stabilisée.

**Indications.** — *Atonie nerveuse, asthénie, amaigrissement, neurasthénie, adynamie.*

**Posologie.** — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IVe).

## GOUTTES BLAGNY

### Composition :

Dionine.....	0,005
Codéine.....	0,005
Bromoforme.....	0,05
Eau laurier-cerise.....	0,05
Teinture aconit.....	0,10
Teinture Drosera.....	0,30

Pour 1 centimètre cube correspondant à L gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique pulmonaire, sédatif de la toux, anti-spasmodique, narcotique.

**Indications.** — Coqueluche, Asthme, Emphyseme, Grippe, Influenza, La Bacillose et toutes maladies des voies respiratoires.

**Mode d'emploi.** — A prendre dans une tasse de lait ou de tisane tiède. Bien agiter le mélange.

**Adultes :** XL à L gouttes à renouveler 4 à 5 fois par jour. Ne pas dépasser 6 fois par 24 heures.

**Enfants :** Ne pas en donner aux bébés.

X gouttes de 2 à 3 ans, XV gouttes de 3 à 5 ans, XX gouttes de 5 à 7 ans, XXX gouttes de 8 à 10 ans.

**Laboratoires René PAMELA**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, 22, rue de la République  
FORGES-LES-EAUX (Seine-Inf.).

## GOUTTES DAYNOC

(Fébrifuge antiseptique).

**Composition.** — Cent grammes contiennent :

Oxyde de méthylène.....	1 gr.
Huile essentielle d'ail naturelle.....	0 gr. 05
Para-Isopropylmétacrésol.....	0 gr. 10

**Indications.** — Utilisé pour l'usage interne et l'usage externe.

**1<sup>o</sup> Usage interne.** — Bronchites récentes et chroniques, Tuberculose, Coqueluche, Fièvre paludéenne (Malaria), Troubles gastro-intestinaux.

Les GOUTTES DAYNOC sont précieuses pour le traitement des gazés de guerre.

**2<sup>o</sup> Usage externe.** — Infections de la bouche et de la gorge, Maladies de la peau, piqûres, morsures.

**Doses moyennes.** — **Adultes :** XL à L gouttes 3 fois par jour.

**Enfants :** XV à XX gouttes 3 fois par jour.

**Nourrissons :** I goutte par mois d'âge 3 fois par jour

Prix : 21 fr. 20 (Impôt compris).

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142, rue de Plépus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré des galbules  
de cupressus sempervirens.

**Indications.** — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, *hémorroïdes*, varicocèles et des *troubles de la ménopause*.

**Dose moyenne.** — XXX gouttes avant chacun des deux principaux repas.

Prix au public : 10 francs.

**LETTRY**

69, rue de Sèvres — PARIS.

---

## GOUTTES ERYL

**Composition.** — Erysimum, Aconit Napel, Belladone, Euphorbe.

**Caractéristiques.** — Tolérance absolue, Effets rapides et surtout persistants. Pas d'accoutumance.

**Indications.** — Toux quinteuse, Coqueluche, Grippe, Adénopathie trachéo-bronchique, *Toux rebelles*.

**Mode d'emploi :**

*Adultes* : XL à LX gouttes dans un peu d'eau sucrée 5 à 6 fois par jour.

*Enfants* : XV à XXV gouttes dans un peu d'eau sucrée 3 à 4 fois par jour.

**Laboratoires J. BRESSIER**

**Docteur en Pharmacie**

102, rue Vincent — MARSEILLE.

## GOUTTES HALOGÈNES

Du docteur BERN.

Reminéralisation magnésienne intensive.

**XL gouttes** = 1 gr. 21 se.s halogènes de magnésium chimiquement purs et anhydres.

**Indications.** — Dépression physique et intellectuelle. Infection des voies intestinales et biliaires, Maladies de la peau, Verrues, Prophylaxie du Cancer.

**Posologie.** — XL gouttes dans 1/2 verre d'eau le matin avant le petit déjeuner, 1/2 dose pour les enfants.

Prix du flacon : 15 francs.

## OVULES HALOGÈNES

Du Docteur BERN.

Magnésiées et goménolées, ni toxiques, ni caustiques.

**Propriétés.** — Antiseptiques, décongestives, cicatrisantes et désodorisantes.

**Indications thérapeutiques.** — Métrites, leucorrhées et toutes infections ou ulcérations.

Prix : 18 francs, la boîte de 6.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE (Haute-Garonne).

## GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

**Composition.** — 25 gouttes renferment:

Extrait de Gui ..... 0,05

Nitrite de Soude..... 0,01

**Indications.** — Contre l'artériosclérose et l'hypertension artérielle.

### Formes :

1<sup>o</sup> *Gouttes*: 20 à 25 gouttes avant les repas.

2<sup>o</sup> *Ampoules* : 1 ampoule tous les 2 jours dans la partie musculaire.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## GOUTTES LECONTE

**Composition.** — Orthoformiate d'éthyle, Codéine, Teintures de Grindélia, Polygala, Aconit, Drosera, Belladone, Bryone.

**Indications.** — Toux spasmodiques, Gripes, Trachéites, Coqueluches.

### Posologie :

*Adultes* : LX gouttes 5 à 6 fois par jour.

16 à 20 ans : XLV à L gouttes 5 fois par jour.

12 à 16 — : XXV à XL — 4 — — —

6 à 12 — : XV à XXV — 4 — — —

2 à 5 — : X à XII — 3 — — —

Echantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

### Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreux — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Louvre 53-16.

## GOUTTES LIVONIENNES DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron de Norvège, de Créosote de Hêtre et de Baume de Tolu.

**Indications.** — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antiseptisme des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote. Médicament préventif et curatif.

**Doses et mode d'emploi.** — 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour *au milieu des repas*.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

Prix au public : 9 fr. 90.

### Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels,  
PARIS (XI<sup>e</sup>).



## GOUTTES MAGALO

**Composition.** — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 super-activé par un sel de manganèse.

**Mode d'action.** — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue; de goût agréable, bien supporté par l'estomac; la plus économique de toutes les préparations similaires.

**Indications.** — Affections du foie et de l'estomac, asthénies, verrues, cancer.

**Etablissements GOY**

23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GOUTTES MALONE

**Composition.** — Allylisopropylmalonylurée, dans un solvant hydroglycériné.

**Avantages.** — Calmant certain et rapide de toutes les toux. Véritable spécifique de la Coqueluche. Non toxique, même pour les nourrissons. Goût agréable.

**Indications.** — Coqueluche, toutes les toux.

### Posologie :

#### Doses minima :

*Nourrissons* : avant 6 mois, III gouttes toutes les 3 heures.

De 6 mois à 1 an : III gouttes toutes les 2 heures.

*Enfants* : de 1 à 2 ans : VI gouttes toutes les 2 heures.

— — 2 à 4 ans : IX — — —

— — 4 à 6 ans : XII — — —

— — 6 à 10 ans : XV — — —

*Adultes* : XX à XXX gouttes toutes les 2 heures.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Dans les bronchites, toux nocturnes, donner une petite expectorante dans la journée et le soir une seule dose massive de Gouttes Malone (XL à LXXX gouttes, XV à XL gouttes chez les enfants suivant les résultats obtenus).

**Laboratoires du MALONE**  
ANCENIS (Loire-Inférieure).

## GOUTTES NARKAY

**Composition.** — Ether de Kay, Narcéine, Bromoforme, Aconit, Belladone, Drosera, Grindélia.

**Indications thérapeutiques.** — Véritable spécifique de la coqueluche. Toux spasmodique et quinteuse, Asthme, Grippe, Hoquet persistant.

**Mode d'emploi.** — *Enfants* : au-dessous de 1 an : IV gouttes 2 fois par jour dans une cuillerée de sirop calmant.

De 1 à 2 ans : IV gouttes 3 fois par jour.

De 2 à 4 ans : V gouttes 4 fois par jour.

De 4 à 6 ans : VIII gouttes 4 fois par jour.

De 6 à 10 ans : X gouttes 4 fois par jour.

Au-dessus de 10 ans : XV gouttes 3 fois par jour.

*Adultes et Vieillards* : XV gouttes 4 fois par jour.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires SAUBA**

**MONTREUIL—PARIS**

---

# GOUTTES NICAN

(Sans sucre)

**Composition.** — Bromoforme et Codéine purs, Aconit Belladone, Drosera, Grindélia, Benzoate de Soude, Eau de Laurier-cerise.

(IV Gouttes = 1 goutte de Bromoforme stabilisé)

**Caractéristiques.** — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces de la toux spasmodique, ramenés par un procédé spécial à un très faible volume et parfaitement dissous. La présentation par gouttes permet la précision du dosage clinique et fractionné à tous les âges, assure la continuité du traitement, et garantit contre les accidents dus à l'insolubilité du bromoforme.

Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite.

**Indications thérapeutiques.** — Toux spasmodique et quinteuse en général ; Coqueluche, Grippe, Toux des Tuberculeux, Asthme, Toux laryngées, Adénopathie trachéo-bronchique, Coryza, toux rebelles. Hoquet persistant, Dysménorrhée, etc.

**Mode d'emploi.** — A absorber loin des repas dans une tasse de liquide tiède, eau, grog, ou lait (enfants) qu'on agitera en ajoutant les gouttes,

L'emploi, avec une tasse de lait tiède sucré, supprime en majeure partie le goût du bromoforme désagréable à certains malades.

*Doses moyennes par jour en 4 fois :*

*Adultes :* CCXL gouttes.

*Enfants :* XII gouttes par année d'âge.

Calme et repos immédiats, et dans les toux grippales, jugulation souvent en quelques heures.

*Dans la COQUELUCHE, doses fractionnées et croissantes.*

Médication permettant l'emploi du bromoforme chez les enfants en bas âge.

*Doses initiales :*

*Adultes :* CXX gouttes.

*Enfants :* VIII gouttes par année d'âge.

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

**N. B.** — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

*Échantillons et Littérature :*

**Laboratoires CANTIN**

**PALAISEAU (S.-et-O.)**

**SABOURIN - 51, rue Jean-Robie — BRUXELLES.**

## GOUTTES PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin).

### Composition :

Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de Thym, Grassette et Drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

### Propriétés :

Action élective spéciale due aux constituants des plantes entrant dans cette préparation.

### Indications :

A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

### Mode d'emploi :

On donne 2 à 3 fois par jour : aux *nourrissons* 1 à 5 gouttes, aux *enfants*, V à X gouttes de *Pilka*, et aux *adultes*, X à XXX gouttes dans un peu d'eau ou tisane.

### Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

# GRAINS CÉPHALGIFUGES AU JASMIN DE VIRGINIE CURATIFS DES NÉVRALGIES REBELLES

par  
médication synergique organo-végétale

## — COMPOSITION —

Poudre de racines de Gelsémium sempervirens.....	0 gr. 05
Poudre de racines d'Aconit napel.....	0 gr. 01
Poudre d'écorce de racines de Piscidia erythrina....	0 gr. 05
Extrait mou de Quinquina jaune.....	0 gr. 05
Cholestérine pure.....	0 gr. 01
Poudre de Foie.....	0 gr. 03
Poudre de Rate.....	0 gr. 02
Extrait mou de Colombo.....	0 gr. 01
Extrait mou de Gentiane.....	0 gr. 01
Extrait mou de Quassia amara.....	0 gr. 01
pour 1 pilule.	

Enrobage soluble dans l'eau et le suc gastrique  
N. B. — Le Gelsémium sempervirens ou Jasmin de Virginie, arbuste grimpant à fleurs jaunes, surtout employé en Amérique contre les névralgies, est la base des « Grains Céphalgifuges ».

## — INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

### MAL DE TÊTE

(céphalalgies céphalée, migraine)  
TOUTES NÉVRALGIES FACIALES

— Névralgies dentaires —

### TOUTES AUTRES NÉVRALGIES

(intercostales, sciatiques, utéro-ovariennes)

NERVOSISME

RHUMATISME

Fièvres intermittentes

## RARES CONTRE-INDICATIONS

### — MODE D'EMPLOI ET DOSES —

Les grains se prennent 1/2 heure avant les repas

### DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

ADULTES : 1 grain 1/2 heure avant chacun des 3 repas (matin, midi et soir).

ADOLESCENTS : 1 grain 1/2 heure avant chacun des 2 principaux repas.

ENFANTS (au-dessus de 7 ans) : 1 grain 1/2 heure avant le repas du soir.

tous les jours pendant 2 à 3 semaines consécutives

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du médecin.

## — PRIX DE VENTE IMPOSE —

**LE FLACON DE 60 GRAINS (Modèle unique) : 18 fr.**

**LABORATOIRE DU DOCTEUR L. DELALBRE**

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

### DÉPOT GÉNÉRAL

Service Commercial et Service Medical

**2, R. CLAUDE MATRAT - ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)**

G. R. LANG, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

**ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE**

## GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) ââ 0,025,

Belladone (extrait), 0,01

Bile 0,02 Erepsine 0,01, Entérokinase 0,01.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 grains au repas du soir.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de coliques, pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation, embarras gastrique ; les grains de Vals décongestionnent le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications.

Prix, le flacon de 30 grains : 4 fr. 50.

**Laboratoire H. NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## GRAINS D'ÉVIAN

Laxatif entéro-hépatique doux.

**Indications.** — Constipation chronique, Stase incipiens, accidents stercorémiques, Hépatisme.

**Composition.** — Extraits biliaires et intestinaux, Podophylline, Purgène, Belladone, Rhamnus frangula, Rhamnus purshiana.

**Propriétés thérapeutiques.** — Activent les fonctions hépatiques et pancréatiques, accroissent la biligenèse, provoquent une hypersécrétion intense de toutes les glandes intestinales. Ni coliques, ni irritation. Pas d'accoutumance. Laxatif sûr, très doux, atoxique, parfaitement toléré.

**Dose et mode d'emploi.** — Un ou deux grains au début du souper ou au coucher avec une tasse de thé.

Prix, la boîte : 6 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoires J. PERROCHON**

57, rue Origet — TOURS.

# LES GRANIONS

Diastases métalliques de synthèse

Procédé E. FOUARD, D<sup>r</sup> ès sciences.

**Propriétés essentiellement nouvelles.**

1° Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.

2° Suppression de la réaction du choc.

Communications

Académie des sciences, 7 février 1927

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926.

Granions			La boîte
<b>As</b>	Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrition, etc.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.	18 fr.
<b>Argent simple et double</b>	Infections générales locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	20 fr.
<b>Cuivre</b>	Cancer, angiocholites, cholécystites.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale.	18 fr.
<b>Bismuth</b>	Syphilis.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	20 fr.
<b>Mercure</b>	Syphilis.	id.	18 fr.
<b>Iode</b>	Hypertension, rhumatismes, syphilis, tuberculose, etc.	En ampoules de 2 cmc. pour infections, en solution pour voie buccale.	18 fr. 14 fr.
<b>Soufre</b>	Sciatique, humatismes.	En flacon : voie buccale.	25 fr.
<b>Or simple et double</b>	Tuberculose, infections générales, locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	25 fr.
<b>Osmium, Magnésium, Uranium</b>	Cancer	Ampoules de 2 cmc. injections intraveineuses, intramusculaires, voie buccale.	25 fr. 18 fr. 25 fr.

Littérature et échantillons sur demande :

**Laboratoires FOUARD**

61, rue G.-Lauriau — MONTREUIL (Seine)

**F. GAUTIER, pharmacien.**

Téléphone : Avron 01-42

## GRANOXYL

**Reconstituant bio-énergétique polyvalent.**

**Composition.** — Iode, Tanin, Glycéro de manganèse et de chaux, Phosphore végétal, Arséniate de Strychnine.

**Indications.** — Troubles de croissance. Fatigue de l'adolescence. Décalcification. Anémie. Convalescence.

### Deux Présentations :

Adultes : *Granoxyl Elixir*, 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Enfants : *Granoxyl Granulé*, 1 cuillerée à café avant chaque repas.

**Docteur MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

## GRANULÉ CARESMEL

Produit contenant le phosphore sous forme végétale, saturé de chaux et de magnésie, associé au carbonate de chaux fluoré et à l'oxyde de magnésium dans les proportions les plus aptes et les plus utiles à la formation du squelette et à la constitution de la cellule nerveuse.

**Propriétés thérapeutiques.** — D'une assimilation parfaite, stimulant des échanges nutritifs, c'est un puissant reconstituant et reminéralisateur indiqué dans tous les cas de faiblesse constitutionnelle, neurasthénie, névroses, etc., ou dans les maladies amenant l'épuisement : anémie, rachitisme, pré tuberculose, tuberculose, etc.

Doses : Adultes : 1 cuillerée à café à chaque repas.

Enfants : 1/2 — — —

Le flacon : 15 fr. Le 1/2 flacon : 8 fr. (sans impôt).

Echantillons :

**Laboratoires CARESMEL**

2, quai Paul-Bert — TOURS

Tél. : 19-42.



## GRANULÉ EDGÈS

**Laxatif, désensibilisant.**

**Composition.** — Hydrate de magnésie, lactose, citrate de soude, hyposulfite de magnésium.

**Forme.** — Granulé fondant, immédiatement soluble, d'un goût très agréable.

**Propriétés.** — Laxatif par tous ses éléments, désensibilisant par son hyposulfite de magnésium. Régularise à la longue les fonctions intestinales et hépatiques.

**Avantages.** — Facile et agréable à prendre. Action douce, toujours certaine. Ne provoque jamais de colique, pas plus que de congestion ou d'irritation hépatobiliaire.

**Indications.** — Constipation, Congestion du foie, Insuffisance biliaire, Entéro-colite, Manifestations anaphylactiques.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires STELVIA**

**Georges BLAQUE,**

Docteur en pharmacie.

Licencié ès Sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## GRANULES DE PANTOFORT

du Docteur BOVEIL

Composé formé des plus énergiques stimulants, destiné à favoriser l'assimilation, à combattre la déminéralisation, le surmenage, la déchéance organique du système nerveux, la dépression générale.

**Composition.** — Nucléinate de Manganèse, Sulfate de Strychnine, Quassine cristallisée, Arséniate de soude.

**Indications.** — Surmenage physique ou intellectuel, asthénie, épuisement nerveux, lymphatisme, neurasthénie, suite de grippe, convalescence, état pré-tuberculeux.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 6 granules par jour, 1 ou 2 avant chacun des 3 repas. *Enfants* : demi-dose.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. la boîte de 60 granules.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n<sup>o</sup> 346-3.

**Maro PARIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

## GRANULES DES VOSGES

**Composition.** — Aconit, Drosera, feuilles Belladone, Cte Thébaïque et Dionine.

**Indication.** — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

**Posologie.** — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

*Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.*

**Laboratoire G. BERNHARD**

11, rue Lafayette — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## GRAVIDOSTYL

**Sérum de jument gravide.**

**Indications.** — Vomissements de la grossesse. Enfants prématurés. Déficiences hormonales.

**Forme.** — Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules en ingestion ou en lavement.

Dans les cas graves : 2 ampoules en injection hypodermique.

**Laboratoires du Dr ROUSSEL**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## GUÉTHURAL

(Allophanate de Guéthol).

**Forme.** — Granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchites, Bronchorrhées, Catarrhes, Grippe, etc.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas, dans un peu d'eau, de tisane, ou croquées tout simplement.

**Laboratoires PÉPIN ET LÉBOUCQ**  
COURBEVOIE (Seine). Tél. : Défense 09-71.

---

## GUI BYLA

(Vaso-dilatateur, antislébreux,  
antihémorragique).

Contient l'alcaloïde, les saponines et l'inosite du gui.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hypotenseur par action centrale sur les vaso-dilatateurs. Dépresseur de l'excitabilité exagérée. Toni-cardiaque par action myocardique. Diurétique par action cardio-rénale.

**Indications.** — Artério-sclérose, hypertension, cardiopathies artérielles, albuminurie, néphro-sclérose, éclampsie, hémoptysies, hémorragies, ménorragies, épistaxis, migraines.

**Mode d'emploi.** — 3 cuillerées à café par jour.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## G U I G M E T

**Liquide sans alcool ni éther**

**Composition.** — Extrait *total* du viscum album sous forme liquide; mieux assimilable que les pilules. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Propriétés** — Régulateur cardiaque et artériel, Hypotenseur, Diurétique, Vaso-dilatateur.

**Indications.** — Hypertensions, Cardiopathies artérielles, Artério-sclérose, Anévrysmes, Hémoptysies, Hémorragies, Éclampsie (dans la grossesse fait baisser l'albuminurie).

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café, une ou deux fois par jour, entre les repas.

**Laboratoire G M E T**

27, Faubourg Montmartre. — PARIS (IX<sup>e</sup>)

---

## G U I M E L I N D E

(Gouttes hypotensives.)

**Composition.** — Extraits fluides de gui, d'aubépine, d'hamamélis et de marrons d'Inde associés au nitrite de soude.

**Propriétés.** — Hypotenseur, par action centrale sur les vaso-dilatateurs, action due au gui, à l'aubépine et au nitrite de soude rendu stable par un procédé spécial.

**Indications.** — Artériosclérose, Hypertension artérielle, Etats congestifs, Vertiges, Bourdonnements, Troubles de la circulation du sang. Toutes affections du système veineux, Phlébites, Varices, Hémorroïdes.

**Posologie.** — XX gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau, avant le repas. Ces XX gouttes contiennent 1 cgr. de nitrite de soude et correspondent à 0 gr. 10 de plantes sèches.

**Laboratoire de la G U I M E L I N D E**

**A. VERGER, Pharmacien**

ANCENIS (Loire-Inférieure).

## GUIPSINE

Principes utiles du Gui.

**Indications thérapeutiques.** — Véritable régulateur du travail du cœur et de la circulation générale, non vaso-constricteur.

**Médication hypotensive.** — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause (Spécifique). Néphro-sclérose, Prostatisme.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour (réservées aux cas d'urgence).

Prix de vente au public : 18 fr.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

## QUITOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

**Forme et dosage.** — Pilules dosées à 0 gr. 05.

**Posologie.** — 4 à 8 pilules par jour entre les repas.

**Indications.** — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

**Prix.** — L'étui de 60 pilules : 10 francs.

Échantillons et vente en gros :

**H. PERRIN-BRUNO**

4, rue Désirée — LYON

**J. MURARD, Pharmacien.**

## GUTTOLÉOL

Huile antiseptique à 2 p. 100, à base d'eucalyptol et de citron.

S'emploie facilement chez l'enfant, en raison de l'huile de citron, qui lui confère, outre ses propriétés antiseptiques, une odeur agréable.

**Indications.** — Rhinites, Adénoïdites, Coryzas, Grippe, Otites, Rhinopharyngites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

S'emploie en injections intratrachéales.

Nourrissons : II gouttes	} dans chaque narine 3 fois par jour.
Enfants : III à IV gouttes	
Adultes : V à VI gouttes	

Pulvérisations.

**Laboratoires MAIRE, pharmacien,**  
171, rue de Belleville. — PARIS.

---

## GYNÉCO VACLYDUN

**Lysat vaccin du Docteur DUCHON**

**Composition.** — Entérocoques, Diplocoques de NEISSER, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

**Indications.** — Infections communes des organes génito-urinaires, Métrites aiguës, Métrites chroniques, même anciennes, Complications annexielles ou péri-utérines.

**Posologie.** — En injections sous-cutanées quotidiennes de 1 cc. pour débiter, passer progressivement à la dose de 2 cc. Réduire à 2 cc. tous les 2 jours lorsque l'amélioration clinique sera très franche.

**Présentation.** — En boîte de 6 ampoules de 2 cc.

Prix : 25 francs.

**Laboratoire pharmaceutique CORBIERE**  
27, rue Desrenaudes — PARIS

## GYNERGÈNE « SANDOZ »

*Adopté par les Hôpitaux de Paris.*

**Composition.** — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée ( $C^{23} H^{35} N^5 O^6$ ), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle et principe actif spécifique. Produit pur, exactement dosable.

**Formes.** — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine pour injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1000, usage interne. — Comprimés : 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Gynergène Sandoz est le plus puissant des hémostatiques utérins et le sédatif du sympathique. Effets constants.

**Indications.** — Toutes hémorragies utérines. Atonie de l'utérus. Cancer utérin. — Les sympathicotoniques. Migraines, Basedow, Tachycardies, Hémoptysies.

**Posologie.** — 1/4 de cc. à 1 amp. par jour. XV à XXX gouttes ou 1 à 2 comprimés 2 fois par jour.

### PRODUITS SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

## GYNOCALCION

### Forme M.

Traitement rationnel des troubles de la Ménopause naturelle, chirurgicale ou radiothérapique chez la femme, de la sclérose-utérine.

### Forme P.

Traitement des accidents de la Puberté chez la jeune fille.

**Propriétés.** — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douleur ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques (extrait ovarien et orchitique).

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (lobe antérieur) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

**Doses.** — *Gynocalcion M.* — 10 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

*Gynocalcion P.* — 10 à 12 dragées par 24 heures en série de dix jours par mois.

Effets rapides. Tolérance parfaite.

Echantillons. Littérature :

**LABORATOIRES CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS

## GYNOESTRYL

### **Folliculine cristallisée du Docteur Roussel.**

Hormone sexuelle, sous sa forme cristallisée, chimiquement pure, strictement identique à la substance constituant l'étalon-type établi pour la définition de l'unité internationale.

L'unité internationale correspond à un dix-millième de milligr. de Folliculine cristallisée.

#### **Deux présentations :**

- 1° Boîte de 6 ampoules de 1 cc. contenant chacune, en solution huileuse, 0 mgr. 05 de Folliculine cristallisée, soit 500 unités internationales ;
- 2° Flacon de 10 cc. contenant en solution hydro-alcoolique, la Folliculine cristallisée à l'état de dihydro-folliculine, titrée à 1/10 de mmgr. pour 1 cc., soit 1.000 unités internationales.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les accidents de la vie sexuelle de la femme : troubles de la menstruation, de la puberté et de la ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhée, Syndrome adiposogénital ; Symptômes subjectifs, Vomissements de la grossesse. Traitement de l'hypotrophie, en particulier chez les prématurés.

**Posologie.** — Suivant les indications, une ampoule, soit tous les jours, soit tous les deux ou trois jours. Sauf au cours de la grossesse, le traitement doit être entrepris sept jours après la fin ou l'époque présumée des règles et interrompu sept jours avant la date d'apparition des règles suivantes.

Suivant les indications, XX à L gouttes par jour en plusieurs prises dans un demi-verre d'eau, loin des repas. Observer le même cycle que celui recommandé pour les injections.

Prix au public :

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Le flacon de 10 cc. : 18 francs.

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).



## HAMACITRO

### Médication vasculaire.

Trois composants à des doses thérapeutiques actives :

Citrate de soude..... 0 gr. 80

Acide (monosodique),

Neutre (Trisodique),

En proportions égales.

Hamamélis ..... 0 gr. 08

Marron d'Inde (stabilisé)..... 0 gr. 02

Par cuillerée à café de *granulé* sucré, facilement soluble  
(solution légèrement acide, aromatisée et très agréable  
au goût).

1 cuillerée à café dans un demi-verre d'eau 2 fois par jour  
(ou plus, suivant indications).

Stases veineuses, tous états congestifs, Phlébites, Arthri-  
tisme, Varices, Pneumonies, Hémorroïdes.

La boîte : 14 francs.

Laboratoire PHYTALIA

47, boulevard Saint-Michel — PARIS

## HAMAMÉLINE ROYA

Principe actif aromatique de

l'Hamamelis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en  
dilution convenable (20 cgr. p. cuil. à soupe)

l'Huile Essentielle aromatique, véritable prin-  
cipe actif de la plante, à l'exclusion de l'extrac-  
tif, inerte au point de vue vasculaire.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur, Tonique des  
fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant cir-  
culatoire.

**Indications.** — Toutes les dilatations, congestions  
et inflammations veineuses (Varices, varicocèles,  
hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes).  
Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dys-  
ménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

**Dose.** — Par cuill. à soupe, 2 à 4 par jour, aux  
repas ou en dehors des repas.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). — Lab. 08-00.

## **HAMAMÉLIODE**

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'Hamamelis Virginica.

**Indications.** — Maladies du système vasculaire,

Varices, Phlébite.

Hémorroïdes.

Troubles congestifs de la Ménopause.

Artério-sclérose.

**1° Gouttes concentrées :** de XXX à XL gouttes par 24 heures.

Prix : 12 fr. 75

**2° Élixir** (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

---

**Laboratoire OBERLIN**

**J. Tinardon,**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de la Faculté de Pharmacie de Paris  
17, rue Cadet — PARIS.

## HAMAMELIS GMET

### Composition :

Extrait total, liquide et sans alcool de l'hamamelis virginica, correspondant à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

### Propriétés :

L'absence d'alcool conserve à notre préparation toutes les propriétés décongestives de la feuille d'hamamelis, tandis que les préparations alcoolisées ont une activité restreinte. L'Hamamelis Gmet agit sur les fibres lisses de la paroi veineuse qu'il tonifie. (Plus actif que les cachets de poudre et les comprimés, peu actifs et indigestes.)

### Indications :

Toutes les dilatations et inflammations veineuses, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, conjonctivites, angines congestives, fibromes, prostatites, varicosités du nez et du visage. Accidents de la puberté, de la menstruation et de la ménopause. Vertiges, bourdonnements, bouffées de chaleur après les repas. Varices au cours de la grossesse, etc.

### Posologie :

1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant le repas, une ou deux fois par jour. Hémorragies (fibromes) une cuillerée à soupe trois fois par jour dans une tasse d'eau froide. Lavements. Applications locales. Gargarismes.

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## HAMAMELIS GRANDVAL

**Forme et Composition.** — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamelis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arome tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

**Indications.** — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorragies. — Œdème chronique. — Congestions, etc., etc.

**Dose.** — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient, pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 fr. — Le flacon : 11 fr.  
(Toutes pharmacies.)

**Laboratoires GRANDVAL**

12-14, rue Féry — REIMS.

---

## HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis.

**Indications.** — Syphilis, Paludisme.

**Formes.** — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

**Posologie.** — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours; ou XL gouttes par jour pendant les 4 premiers jours; ensuite LX ou LXXX pendant 15 jours.

*Enfants* : Moitié doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert  
à VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

## HECTINE

Spécifique de la Syphilis  
et succédané du cacodylate de soude.

**Indications.** — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie.

**Formes.** — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

**Posologie.** — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

*Enfants* : Moitié doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert  
à VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine)

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

EMMÉNAGOGUE-ANALGÉSIQUE COMPLET  
à effet polyvalent et immédiat.

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Methylnonylcétone, Folliculine et principes vaso-dilatateurs.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée, régulateur du flux sanguin.

**Indications et posologie.**

- 1° **DYSMENORRHEE** : 2 dragées dès l'apparition des douleurs ; une demi-heure après : deux autres. Maximum : 8.
- 2° **AMENORRHEE** et **MENOPAUSE** : 4 à 6 dragées par jour.
- 3° **COLIQUES POST-PARTUM** : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 8 fr.

Grand flacon de 30 dragées : 15 fr.

**Laboratoire SEVENET**

10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsénicale  
phosphorée-strychnique.

**Doses et mode d'emploi.** — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

**Propriétés thérapeutiques.** — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

*Tonique puissant, antiscrofuleux.*

**Eugène PETIT**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

---

## HÉMATOÉTHYROÏDINE

**Composition.** — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure.

**Forme.** — Liquide. Comprimés dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

**Indications.** — Goitre exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse, Insomnie, Hémophilie.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

**Laboratoire de Biologie appliquée**

**H. CARRION et Cie**

54, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie.**

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées.)

## HEMATO-IODINE

États lymphatiques et anémiques,  
Adénites chroniques.

La boîte de 36 cachets :

15 francs, prix public.

Le tube de granulés :

15 francs, prix public.

**Laboratoires STÉNÉ**

2, place des Vosges

PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HÉMAXOL

*Troubles nerveux dysménorrhéiques.*

*Etats congestifs et douloureux.*

**Action.** — Sur l'élément congestif utéro-ovarien :  
Hamamelis. — Vaso-moteur : Marron d'Inde.  
Sur l'élément douleur : Anémone.

**Indications.** — Règles douloureuses, Hemorragies  
utérines, Etats congestifs des Vieillards, Hémor-  
roïdes, Varices, Métrites et Ovarites.

**Formes.** — Elixir et comprimés-pastilles.

**Dose et Mode d'emploi :**

*Comprimés* : 4 à 8 comprimés-pastilles par jour  
avant les repas.

(Conforme aux prescriptions légales, l'Hémaxol  
peut être prescrite aux assurés sociaux.)

La flacon : 14 fr.

**Laboratoire JONIDS**

DIJON.

## HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du Pr E. Maragliano

**Composition.** — Sang de bœuf immunisé contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano ..... 25 p. 100  
 Alcool ..... 14 —  
 Glycérine ..... 10 —  
 Eau aromatique ..... 51 —

**Indications.** — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofule. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

**Formes et Posologie.** — *Simple* : adultes : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas). Enfants : une cuillerée à café quatre fois par jour (avant les repas.)

*Triple* : mêmes doses (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 20 francs.

**Echantillons et vente en gros : H. PERRIN-BRUNO**

4, rue Désirée — LYON.

MURARD, Pharmacien.

## HÉMOCALCINE

**Composition.** — A base d'extrait de foie intégral inaltérable et métaux ferments, associés à la magnésie et au calcium à l'état de glycérophosphates avec 1/2 mmgr. de strychnine, sans arséniaux intolérés, sans vitamines périssables.

**Propriétés thérapeutiques.** — Donne un pH favorable à la fixation phospho-minérale. N'entraîne pas de constipation.

**Indications.** — Anémie, Asthénie, Puberté, Déminéralisation, Dépressions nerveuses et toxiques.

**Formes et mode d'emploi.** — Petits cachets comprimés instantanément dissociés.

Un cachet avant le repas de 8 à 15 ans.

2 à 3 cachets (avant le repas) pour les adultes.

En cas de contre-indication, formuler : HEMOCALCINE sans strychnine.

Prix : 15 francs.

Ne contient pas de notice intérieure.

**Laboratoires FERCOCQ**

Licencié ès sciences

SAINT-MAUR (Seine).



## HÉMOCALCIOPECTINE

**L'Hémostatique rationnel.**

Solution antihémorragique de Pectine  
et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactysante.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

**Présentation.** — Ampoules buvables de 10 cc.  
Boîtes de 3 et 6 ampoules.

**Mode d'emploi.** — De 1 à 6 ampoules par 24 heures  
dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Dépôt général :

**Pharmacie J. ROBERT**

**J. BOUDIER, Successeur,**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

Tél. : Littré 64-53.

## HÉMO-CYTO-SÉRUM

**CORBIÈRE**

**Composition.** — Soluté de cacodylate de sodium  
chimiquement pur, fer et strychnine.

**Mode d'emploi.** — Une injection intramusculaire  
tous les jours ou tous les deux jours.

**Action.** — Multiplie les globules rouges, accroît  
la valeur globulaire.

**Indications.** — Anémies de toutes origines. Conva-  
lescences, Chlorose, Surmenage, Troubles de la  
croissance et de la puberté.

**Présentation.** — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes,  
12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 21 francs.

Hémo-Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 cen-  
ticubes.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires Pharmaceutiques**

**CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS. Tél. : Carnot 78-11.

## HEMODROME

(Berberis vulgaris, Thlaspi)

**Forme.** — Extrait fluide à prendre en gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action supérieure à l'hamamelis et similaires. Assimilation plus rapide sous sa forme liquide que les produits présentés en pilules ou comprimés.

**Indications.** — Varices, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause. Règles irrégulières, Phlébite.

**Posologie.** — XV à XX gouttes 3 ou 4 fois par jour dans un peu d'eau.

### LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS.

---

## HÉMODUCTYL

**Pilules ou Solution.**

Extraits d'hamamelis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

**Dose moyenne.** — 2 pilules, 1 cuillerée à café de solution, matin, midi et soir, avant les repas.

**Indications.** — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

**Laboratoires LICARDY**

38, boul. Bourdon — NEUILLY-PARIS

Téléphone : Maillot 17-75.

**HEMOFER**

(Cachets.)

**Reconstituant général.**

**Formules.** — Nucléinate de manganèse,  
 Protoxalate de fer, Surrénine, Phosphure  
 de zinc, Arrhéнал, Hémoglobine, associés  
 aux sels de chaux et aux amers.

**Indications.** — Anémie, Amaigrissement,  
 Grossesse, Allaitement, États pré-  
 tuberculeux, Manque d'appétit.

Enregistré au Laboratoire National de  
 Contrôle des Médicaments sous le N° 653-1.

**Laboratoire LOBRY**6, rue Parrot — PARIS (XII<sup>e</sup>).**HÉMOFLUIDOL**

(Dragées)

**Fluidifie le sang.**

Chaque dragée contient :

Silicate de soude..... 0 gr. 05

Citrate de soude .... 0 gr. 15

**Artériosclérose****Hypertension****Troubles circulatoires**

Deux dragées matin et soir avant le repas

**Laboratoire LÉONARDON**

Docteur en Pharmacie, Arcachon.

Dépositaire général : O. C. P. Paris

## HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

**Formes.** — Ampoules d'Hémogénol contenant 10 cc. de sérum liquide.

*Sirop d'Hémogénol* à base de sérum hémopoïétique.

*Dragées d'Hémogénol* contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

**Indications.** — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique recommandé dans les affections hémorragiques et l'hémophilie.

**Mode d'emploi.** — Ampoules d'Hémogénol. — 1 à 3 ampoules par jour prises par la bouche dans un peu d'eau sucrée ou en lavements.

*Dragées d'Hémogénol.* — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

*Sirop d'Hémogénol.* — *Enfants* : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — *Adultes* : 3 cuillerées à soupe par jour.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HÉMOGÉNYL GODART

**Médication** Opothérapique, Hématomusculaire, Polyglycérophosphatée.

**Indications.** — Toutes les anémies, quelles qu'en soient la cause et la nature. Toutes les affections pulmonaires.

**Action.** — Hématopoïétique, Tonique par excellence (Nitrate de strychnine), Recalcifiant.

**Formule.** — Chaque cuillerée à soupe contient :

Oxyhémoglobine, 1 gr. — Suc Hématomusculaire, 2 gr. — Glycérophosphates composés (*de Soude, Potasse, de Chaux et de Magnésie, ensemble 750 mgr.*). — Citrate de Fer et de Quinine, 100 mgr. — Caféine, 15 mgr. — Nitrate de Strychnine, 1 mgr. — Sirop d'écorce d'orange et de citron.

**Posologie.** — Sirop, agréable à prendre, après les repas. Pas de contre-indication.

*Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 2 à 3 — à dessert par jour.

Prix : 19,50 fr. belges le flacon.

Littérature et échantillons :

Laboratoire de la Meuse, **ANDENNE** (Belgique)  
**LEON GODART, Pharmacien.**

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

**Nature.** — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1° Une hémoglobine vivante, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3° Les substances minimales du plasma (Hémo-poïétines, cytopoïétines) non altérées.

Ces éléments sont incorporés à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où leur vitalité persiste.

### Action :

- 1° Apport d'hémoglobine vivante (fer globulaire).
- 2° Stimulation prudente des organes hémapoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Puissante action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

### Indications :

Anémies.  
Chlorose.  
Déchéances organiques.  
Tuberculose.  
Convalescences.  
Grossesses.  
Suites de couches.  
Paludisme.

**Posologie.** — Une cuillerée à potage au début ou à la fin des 2 principaux repas.

Doubler dans les cas graves.

Pas de contre-indications.

Littérature et échantillons :

**DESCHIENS**

Docteur en Pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## HÉMOLUOL

**Phytothérapie toni-veineuse.**

**Composition.** — Éléments activés par synergie, Thlaspi (capsella Bursa Pastoris), Berberis, Hamamélis, Quinquina, Viburnum prunifolium, Anémone pulsatilla.

Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives, en un élixir agréable à prendre.

Décongestif, tonique, stimulant des vaso-moteurs centraux. Analgésique et sédatif de l'appareil utéro-ovarien.

**Indication.** — Troubles des fonctions menstruelles. Aménorrhée, dysménorrhée douloureuse, ménopause naturelle et opératoire.

**Insuffisances veineuses.** Varices, hémorroïdes, Phlébites, etc.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, 15 jours par mois.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires Docteur H. FERRE**

6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## HÉMOPANBILINE

**Forme.** — Comprimés et Solution.

**Définition.** — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoïétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoïdes, source de mécomptes.

**Composition.** — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Cholagogues) *Extrait hémopoïétique de Foie*. Hémo-globine et Citrate de fer ammoniacal.

**Indications.** — Médication hépatique des *Anémies, Chlorose, Convalescence, Etats de déchéance, Ictère hémolytique*.

**Dose.** — 2 à 4 cuillerées à café, ou 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre avant les repas.

*Enfants* : demi-dose.

Prix au public :

17 francs le flacon d'*Hémopanbiline* liquide  
17 fr. la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

---

Laboratoire du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

## HEMOPAUSINE

**Composition.** — Liqueur à base de : Hydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Cinéraria, Sels de chaux, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

**Action.** — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

**Indications.** — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

**Laboratoire de l'HÉMOPAUSINE**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

## HÉMOPECTAL

(Médication antihémorragique)

**Forme pharmaceutique et composition.** — Boîte de 3 flacons ampoules de formule :

Solution de pectine fraîche et stabilisée à 2 p. 100.....		10
Chlorhydrophosphate de calcium.....		0,50
Solution titrée de genêt.....		0,20

(Pour 1 ampoule.)

**Avantages.** — Produit très actif, s'employant par voie buccale; pas de contre-indication, pas de toxicité même pour le très jeune enfant, *pas d'accidents sériques, pas désagréable à absorber.*

**Indications thérapeutiques.** — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre *préventif avant et après* toute intervention sanglante.

**Mode d'emploi.** — 3 (*enfants*) à 6 (*adolescents et adultes*) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

**Prescription.** — 1 boîte-ampoules Hémopectal Falvy.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## HÉMO-PHAGOSTYL

**Phagostyl ferrugineux**  
(pour adultes).

### Formule :

Cacodylate de soude pur.....	20 centigr.
— de magnésie .....	10 —
Sulfate de strychnine .....	2 milligr.
Fer colloïdal.....	2 centigr.
Soluté chloruré isotonique .....	5 cc.

### Indications :

Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie,  
Troubles de la puberté, Douleurs périodiques,  
Surmenage, Convalescences, Leucémies.

### Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée  
tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de  
la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**  
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## HÉMOPHILINE PLANCHE

### Elixir et Dragées.

**Composition.** — Elixir, à base de piscidia, hydrastis, Hamamelis,  
viburnum, persil, séneçon, salsepareille spéciale.

Dragées, mêmes plantes fraîches stabilisées sous forme d'extraits obtenus  
dans le vide.

Tous deux contiennent en plus le catalyseur général de la femme  
(détecté par analyse vibratoire), ce qui en augmente l'activité et en  
décuple l'efficacité.

**Indications.** — Formation de la jeune fille, de la femme mal réglée,  
malaises précédant ou accompagnant les époques, régulateur du  
flux menstruel trop ou pas assez abondant dont il calme les douleurs;  
aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie, troubles généraux de la  
ménopause.

**Modes d'emploi.** — *Elixir* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un  
peu d'eau.

*Dragées* : 12 à 16 par jour, pendant la durée des règles.

Prix : 14 francs, impôt compris.

**Laboratoire PLANCHE**  
Membre de l'Académie de Médecine

**P. SAUVAGE, successeur**  
2, rue Volney — PARIS (II<sup>e</sup>).

# HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques quelle qu'en soit l'origine.

**Constitution.** — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'animaux réfractaires à la tuberculose contient : Hémoglobine dont l'activité oxydasique est maxima, sérum sanguin, lipoides des globules rouges, lipoides et ferments des leucocytes.

**Indications.** — Toutes anémies:

- 1° Toxiques d'origine exogène ou endogène ;
- 2° Infectieuses (convalescences, tuberculose) ;
- 3° Par spoliation sanguine (hémorragies) ;
- 4° Par cachexie néo-plasique.

**Doses courantes.** — L'Hémoplasme Lumière peut être administrée par voie buccale, sous forme de granulés, de cachets et de dragées.

Granulés.....	de 2 à 6 cuil. à café par jour ;
Cachets.....	de 4 à 6 par jour.
Dragées.....	de 6 à 10 —

Chez les enfants employer de préférence la forme en granulés : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

**Ampoules.** — Pour l'administration par voie intramusculaire

*Adultes* : 2 ou 3 ampoules de 10 cc. par semaine ;

*Enfants* : 2 à 10 cc. deux fois par semaine.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

## HÉMOPLASME du Docteur Morelli.

**Sirop.**

**Zomothérapie.** Opothérapie hématique et méthode de Whipple combinée.

**Indications.** — Anémies pernicieuses et symptomatiques graves, convalescences, surmenages, tuberculose, hémorragies, chlorose, grossesses et toutes déficiences.

**Composition.** — Oxyhémoglobine totale, plasma musculaire de bœuf total, sérum hémopoïétique de foie de veau frais, glycérophosphate de soude, glycérine, sirop, essences aromatiques.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à bouche par jour ; *enfants* : par cuillerées à dessert.

**Laboratoire VAN LIER**

30, rue St-Jacques — NAMUR (Belgique).

## HÉMORROÏDINE GOUTTES

**Composition.** — Hamamelis, hydrastis, intrait de marrons d'Inde.

**Propriétés.** — Régulateur de l'insuffisance veineuse et de ses conséquences.

**Indications.** — « L'Hémorroïdine gouttes » est une préparation rationnelle applicable au traitement des hémorroïdes, avant tout, mais dont peuvent bénéficier d'autres manifestations veineuses, à savoir : *varices, varicocèles, ulcères variqueux, œdèmes phlébitiques.*

**Mode d'emploi.** — Quinze gouttes matin, midi et soir, avant les repas, dans un peu d'eau.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires KERFYSER**  
**DUNKERQUE**

---

## HÉMORROÏDINE POMMADE

**Composition.** — Adrénaline, scuroforme, intrait de marrons d'Inde, carbonate de plomb.

**Propriétés.** — Spécifique par excellence des hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal, fistules.

**Indications.** — Arrête les hémorragies, calme les douleurs, décongestionne.

**Mode d'emploi.** — Pour les hémorroïdes externes : faire une application de la pommade matin et soir et après les garde-robes.

Pour les hémorroïdes internes : adapter la canule au tube. Ce dispositif permet l'application profonde et étendue de la pommade. Après usage, la canule en ébonite sera facilement stérilisée dans l'eau bouillante.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires KERFYSER**  
**DUNKERQUE.**

## HÉMORROÏDINE SUPPOSITOIRES

**Composition.** — Adrénaline-scufoforme-intrait de marron d'Inde stabilisé, carbonate de plomb.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionnants, analgésiques, calmants.

**Indications.** — Hémorroïdes internes, fissures, prurit anal, fistules.

**Mode d'emploi.** — Introduire un ou deux suppositoires par jour, soit le matin au lever, soit le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires KERFYSER**  
DUNKERQUE.

## HÉAMOSAMINE (Utéramine)

**Composition.** — Solution au centième de chlorhydrate de para-oxyphtényléthylamine présentée en ampoules de 1 cc., pour injections, et en flacons de 10 cc. pour l'usage interne.

**Propriétés.** — *Excellent hémostatique, cardio-tonique et bon excitant de l'utérus.* Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

**Indications.** — *Obstétrique et gynécologie.* Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.

**Médecine interne.** Hémophilie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

**Mode d'emploi.** — On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscle fessier), 1 à 3 cc. et jusqu'à 5 cc. selon les cas. Pour l'usage interne 20 à 30 gouttes, trois fois par jour.

Pour l'usage externe : En tampons ou pansements imbibés de solution pure ou diluée au 1/5 avec de l'eau stérilisée ou bouillie.

**Laboratoire ZYMA**  
4, rue Bellart — PARIS (XV°).

## HÉMOSTATIQUE GOY

### Formule :

Extrait fluide de seigle ergoté .....	4
Chlorure de calcium pur .....	8
Acide citrique .....	0 50
Sirop d'orties grièche .....	20
Excipient .....	67 50

**Indications.** — Epistaxis, Hématémèse, Hémoptysies, Métrorragies.

Toutes hémorragies (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

**Avantage.** — La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est complètement masquée par l'excipient spécial.

**Mode d'emploi.** — Deux cuillerées à café toutes les heures.

### Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE

Traitement des troubles du Métabolisme calcique et des Avitaminoses D.

**Composition.** — Ergostérine irradiée (dosée à 15 000 unités Standard internationales par centigramme), Hémoglobine, sels de chaux, de fer, de manganèse, de fluor.

Soumise à un triple contrôle : chimique, spectrophotométrique et physiologique, l'HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE donne toute garantie au point de vue de l'activité de son irradiation et de sa conservation (pratiquement illimitée). Innocuité absolue.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant facteur de reconstitution du taux du calcium et du phosphore sanguins, recalcifant osseux, antirachitique, fortifiant, reconstituant globulaire, antianémique.

**Indications.** — Rachitisme infantile, ostéomalacie, fractures, tétanie, caries dentaires, retard de la dentition, décalcification (grossesse, allaitement, tuberculose et pré-tuberculose).

**Posologie et mode d'emploi.** — *Enfants* : Au-dessous d'un an : une demi-cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 1 à 3 ans : une cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 3 à 8 ans : deux cuillerées à café, soit en nature, soit délayées.

De 8 à 12 ans : trois cuillerées à café par jour.

*Adultes* : Deux cuillerées à soupe par jour, de préférence au moment des repas.

**Laborat. de Thérapeut. expérimentale médico-pharmaceut.**  
366, avenue Thiers — BORDEAUX

## HÉMOSTRA " ROCHE "

Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves par supplémentation de l'organisme en acides aminés hématogènes.

### Composition :

Solution isotonique, neutre et stérilisée de Tryptophane et d'Histidine en *ampoules de 5 cc.* (0 gr. 10 tryptophane et 0 gr. 20 histidine) et en *ampoules de 2,5 cc.* (0 gr. 05 tryptophane et 0 gr. 10 histidine).

### Propriétés :

Apporte directement à l'organisme, en proportions rationnellement dosées, les principes actifs du foie et réactive immédiatement et d'une façon considérable les processus de l'hématopoïèse.

### Avantages :

Ne provoque pas de dégoût chez le malade ; évite l'action destructrice de la flore intestinale et permet de poursuivre le traitement aussi longtemps qu'il est nécessaire.

1 ampoule de 5 cc. équivaut, par ses effets, à plusieurs centaines de grammes de foie de veau.

### Indications :

Toutes les anémies graves : Biermériennes, leucémiques, néoplasiques, etc. Tous les états de déficience organique : Convalescences difficiles, Inappétence, Maladies consomptives, même chez les enfants, les femmes enceintes et les nourrices.

### Mode d'emploi et doses :

1 ampoule de 5 cc. ou de 2,5 cc. suivant les cas, tous les jours par voie sous-cutanée ou intramusculaire rigoureusement indolore. Aucune toxicité ; pas de contre-indication. On peut, dès le début, vérifier l'activité de cette préparation par une numération globulaire.

Produits **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.**  
10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HÉMOSTYL

Sérum frais, hémopoïétique de cheval.

### Action :

1° Hémopoïétique spécifique (prof. Carnot, Acad. de Sciences, 1906) ; 2° Hémostatique ; 3° Hyperleucotaire général et local.

### Formes pharmaceutiques :

1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. ; 2° Flacon de 300 gr. de sirop de sang hémopoïétique total ; 3° Boîte de six ovules (usage gynécologique).

### Indications et Posologie :

Toutes les *Anémies*, quelle qu'en soit la nature. Convalescences, Tuberculose, Paludisme, suites opératoires et obstétric. 1 à 2 flacons-ampoules par jour en ingestion ou lavement ou 2-3 cuillerées à potage de sirop.

*Syndromes toxi-hémorragiques*, hémophilie.

*Hémorragies* (hémoptysies, entérorragies, métrorragies etc...). Plaies saignantes. Cas graves : inject. de 30 cc de sérum. Autres cas : ingest. ou mieux lavement de 3 flacons-ampoules. Application locale.

*Enfants* : demi-dose.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires du Dr ROUSSEL**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## HÉMOTAL

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

**Indications.** — Spécifique des maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, tuberculose, surmenage, débilité générale, croissance.

**Posologie.** — *Adultes.* — Laisser fondre dans la bouche 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

*Enfants* : 1 cuillerée par repas.

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS.

# HEMOVIRIS

Cachets.

## Composition par cachet.

Noix vomique pulvérisée .....	0 gr. 05
Protoxalate de fer.....	0 gr. 05
Dioxyde de manganèse.....	9 gr. 05
Oxyde de magnésium lourd.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de calcium.....	0 gr. 25
Cola pulvérisé.....	0 gr. 05
Quinquina rouge pulvérisé.....	0 gr. 10
Colombo pulvérisé.....	0 gr. 10
Condurango pulvérisé.....	0 gr. 10
Cascara sagrada pulvérisé.....	0 gr. 05
Bourdainé pulvérisé.....	0 gr. 05
Boldo pulvérisé.....	0 gr. 05
Pancréatine.....	0 gr. 05

**Indications.** — Surmenage intellectuel et physique — Inappétence — Asthénies. — Dépressions morale et physique — Déminéralisation — Phosphaturie — Anémie — Chlorose — Faiblesse de constitution — Rachitisme — Cachexie, Tuberculoses (pulmonaire, osseuse ou ganglionnaire) Impuissance.

**Posologie.** — 1 à 3 cachets par jour au début des repas.

Prix : 15 fr. la boîte de 30 cachets.

Laboratoires de l'**PULMACETYL** et du **SPICANOL**

54, rue de Sablonville, 1, rue de l'Ouest. — NEUILLY-PARIS

**G. DURAND, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,

Ex-pharmacien de l'Hôpital Maritime de Berck

# HEMOVIRIS

Elixir

## Composition centesimale.

Méthylarsinate de sodium.....	0 gr. 125
Acide nucléinique.....	0 gr. 350
Phosphate monoacide de sodium.....	0 gr. 350
Teinture d'aloès .....	0 gr. 020
Teinture de noix vomique.....	1 gr.
Teinture de cola .....	2 gr.
Alcool éthylique pur à 90°.....	12 gr. 500
Excipient aromatisé.....	Q. S. pour 100 cc3

**Indications.** — Convalescence des opérés, de la grippe et de toutes les maladies infectieuses — Surmenage intellectuel et physique — Inappétence — Asthénies — Dépression morale et physique — Faiblesse de constitution — Rachitisme — Scrofule — Anémie — Cachexie — Tuberculose (pulmonaire, osseuse ou ganglionnaire) — Paludisme — Impuissance.

## Posologie :

**Adultes :** 2 à 3 cuillers à soupe par jour, 5 à 10 minutes avant les repas, pur, additionné d'eau ou de vin généreux.

**Enfants de 10 à 16 ans :** 2 à 3 cuillers à dessert par jour.

**Enfants de 5 à 10 ans :** 1 à 3 cuillers à café par jour.

Prix : 15 fr. le flacon de 250 cent. cub.

Laboratoire de l'**PULMACETYL** et du **SPICANOL**

54, rue de Sablonville, 1 rue de l'Ouest — NEUILLY-PARIS

**G. DURAND Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

Ex-pharmacien de l'Hôpital Maritime de Berck.



## HÈMYPNAL CIBA

**Analgésique pelvien.**

**Trichloro-butylalcool-diallylmalonylurate d'éthyl-morphine.** Analgésique particulièrement propre à atténuer les douleurs de l'accouchement, sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant. Utilisable également dans toutes les petites interventions gynécologiques ou urologiques.

*Cachets, Suppositoires, Ampoules.*

**Indications.** — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine). Curettages, cystoscopies. Cathétérismes, prostatectomies. Dysménorrhée.

**Doses.** — Pour un accouchement : 2 à 4 suppositoires, 1 à 3 ampoules. Interventions : 1 à 2 cachets ou suppositoires dans l'heure qui précède ; 2 à 4 suppositoires par 24 heures après l'opération. Chez les dysménorrhéiques 1 à 3 suppositoires par jour.

Le tube de 10 cachets.	} 20 francs.
La boîte de 4 suppositoires.	
La boîte de 4 ampoules.	

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## HEPANÈME

**Composition.** — Extrait de foie très concentré (méthode de Whipple) associé au Protosalate de fer et au Phosphate de soude.

**Forme.** — *Comprimés seulement.*

**Indications.** — Recommandé pour le traitement des anémies ordinaires.

**Mode d'emploi.** — *Enfants* : 2 comprimés par jour aux repas.

*Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 20 francs.

**Laboratoire de Biologie appliquée**

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>,**

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**V. Borrien, Docteur en Pharmacie.**

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées.)

## HEPAPHOS

Reconstituant général.

**Composition et forme.** — Granulé fondant à base de : Extrait de Foie, Protoxalate de fer, Phosphore végétal, Vitamines.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant âge et indications du médecin.

**Indications thérapeutiques.** — Anémies légères, Convalescences, Troubles de croissance, Surmenage, Déminéralisation.

*Aucune contre-indication.*

Prix : 20 francs (traitement d'une semaine).  
Si Anémies graves, prescrire HEPATROL.

**Laboratoires Albert ROLLAND**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## HÉPARBILINE

(Cholagogue complet.)

**Forme.** — Granulé soluble et aromatisé.

**Composition.** — Sulfate de magnésie, Peptone (agissant sur l'excrétion biliaire). Bile, Boldo (agissant sur la sécrétion biliaire).

**Propriétés thérapeutiques.** — Cholagogue complet, efficace, à base de substances cholécysto-kinétiques et cholérétiques. Agit sur l'excrétion et la sécrétion biliaire.

**Indications.** — Toutes les affections du foie et des voies biliaires (ictère, cholécystites, lithiase biliaire, engorgement du foie et de la vésicule biliaire). Inappétence, migraine, urticaire, affections dermatologiques, certaines formes d'asthme, fatigue générale, etc.

**Posologie.** — Le matin à jeun, 1/2 h. avant de manger, deux cuillerées à café dans un verre d'eau tiède.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

## HEPARFER

### Comprimés.

#### Composition :

Carbonate ferreux.....	0,05
Sulfate de cuivre.....	0,0005
Poudre de foie Pellissier..	0,15
Poudre d'estomac Pellissier	0,10

**Action.** — Anti-anémique par sa poudre de foie Pellissier (méthode de Whipple), son action est renforcée par la poudre d'estomac Pellissier, le carbonate de fer qui exalte le traitement hépatothérapique (Mauret-Greengard) et le sulfate de cuivre à très faible dose qui, par son action catalytique, provoque l'utilisation maxima du sel ferrugineux.

**Indications.** — Anémie de croissance, Anémie fébrile, Anémie splénique, post-hémorragique et toxique, Anémie infantile et chloro-anémie, Anémie secondaire des cancéreux, des tuberculeux, etc., Anémie des paludéens.

**Posologie.** — Deux à trois dragées avant chaque repas.

Prix : La boîte, 18 francs.

Littérature et échantillons :

**Laboratoire PELLISSIER**

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Wagram 14-59.

## HÉPARMONE

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

Traitement des Anémies (méthode de Whipple).

**Composition.** — Hormone hépatique purifiée, présentée :

1° En ampoules *ingérables* de 10 cc. (boîtes de 6), chaque ampoule correspondant à l'activité de 125 gr. de foie frais de veau.

Pour les *enfants* : ampoules de 2 cc. = 25 gr. de foie frais de veau (boîtes de 12).

2° En ampoules *injectables* de 2 cc. (boîtes de 6) chaque ampoule représentant 60 gr. de foie frais de veau.

**Indications thérapeutiques.** — L'HEPARMONE est le médicament spécifique de toutes les anémies.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 ampoules *ingérables* par jour, dans une demi-tasse de bouillon tiède ou d'eau tiède, 1/2 heure avant le repas, ou bien 1 à 2 ampoules *injectables* par jour, en injection intramusculaire.

*Enfants* : 3 à 5 ampoules *ingérables* par jour, ou bien 1 ampoule *injectable*.

**Les Etablissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## HÉPATERGOL

**Ampoules buvables.**

**Indications thérapeutiques.** — Anémies, déficiences organiques, pré-tuberculoses, Rachitisme, Carences.

**Formule.** — Chaque ampoule correspond à 100 gr. de foie frais et 32 gr. de rate.

**Posologie.** — Une à deux ampoules par jour dans un peu d'eau.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 882-4.

**Laboratoire COUSIN**

rue Albert-1<sup>er</sup>

BEAUMONT-SUR-OISE

## HEPATHEMO

### DESCHIENS

**Méthode de Whipple — Technique de Minot et Murphy.**

Traitement des anémies par le foie de veau frais associé au fer globulaire (technique de Minot et Murphy).

**Nature.** — *L'Hépathemo* est constitué : 1° Par un extrait de foie de veau hydrosoluble préparé à froid sans traumatisme et contenant physiologiquement intact le principe anti-anémique du foie.

2° Les substances minimales (hémopoïétines) sériques et globulaires.

3° Une proportion rigoureusement déterminée de fer globulaire.

**Action.** — 1° Action spécifique du principe anti-anémique du foie de veau frais.

2° Action stimulante sur les organes hémopoïétiques.

3° Action réparatrice par apport de fer globulaire.

**Indications.** — Anémies pernicieuses. Anémies symptomatiques graves.

**Formes.** — *Hépathemo* ampoules ingérables de 10 cc. correspondant à 125 gr. de foie frais.

*Hépathemo* sirop.

**Posologie :**

**Ampoules :** 2 à 3 ampoules par jour. **Sirop :** 2 à 8 cuillerées par jour.

Pas de contre-indications.

**DESCHIENS, Docteur en Pharmacie**

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## HEPATIC EFA

du Docteur Lecacheux.

**Traitement phytothérapique des maladies du foie.**

**Composition.** — Elixir végétal, composé uniquement d'extraits non alcooliques de plantes fraîches.

**Indications.** — Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Cirrhoses, Auto-intoxications, Dermatoses.

**Présentation.** — Boîte contenant 12 cachets et 12 ampoules buvables de 5 cc.

**Mode d'emploi.** — Prendre 1 cachet le matin à jeun dans un peu d'eau et un quart d'heure après prendre le contenu d'une ampoule dans 1/4 de verre d'eau.

**Laboratoire HEPATIC EFA**

16, rue du Château — CARENTAN (Manche).

## HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire en ovoïdes glutinisés.

**Dose.** — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas, avec un demi-verre d'eau, ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

**Propriétés.** — L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal, dans la Constipation, l'Entérocélite et toutes les affections du foie.

Admis aux Assurances Sociales.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86.

(Précéd. : 8 rue de la Source. — PARIS)

## HÉPATODIASE

### Composition :

Opothérapie gastro-intestinale associée aux ferments. En comprimés dragéifiés à base de diastase, pepsine, duodénum, orchitine, chlorure de magnésium, bromure de calcium et noix vomique.

### Indications :

Traitement rationnel de toutes les affections du tube digestif. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, aérophagie. Décongestif du foie.

### Posologie :

Deux comprimés après chaque repas.

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14 rue, Demarquay — PARIS.

# HÉPATOFORMINE

En granulé seulement.

Stimulant énergétique de l'activité hépatique et rénale.

Antiseptique puissant des voies biliaires intestinales et rénales.

Pouvoir adsorbant et absorbant considérable.

**Cholérétique** : active le Foie.

**Cholagogue** : draine la Bile.

**Diurétique** : augmente la Diurèse.

Une seule formule :

Charbon animal et végétal, Benzo-naphtol, Formine (Hexaméthylène tétramine), Sucre granulé anisé.

**Alphonse CHARMAISON**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de l'Université de Paris.

26, avenue de Royat — CLERMONT-FERRAND

# HÉPATO-MANGANOL

Composition :

Extrait de noyer .....	0,10
Extrait de boldo .....	0,01
Extrait biliaire .....	0,025
Bioxyde de manganèse .....	0,05
Arséniate de soude.....	0,005

**Propriétés.** — Régularise la fonction glycogénique par l'extrait de noyer. Stimule la cellule hépatique et l'excrétion biliaire par le boldo et l'extrait biliaire. Favorise le métabolisme des hydrates de carbone par le bioxyde de manganèse. Tonique général par l'arséniate de soude.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, Lithiase, Obésité, Glycosurie hépatique, Hépatisme tropical, Hépatomégalie des gros mangroliers et des buveurs, Constipation par insuffisance biliaire, etc.

**Présentation.** — Tube de 75 pilules : 13 fra-

**Posologie.** — 4 à 12 pilules par jour aux rep-

**Laboratoires L. LEGRAND**

11, place Louis-XII — BLOIS (Loir-et-Cher)

## HÉPATOSODINE

**Médication** alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'hexaméthylène tétramine. Syndrome hépato-entéro-rénal.

**Action.** — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

**Indications.** — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes, Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

**Doses.** — *Avant une opération* : Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les 8 jours qui précèdent l'intervention.

**Troubles gastriques** : Une demi-cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède, à jeun le matin, et le soir à 18 heures.

**Troubles hépatiques** : Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.

**Constipation** : 1 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DURET et REMY  
et du Docteur Pierre ROLLAND réunis  
ASNIERES (Seine).

---

## HÉPATOZYL CALDO

Traitement opothérapique  
des Fonctions hépatiques.

**Composition.** — Boldine cristallisée, Hépatine, Extrait Combretum, Fiel de bœuf, Rhamnus purshiana, Rhamnus frangula.

**Indications.** — Constipation, Entérocolite, Coliques hépatiques, Cirrhose et Précirrhoses, Ictère, Affections d'origine colonicale.

**Forme.** — Pilules à enrobage de gluten.

**Dose :**

4 à 8 par jour aux principaux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire Moderne  
d'Opothérapie et Biologie Médicale.  
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.



## HÉPATROL

(Forme buvable.)

Extrait hydro-soluble de foie de veau frais.

### MÉTHODE DE WHIPPLE

Sans contre-indication. Adultes et enfants.

**Indications.** — Toutes Anémies, Asthénies, Insuffisances hépatiques.

**Formes thérapeutiques.** — Ampoules buvables non injectables.

Ampoules de 10 cc. : 1 ampoule. = 125 gr. de foie.  
Boîte de 6 ampoules. Coffret 18 ampoules.

Ampoules de 2 cc. : 1 ampoule. = 25 gr. de foie.  
Boîte de 12 ampoules.

Ce dosage est indiqué également dans les anémies légères et les insuffisances hépatiques de l'adulte.

**Posologie.** — 1 à 3 ampoules par jour à prendre dans un liquide quelconque au début des repas.

## HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais (activité standardisée par contrôle biologique.)

**Indications** — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

**Mode d'emploi** — Par voie intramusculaire. Injecter chaque jour 2 à 4 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance, puis associer Hépatrol buvable.

**Présentation** — Ampoules de 2 cc.

Activité égale à celle de 250 gr. foie de veau *per os*.  
Boîtes de 6 et 12 ampoules.

Ampoules de 1 cc.

Activité égale à celle de 125 gr. foie de veau *per os*.  
Boîtes de 6 et 12 ampoules.

Voir communications	{	<i>Presse Médicale</i> 20 Sept. 1930
		(Achard)
		<i>Soc. Méd. Hôp.</i> 19 Mai 1930
		(Aubertin)
		<i>Soc. Dermato. Janv. 1931</i> (Pinard)

Laboratoire **ALBERT ROLLAND**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HÉRACLÉOL

(Héraclès-Hercule).

**Nucléi-arrhénocalcium** (procédé Elzévir). Fixe le calcium organique. Active l'hémopoïèse et la phagocytose. Nourrit la cellule nerveuse. Augmente l'appétit et le métabolisme basal. Augmente le coefficient respiratoire et l'assimilation des aliments.

**Indications.** — *Tuberculose, Rachitisme, Décalcifications, Anémie, Asthénie, Convalescence.*

### Posologie :

*Granulé* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Elixir* : *Enfants* : dose moitié.

*Ampoules* : 1 ampoule sous-cutanée (indolore) tous les jours.

Adopté par les hôpitaux et cliniques de Paris.

Littérature et échantillons au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## HERGENOL

**Indications.** — Coqueluche, Toux spasmodiques et bacillaires, Asthme.

**Composition.** — Essences naturelles balsamiques et carbures halogènes, antispasmodiques.

**Forme.** — Produit volatil, usage externe.

**Emploi.** — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

**Doses.** — *Bébés et enfants* : renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

*Adultes* : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : le flacon stilligoutte : 15 fr.

**Laboratoires GROS**

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

## HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

**Antisymphilitique, Cholagogue, Diurétique.**

**Constitution.** — Mercure phénol disulfonate de sodium représente 40 p. 100 de mercure métallique.

**Propriétés.** — Elimination rapide, sans aucune réaction nocive sur le rein. Son hypotoxicité permet à chaque injection intra musculaire d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

### Indication et doses.

1° *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée (injections intra-musculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

b) Par voie stomacale : De 20 à 30 centigr. d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE par jour.

### 2° Antisepsie.

a) Chirurgie : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

b) Antisepsie des voies génito-urinaires : Blennorrhagies, injections urétrales, instillations et grands lavages urétraux ou vésicaux, solutions à 1 p. 100 et 1 p. 200. Cystites : Lavages vésicaux à 7 p. 1 000.

**Formuler.** — Selon les cas :

Boîte d'ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par cc. titrée à 5 centigr.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

45, rue Villon — LYON.

## HEXAFEL

Régulateur des fonctions biliaires et digestives.  
Cachets globulaires : extrait biliaire, magnésie, térébenthine modifiée, hexaméthylènetétramine.

**Mode d'action.** — Favorise l'assimilation des aliments. Active la digestion intestinale. Régularise la fonction hépatique. Excite le péristaltisme intestinal.

**Indications.** — Insuffisances biliaires, troubles hépatiques.

Fermentations intestinales, entéro-colites.

Insuffisance ou stase du bol fécal, constipations chroniques.

Prix : 20 francs

Echantillon grandeur normale sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

# HÉXORCÈNE

**Hexylrésorcine.**

Antiseptique urinaire polyvalent, particulièrement efficace contre le colibacille.

**Indications.** — Infections aiguës et chroniques de l'appareil urinaire : pyélites, pyélonéphrites gravidiques, cystites, urétrites, prostatites, infections secondaires de la tuberculose des voies urinaires.

**Posologie et mode d'emploi.** — Deux capsules dosées à 0 gr. 15, trois fois par jour. Augmenter progressivement la dose jusqu'à 4 capsules par prise, soit 12 au total.

Poursuivre le traitement au moins 15 jours après l'obtention de la première culture stérile d'urine. Les capsules doivent être prises à la fin d'un repas.

Société Parisienne d'Expansion chimique

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

# HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

**Composition.** — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santatol pur et gluten.

**Avantages.** — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

**Emploi et doses.** — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

*Cas chroniques* : 6-8-10 globules par jour.

**Indications.** — Cystites, Prostatites, Gonococcies, Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites, Diathèse urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

**Laboratoires CAMUSET**

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

## HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid.  
Provenant du cheval vigoureux et reposé.  
Supérieur au suc musculaire des bovidés :

Par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer ;

Par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Taenia.

Assimilation parfaite.

Aucun inconvénient digestif.

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales. Tout état d'affaiblissement et de consommation. Maladies de l'estomac et des intestins.

### GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON.

## HIRUDINASE

Le premier produit spécialisé à base d'extrait de sangsues.

**Indications.** — Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Acrocyanose, Œdèmes trophiques, Artérites aiguës et chroniques, Troubles de la ménopause, Troubles de la menstruation, Hypertension artérielle.

### Formule :

Extrait de sangsues (procédé spécial), Iode-citrate de soude, Extrait d'hypophyse, Hamamélis-hydrastis-marron d'Inde, Extrait hépatique.

**Présentation.** — Dragées.

**Mode d'emploi.** — a. 2 dragées au milieu de chacun des principaux repas (Affections vasculaires).

b. 3 dragées au milieu des 2 principaux repas (Dysménorrhées).

c. 8 à 16 dragées par jour (Hypertension artérielle).  
Prix : 18 francs.

### LABORATOIRES « ANA »

Anciennement : Laboratoire de Dermatologie de Paris.  
18, avenue Daumesnil — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Dorian 52-12.

## HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général.

**Indications.** — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

**Formes.** — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

**Posologie.** — *Adultes* : Une cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.

*Enfants* : Moitié doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue de Chemin-Vert  
à VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

## HOLASEPTINE

**Composition.** — Huile éthérée, camphrée, gommolée et essences balsamiques.

**Formes et posologie :**

**Ampoules** : 1 à 6 par jour, en injections sous-cutanées profondes ou intramusculaires. Contre toutes affections pulmonaires.

**Liquide** : S'administre par voie rectale sans irritation du rectum, même chez les nourrissons, contre la coqueluche.

**Suppositoires** : 2 par jour, contre Grippe, Bronchite, chronique, Tuberculose.

**Ampoules** : La boîte de 12, de 2 cc..... 20 fr.

**Liquide** : Le flacon de 210 cc..... 25 »

— Le litre..... 100 »

**Suppositoires** : La boîte de 14..... 20 »

Littérature et échantillons :

**Laboratoires CH. LAVERGNE**

5, rue Grande — CANNES (Alpes-Maritimes)

## HOLOS

### Opothérapie osseuse.

**Nature.** — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

**Indications.** — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

**Posologie.** — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature — Echantillons.

**DESCHIENS, Docteur en Pharmacie,**

9, rue Paul-Baudry — PARIS.

## HOLOVARINE

**Forme et composition.** — Cachets ou dragées dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

**Avantages.** — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

**Indications.** — Toutes les insuffisances ovariennes ; troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 20 par jour.

*Adolescentes* : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 20, 15 francs. La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 10, 9 fr. 50.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 26-87.

## HOPOGAN-BOCQUILLON

Composé organo-minéral à base de Peroxyde de Magnésium et de charbon activé, dégageant de l'Oxygène naissant au contact des muqueuses.

**Propriétés.** — Désinfection et désintoxication du tube digestif avec revivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires.

Pansement interne de la muqueuse stomacale ou intestinale. Propriétés anti-cancéreuses de l'ion magnésium.

**Formes.** — **HOPOGAN CACHETS** pour digestions douloureuses, mauvaise haleine, intoxications de toute nature (2 à 4 cachets par jour).

**HOPOGAN PILULES GLUTINISÉES** pour action localisée dans l'intestin : entérite, diarrhées (2 à 6 pilules par jour).

**HOPOGAN PRISE-BÉBÉ** contre les diarrhées vertes des nourrissons (1 à 3 paquets par jour).

Laboratoire des **PEROXYDES MÉDICINAUX**

12-18, rue Lamartine — PARIS.

---

## HORMOBILINE

Laxatif opothérapique.

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

**Composition.** — Hormones cœco-appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

**Indications.** — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

**Avantages.** — Ne provoque ni dégoût, ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

**Posologie.** — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

*Clystère* : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.

*Forme pilulaire* : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n° 586-1 et 586-2.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°).

Tél. : Roquette 14-12.



## HORMOCLINE

Chlorhydrate de Choline

### Traitement des Etats Tuberculeux

**Propriétés thérapeutiques.** — Le chlorhydrate de choline est une hormone qui agit sur le métabolisme du cholestérol, excite les surrénales aux propriétés anti-toxiques puissantes et opère ainsi une transformation du terrain biologique se manifestant par un relèvement de l'état clinique général.

**Indications.** — Toutes les formes de la tuberculose à tous les stades d'évolution, aussi bien dans les formes médicales que dans les formes chirurgicales. Amaigrissements, Asthénies, anorexies rebelles.

Adjuvant précieux des cures hygiéno-diététiques. Abaissement de la température, diminution des signes fonctionnels, engraissement rapide et durable.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

**Mode d'emploi.** — Une injection sous-cutanée tous les deux jours.

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 2 centigr. de chlorhydrate de choline.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

## HORMOCRINOL « F » et « M »

Une conception nouvelle dans la thérapeutique antiobèse.

L'Hormocrinol, en dehors de ses effets sur l'oxydation des graisses et des mucines, réalise la plus efficace cure de diurèse agissant favorablement sur les troubles du métabolisme de l'eau.

Extraits glandulaires totaux obtenus par dessiccation dans le vide à basse température des organes frais.

**Posologie.** — Prescrire HORMOCRINOL « F » chez la femme, et HORMOCRINOL « M » chez l'homme.

6 à 8 comprimés par jour à prendre en deux ou trois fois.

Prix au public : 20 francs.

Laboratoires de l'HORMOCRINOL

R. JAMMES DE GOLBERY, Pharmacien-Directeur

17, rue de la Glacière  
LA GARENNE-COLOMBES (Seine).  
Tél. : Charlebourg 26-56.

## HORMOVARINE BYLA

(Folliculine).

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

(En ampoules injectables, gouttes, comprimés et ovules.)

**Composition.** — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

**Indications.** — L'HORMOVARINE BYLA peut être utilisée dans tous les cas d'*hypo-fonctionnement ovarien* et donne des résultats très favorables dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, l'hypoplasie utérine, les troubles de la ménopause, l'ovariectomie, la stérilité, l'obésité, etc., et dans certains cas de diabète ovarien résistant à l'insuline.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les jours en injection lente, intramusculaire ou 15 à 40 gouttes ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'HORMOVARINE doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours, dans la période qui précède immédiatement la date présumée de la prochaine menstruation.

Les Établissements BYLA,  
26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## HUILAXINE

**Forme.** — Solution (270 cc.).

**Composition.** — Huile de paraffine distillée et rectifiée.

**Indications.** — Rééducation de l'intestin.

Traitement physiologique de la constipation et de toutes affections provoquées par la stase intestinale.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 2 fois par jour, 1 cuillerée à soupe.

*Enfants* : 2 fois par jour, 1 cuillerée à café.

*Nourrissons* : 1 cuillerée à café par jour, mêlée au lait.

Le flacon de 270 cc. : 12 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure.

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

*Absolument sans saveur et sans odeur*, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 15, 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

## GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, chemin de Combe-Blanche — LYON.

## HUILE DE FOIE DE MORUE

**Médicinale suractivée**  
**Rhône-Poulenc.**

500 unités Vitamine A,  
500 unités Vitamine D,  
par centimètre cube.

**Indications.** — Toutes celles de l'huile de foie de morue ordinaire avec l'avantage d'une posologie réduite, parfaitement supportée.

Facteur précieux du développement de l'organisme.

Aliment d'appoint au cours des convalescences.

**Posologie** (par 24 heures) :

*Première année* : XXX gouttes à 1/2 cuillerée à café.

*Enfants* : A partir d'un an et suivant l'âge : 1/2 à 1 cuillerée à café.

*Adolescents et adultes* : 1 à 2 cuillerées à café.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## HUILE GALLINA

Lipoïdes des Galli résistants au Bacille de Koch, Morhuate d'Éthyle, Cinnamate de Benzyle.

### Formes :

Ampoules de 5 cc. (voie parentérale, tissus).

### Indications :

Toutes les formes de la tuberculose viscérale.

Prix, 10 ampoules de 5 cc. : 24 francs.

### Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V<sup>e</sup>).

---

## HUILE GRISE ERCÉ

**Constitution.** — Huile grise de formule spéciale, complètement résorbable, sans huiles minérales.

**Forme.** — Ampoules-seringues auto-injectables.

**Avantages.** — 1<sup>o</sup> *Indolore*, neutralité absolue.

2<sup>o</sup> Assimilation totale. *Résorption* rapide.

3<sup>o</sup> *Dosage* absolument rigoureux.

**Dosages.** — 0.05 - 0.08 - 0.10 - 0.12 cgr. de Hg. complètement injecté.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

## HUILE IODÉE FINIKOFF

### CALCIUM INTRAVEINEUX FINIKOFF

**Méthode du Dr A. FINIKOFF**

pour le traitement des Tuberculoses chirurgicales.

**Indications.** — Tuberculoses osseuses, articulaires, ganglionnaires, glandulaires, séreuses et cutanées. Innocuité absolue.

**Contre-indications.** — Tuberculose pulmonaire évolutive, tuberculoses viscérales avec dégénérescence amyloïde du foie et du rein, cachexie et septicémie bacillaires, méningites bacillaires.

**Formes.** — *Huile iodée* à préparer extemporanément une ampoule d'huile d'arachide, une ampoule d'iode en solution au 1/10.

**Chlorure de calcium** pour injections intraveineuses. Ces injections ne sont à pratiquer que chez les malades robustes ayant une intégrité viscérale totale.

Remplacer ces injections par la Tricalcine chez tous les autres malades.

**Doses et mode d'emploi.** — Un prospectus indiquant la posologie accompagne chaque boîte. Il est envoyé sur demande au Corps médical.

Prix de la boîte de.	6	ampoules	huile.	}	25 fr.
—	—	6	— iode.		
—	—	12	— calcium.	}	25 fr.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS.

# HUMORO-STABILINE

PRÉPARATION  
OPOTHÉRAPIQUE ET PHYTOTHÉRAPIQUE  
non toxique

A BASE DE PEPTONE ET DE VALÉRIANE

STABILISATRICE DES HUMEURS

pour  
MÉDICATION  
ANTI-ANAPHYLACTIQUE

et  
ÉQUILIBRANTE DU SYSTÈME NERVEUX

— COMPOSITION —

PILULES		GRANULÉ	
Peptone de viande.....	0 gr. 20	Peptone de viande.....	4 gr.
Extrait de Valériane....	0 gr. 10	Extrait de Valériane.....	2 gr.
Extrait de Muguet.....	0 gr. 05	Extrait de Muguet.....	1 gr.
Pour 1 pilule.		Pour 100 gr.	
Excipient spécialement étudié		Stimulant aromatique.. q. s.	
Enrobage soluble dans l'eau		Excipient : Sucre de 1 <sup>er</sup> choix	

## — INDICATIONS THERAPEUTIQUES —

### 1. - DANS L'ANAPHYLAXIE :

Urticaires - Eczémas - Migraines - Névralgies - Asthme.

### 2. - DANS LES DYSTONIES ORGANO-VÉGÉTATIVES

Troubles respiratoires, circulatoires, sécrétoires, etc., liés à un déséquilibre du Grand Sympathique.

### 3. - DANS LES PERTURBATIONS NERVEUSES :

Neurasthénie - Epilepsie - Hystérie - Convulsions.

### 4. - DANS LES DÉSORDRES CARDIAQUES.

## AUCUNE CONTRE-INDICATION

## — MODE D'EMPLOI ET DOSES —

Se prend toujours 1 heure au moins avant chaque repas. Les pilules s'avalent avec ou sans eau. Le granulé se croque et se donne aussi dans un peu d'eau ou de lait.

## DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

### PILULES

ADULTES : 3 pilules à la fois  
1 heure avant chacun des deux  
principaux repas.

ADOLESCENTS : 2 pilules à la  
fois 1 heure avant chacun des  
deux principaux repas.

tous les jours pendant 2 à 3 mois consécutifs

### GRANULÉ

ENFANTS : 1 bonne cuillerée à  
café 1 heure avant chacun des  
deux principaux repas.

NOURRISSONS : 1/2 cuillerée  
à café matin et soir 1 heure  
avant l'une des tétées normales.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications  
du médecin.

## — PRIX DE VENTE IMPOSÉS —

Le Flacon de 60 pilules... 18 fr. La Boîte 100 gr. de granulé. 14 fr. ]  
(Modèle unique) (Modèle unique)

## LABORATOIRE DU DOCTEUR L. DELALBRE

### PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

### DÉPOT GÉNÉRAL

Service Commercial et Service Médical

2, R. CLAUDE MATRAT - ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)

et R. LANG, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

## HYDRALIN

**Antiseptique gynécologique.**

**Composition.** — Perborate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Fluorure de sodium, Essences aromatiques.

**Propriétés.** — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

**Indications.** — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

**Présentation.** — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

**Mode d'emploi.** — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-2.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV)

Téléphone : Invalides 12-63.

---

## HYDRASTIS GMET

**Composition.** — Extrait total liquide et sans alcool de l'hydrastis canadensis.

**Propriétés.** — Décongestif, hémostatique, laxatif (par son action sur le foie).

**Indications.** — Hémorragies, Fibromes, Métrorragies, Congestions pelviennes, hémorroïdes, Constipation.

**Posologie.** — De 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

La moins onéreuse des préparations d'hydrastis.

Le flacon de 135 cc. : 22 francs.

**Laboratoire GMET**

27, rue du Faubourg-Montmartre  
PARIS (IX<sup>e</sup>).

## HYDRORRHÉOL

(Ancien Hydrastol)

Sous forme de cachets.

**Composition.** — Terpentol et Hépatine sans aucun toxique.

**Propriété.** — Désensibilisateur de la Muqueuse nasale.

**Indications.** — Écoulement nasal, Hydrorrhée nasale, Rhinite spasmodique, Rhume au début.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cachets par jour.

Laboratoire Laryngologique

**VOCALDOP ET HYDRORRHÉOL**

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (Xe).

## HYGIODINE

Traitement discret et complémentaire anti-syphilitique.

Aucune mention mercurielle ni spécifique sur l'étiquette, le prospectus et l'enveloppe.

**Forme.** — Elixir à base de vin iodotannique.

**Doses.** — Un verre à liqueur avant chaque repas contenant :

Iode .....	0,06
Iodure de potassium.....	0,06
Bi-iodure de mercure.....	0,012
Méthylarsinate de soude....	0,024

Prix : 15 francs le flacon.

Laboratoire du Docteur H. MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## HYOL

(Norwegian Essence).

**Composition.** — A base de menthol, gaïacol et de plantes aromatiques (Cedrus, Abiès, Epicéa, Pinus, Larix).

**Indications.** — Asthme, Bronchites, Coryza, Coqueluche, Grippe, Laryngites, Toux spasmodique, etc...

**Mode d'emploi.** — Inhalations, évaporations à froid, Pulvérisations, Gargarismes.

Le flacon : 16 francs.

Echantillons et littérature :

**Laboratoire FORTIN**

109, rue de Sèvres  
PARIS.

---

## HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 mmgr. et à 1/4 de mmgr.

**Hyoscyamine Houdé.** — Produit pur cristallisé, extrait de l'*Hyoscyamus Niger*.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, calmant, hypnotique, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 6 granules *pro die* ; les prendre avant les repas.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS.

## HYPALÈNE

**Composition.** — Combinaison de l'acide Cyclopenténylallylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

**Action.** — Analgésique, Sédatif, Hypnogène.

**Indication.** — Traitement de l'insomnie douloureuse, algies diverses, angoisse pré-opératoire, et douleurs post-opératoires.

**Force pharmaceutique.** — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Ne contenant pas de toxique du Tableau B.

**Dose.** — Angoisse pré-opératoire, 1 à 2 comprimés d'Hypalène quelques minutes avant l'intervention.

*Algies diverses, douleurs post-opératoires :* 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

*Dose hypnogène :* 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, 1 heure ou 2 après le repas.

Prix : 13 francs.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

---

## HYPERSAN

*Médication hypotensive-diurétique.*

**Composition.** — Association d'extraits fluides de Gui, cratægus, Stigmates de maïs et Cascara.

**Action.** — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratægus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

**Indication.** — L'hypertension sous toutes ses formes.

**Doses.** — XXV gouttes, 3 fois par jour.

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES

## HYPOCHOLATE

des professeurs **G. CARRIERE** et **E. GERARD**,  
**Traitement de l'Hypertension artérielle.**

**Composition.** — En ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 02 de CHOLALATE de SOUDE, chimiquement pur pour 1 cc.

**Indications.** — Hypertension intermittente, Hypertension par pléthore, Hypertension intermédiaire entre pléthore et sclérose.

**Posologie.** — Injecter le contenu d'une ampoule profondément sous la peau, tous les jours au début. Puis, lorsqu'un abaissement suffisant a été obtenu, injecter seulement deux fois par semaine et même une seule fois, le contenu d'une ampoule, ce qui parfois suffit pour maintenir l'abaissement de tension obtenu. Puis, au bout d'un temps variable, cesser le traitement, pour le reprendre plus tard s'il y a lieu.

L'**HYPPOCHOLATE** est présenté en suppositoires à 0 gr. 10. Il est employé avec succès égal en petits lavements dans la capsule rectale de 5 ou 10 cc. à la poire ou à la main, en utilisant le contenu d'une ampoule de 5 cc.

**Prix au public :** la boîte de 10 ampoules : 30 francs.  
 La boîte de 10 suppositoires à 0 gr. 10 : 30 francs.

**Laboratoires STENE**

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HYPOPHÉDRINE

**Ephédrine végétale française corrigée.**

**Composition :**

Ephédrine végétale.....	0 gr. 03
Hypophyse totale.....	0 gr. 05
Ext. de Lobélie.....	0 gr. 01
par dragée.	

**Indications.** — **Asthme. Rhume des Foins. Bronchites emphysémateuses.** Tous états dyspnéïques.

**Avantages.** — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaires, ni insomnie.

**Posologie.** — 3 à 4 dragées par 24 heures.  
 Sucrer la dragée avant d'avaler le noyau.

**Laboratoires DEPRUNEAUX**

18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## HYPOSULFÈNE

**“ Soufre soluble. ” — “ Aliment soufré. ”**

**Pilules glutinisées** à 0 gr. 25 d'Hyposulfite de Na chimiquement pur, stabilisé.

**Doses.** — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas.

**Indications.** — Dermatoses récidivantes : Eczéma, Strophulus, Prurigo, Prurits, Urticaires, etc. Intolérances alimentaires, Ictère, Acné, Séborrhée, etc.

**Action.** — Très grande activité réductrice et sulfurante due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 60 pilules glutinisées : 15 francs.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses

La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE**

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

---

## HYPOTAN

**Le Régulateur du débit Artériel.**

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive, associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Hypotan constitue une synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. Il améliore la circulation périphérique si profitable à l'état clinique des hypertendus. L'Hypotan réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre les organes à musculature lisse.

**Indications.** — Thérapeutique d'entretien des hypertendus, Hypertension, Spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'**Acécoline**, Hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

Adresse tél. : Chevrematte, 90 — PARIS.

## « I. A. M. »

Iodo-méthyl, Arsinat de Manganèse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Composé organique, réalisant sous une forme optimale l'action synergique de :

*L'ion iode* histotrope, leucopoïétique, lymphagogue.

*L'ion arsenic* stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

*L'ion manganèse* vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux 1928*).

**Indications.** — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, Etats anémiques, Bronchites, Asthme, Convalescences.

**Posologie.** — Gouttes « I. A. M. » (*adultes*) XV à XX gouttes matin et soir.

Sirop « I. A. M. » (*enfants*), 1 cuillerée matin et soir.

**Littérature et échantillons**

**Docteur LAVOUÉ — RENNES.**

## IFRANOL

*Quinine* (0 gr. 20 par dragée ou par grande cuillerée-mesure).

*Arsenic trivalent, Fer, Strychnine, Cholagogues.*

### Paludisme

*Dragées* (traitement habituel de l'*adulte*). *Curatif* : 8 à 10 dragées par jour. *Préventif* : 2 dragées tous les soirs au dîner.

*Granulé* : (spécialement destiné au traitement de l'*enfant* ; de l'*adulte* dont l'estomac fragile supporte mal la quinine; de la femme enceinte.)

Une grande cuillerée-mesure correspond à une dragée.

*Adulte* : même dose qu'avec les dragées.

*Enfant* : *Préventif* : une petite cuillerée-mesure par année d'âge. *Curatif* : cinq fois la dose préventive.

### Grippe et ses complications.

(*Angine grippale* en particulier.)

*Adulte. Période aiguë* : 5 dragées ou 5 grandes cuillerées-mesure par jour.

*Convalescence* : 3 dragées ou 3 grandes cuillerées par jour pendant 10 jours.

*Enfants. Période aiguë* : 2 petites cuillerées-mesure par année d'âge.

*Convalescence* : 1 petite cuillerée par année d'âge.

Littératures et échantillons :

**VAILLANT, Pharmacien**

19, rue Jacob — PARIS

Dépôt général :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

## ILOGLANDOL « ROCHE »

Solution aqueuse stérilisée des principes actifs des îlots de Langerhans.

1 cc. = 15 unités internationales.

Titrage conforme aux décisions prises par la Convention de Genève.

Activité correspondant à l'activité de l'étalon officiel de Londres.

### Indications thérapeutiques :

*Toutes celles de l'insulinothérapie.*

### Doses et modes d'emploi.

N. B. — Le médecin traitant est seul juge de la posologie et des modalités d'application de l'ILOGLANDOL « ROCHE », car le traitement insulinién est toujours conditionné par l'état général (poids) du malade et par les examens systématiques répétés de son sang et de ses urines (glycosurie, glycémie, acidose, réserve alcaline du plasma).

### Doses d'urgence (Coma diabétique).

*Voie endoveineuse* : 1/2 à 3 cc. en 1 fois, puis 1/2 à 1 cc. toutes les heures.

*Voie intramusculaire* : 2 à 4 cc. en 1 fois, puis 1cc. toutes les heures.

*En même temps* : Sérum glucosé, sérum physiologique et bicarbonate de soude (par voies buccale, rectale, intramusculaire, endoveineuse) et tonicardiaques.

### Doses habituelles (Tous autres cas).

*Voie intramusculaire (intrafessière)* : 2 cc. par jour (un quart d'heure à une demi-heure avant les repas) pendant 21 jours.

*En même temps* : Chez les diabétiques, régime alimentaire aussi riche en hydrates de carbone, graisses et albuminoïdes, que le permettra l'état du malade.

### Iloglandol « Roche »

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

### PRODUITS

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>.**

10, rue Crillon — Paris (IV<sup>e</sup>).

# IMMUNIZOLS

## Vaccins

### I. Ampoules

10. Furonculose, Ostéomyélite.
11. Entérite, Appendicite.
13. Asthme, Asthme des foins.
15. Eczéma, Psoriasis.
16. Bronchites chroniques.
17. Rhumatismes.
18. Urétrites.
19. Acné.
22. Typhoïde.

### II. Bouillon-Vaccins pour pansements.

10. Furonculose et toutes staphylococcies.
24. Streptococcies.
25. Pneumococcies.
26. Colibacilloses.
31. Abscess chauds.
35. Ulcères variqueux.
36. Brûlures infectées.
41. Métrites.
50. Otites, Rhino-Pharyngites.

### III. Hibévé-Bouillon-Vaccin.

Concentré polyvalent à diluer pour obtenir un demi-litre de bouillon-vaccin normal.

### IV. Comprimés

*Avec pilules adjuvantes de bile.*

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10. Furonculose - Os-<br>téomyélite. | 22. Typhoïde.                        |
| 11. Entérite-Appendi-<br>cite.       | 31. Abscess, plaies in-<br>fectées.  |
| 13. Asthme, Asthme<br>des foins.     | 40. Cystites, Pyéloné-<br>phrites.   |
| 15. Eczéma, Psoriasis.               | 41. Métrites.                        |
| 18. Urétrites.                       | 70. Pyorrhée alvéolo-<br>dentinaire. |

## GRÉMY

### Microbiens

#### Injectables.

- 23. Grippe.
- 24. Streptococcies, infections puerpérales.
- 31. Abscess chauds et froids, plaies suppurées.
- 34. Gangrène.
- 40. Cystites, Pyélonéphrites.
- 41. Métrites, Salpingites.
- 50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.
- 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

#### Immuniphages (bactériophages).

- N° 10. Toutes staphylococcies.
- N° 11. Affections intestinales.
- N° 26. Colibacilloses.
- N° 31. Infections pyogènes.

**Ovules à l'Immunizol n° 41**  
*pour pansements gynécologiques.*

#### V. Immuniperos.

*(Vaccins liquides pour vaccination buccale simple ou associée au bactériophage).*

- 10. Furunculose.
- 11. Infections intestinales.
- 15. Dermatoses.
- 22. Fièvre typhoïde.

#### VI. Immuniderm.

Pommade à l'Antivirus et au Bactériophage.

— PARIS (IX<sup>e</sup>).

R. C. Seine. 229.088 B.



## IMMUNOVACCIN ANTIRHUMATISMAL

(Formule du Dr L. Bertrand d'Anvers).

**Composition.** — Emulsion du diplostreptobacille isolé de l'organisme des malades atteints de rhumatisme articulaire aigu. (Achalme, Thiroloix, G. Rosenthal, Bertrand, Triboulet, Leyden, Wassermann, de Vecchi et R. Lautier).

**Présentations.** — 1° Forme injectable : 5 séries d'ampoules de 5 à 425 millions ; 2° Forme à ingérer : ampoules dosées à 500 millions.

**Indications et mode d'emploi :**

**Forme injectable.** — Rhumatisme articulaire aigu : débiter par série II. — Complications du rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme cardiaque, chorée et goître exophtalmique, rhumatisme chronique : débiter par série I.

**Forme à ingérer.** — Formes bénignes du rhumatisme chronique, douleurs arthritiques ; troubles intestinaux, syndromes entéro-hépatiques, entéro-rénaux, entéro-génitaux des arthritiques, hypertension : 1 ampoule par jour, 20 jours par mois.

**Laboratoires IMMUNOS**

8, avenue des Sources — NICE (A.-M.).

## INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Médications végétale et opothérapique associées.

**Composition.**

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune simple associés aux sucs glandulaires de : Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

**Indications.**

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté ; dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

**Mode d'emploi.**

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 15 francs.

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142, rue de Picpus — PARIS (XII°).

## INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

**Composition.** — Principes actifs d'Hamamelis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur de la circulation générale. Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonivascular et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

**Indications.** — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 12 francs.

**LABORATOIRES A. LEJEUNE.**  
142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## INFANGYL CARLIER

**Composition :**

Thiocol, antipyrine, tolu .....	āā 0 gr. 02
Benz. de Na, Eau de laurier cerise.....	āā 0 gr. 04
Teinture de Droséra.....	0 gr. 08
Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café.	

**Indications.** — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et striduleuses.

**Propriétés.** — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

**Posologie.** — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourrissons : demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Echantillons et Littérature :

**Laboratoires René CARLIER**

Grande-Rue, à SAINT-FLORENTIN (Yonne).

## INFRA-ROUGES

- 1° *Plaies et ulcérations atones, infections cutanées et sous-cutanées ;*
- 2° *Troubles circulatoires (œdèmes, cellulite, stase veineuse, troubles de la circulation artérielle, engorgements ganglionnaires) ;*
- 3° *Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies ;*
- 4° *Douleurs abdominales : entéro-colite, périviscérites, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;*
- 5° *Névralgies et névrites.*

Vente et location de tous appareils et accessoires à

**La Verrerie Scientifique**

12, avenue du Maine — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél.: Littré 94-62 et Littré 01-63.

## INHALATION-GARGARISME

### « VOCALDOP »

**Composition.** — Perborate et salicylate de soude, eucalyptol, menthol.

La poudre VOCALDOP réunit en une seule prescription médicale, synthétisant la thérapeutique externe naso-pharyngienne :

une *inhalation* et un *gargarisme*.

- |               |  |
|---------------|--|
| 1 cuillerée à | Inhalation                                     |
| café de       | + H <sup>2</sup> O chaude = Respiration nasale |
| Poudre        | et gargarisme.                                 |
| Vocaldop.     | Bain buccal.                                   |

L'Inhalation-Gargarisme *Vocaldop* remplace avantageusement les solutions alcooliques et les teintures (benjoin, eucalyptus, tolu). En effet, les vapeurs éthyliques sont nocives pour la Voix, l'alcool « fixe » les tissus des organes phonateurs. (Thèse de Doctorat 1924.)

**LABORATOIRE LARYNGOLOGIQUE**

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

## INHALATION LANCOSME

**Composition.** — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

**Présentation.** — Liquide.

**Propriétés.** — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

**Indications.** — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

**Contre-indications.** — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

**Emploi.** — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante, deux à trois inhalations par jour.

### LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## INHALO-BOL

**Cornet pour inhalations**

(en papier parcheminé),

Simple,

pratique,

bon marché.

### Indications thérapeutiques :

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 5 fr.

**Laboratoire de l'INHALO-BOL**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

## INHALOL

Médication  
des voies aériennes supérieures.

**Composition.** — Association d'essences volatiles (Isopropylmétacrésolmenthol et Cajeputol) sans alcool.

**Action thérapeutique.** — Antiseptique, anticongestif, analgésique.

**Indications.** — Coryzas, rhinites, pharyngites, laryngites, sinusites, trachéites, bronchites.

**Mode d'emploi.** — IV à V gouttes dans un verre d'eau bouillante en inhalations, ou quelques gouttes sur le mouchoir à titre préventif.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires BOUVELOT**

62, rue d'Antibes — Cannes (A.-M.)

## INHALONE

Inhalation *solide* à l'état pulvérulent.

**Exempt d'alcool.**

**Formule :**

Cupressol, hydrure de naphthyle, essence de thym, goménol, benjoin en milieu carbo-gazeux.

Donne des résultats surprenants, dans tous les cas d'inflammation des muqueuses buccales et rhinopharyngiennes. Diminue rapidement l'intensité des quintes et leur fréquence, dans la coqueluche.

Modifie nettement les sécrétions nasales. N'irrite jamais, ne dessèche jamais les muqueuses. Jouit vis-à-vis d'elles de propriétés antiseptiques inégalables.

Prix : 12 fr. la boîte.

Echantillons et littérature sur demande

**AUX LABORATOIRES CH. DEHAY**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, licencié ès sciences

58, rue Saint-Géry — ARRAS.

## INHALO-SÉL

**Composition.** — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles.

**Avantages thérapeutiques.** — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

**Indications thérapeutiques.** — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 5 fr. 50.

**Laboratoire de l'Inhalo-Bol**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, docteur en pharmacie.

---

## INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

**Composition.** — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

**Mode d'emploi.** — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

**Indications.** — Coryza, Laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en **huile** pour instillations et pulvérisations.

Prix : 9 fr. 75 et 12 francs.

**Laboratoires G. WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## “ INNERCLEAN ”

**Composition.** — Algue de Java, Thé de santé, Herbes aromatiques en plantes coupées menues.

**Indications ou Propriétés.** — Espèces laxatives aromatiques pour le traitement spécial de la constipation.

**Posologie ou mode d'emploi.** — Un tiers de cuillerée à café. Augmenter graduellement cette dose si nécessaire.

Pour le prendre, la meilleure façon est de le déposer sur la langue et de l'avaler à l'aide d'un peu d'eau fraîche.

Pour les Enfants et les Bébés, commencer par une très petite quantité, en tenant compte de leur âge.

Prix, en France : 15 fr.

Dépôt général pour la France :

« EVANS DRUG STORE »

**J. M. RICARDOU, Docteur en Pharmacie**

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar de *savueur agréable*.

**Propriétés.** — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

**Indications.** — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès, fistules dentaires, soins post-opératoires. Hygiène de la bouche. Soins de la gorge et du nez.

### Mode d'emploi :

*Lavages* : 2 à 3 cuillerées à café par litre d'eau.

*Gargarismes* : *Bains de bouche* : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

*Badigeonnages* : pur ou au demi.

*Inhalations*.

*Dentifrice* : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

### SPÉCIALITÉS INOLÈNE

**Inolène simple** : Rhino-Laryngo-Stomatologie. (Voir ci-dessus.)

**Inolène vaseline** (Nasolène) : Antisepsie des fosses nasales.

**Inolène thymolé** : Antisepsie générale. (Injections, pansements 2 à 3 cuill. à café par litre d'eau).

**Inolène ovules** : Gynécologie.

**Inolène pommade et Inolène poudre**  
Dermatologie.

**Laboratoires ODILIA**

**E. LACOMBE, Pharmacien.**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).



**INOTYOL**

Eczémas, ulcères, prurits.

**INOSEPTA**

Acnés, furoncles, pyodermites.

**Inosepta ophtalmique**

Conjonctivites, blépharites, orgelets.

**Inosepta Auriculaire**

Infections du conduit auditif

**Filtrat Inosepta**

Pansements locaux.

---

Échantillons et littérature :

60, rue de Prony — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

# INSTITUT PASTEUR

## SÉRUMS :

Antidiphthérique, antitétanique, antistreptococcique, antiméningococcique, antidysentérique, anticharbonneux, antipneumococcique, antipesteux, antigangréneux.

## Sérums desséchés :

Antidiphthérique, antitétanique.

## Sérums purifiés et concentrés :

Antidiphthérique, antitétanique.

## Sérums antivenimeux :

E. vipères d'Europe ; A. N. serpents africains ; A. O. serpents Afrique occidentale et équatoriale ; C. serpents Inde et Egypte.

## VACCINS :

Antidiphthérique, antitétanique, antipesteux, anticholérique, antityphoïdique et antipara (T. A. B.), antigonococcique, antistaphylococcique (furunculose), antistaphylococcique (ostéomyélite), antipyogène, antipneumonique, antiméningococcique, B. C. G., B. C. G. = S. C.

*Extrait d'antigène tuberculeux méthylique. Tuberculine.*

Les sérums et vaccins ne sont délivrés qu'aux Droguistes et aux Pharmaciens.

C'est à ces derniers que doivent s'adresser exclusivement les Médecins et le Public.

**Institut PASTEUR**

22, rue Dutot — PARIS.

## **INSULANOL**

Pommade à l'Insülyl.

**Mode d'action.** — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

**Indications.** — 1° Ulcères variqueux et plaies atones ;  
2° Prurits de toute nature ;  
3° Hémorroïdes ;  
4° Brûlures.

**Mode d'emploi.** — En onctions sur les parties malades.

Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

R. C. 18.000. Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

---

## **INSULINE**

Voir **ENDOPANCRINE**

Page 382

Voir **POUDRE ET POMMADE  
D'INSULINE PHYLOZE**

Page 937

**Laboratoire  
de Thérapeutique Générale**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléph. : Ségur 26-87

# **INSULINE BUCCALE FORNET**

## **Principe actif :**

Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

## **Présentation :**

Concentration III (Pilules rouges : 4 unités par pilule).

Concentration I (Pilules vertes : 1 unité par pilule).

## **Posologie :**

3 pilules 3 fois par jour une 1/2 heure avant les repas.

## **Indications :**

Tous les cas justiciables de l'Insuline (cas graves exceptés). (Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoérables, acétoniques, etc...)

L'Insuline Fornet est utilisée sous ses deux formes (pilules et pommade) dans tous les hôpitaux de Paris.

## **Observations :**

Avoir toujours recours à la concentration forte au début du traitement.

Prix : 49 francs et 25 francs.

Vente et Échantillonnage :

**Laboratoire de Microbiologie**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Gutenberg : 03.45

## INSULINE BYLA

*Adoptée par les hôpitaux.*

Purifiée, débarrassée des matières salines et protéiques de la glande. Présentée sous deux formes injectables :

- 1° *Insuline Byla* (poudre) soluble dans l'eau, enfermée dans des ampoules stériles de 15 unités internationales (enfants, 5 unités). Chaque ampoule est accompagnée d'une ampoule de 2 cc. sérum physiologique, dans laquelle on la fait dissoudre.
- 2° *Insuline Byla liquide*, en flacon de 5 cc. à 100 unités (20 u. par cc.) et en flacon de 5 cc. à 200 unités (40 u. par cc.) En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. à 5, 10 et 20 unités par ampoule.

**Indications.** — Traitement du diabète et de toutes ses manifestations.

**Posologie.** — 1 à 5 ampoules, ou 1 cc. à 5 cc. de solution, par jour, suivant avis du médecin.

Traitement des plaies atones :

**Pommade à l'Insuline Byla — Poudre à l'Insuline Byla**

*L'Insuline Byla* est titrée en unités internationales, conformément à la décision du Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Envoi sur demande de la notice détaillée.

**Les Établissements BYLA,**  
26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## INSULINE « LEO »

Décret d'autorisation du 8 juillet 1931 (Cette autorisation ne garantit pas l'efficacité du produit).

**Indications.** — Diabète, cures d'engraissement.

**Forme.** — Ampoules de 5 cc. contenant 100 u. i.

(1 cc. — 20 u. i.). Prix : 15 francs.

Ampoules de 5 cc. contenant 200 u. i.

(1 cc. — 40 u. i.). Prix : 28 francs.

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, suivant l'indication du médecin.

*L'Insuline « Leo »* ne contient aucun antiseptique, sa stérilité est absolue, les injections en sont indolores et son activité est constante grâce à sa teneur régulière en u. i.

**LA SERINGUE SPÉCIALE « LEO »**

grâce à ses deux graduations permet de mesurer la dose exacte d'Insuline directement en unités.

**Valentin AAGE MOLLER**

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire et Pharmacien Garant pour la France :

**Jean DEDIEU, pharmacien**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

Belgique et Luxembourg : **Ed. JUST**

11, square Marie-Louise — BRUXELLES

## INSULYL

Autorisé par l'Académie de médecine.

Adopté dans les Hôpitaux.

Produit de la sécrétion interne du pancréas.

**Action.** — Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

**Indications.** — 1° Diabète et ses complications ; 2° Athrepsie des nourrissons ; 3° Acidose ; 4° Cure d'engraissement.

**Formes.** — 1° Boîte de 10 ampoules de 1 cc. environ, chacune renfermant 20 unités ; 2° Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 40 unités par ampoule ; 3° Tube de 5 cc., chaque centicube contenant 20 unités.

**Doses.** — En moyenne une ampoule en injection intramusculaire avant chaque repas.

Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

---

## INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux spécifique des *Hémorroïdes*, *varices*, *phlébites*.

**Forme.** — *Solution d'Intrait de marron d'Inde* : X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

**Mode d'emploi.** — *Usage interne* : V gouttes, matin, et soir de *solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*.

## INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Toni-cardiaque puissant.

**Formes.** — *Solution d'Intrait de Strophanthus* : X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

*Ampoules d'Intrait de Strophanthus* dosées à un milligr. d'Intrait par cc.

**Indications.** — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiorénaux et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

**Posologie.** — *SOLUTION D'INTRAIT* : Dose d'entretien cardio-tonique : V gouttes par jour pendant 15 jours.

*Dose antiasystolique.* — XX à XXX gouttes en une fois.

*AMPOULES D'INTRAIT* — Exclusivement par *voie intramusculaire* : 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

## INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

**Antispasmodique,  
sédatif du système nerveux.**

**Forme.** — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

**Indications.** — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

*Nervosisme*, *irritabilité nerveuse*, *affections spasmodiques*, *dermatoses prurigineuses*, *chorée*, *tics*, *convulsions infantiles*.

**Posologie.** — *Solution d'Intrait de Valériane* : 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

**Laboratoire DAUSSE**  
4, rue Aubriot — PARIS (IV°).

## **IODALOSE GALBRUN**

Gouttes titrées renfermant 5 centig. d'iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iodes et Iodures dans toutes leurs applications internes sans iodisme.

**Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme. — Artério-sclérose. — Maladies du cœur et des vaisseaux. — Affections glandulaires. — Rachitisme. — Goitre. — Fibrome. — Syphilis. — Obésité.**

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

**Laboratoire GALBRUN**

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---



# IODAMÉLIS LOGEAIS

## Formule :

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'*Hamamelidine* (extrait glycéринé total d'hamamélis sans alcool) et d'*Iodo-Iodure de Potassium* (forme la plus active de l'iode thérapeutique). Cette combinaison, découverte par M. Logeais, exalte considérablement l'activité pharmacodynamique du produit.

## Propriétés :

### Spécifique cardio-vasculaire total :

*Par son Hamamélidine*, chez les hypertendus veineux, cyanotiques, variqueux ;

*Par son Iodo-Iodure de Potassium*, chez les artérioscléreux, uricémiques, hypervisqueux.

L'Iodamélis diminue la viscosité sanguine, combat les stases, stimule le tissu lymphoïde, abaisse la tension artérielle, oxyde les toxines organiques, favorise la circulation en retour.

## Indications :

### Toutes les affections vasculaires, artérielles et veineuses :

Artério-sclérose, Hypertension, Pléthore des hypervisqueux, Cyanose des hypotendus, Obésité, Jambes en poteau, Varices, Hémorroïdes, Asthme, Emphyseme, Bronchite chronique, Troubles circulatoires de la Puberté et de la Ménopause, etc...

## Posologie :

50 gouttes d'Iodamélis =  $\left\{ \begin{array}{l} 0,03 \text{ Iode.} \\ 0,20 \text{ Iodure de Potassium.} \\ 0,20 \text{ Hamamélidine.} \end{array} \right.$

## Doses :

De 20 à 40 gouttes aux deux principaux repas, dans un peu d'eau, (Vichy de préférence).

Tolérance parfaite, pas d'iodisme.

**Prix :** un flacon = 1 mois de traitement = 18 fr.

**Laboratoires J. LOGEAIS**

BOULOGNE-SUR-SEINE, près Paris.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

# IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur Guiraud

*Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux*

**Formule.** — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

**Indications.** — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

**Posologie.** — Enf. de 6 mois à 2 ans II à X gouttes par jour

— 2 ans à 8 ans IV à XX —

— 8 ans à 15 ans IV à XXX —

Adultes X à XL —

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

**Présentation.** — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Prix : 14 francs.

Echantillons et littérature:

**Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD**

10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>). — Tél.: Marcadet 37-98.

## IODASEPTINE CORTIAL

**Composition.** — (Iodobenzométhylformine) contenant 42 % iode, soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dérivées de la nature de ses composants ; iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzoylés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie), Adénopathies, Paludisme, Spirillose. Puissant tonique du cœur.

**Prép. Pharm. Posologie.** — Ampoules : A. 2 cc., B. 5 cc., C. 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire à doses progressives.

*Tuberculose* (doses faibles) : 2 à 5 cc.

*Rhumatismes chroniques* (doses fortes) : 5 à 20 et même 25 cc. *pro die*.

Gouttes : XXX à C par jour (enfants : XX à L).

### Iodaseptine salicylée.

Dans les rhumatismes aigus ou subaigus en injections intraveineuses, joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Tolérance parfaite. Supplée le traitement salicylé à haute dose qui ne peut être continué longtemps.

Ampoules de 5 cc. et de 10 cc.

**Doses.** — Une ampoule matin et soir en injection intraveineuse.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS

## IODASSIUM

**Composition.** — Solution iodo-iodurée répondant à la formule du Lugol d'une stabilité parfaite, édulcorée, anisée et préparée avec de l'iode et de l'iodure de potassium de tout premier choix. Pas d'inconvénients d'iodisme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toutes les indications de l'iode et des iodures de potassium : bronchite chronique et emphysème pulmonaire ; tuberculose osseuse, ganglionnaire ; syphilis à toutes les périodes ; artério-sclérose ; vertiges ; insuffisance thyroïdienne ; maladie de Basedow ; obésité ; troubles circulatoires de la ménopause ; asthme ; ulcères variqueux ; maladies mycosiques : sporotrichose actinomycose, trichophyties cutanées, kérion ; lymphogranulome suppuré ; angines de toutes natures (badigeonnages et *per os*)

**Posologie** — Une cuiller à café de cette solution contient 5 cgr. d'iode métalloïde et 10 cgr. d'iodure de potassium.

*Adultes :*

*Dose faible :* 2 cuillerées à café par 24 heures.

*Dose moyenne :* 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

*Dose forte :* 6 à 12 cuillerées à café par 24 heures.

*Enfants :*

De X à L gouttes matin et soir, c'est-à-dire de X gouttes à une demi-cuillerée à café matin et soir, et plus suivant tolérance.

**Mode d'emploi.** — A prendre dans n'importe quel liquide, mais de préférence dans du lait sucré, immédiatement avant les repas.

**Laboratoire G. WARIN**

4, chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. : Auteuil 18-30

## IODAUBÉPINE

Etabli sur des bases scientifiques contrôlées par une longue expérimentation chimique, l'**Iodaubépine** constitue à l'heure présente le remède qui donne les résultats les plus heureux dans les maladies dues à l'altération des cellules et des humeurs de l'organisme.

Par sa composition (association du Crataegus et de l'iode combiné avec la peptone), à laquelle sont dues ses propriétés toniques, sédatives et vaso-dilatatrices, l'**Iodaubépine** en même temps qu'il active les échanges de notre économie, en facilite l'élimination des toxines.

Son emploi est particulièrement indiqué dans les Maladies du Cœur et des Vaisseaux, l'Artério-Sclérose, l'Angine de Poitrine, l'Asthme et l'Emphysème, la Néphrite interstitielle et l'Obésité, le Goitre et les diverses affections glandulaires.

**Doses** (sauf avis spécial du Médecin).

**Adultes :** XX à XXV gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée ou non.

**Enfants :** V à X gouttes 3 fois par jour.

Dépôt principal :

**Laboratoires ADLER**

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

Détail dans toutes les pharmacies.

## IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine.)

**Propriétés.** — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

**Indications.** — Toux, Emphysème, Asthme.

**Formes pharmaceutiques :**

*Sirop.* — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe. 15 francs.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

*Gouttes.* — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist. 15 francs.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

*Pilules.* — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 12 fr. 50.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

*Ampoules* (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour. 15 francs.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## IODENTÉROL

Iode métalloïdique et iodure de potassium en *solution* alcoolique, et *poudre* iodophile (substances amylacées et calcifiantes) assurant : 1° la tolérance parfaite de l'iode pur par la voie stomacale ; 2° la calcification simultanée de l'organisme.

**Indications.** — Toutes les manifestations de la bacillose extra-viscérale : adénopathies, synovites, ostéites, etc...

**Formes et doses.** — *Gouttes* administrées par la voie entérale ou digestive, selon un régime progressif jusqu'à quantités massives.

Prix n° 1 : 20 francs. — N° 2 : 28 francs.

**Établissements GALLINA**

4, rue Candolle — PARIS (V°).

## IODE ORGANIQUE BOISSY

( $C^6 H^{12} N^4 - C^2 H^5 I$ )

Comprimés de 10 centigr., glutinisés et dragéifiés.

**Propriétés.** — L'*Iode organique Boissy* (Iodéthylhexaméthylènetétramine) est un corps cristallisé, blanc, renfermant 43 p. 100 d'iode. Très soluble dans l'eau, il donne des solutions neutres, incolores, très dialysables. Ne provoque jamais d'iodisme. Se dissocie dans l'organisme avec mise en liberté d'*iode naissant*, puissamment *antitoxique* et *antiseptique*. Abaisse la tension artérielle et provoque une diurèse surtout manifeste au début de son emploi.

**Indications.** — Plus actif que l'iode et les iodures, les remplace avec avantage. Particulièrement efficace contre Hypertension, Angine de poitrine, Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Rhumatisme, Goutte, etc.

**Doses moyennes.** — 2 à 8 comprimés par jour.

Prix : 15 francs le flacon de 60 comprimés.

**Laboratoires BOISSY**

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

---

## IODEX

L'Iodex possède, considérablement accrues, toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, mais il a sur les associations ou combinaisons iodées employées jusqu'à ce jour des avantages indiscutables.

Lorsqu'on frictionne une surface cutanée avec l'Iodex, celui-ci disparaît sans laisser de traces. Ce fait expérimental est de la plus haute importance : il démontre que l'iode renfermé dans l'Iodex pénètre et est entièrement absorbé. C'est pourquoi cette pommade constitue un agent thérapeutique supérieur à la teinture d'iode.

L'action de la teinture d'iode n'est en effet que superficielle : appliquée sur la peau, elle perd aussitôt son alcool, laissant de l'iode métallique non absorbable ; celui-ci colore l'épiderme, et détermine de violentes réactions cutanées telles que cuisson, démangeaison, desquamation.

L'Iodex n'est ni toxique ni caustique, il ne colore pas la peau et lui conserve toutes ses qualités vitales. Il peut s'appliquer sans inconvénients même sur les muqueuses.

L'Iodex est d'une stabilité absolue. Il ne s'y forme jamais d'acide iodhydrique, et le produit ne subit aucune altération, même conservé pendant de longues années ; c'est un autre avantage qu'il présente sur la teinture d'iode, laquelle devient acide en vieillissant, et peut de ce fait provoquer de graves désordres.

Enfin sa consistance de pommade fait de l'Iodex un médicament économique, commode à transporter, et d'une application facile et propre.

### Iodex simple.

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif, exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Ses principales indications : adénopathies, oreillons, goîtres, impétigos, trichophyties, furoncles, blessures.

Prix : 12 francs.

### Iodex au Salicylate de Méthyle.

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes scarlatins, pleurites, points de côté, névrites, lumbagos, entorses.

Prix : 12 francs.

### Iodex liquide.

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures)

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoires RISSA**  
**LILLE**

## IODHÉMA

Iodo-alcoylate-méthyle-benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solutions aqueuses (43 p. 100 d'iode assimilable).

### Indications :

*Toutes les formes du rhumatisme chronique.*

### Formes :

- 1° Ampoules de 5 cc. (16 fr.) et de 10 cc. (30 fr.) ;  
1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2° Flacons (30 fr.) (voie entérale ou digestive), 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée entre les repas.

Mêmes présentations pour :

- 1° Iodhéma M (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique (14 et 28 francs) ;
- 2° Iodhéma B (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques (20 et 35 francs).

### Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V<sup>e</sup>).

## IODINJECTOL JAMMES

Médication iodée intensive indolore.

**Composition.** — Iodure de formine benzosodique :  
20 cgr. par ampoule de 3 cc.

**Indications.** — Celles de l'iode et des iodures.  
IODINJECTOL salicylé (Iodinjectol + 20 cgr. de salicylate de soude).

Action rapide et énergique sur les crises aiguës de tous Rhumatismes. Sciatique.

### Posologie des deux formes :

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

Iodinjectol « Gouttes » : 60 à 100 gouttes par jour.

Prix au public :

Ampoules : 18 francs. Gouttes : 16 francs.

### Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## **iodo-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE**

### **Composition :**

Iodo-Bismuthate de Quinine : 0 gr. 20;  
huile d'olive : 4 cc.

### **Indications :**

Dans toutes les formes de la syphilis.  
Traitement ordinaire : 30 à 35 ampoules,  
dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 18 francs.

**Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin — PARIS.

---

## **iodo-BISMUTH ERCÉ**

Iodo-bismuthate de quinine.

**Forme.** — Ampoules-seringues auto-injectables, pour injections intramusculaires.

**Avantages sur les préparations analogues.**

- 1° Trois fois *moins* d'excipient à injecter.
- 2° Suspension *stable* permettant d'éviter une agitation longue et pénible.
- 3° Suppression du transvasement toujours difficile d'une suspension huileuse.
- 4° *Résorption parfaite.*

**Indications.** — Syphilis à toutes ses périodes.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.



## IODOCALCIUM

### LA FORME MODERNE DU SIROP IODOTANNIQUE

D'un goût agréable, ne contient ni arsenic, ni phosphore. Epargne le tube digestif.

**Composition.** — Par XX gouttes : Chlorure de Calcium, 0 gr. 20 ; iode, 0 gr. 01.

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et du calcium : états de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, pré tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

**Forme.** — Flacon de 45 grammes pour 20 à 25 jours de traitement.

**Posologie.** — A partir de 2 ans : XX gouttes et plus (jusqu'à L gouttes) deux fois par jour dans un peu d'eau sucrée au début des repas.

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France,**  
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

## IODOGÉNOL PÉPIN

### Peptone iodée spéciale.

Remplace Iode et Iodures sans Iodisme.

**Propriétés.** — Très grande proportion d'iode substitué (25 %) :

Absence d'acide iodhydrique libre.

Grande stabilité des iodures organiques.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

**Indications.** — Artériosclérose. Hypertension. Arthritisme, etc...

**Posologie.** — XL à LX gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau, au début des deux principaux repas.

**Laboratoires PÉPIN ET LEBOUQ**

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 09-71.

## iodo-maïsine

### Globules.

Combinaison directe de l'iode d'une *Albumine* d'origine strictement végétale.

**Propriétés particulières.** — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

**Indications.** — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphyseme, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes.

**Posologie.** — Chaque globule contient un cgr. d'iode actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois, avant les repas.

Enregistré au Laboratoire National N° 218-3.

## iodo-maïsine

### Pommade

Iodo-Maïsine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

**Propriétés particulières.** — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

**Indications.** — Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

**Mode d'emploi.** — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'*Iodo-Maïsine pommade* est présentée en tube. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-interne des hôpitaux de Paris.

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire National N° 218-4.

## IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodométhylate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, V gouttes représentent 1 centigramme d'iode ; XX gouttes agissent comme 1 gramme d'iodure alcalin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excitateur puisant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense. Agent anti-infectieux énergique par son radical hexaméthylène tétramine.

**Indications.** — Toutes affections glandulaires, Adénites, Végétations adénoïdes, Scrofulides, etc., Maladies de la nutrition, Goutte, Rhumatismes chroniques, Sciatique, Asthme, Emphysème, etc.

**Dosologie.** — *Adultes* : XX à LX gouttes par jour.  
*Enfants* : V à XX gouttes par jour.

Prix : 12 francs.

**Laboratoire E. HAUTDIDIER**  
37, rue Galilée — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes : XX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. d'iodure de potassium.

**Doses et mode d'emploi.** — X à LX gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

**Indications.** — Maladies par ralentissement de la nutrition ; artério-sclérose ; obésité ; polysarcie ; dégénérescence graisseuse ; intoxications chroniques ; asthme ; emphysème, rhumatisme ; arthritisme ; goutte ; tertiarisme.

**Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN**  
13, rue de Poissy — PARIS.

## IODONESYL

(Gouttes)

Complexe organo-iodo-magnésien.

**Formule.** — 10 p. 100 Iode métalloïdique dynamisé par la présence de réducteurs hydrocarbonés et du magnésium.

**Action.** — L'Iode sous cette forme élective, administrée à dose élevée sans iodisme, stimule l'activité du tissu lymphoïde, réalise l'atténuation directe *in vivo* des toxines microbiennes.

Son action est alors analogue à celle d'un vaccin d'une valence strictement adéquate. Résultats cliniques surprenants.

**Indications.** — Toutes les indications de l'iode, en particulier infections aiguës, Grippe, Angines, Pneumonie, Otites, Rhumatismes, Dermatoses.

**Posologie.** — Doses d'attaque pour infections aiguës : deux cuillerées à café à 2 heures l'une de l'autre, puis XXX gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau sucrée.

**Laboratoires REVEL**

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoiodobenzoate de soude).

**Forme.** — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

**Indications.** — Hypertension, Artériosclérose, Emphysème, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

**Doses.** — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

**Laboratoire P. MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## iodo-SALVA EVESQUE

**Composition.** — Iode assimilable, Benzoate de soude, Teinture de Digitale, Teinture de Lobelie, *Alcaloïdes totaux du café.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication de choix contre l'Asthme et l'Emphysème, et il est employé avec le plus grand succès dans les maladies des voies respiratoires, en général celles des bronches.

**Forme et mode d'emploi.** — *Asthme* : Accès moyens et mineurs, dès le début de l'accès. Crises majeures, à la fin quand la phase spasmodique violente est terminée. A la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour, 1/2 dose pour les enfants. On peut fractionner.

*Emphysème et bronchite chronique.* Il faut l'employer d'une façon subcontinue à la dose d'une cuillerée à café par jour.

Prix : 16 francs.

Dépôt général : O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Littérature et échantillons :

10, rue de Belfort — RENNES (Ille-et-Vilaine).

---

## **IODOSAN**

### **Composition :**

Solution hydro-alcoolique à 6 p. 100 d'iode métalloïdique à caractère colloïdal, exempte d'iodures, iodates, etc... Dégage l'iode bi-atomique naissant par dilution dans l'eau potable ou par contact avec les tissus et les sécrétions organiques.

### **Indications :**

Hygiène quotidienne de la bouche : en collutoires et gargarismes contre toutes les affections de la gorge et comme préventif des maladies infectieuses.

Irrigations et lavages du nez et de l'oreille.

Hygiène intime de la femme.

Usage externe : traitement iodique ; tolérabilité parfaite.

Flacon compte-gouttes de 30 grammes.

Prix : 15 francs.

Préparateur :

**Établissements DARRASSE frères**

13, rue Pavée. — PARIS

## IODO-SCILLINE

**Pilules spécifiques de l'artério-sclérose.**

**Composition.** — Iode agissant contre la sclérose ; Scille, tonicardiaque et diurétique ; Scammonée à dose laxative.

**Indication.** — Artério-sclérose.

**Posologie.** — 2 à 6 pilules par jour.

Chaque pilule contient : 0,01 d'iode ; 0,02 de Scille ; 0,02 de Scammonée.

Prix : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de  
Contrôle des Médicaments.

**Laboratoires S. GABAIL**

5, rue Lefebvre — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## IODOTENSYL DUBOIS

**Forme.** — Pilules.

**Composition :**

Di-iodhydrate de Spartéine .....	5 cgr.
Benzoate de Benzyle .....	10 —
Extrait de Bourdaine .....	3 —
Charbon activé .....	10 —

Par pilule.

**Indications.** — Troubles fonctionnels de l'âge critique chez les deux sexes.

Hypertension, Artériosclérose, Asthme, Angine de poitrine et Spasmes divers.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 5 pilules par jour, de préférence avant les repas.

*Enfants* : 1 à 3 pilules par jour selon l'âge.

**LABORATOIRES DUBOIS**

R. Dubois, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## iodo-THYROÏDINE CATILLON

### Forme :

Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

### Indications :

Obésité, Goitre, Myxoédème, Dermatoses.

### Doses :

1 à 2 contre Myxoédème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

### Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III<sup>e</sup>).

## iodo-VITASINE

Iodo-protéine à formule organique nettement définie. Attaquée en milieu *intestinal* par la *trypsine* (digestion). Libère son code naissant seulement à ce niveau. Pas de troubles gastriques, pas d'iodisme (iode naissant à dégagement constant mais *non brutal*).

Avantages de l'iode et des iodures sans leurs *inconvenients*. Cinq fois plus actifs.

**Posologie.** — 1<sup>o</sup> Solution : XX à XXX gouttes par jour ;

2<sup>o</sup> Pilules : 4 à 8 par jour.

*Enfants* : dose moitié.

Ces doses peuvent être augmentées.

Pommade à l'Iode-Vitasine (antiseptique et ne tachant pas le linge).

Son action résolutive la fait employer avec efficacité dans les métrites du col.

Echantillon et littérature au Corps médical

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).



## IODURAL NOVAT

**Formule.** — Comprimés contenant chacun 25 centigr. d'iodure de potassium très pur. Chaque comprimé contient également 25 centigr. de bicarbonate de soude alcalin qui, neutralisant dès leur formation dans l'estomac les acides iodique et iodhydrique, permet d'administrer l'iodure de potassium pur sans les inconvénients habituels (iodisme, pyrosis, etc....).

Ces comprimés doivent être absorbés avec un liquide sans y être dissous.

**Laboratoires BOMEL**

ANNONAY (Ardèche) — France.

---

## IODURASE

**Description.** — Capsules glutinisées contenant :

Iodure de potassium pur ...	0 gr. 50
Levurine extractive .....	0 gr. 10

**Action thérapeutique.** — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

**Indications.** — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**  
18, avenue Hoche — PARIS.

## IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

**Antiseptique énergique**

**dépourvu de toute action irritante et de toute toxicité.**

**Propriétés.** — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humorales, de l'iode à l'état naissant.

**Infections gastro-intestinales** (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie).

**Formule.** — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

**Dose.** — *Adultes* : 6 à 12 pilules par jour.

**Usages externes.** — *Pansements et chirurgie* : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

*Pansement Lumière* : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte ou poudre) et *Tulle gras* Lumière, constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antiseptie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

**Formuler.** — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'amidon Lumière.

**LABORATOIRES LUMIERE**

45, rue Villon — LYON.

## IODURE DE FER INALTÉRABLE DE BLANCARD

**Pilules et Sirop.**

Approuvés par l'Académie de Médecine de Paris.

**Propriétés thérapeutiques.**

Agent incomparable d'Hématopoïèse grâce à sa parfaite assimilation. « Le fer est employé en thérapeutique depuis des siècles ; les plus anciennes préparations sont les meilleures ; une action certaine n'est obtenue que par les composés ferreux inorganiques et le fer métallique. »

(*Lang-Apotheker Zeitung*, 1932, n° 61.)

**Doses et Mode d'emploi.**

*Pilules* dosées à 5 cgr. d'iodure de fer, entièrement faites à la main.

*Adultes* : 2 à 6 pilules par jour aux trois principaux repas.

*Sirop* : ne contient aucun sirop coloré pouvant masquer les altérations possibles. 10 cgr. par cuillerée à soupe par jour.

**Indications**

Anémie, Scrofule Lymphatique, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée. Suite de gripes infectieuses.

*Pilules* : Prix du flacon : 14 francs. — Le demi-flacon : 8 fr. 50.

*Sirop* : Prix du flacon : 11 francs.

**BERTAUT BLANCARD frères**

64 rue de La Rochefoucauld — PARIS (IX°).

## **IODURES PACHAUT**

**chimiquement purs**

Tubes dosés d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

### **Présentation :**

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

## **Laboratoires PACHAUT**

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Téléph. : Laborde 16-72

---

## **IONYL**

Médication bio-énergétique complète.

**Composition.** — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

### **Action thérapeutique et indications :**

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles. Usure sénile).
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

Action immédiate. Innocuité absolue.

**Posologie.** — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

Littérature et échantillons gratuits.

**Laboratoires LA BIOMARINE**

DIEPPE (Seine-Inférieure).

## IRÉNINE GONNON

**Composition.** — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir : 0 gr. 53 d'Irénine proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine), 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

**Indications.** — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

**Posologie.** — 1, 2 ou 3 cachets par jour.  
Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.

Prix : 8 fr.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## IRRASTÉRINE

### Vitamine D. Standardisée.

Ergostérine irradiée par les rayons ultra-violets.

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Chocolatés.

**Composition.** — Ergostérine pure irradiée aux rayons ultra-violets, en solution dans l'huile d'olives, sans aucune addition de cholestérine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'Irrastérine peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

**Indications.** — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmophiles. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Prétuberculose et tous états de déminéralisation.

**Dose et mode d'emploi.** — *Solution huileuse* (1 goutte = 200 unités antirachitiques) jusqu'à 1 an, X gouttes ; de 1 à 10 ans, XX gouttes ; adolescents, adultes, XXX gouttes. — *Chocolatés* (1 chocolaté = 3000 unités antirachitiques) 1 à 3 par jour.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## ISACÈNE « ROCHE »

Laxatif synthétique nouveau.

**Action thérapeutique.** — L'Isacène « Roche » est la diacétyldioxyphényl-isatine, insoluble dans l'eau et l'acide chlorhydrique, soluble seulement dans le milieu alcalin du côlon, où se constitue la constipation. Il est absolument atoxique, sans odeur, sans saveur, sans aucun effet nocif ; il agit d'une manière douce, constante, certaine, sans coliques, sans épreintes et sans ténésme. Il n'est pas absorbé au niveau de l'intestin, il ne passe pas dans l'organisme, et il est éliminé en totalité avec les matières fécales.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les cas de constipation (sans aucune exception), adultes bien portants ou malades, alités, opérés, rénaux, vieillards, intoxiqués, femmes enceintes, enfants, etc.

### Posologie et mode d'emploi :

#### *Adultes :*

Dose laxative légère . . . .	2 granules.
— moyenne .	2 à 4 granules.
— forte . . . . .	4 à 8 granules.

#### *Enfants.*

1/4 ou 1/2 dose, selon l'âge et le cas.

### ISACÈNE « ROCHE »

Flacon de 40 granules.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — Paris (IV<sup>e</sup>).

# ISONAL



Dérivé méthylé à l'azote de la phényl-éthyl-malonylurée. Barbiturique dénué de toxicité, il possède des propriétés calmantes, et anticonvulsivantes, justifiant son emploi contre toutes les affections nerveuses ; il permet un sommeil agréable sans provoquer, au réveil, aucun état de torpeur.

**Indications.** — Epilepsie essentielle ou symptomatique, Anxiété, Angoisse des faux cardiaques, Nervosisme, Insomnie par surmenage ou dépression.

**Présentation.** — Comprimés de 0 gr. 10, 0 gr. 05, 0 gr. 01.

**Posologie.** — *Adultes* : de 0,60 à 0,80 par jour (traitement des phénomènes convulsifs) ; de 0,10 à 0,30 : tous autres troubles.

*Enfants* : de 0,02 à 0,10 par jour suivant l'âge.

Le tube de	20 comprimés	à 0,10	} 7 fr. 50 le tube.
—	30	à 0,05	
—	60	à 0,01	

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

## ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

### Action.

L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38, nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'Isotonyl Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyper-acide, assure l'évacuation gastrique.

### Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre. Discoïdes, 2 pour 1 verre.

*Adultes* : 2 à 3 verres par jour.

*Enfants* : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : 13 francs.

**Pharmacie CHAUMEL**

87, rue Lafayette — PARIS (IX°).

# ISPAGHUL TROUETTE-PERRET

✱ **Phytothérapie gastro-intestinale.**

Mucilage naturel des Semences sélectionnées et triées  
du *Plantago Decumbens*.

Traitement idéal de la constipation.

**Avantages.** — L'Ispaghul « Trouette-Perret » est un produit naturel d'une innocuité absolue et d'une tolérance parfaite. Son mode d'action est exclusivement mécanique.

L'Ispaghul « Trouette-Perret » rééduque l'intestin et facilite son travail biologique normal. C'est un lubrifiant.

**Indications.** — Constipation sous toutes ses formes, Digestions lentes et difficiles, Gastro-Entérites, Insuffisance biliaire.

**Mode d'emploi.** — L'Ispaghul se prend sous la forme de fines semences dont l'absorption est très facilement acceptée. On les prend pures à sec dans de l'eau ou dans un breuvage quelconque.

## Doses :

**Adultes :** Une cuillerée à soupe à chacun des principaux repas, midi et soir.

**Enfants :** Une cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge à chacun des deux principaux repas.

Littérature et échantillon sur demande aux :

**Laboratoires CONDOU et LEFORT**

15, rue des Immeubles-Industriels — PARIS (XI<sup>e</sup>)

---

# IXIUM

**Solution isotonique stérilisée de Thorium X  
pour usage médical.**

**(Injections intramusculaires profondes  
ou intraveineuses).**

## Principales utilisations et posologie du Thorium X

<i>Affections traitées.</i>	<i>Doses de thorium X employées.</i>	<i>Marche et durée du traitement</i>
<b>Rhumatismes chroniques</b>	Commencer par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à la dose de 150 à 200 micro.	8 injections, au rythme d'une injection par semaine.
<b>Goutte</b>	Débuter par des doses légères, en dehors des crises douloureuses. — de 50 à 200 micros environ, par augmentations progressives de 20.	8 injections, au rythme d'une par semaine.
<b>Psoriasis</b>	1 <sup>re</sup> injection : 50 mgr. 2 <sup>e</sup> injection : 100 mgr. les 6 dernières : 150 mgr.	8 injections, au rythme d'une par semaine.
<b>Névrite Sciatique</b>	Débuter par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à 150 à 200 micros.	8 injections, au rythme d'une injection par semaine.
<b>Anémie Chlorose Neurasthénie</b>	De 25 à 75 microgrammes, par augmentations successives.	8 injections, au rythme d'une injection par semaine.
<b>Leucémies Maladie de Hodgkin et Tumeurs</b>	Commencer par 100 microgrammes pour arriver à 350 par augmentations successives de 25 microgrammes.	5 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.

Il est bien entendu que les doses ci-dessus peuvent être modifiées au gré du médecin et que les séries peuvent être renouvelées après un intervalle d'environ 2 mois de repos.

Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de bromure de radium.

Prix de vente réglementé à 30 p. 100.

Tarifs sur demande.

L'Ixium est préparé à Paris tous les mardis par la

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

**R. MOREUX, Pharmacien**

**Ancien interne des hôpitaux**

**98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).**



## JABOSULFÈNE

**JABOrandi + hypoSULfite**

« Le désensibilisant de choix ». Modifie le « terrain » et régularise le vague.

**Pilules glutinisées** à 0 gr. 25 d'hyposulfite de Na chimiquement pur et 0 gr. 02 de poudre de feuilles de Jaborandi stabilisée.

**Doses.** — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas.

**Indications.** — Toutes manifestations anaphylactiques : Urticaire, Œdème de Quincke, Prurits, Dermatoses récidivantes, Asthme, Migraine, Rhume des foins.

**Action.** — Très grande activité due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 60 pilules glutinisées : 16 francs.  
Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.  
La boîte de 10 ampoules : 27 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE**  
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

## JECOFLUYL HARDY

**Drainage hépatique, anaphylaxie alimentaire.**

**Forme la plus agréable, la plus active,  
grâce à son absorption facile.**

Une mesure de granulé (2 gr. 40) contient environ :

Sulfate de Magnésie desséché .....	1 gr. 20
Hyposulfite de Soude sec.....	0 gr. 12
Hyposulfite de Magnésie.....	0 gr. 12
Polypeptones (viande, œuf, poisson).....	0 gr. 24

qui, associés à un extrait de bouillon, permettent, par simple dissolution dans une demi-tasse d'eau chaude, d'obtenir un bouillon de saveur agréable.

**Indications.** — Intolérance digestive, Engorgement du foie et de la Vésicule biliaire, Inappétence, Nausées, Insomnies, Obésité, Arthritisme et Goutte, Maladies hépatiques des pays chauds.

**Posologie.** — Prendre le matin à jeun, dans une demi-tasse d'eau chaude, de 1 à 2 mesures de granulé. Attendre ensuite 20 à 30 minutes pour prendre le petit déjeuner.

**Prix :** 16 francs la boîte, assurant 15 jours de traitement quotidien.

**Laboratoires PAUL HARDY**  
**Docteur en Pharmacie**

Ancien interne des Hôpitaux,  
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V<sup>e</sup>). — Tél. : Gob. 36-96.

## JÉCOL

Régulateur entéro-hépatique.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-2.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

*Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, etc.*

**Formule.** — *Combretum* (extrait spécialisé de kinkélibah).

*Boldo* (extrait aqueux).

*Evonymus* (extrait titré).

**Forme.** — Petits cachets.

**Prescription.** — 1 ou 2 cachets à la fin de chaque repas. — 3 à 6 semaines.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

**LABORATOIRE DU JÉCOL**

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine)

## JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue  
et d'extrait de malt à l'état de paillettes.

**Composition.** — Huile de foie de morue, 30 p. 100,  
Extrait de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ;  
Essences aromatiques, Q. S.

**Indications.** — Le jemalt réalise la médication à  
l'huile de foie de morue renforcée des éléments  
nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de  
malt. Anémie en général. Croissance des enfants.

**Doses.** — Enfants jusqu'à 2 ans, 1 à 2 cuillerées à  
café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à  
6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel  
que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué  
dans du lait tiède ou dans une infusion.

La boîte : 12 francs.

**Établissements WANDER**  
**P. BASTIEN, pharmacien.**  
CHAMPIGNY (Seine).

---

## JUGLANE

**Composition.** — Principe actif du noyer sauvage.

**Indications.** — Toutes les formes du diabète  
et ses complications : acidose, acétonémie, en  
particulier les diabètes gras, arthritiques, hépa-  
tiques. Aucune contre-indication, tolérance par-  
faite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 pilules avant chacun des  
trois repas. Cette dose peut être doublée sans  
inconvenient. Continuer progressivement le trai-  
tement jusqu'à complète disparition du sucre  
dans les urines.

Prix en France : 15 fr. la boîte de 150 pilules.

**Produits Euthérapiques**

**Camille CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon**  
12, rue des Ecoles — CHAMBÉRY (Savoie).

## KALMIGRAINE

**Elixir calmant concentré.**  
**Spécifique de la douleur.**

**Composition.** — 10 cc. contiennent :

Codéine .....	0,005
Stovaine .....	0,007
Caféine .....	0,08
Salipyrine .....	0,10
Pyramidon .....	0,40
Liqueur.....	Q. S. pour 10 cc.

**Propriétés.** — Puissant calmant de la douleur, agréable à prendre, très actif, bien toléré par l'estomac, rapidement assimilé. Soulage en quelques minutes.

**Indications.** — Céphalées, Migraines, Odontalgies, Névralgies, Rhumatismes, Torticolis, Lumbago, Gouttes, Sciatique, Dysménorrhée, Zona, Cystite, Fièvre, Grippe.

### Posologie :

De 8 à 15 ans : une demi à une cuillerée à café.

*Adultes* : Une à deux cuillerées à café, à prendre en cas de souffrance et renouveler au besoin 2 à 3 fois en 24 heures.

*Présentation soignée* en flacon de 120 cc. au prix de : 10 francs.

Préparation exécutée aux :

**Laboratoires MEUNIER, Pharmacien**  
Lauréat 1<sup>er</sup> prix de la Faculté de Montpellier,  
MONTMARSAULT (Allier)

## KALMOBROL

(Spécialité absolument française.)

**Composition.** — Extrait de bouillon bromuré à base de bromure de sodium très pur.

**Doses.** — 1 cuillerée à café : 1 gr. de bromure de sodium.

**Indications.** — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc., etc.).

**Mode d'emploi.** — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

**Laboratoires R. NIEL**

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône).

## KAOBROL

**Composition.** — Bromure de sodium et Poudres absorbantes. Kaolin, carbonate de magnésie, carbonate de chaux, gomme pour homogénéiser la poudre.

Poudre blanche de saveur agréable, sucrée et aromatisée à la menthe.

**Indications.** — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

**Posologie.** — Une cuillerée à café après les repas et au moment des crises douloureuses.

Littérature et Echantillons à Messieurs  
les Docteurs.

### Laboratoire du KAOBROL

J. LAROZE, Pharmacien

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

Tél. : Entrepôt 01-41.

---

## KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, lavé et stérilisé.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (*détail* sur prospectus).

**Propriétés thérapeutiques.** — Le KAOLIN constitue le médicament de choix pour le *plâtrage* de l'estomac (Prof. Hayem, A. M., 13-5-1920).

**Indications.** — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc.

La boîte de 20 paquets de 10 gr. : 12 fr.

Echantillons gratuits :

### Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 76-85.

## KAVIASE

### Traitement des infections génito-urinaires.

#### Composition et mode d'action :

La KAVIASE est une association de Macropiper-Methysticum et de Formine (antiseptique et diurétique classique).

Le Macropiper-Methysticum, également connu sous le nom de Kawa-Kawa, est une plante originaire des Iles de la Mer du Sud.

#### 2 Principes actifs :

La Kawaine et le Jenkonine lui confèrent les propriétés suivantes :

**Action sédative et analgésique**, s'étendant à tout l'appareil génito-urinaire.

Disparition de l'éréthisme inflammatoire.  
Assèchement des suppurations.

#### Avantages :

La KAVIASE peut être administrée à toutes les périodes des infections génito-urinaires, en particulier dès le début dans la blennorragie.

Ne provoque aucun trouble gastrique, ne détermine jamais de congestion rénale, ne donne à l'urine aucune odeur anormale.

**Indications.** — Urétrites aiguës ou chroniques, Cystites-pyélo-néphrites, Prostatites aiguës, Métrites-Salpingites.

**Doses et mode d'emploi.** — 6 à 8 pilules par jour avant les repas, avec un demi-verre d'eau. Maximum 12 pilules par jour.

**Laboratoires de la KAVIASE**

76, avenue d'Italie — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## KENOL

### Compensateur intestinal.

Extrait duodénal total .....	0 gr. 045
— biliaire total purifié ..	0 gr. 015
— Gladiolus ceruleus....	0 gr. 019
— Evony. atropur.....	0 gr. 019
Mag. de soufre purifié .....	0 gr. 035
pour un comprimé-dragée.	

**Propriétés thérapeutiques.** — Rétablit l'équilibre des sécrétions intestinales. Agit sur le péristaltisme. Action antiseptique puissante.

**Indications.** — **Constipation**, Affections hépatiques, Cholécystites, Dermatoses, Auto-intoxication.

**Doses.** — 1 à 3 dragées au repas du soir ou 1 à 2 à chaque repas. Avaler sans croquer. Action évacuante douce, activité constante. Pas d'accoutumance.

Prix au public : 10 fr.

**A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

---

## KERAFFINE

**Agent physique radioactif.**

**Composition.** — Les Kéraffines sont des mélanges à base de paraffine et de résines dures, radioactivées à des degrés divers par incorporation de sels de mésothorium.

**Concentration.** — Il existe 3 concentrations :

1° Kéraffine A, radioactivée à 15 millimicrocuries par kilogramme.

2° Kéraffine B, radioactivée à 150 millimicrocuries par kilogramme.

3° Kéraffine C, radioactivée à 400 millimicrocuries par kilogramme.

**Indications.** — Rhumatismes de toutes origines, rhumatisme chronique (goutteux déformant, etc.), Ankyloses, Contusions, Arthrites blennorragiques, Orchites, Phlébites, Varices, Ulcères variqueux, Névralgies, Cellulites, Brûlures à tous les degrés.

Dermatoses, Eczéma chronique, Prurits, Lichens, Sycosis, Acrocyanoses, Ecthyma, Impétigo, Zona.

**Mode d'emploi.** — Faire fondre la Kéraffine à feu doux. Laisser refroidir à 60°. Huiler légèrement la peau à l'huile de paraffine, et recouvrir de Kéraffine au pinceau ou au pulvérisateur, toute la partie à traiter. Laisser en cet état pendant trois quarts d'heure environ.

Renouveler l'application tous les jours ou tous les deux jours, suivant indication du médecin. Enlever la Kéraffine, frictionner la peau à sec et ensuite avec une serviette imbibée d'eau de Cologne. Récupérer la Kéraffine, l'assécher, et la conserver pour l'emploi suivant.

**Présentation.** — Boîtes de 100, 250 grammes et 1 kilogramme.

Prix de vente au public :

	Concen- tration A. fr.	Concen- tration B. fr.	Concen- tration C. fr.
La boîte de 100 gr.....	16 »	25 »	35 »
La boîte de 250 gr.....	35 »	55 »	75 »
La boîte de 1 kg.....	100 »	160 »	225 »

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX**

*R. MOREUX, Pharmacien.*

Ancien Interne des Hôpitaux,  
98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).



## KERLACTINE

**Composition.** — Pilules kératinisées d'acide lactique pur de ferment (principe actif de tous les ferments lactiques comprimés ou liquides) enrobées selon un procédé spécial et nouveau, qui permet de libérer l'acide lactique dans l'intestin seulement, à l'endroit précis où doit se produire sa puissante action.

**Indications.** — Entérites, Entéro-colites, Diarrhées, Dysenterie, Fermentations, Dermatoses d'origine intestinale, Auto-intoxications, Grippe intestinale, Entérites des Tuberculeux.

**Posologie.** — 5 à 6 pilules à la fin des deux principaux repas.

Pas de contre-indication.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 francs l'étui de 60 pilules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 346-7.

**Marc PARIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe**  
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

---

## KETOPHAN

Acide phénylcinchonique-alpha. Produit chimiquement pur.

**Indications.** — Diathèse urique en général : rhumatisme, goutte, dermatoses d'origine arthritique, sciatique, névralgies.

**Forme.** — Tube de 20 comprimés de 50 centigrammes.

**Doses.** — Un à 2 comprimés, 3 à 4 fois par jour.  
Etats aigus : 8 à 10 comprimés dans les 24 heures.  
Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

Prix : 6 francs.

**Laboratoires D. C. E.**

**Henri HOFSTETTER**

6, rue des Cigognes — STRASBOURG (Bas-Rhin).

## KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

### Indications.

- 1) Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
- 2) Adénoïdite aiguë de l'enfance ; décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage *utile* de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
- 3) Accès de faux croup.
- 4) Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

### Mode d'emploi.

Chez les nourrissons instiller à la fois V à VI gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.

Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller VI à X gouttes. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Flacon de 20 centilitres.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS

Prix : 13 fr. 50.

---

## KINÉCHOL

**Composition.** — Granulé soluble à base de sulfate de magnésie desséché, peptone de fibrine, extrait de boldo, hyposulfite de magnésie.

**Indications.** — Affections du foie et de la vésicule biliaire (calculs et coliques hépatiques).

Troubles digestifs d'origine hépatique : Vomissements, Pesanteurs, Constipation, Diarrhée d'origine hépatique. Manifestations hépatiques : Migraines, Urticaires, Nausées, Prurit.

**Contre-Indications.** — Cholécystites aiguës et dysenterie.

**Posologie.** — Une, deux ou trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun. Se coucher ensuite 20 minutes sur le côté droit.

Prix : 16 francs.

Laboratoire du KINÉCHOL

GENEVET, Docteur en Pharmacie

29, rue des Marchands — AVIGNON (Vaucluse).

## KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins  
et du Coryza aigu.

**Indications.** — Fièvre des foins, Coryza  
aigu.

**Forme.** — Comprimés.

**Posologie.** — *Adultes.* — 3 comprimés par  
jour.

*Enfants.* — Moitié dose

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE - LA - GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

---

## KIPSOL

(En pilules.)

Cacao pulvérisé et tannates d'alcaloïdes, avantages  
curatifs des préparations belladonnées et opiacées,  
à l'exclusion de leurs inconvénients.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 7 pilules par jour  
à intervalle d'au moins deux heures. Ces pilules,  
très petites, s'avalent facilement avec une gorgée  
d'eau, et même sans aucun véhicule liquide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique des  
Coryzas accidentels ou chroniques, des Toux,  
Bronchites, Rhume des foins, Coryza des iodures,  
Grippes, etc.

**Indications.** — Préservatif et curatif des rhumes.  
Prix : 5 francs.

**BERTAUT BLANCARD frères**

64, rue de La Rochefoucauld — PARIS

## KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

**Forme.** — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants.*

Moins d'un an .....	2 à 4	cuill. à café par jour.	
1 à 5 ans .....	4 à 8	—	—
5 à 10 ans .....	5 à 10	—	—
Au-dessus de 10 ans .....	8 à 10	—	—

**Nota.**

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

### LABORATOIRE REMEAUD

83, avenue J.-Baptiste-Clément — Boulogne-sur-Seine.

Téléphone : Molitor 04-59.

Dépôt général O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS

## KODOS

**Composition.** — Mélange effervescent de sels de potasse, de lithine, de magnésie, de soude avec de l'hexaméthylène tétramine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Elimine les déchets de la combustion vitale, Assouplit les artères, Combat la sclérose des tissus, Décongestionne le foie et les reins, Désinfecte les urines colibacillaires.

**Indications.** — Cure d'amaigrissement, Congestion du foie, Lithiase rénale, Affections de la peau, Prurit, Pyélonéphrite, Cystite, Prostatisme, Arthritisme, Rhumatisme, Troubles urinaires, Asthme et Emphyseme, etc...

**Mode d'emploi.** — Une pellette de poudre chaque matin à jeun au lever dans une eau très peu calcaire (de préférence l'eau minérale des Abatilles) ou une pellette un quart d'heure avant chaque repas.

Laboratoire de la STAR MONOPOLE

Route de Moulleau — ARCACHON

## KOLA GRANULÉE ASTIER

**Composition.** — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

**Indications.** — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et des maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

**Posologie.** — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## KOLA MONAVON

### Présentation et composition :

*Elixir* (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).

*Vin* (21°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).

*Granulée* : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.

*Pastilles* : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : Excitant tonique général.

**Indications.** — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalalgie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

### Posologie :

*Elixir* : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

*Vin* : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

*Granulée* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

*Pastilles* : 10 à 15 par jour.

### Prix :

Elixir et Vin : 18 francs. — Granulée : 13 francs. — Pastilles : 8 francs.

### Produits GONNON

J. et G. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## KOUMYL

### Concentrat de bacilles bulgares vivants en gouttes.

Le KOUMYL est une suspension de ferments lactiques extrêmement concentrée (4 milliards de bacilles par cc.) et stabilisée par son support glycérimé qui suspend la vie du bacille sans la détruire.

#### Avantages.

- 1° Maniement pratique.  
Quelques gouttes versées au moyen du flacon compte-gouttes dans un peu de lait ou d'eau.
- 2° Exempt d'acide lactique, n'entretient pas le processus de déminéralisation.
- 3° Ne contient ni caséine, ni matières grasses, ni peptones, ni sucre. N'est pas un milieu de culture favorable aux ensemencements accidentels.
- 4° Conservation pratiquement illimitée.
- 5° Pas de saveur désagréable.

#### Indications.

Toutes les affections intestinales, aussi bien chez l'adulte que chez le nouveau-né (gastro-entérites, auto-intoxication, etc.), ainsi que les dermatoses et migraines dérivées. Le KOUMYL étant d'une innocuité absolue peut être administré dès la naissance.

#### Posologie.

*Nourrissons* : I à V gouttes trois fois par jour.

*Enfants* : X gouttes trois fois par jour.

*Adultes* : XV à XX gouttes trois fois par jour.

Entre les repas dans un liquide froid ou à peine tiède. Agiter fortement avant l'usage.

Prix : 16 fr. 75.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## KYDALOSE

Poudre non toxique.

Iode organique non caustique.

Salicylate de soude.

Priser 5 à 6 fois par jour.

Coryza aigu et chronique, Obstruction nasale et ses conséquences, Sinusites, Otites, Hypertrophie des cornets, Ozène.

N.-B. — Par le salicylate de soude que contient la KYLADOSE, ce médicament convient aussi au coryza aigu et l'enraye si l'on s'en sert dès le début de la crise. Il est de plus en plus avéré que le coryza aigu n'est autre chose qu'une fluxion rhumatismale « a frigore », par conséquent justiciable du salicylate de soude employé localement.

Son effet préventif n'est pas douteux.

Echantillons (modèles de vente) :

**G. DALIN, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

49, quai Saint-Vincent. — LYON.

## KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

**Dose.** — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 12 fr. 50.

**Henry ROGIER**

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.



## LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

**Indications.** — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

**Dose.** — Pour *adultes et enfants* : une cuiller-mesure par verre de lait. *Nourrissons* : une demi-cuiller-mesure par biberon ou par tétée.

**Mode d'emploi.** — Mettre la dose indiquée dans 1 à 2 cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

---

## LABYLAX

**Composition.** — Extraits biliaires, Pancréatine, Ferments lactiques, Evonymine brune, Cynara, Podophylline.

1 à 3 comprimés le soir.

Prix : 10 francs.

20 à 30 jours de traitement.

**Indications.** — Constipation chronique, Atonie de l'intestin, Insuffisance hépatique, Entérite, Infection intestinale, Angiocholite, Cholécystite, Lithiase biliaire.

**P. BASUYAUX**

**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

94, rue Pasteur — FONTENAY-S.-BOIS.

## LACCODERMES

Vernis semi-gras, soluble à l'eau.

Pansement dermatologique.

*Laccoderme à l'oxyde de zinc* : Affections légères de la peau.

*Laccoderme sulfo-cadique* : Eczématides. — Impetigo.

*Laccoderme au goudron de houille* : Dermatoses suintantes. — Eczémas.

*Laccoderme à l'ichtyol* : Impétigo. — Ecthyma.

*Laccoderme ichtyol-slovaïne* : Dermatoses prurigineuses.

**Mode d'emploi.** — Nettoyer la peau au savon Denisol. Etendre le Laccoderme. Laisser sécher et saupoudrer avec l'Anytal Brisson.

**Laboratoires BRISSON**

**Dr DEDET et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## LACHÉSINE

Extrait du venin  
du *Trigonocephalus lachesis*.

**Forme.** — Comprimés solubles dans l'eau.

**Mode d'emploi.** — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

**Indications.** — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)

S'abstenir pendant les règles.

**Prix** : 12 francs le tube de 40 comprimés.

**Laboratoire RENAUD**

2, rue Pierre-Demours — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Étoile 23-82.

## LACPININE

**Forme.** — Liquide blanc.

**Composition.** — Emulsion d'essence de pin naturelle.

**Indications.** — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

**Mode d'emploi.** — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la LACPININE s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

Prix.	{	Flacon de	60 gr. :	5 fr. 80
		—	150 gr. :	13 fr.
		—	750 gr. :	43 fr. 80
		—	1 000 gr. :	50 fr.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

## LAC-SER

**Composition.** — Lactosérum desséché.

**Propriétés.** — Provoque dans l'intestin des fermentations acides qui s'opposent aux putréfactions albuminoïdes toxiques. A, en outre, une action diurétique et cholagogue.

**Indications.** — Auto-intoxications intestinales, entérites des nourrissons, affections hépatiques.

**Formes et posologie.** — Paquets : 5 gr. de lactosérum desséché par paquet correspondant à 100 gr. de lactosérum liquide.

**Dose :** 3 à 4 paquets par jour dans un liquide (300 à 400 gr.).

**Prix :** 15 francs (boîte de 30 paquets).

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## LACTAGOL

### Poudre.

**Nature.** — Protéine galactogénique extraite par procédé spécial de la graine de cotonnier, Phospho-protéides, Phosphates organiques assimilables.

**Mode d'emploi.** — Poudre agréable à prendre : 3 à 6 cuillerées à café par jour avant ou après les repas, délayée dans un liquide froid ou tiède. Ne pas chauffer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Accroissement de la sécrétion lactée, enrichissement du lait en principes actifs : beurre, caséine, sels, etc.

**Indications.** — Agalactie, Hypogalactie, Allaitement maternel insuffisant au point de vue qualités du lait, Fatigues de l'allaitement.

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire National N° 218-6.

---

## LACTARIS

**Bactériothérapie polyvalente nouvelle**  
par précipité massif de cultures lactiques acidophiles  
en symbiose.

**Effet thérapeutique.** — Hyperactif et stabilisé.

**Présentation.** — Ampoules-flacons de 6 cc. à sucer, état pur, à l'aide des chalumeaux stérilisés inclus dans la boîte.

**Composition.** — Env. 2 mgr. 5 de bactéries lactiques acidophiles en symbiose.

**Indications.** — Toutes diarrhées, entérites, intoxications intestinales. *Colibacillose*.

**Doses.** — *Adultes, enfants* : 2 à 3 ampoules 1/4 d'heure avant les repas.

**Nourrissons** : 1 ampoule mélangée au biberon.

**Prix** : 25 francs la boîte de **18 ampoules**  
(cure de 9 jours).

**Laboratoire CENTRAL**

129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

**MASSON, Pharmacien.**

## LACTICHOLÉINE TULIVET

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés.  
Extrait de fiel de bœuf.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique infail-  
liblé dans les affections du tube digestif, dans les  
affections intestinales et cutanées, dans l'insuf-  
fisance biliaire et la désinfection intestinale.

**Mode d'emploi.** — A prendre 10 minutes avant le  
repas dans de l'eau sucrée ou du lait.

*Adultes* : 3 à 8 comprimés par jour.

*Enfants* : 2 à 5 comprimés par jour.

*Nourrissons* : 1/2 comprimé 2 fois par jour.

**Laboratoire TULIVET**

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

---

## LACTIMASE

**Description.** — Comprimés de ferment  
lactique de 0 gr. 50 ; par flacons de 40 com-  
primés.

**Action thérapeutique.** — La *Lactimase*  
détruit les microbes pathogènes de l'intes-  
tin par accaparement du milieu, action  
renforcée par la symbiose du bacille Bul-  
gare et d'une levure spéciale.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour  
dans les intoxications intestinales, diar-  
rhées vertes des nourrissons, constipation,  
dysenteries, entérites.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques  
sélectionnés.

**Doses et mode d'emploi.** — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

**Indications.** — Auto-intoxication intestinale, entérites, diarrhées, dermatoses.

**Laboratoires DARRASSE**

7 à 13, rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine).

---

## LACTOBYL

**Composition :**

Sels biliaires.

Poudre de muqueuses intestinales.

Charbon poreux hyperactivé.

Ferments lactiques sélectionnés.

Extrait Cytoplasmique de *Laminaria flex.*

Pancréine.

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 35.

**Propriétés thérapeutiques.** — Rééducateur intestinal.

**Indications.** — Toutes les modalités de la constipation.

**Doses et Mode d'emploi.** — De 2 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés 10 minutes avant ou après les repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Prix de vente au public : 12 francs.

**LE « LACTOBYL »**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## LACTOCHOL

**Composition.** — Ferments lactiques. Sels biliaires.

**Forme.** — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

**Propriétés thérapeutiques.** — Infections intestinales, entérite. Adultes et nourrissons, Insuffisance biliaire.

### Dose et mode d'emploi :

*Adultes : Comprimés :* 2 à 6 par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avalé sans mâcher).

*Enfants :* 2 à 6 comprimés par jour dans miel, confiture, 1 cuillerée à café avant les repas.

*Nourrissons :* 1 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

Prix de vente au public : 14 francs.

**Laboratoires « LOBICA »,  
46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).**

---

## LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

**Forme.** — Comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

*Enfants :* 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 14 francs.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## LACTO-SÉRUM LAVRIL

Sérum de lait dans son état moléculaire original.

Substance Tampon du sang. Isotonique.

$\Delta = 0,55$  ; pH = 6,8.

Anti-toxique, diurétique, cholagogue.

Active les grandes fonctions et les éliminations.

Régit la flore intestinale. Equilibre l'isotonie humorale.

### 1° Cure de désintoxication.

Le flacon de 240 grammes pris en 2 ou 3 fois le matin à jeun à 20 minutes d'intervalle, pendant 5 ou 10 jours.

**Indications.** — Insuffisances, Intoxications, Infections.

*Intestin* : Constipation, Entérite, Colibacillose, Appendicite.

*Rein* : Néphrite, Pyélonéphrite, Urémie, Lith, Cystite, Anurie.

*Sang* : Hypertension, Azotémie, Acidose.

*Foie* : Toutes affections de petite insuffisance à hépatite aiguë.

Traitement hépatique : fractionner et multiplier les prises.

L-S HYPERACIDE : pH 4,5 spécial pour états infectieux et alcalose.

### 2° Grande cure diététique.

Flacon de 960 grammes par prises de 120 grammes espacées de 2 heures.

**Diète** des fiévreux, Grippés, Typhiques, grands malades, Infections aiguës.

**Chirurgie** : Préparation opératoire. Diététique post-opératoire.

### 3° Médication infantile.

Troubles d'assimilation : Mélanger 25 à 50 p. 100 de L.-S. L. au lait.

Troubles gastro-intestinaux : 60 à 80 grammes de L.-S.-L. pur le matin.

Cas aigus, entérite : 7 biberons de 60 à 80 grammes de L.-S. L. pur.

### Nota :

Prescrire : Lacto-Sérum Lavril, petite ou grande cure. Sucrer ou aromatiser à volonté avec café ou citron. Si acidité gastrique : alcaliniser.

Défendre à l'adulte tout aliment lacté. *Infection intestinale* : ajouter 2 grammes de poudre Lacto-Ferment Lavril.

## LACTO-FERMENT LAVRIL

Ferment lactique : activité, vitalité, longévité indéfinie. Streptobacillus et streptococcus Lebenis en symbiose, poudre pour Pansements et comprimés à usage interne gastro-intestinal.

**Pansements lactiques.** — Chirurgie, Gynécologie.

1° Saupoudrer la plaie de Lacto-Ferment Lavril.

2° Saupoudrer de Lacto-Ferment et appliquer un pansement tiède et humide de Lacto-Sérum Lavril.

3° *Bouillie lactique.* — Mettre 2 grammes de poudre pour 50 grammes de Lacto-Sérum. Chauffer à 45° 10 minutes, tiédir pour lavage, pansement des plaies infectées, atones, brûlures, périnées et injections. Epaissir à volonté en ajoutant de la poudre et du lactose.

Pour Pansements, utiliser nos ampoules de 20 et 50 cc. d'Orgamine (ex-Lacto-Sérum Rotschild).

26, boulevard des Batignolles — PARIS

Tél. : Marcadef 21-14.



## LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

Combinaison chimique définie de magnésie et d'eau (hydroxyde de magnésium) ne contenant aucun excipient destiné à maintenir la magnésie en suspension.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-acide, sédatif gastrique, Laxatif.

**Indications.** — Gastralgies, Dyspepsies acides et nerveuses, Eructations, Etats bilieux, Constipation, Coliques, Diarrhées d'origine dyspeptique, toutes les affections dues à l'acidité buccale.

**Posologie.** — *Anti-acide.* Adultes. — D'une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, 2 heures après les repas. Enfants : 1/2 à une cuillerée à café. Nourrissons : X à XX gouttes suivant l'âge.

*Laxatif.* Adultes. — D'une à quatre cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de limonade, une heure et demie avant le petit déjeuner du matin. Enfants : de une à deux cuillerées à café. Bébés : une demie à une cuillerée à café, suivant l'âge.

*Anti-acide buccal.* — Après s'être brossé les dents, bien se rincer la bouche avec une cuillerée à soupe de Lait de Magnésie Phillips. Il se forme sur les dents et les gencives une pellicule alcaline qui dure plusieurs heures et les protège contre les attaques de l'acide.

Présentation : flacon de 120 cc., triple-flacon de 360 cc. environ.

---

Echantillons et littérature sur demande à

O. C. P.

108, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Préparé avec le lait pur de la Gruyère (Suisse). Est livré sous trois formes :

Lait complet, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, à une température n'excédant jamais 50°, conserve toutes ses vitamines et peut alimenter un nourrisson sans adjonction de jus de fruit. C'est un lait vivant. Il caille spontanément comme le lait cru.

Par sa coagulation, par la petitesse de ses globules gras, par sa facilité de digestion, se rapproche du lait maternel.

**Indication.** — Lait sucré spécialement préparé pour l'alimentation des nourrissons et des personnes ne supportant pas le lait frais.

**Dose.** — Une partie de Lait GUIGOZ pour six parties d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

**Soupe de babeurre Guigoz en poudre.** — A base de lait totalement écrémé, de dextrines et de ferments lactiques vivants, combat l'entérite infantile. Sa conservation est parfaite.

Littérature et échantillons :

**LE LAIT GUIGOZ**

19, rue J.-J.-Rousseau — PARIS (1<sup>er</sup>).

Tél. : Gutenberg 73-00.

## LAIT GALLIA

Lait concentré sucré.

Préparé à NEUFCHATEL-EN-BRAY (Seine-Inférieure), concentré dans le vide à basse température, conserve toutes ses vitamines ; très sucré (42-43 p. 100), d'une grande valeur alimentaire surtout pour les *nourrissons et enfants*.

Pour dosage précis des repas, se servir du biberon TRILAC-GALLIA le seul qui indique le dosage des trois laits couramment employés dans l'alimentation des nourrissons : LAIT GALLIA concentré sucré ; LAIT naturel stérilisé ; GALLIASEC, lait en poudre soluble.

## GALLIASEC

Lait en poudre soluble : partiellement écrémé (matière grasse 12 p. 100). Pour enfants débiles, prématurés, premiers mois de la vie.

## CARNET DE SANTÉ GALLIA

(pour nourrissons.)

Permet l'établissement d'une documentation médicale précieuse pour la maman et le médecin.

CH. GERVAIS, S. A.

11, rue de Prony — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

Tél. : Carnot 54-63 (5 lignes).

# LAIT MONT BLANC

## 1° CONCENTRÉ SUCRÉ.

### Composition moyenne :

Eau.....	24	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	10	—
Matières azotées (caséine, albumine).....	10	—
Lactose (sucre de lait).....	13,40	—
Saccharose (sucre cristallisé).....	40,75	—
Cendres.....	1,85	—

**Nature et caractéristiques.** — Lait de vache pur et intégral condensé en vase clos et à basse température, après pasteurisation, additionné de sucre cristallisé de premier choix. — Riche en vitamines.

**Propriétés et indications.** — Allaitement mixte ou artificiel. Spécialement indiqué chez les nourrissons atteints de troubles de la digestion ou de la nutrition, d'arrêt de croissance et de rachitisme, indiqué également chez les adultes en cas d'entérites, de dyspepsies, de tuberculose intestinale ou pulmonaire.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc serties, de 75, 200 et 400 grs net.

**Mode d'emploi.** — Suivre les indications portées sur l'étiquette des boîtes. Pour l'allaitement des nourrissons utiliser de préférence le biberon gradué « MONT BLANC » en vente dans toutes les pharmacies, ou demander à la Compagnie Générale du Lait son barème de dosages normaux.

## 2° CONCENTRÉ NON SUCRÉ.

### Composition moyenne :

Eau.....	72	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	8	—
Matières azotées (caséine albumine).....	8	—
Lactose (sucre de lait).....	10,5	—
Cendres.....	1,5	—

**Nature et caractéristiques.** — Successivement concentré, homogénéisé, mis en boîtes hermétiques et enfin stérilisé, ce lait est rigoureusement pur, c'est-à-dire exempt de germes saprophytes et pathogènes. Il se conserve indéfiniment et se digère parfaitement.

**Propriétés et indications.** — A peu près les mêmes que pour le lait sucré mais en ne perdant pas de vue que ce lait est stérile. Il est donc recommandé — lorsque son emploi est exclusif et prolongé — de faire absorber journellement aux nourrissons quelques cuillerées à café de jus de fruit frais (orange, citron ou raisin), de façon à compenser l'absence de vitamines.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc serties, de 170 et 450 grammes net.

## 3° NATUREL HOMOGÉNÉISÉ STÉRILISÉ.

### Composition moyenne :

Eau.....	87,60	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	3,50	—
Lactose (sucre de lait).....	4,70	—
Matières azotées (caséine, albumine).....	3,50	—
Cendres.....	0,70	—

**Nature et caractéristiques.** — Les mêmes que celles du lait concentré non sucré, la concentration en moins.

**Propriétés et indications.** — Recommandé dès le début de l'allaitement, et spécialement chez les bébés débiles ou prématurés. Très digestible, réussit particulièrement bien aux nourrissons constipés ou vomisseurs, à ceux sujets à l'eczéma ou atteints de troubles de la digestion ou de la nutrition. Également précieux à l'époque du sevrage et pendant les chaleurs.

Recommandé chez les adultes, en dermatologie (cures de désintoxication, eczéma, etc...), en gastro-entérologie, dans les cas de cancers d'estomac, de sténose ou spasmes du pyllore, etc...

**S'emploie comme du lait ordinaire.** — Jus de fruits frais en cas d'alimentation exclusive.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc serties de 165 et 420 grammes net. Échantillons, littérature et prix spéciaux sur demande à la

**COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT**

RUMILLY (Haute-Savoie).

Société anonyme au capital de fr. : 10.000.000.

## LAITS DARDELET

### Formes :

*Lait humanisé n° 1* (Système Backauss modernisé). — Semblable par sa composition au lait de femme. Ne contient ni eau surajoutée, ni antiseptique.

*Lait humanisé n° 2.* — Destiné à faire la transition entre l'humanisé n° 1 et le lait de vache.

*Lait naturel homogénéisé.*

*Le Babeurre Dardelet.* — Médicament héroïque de la diarrhée verte et entérite.

*La soupe de Babeurre.* — C'est du babeurre additionné de 2 p. 100 d'Arrow-Root.

**Mode d'emploi.** — Faire tiédir au bain-marie.

Prix, en bouteilles de capacités suivantes :

1/8, prix : 1 fr. 25, plus 0 fr. 75 de consigne. Caisse de 10, 25, 50.

1/4, prix : 2 francs, plus 1 franc de consigne. Caisse de 25 ou 50.

1/2, prix : 3 fr. 80, plus 1 fr. 20 de consigne. Caisse de 21.

Toutes les bouteilles sont remboursées au tarif de consigne.

### J. DARDELET

BONNARD (Yonne). — Tél. : 4.

---

**LAIT SEC « C. G. »****(Cow et Gate Milk Food).****Aliment pour enfants dès la naissance.****Analyse :**

Graisse .....	27,3	p. 100.
Protéine .....	26,6	—
Lactose .....	37,6	—
Matières minérales .....	6,0	—
Eau .....	2,5	—
	<hr/> 100,	

**Valeur calorifique par 100 grammes : 518.**

**Indications.** — Préparé avec du lait de vache de l'ouest de l'Angleterre par le procédé perfectionné à rouleaux « Cow et Gate » tout en conservant intacte la teneur exceptionnelle en vitamines naturelles et sels minéraux pour laquelle le lait de ces pâturages est très renommé.

Le « Lait C. G. » est un aliment complet pour enfants dès la naissance. L'aliment est strictement standardisé, point très important pour le médecin. Il contient invariablement le même pourcentage de graisses et il est exempt des variations et des irrégularités du lait liquide et d'autres aliments.

**Pour nourrissons :** Le « Lait C. G. » forme dans l'estomac de l'enfant un caillé velouté et léger complètement assimilable et qui pratiquement ne se distingue pas du lait de la mère.

**Préparation.** — Suivant les doses indiquées sur la boîte. A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

**Société de Spécialités Diététiques et Pharmaceutiques**

22, rue des Belles-Feuilles — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

**Et W.-P. WRATHALL**

204, rue Royale — BRUXELLES.

## LAMINAROL

**Composition.** — Hormones et ferments gastro-intestinaux, extrait hépatique, sels biliaires dépigmentés, ferments lactiques sélectionnés, mucilage endocellulaire d'algues marines, charbon hyperactivé, gomme, résine.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, arthritisme, constipation sous toutes ses formes, infections intestinales, troubles gastro-intestinaux, etc...

**Mode d'emploi.** — 2 à 8 comprimés par jour.

« PROTHERAPIA »

Laboratoire G. CHAMAGNE

Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie,  
Lauréat de l'Académie de Médecine  
132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## LANSOYL

HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

**Deux formes.** — Liquide et gelée.

**Liquide :** Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

**Gelée :** Contient 90 p. 100 de Lansoyl liquide et 10 p. 100 de suc de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect d'une véritable gelée de fruits. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

**Propriétés thérapeutiques.** — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

**Indications.** — Constipation chronique, Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

**Doses.** — *Adultes :* Une cuillerée à dessert le matin et le soir.

*Enfants :* Une cuillerée à café trois fois par jour.

*Nourrissons :* Une demi-cuillerée à café trois fois par jour

Prix : *Liquide :* G. M., 20 fr. ; P. M., 12 fr.

*Gelée :* 18 fr. 50.

ROBERTS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Opéra 48-91.

## LANTOL

**Description.** — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium ; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules, et en capsules glutinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

**Action thérapeutique.** — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

**Indications.** — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, gripes, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

---

## **LAROSAN « ROCHE »**

Caséine-Calcium

Spécifique de la Diarrhée infantile.

**Avantages.** — Alcalinisation du milieu intestinal. Suppression du petit lait. Apport minimum de sucre. Taux élevé de caséine.

**Indications.** — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (Diarrhées simple, lientérique, verte, infectieuse, cholériforme. Diarrhées de dentition et de sevrage. Athrepsie, etc.)

Diarrhées toxiques des enfants et des adultes. États dyspeptiques des adultes. Ulcère de l'estomac, etc.

### **Modes d'emploi et doses :**

On prépare des mélanges : Eau bouillie, Lait, Larosan contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

**Indications.** — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène médecine générale.

**Mode d'emploi.** — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

**Doses.** — Suivant les indications.

Le litre : 10 fr. — Le demi-litre : 6 fr. 25.

**Formes actives.** — SAVON LAURÉNOL (antiseptie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

**LAURENOL n° 2, désinfectant, sans odeur, ni mercure.**

Savon Laurénol : 4 fr. — Savon dentifrice : 6 fr.

Ovules Laurénol : 12 fr. — Pommade : 10 fr.

Laurénol n° 2 :

Le litre : 6 fr. — Le demi-litre : 4 fr.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX°).

## LAURIATOL

**Propriétés.** — Reconstituant général, Accroît le dynamisme des cellules nerveuses, Accélère les échanges nutritifs.

**Indications.** — Dépressions nerveuses, surmenage physique et intellectuel, neurasthénie, anémie, chlorose, insuffisance de la nutrition, convalescences, pré-tuberculose, tuberculose, croissance.

**Composition.** — Pour un comprimé : Nucléinate de Manganèse 0,025; Extr. sec de Noix vomique 0,0025; Salicine cristallisée 0,05; Picraena excelsa 0,05; Gonolobus Condurango 0,05; Glycérophosph. de magnésie 0,05; Phosph. tricalciq. 0,20; Excipient (Talc, Gomme) 0,20.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Posologie.** — *Adultes* : 4 comprimés par jour, soit 2 comprimés 1/2 heure avant chaque repas.

*Enfants* : au-dessus de 8 ans : 1/2 dose.

**Avaler sans sucer ni croquer.**

Prix : 15 francs la boîte de 60 comprimés.

**Laboratoire LAURIAT**

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

## LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.

**Poudre cristalline d'un goût très agréable.**

**Posologie :**

**Nourrissons :** 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

**Enfants :** 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

**Adultes :** 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

**Laboratoires LICARDY**

**38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.**

**Téléphone : Maillot 17-75.**

---

## LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

**Pastilles Miraton Châtel-Guyon.** — Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du péristaltisme intestinal, non irritant.

**Dose.** — 1 à 2 pastilles, le soir au coucher.

**Grains Miraton Châtel-Guyon.** — Sels de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques. Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

**Dose.** — 1 à 2 grains au repas du soir.

**Enregistré au Laboratoire National n° 218-7 (grains)  
n° 218-8 (pastilles).**

**Littérature et échantillons :**

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,**

**Ex-interne des Hôpitaux de Paris,  
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).**

## LAXOCHOLÉINE TULIVET

**Composition.** — Extrait de fiel de bœuf,  
0 gr. 20.

**Forme.** — Ovoïdes glutinisés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Ictères, Cholémie, Constipation, Entéro-colite.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 8 par jour avant les repas.

**Laboratoires TULIVET**

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

---

## LAXOGELOSE TULIVET

**Composition.** — Agar-Agar et Extrait de Rhamnées.

**Forme.** — Cachets.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action laxative. Agit mécaniquement par augmentation du bol fécal et massage la intestinal. Sans action irritante sur muqueuse intestinale.

**Mode d'emploi.** — Un cachet au début du repas. 1 à 3 par jour.

**Laboratoires TULIVET**

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

## LAXOPEPTINE GIRARD

Ferments de céréales contenant leurs Vitamines.  
Citrates de soude, Eupeptiques, poudre agréable  
à prendre.

### Mode d'emploi :

*Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans  
lait ou eau bouillie.

*Enfants* : doubler ou tripler les doses.

### Propriétés thérapeutiques :

Régulateur des fonctions digestives, antiseptique  
intestinal, laxatif idéal des nourrissons et jeunes  
enfants.

### Indications :

Ballonnements, Gastro-entérites, Maladies infec-  
tieuses ou fébriles d'origine digestive, Vomisse-  
ments du nourrisson et de l'adulte, Constipation  
infantile.

### Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire National N° 405-4.

---

## LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine par cuillerée  
à café.

**Propriétés thérapeutiques.** — Elle accélère les  
échanges nutritifs, accroît les forces, augmente  
très rapidement le poids du corps et le nombre  
des globules rouges du sang, tonifie la cellule  
nerveuse.

**Indications.** — Phosphaturie, neurasthénie, affec-  
tions du cerveau et de la moelle ; Chlorose, dia-  
bète, rachitisme ; Convalescences longues et  
pénibles.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

### Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## LÉNICURE-VICHY

Médication préventive et curative des affections hépatiques et biliaires.

Adjuvant précieux de la cure de Vichy.

**Composition.** — Acides cholique, oléique et palmitique associés au combretum R.

**Forme.** — Capsules enrobées de gluten pour les soustraire à l'action dissolvante des sucs de l'estomac.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Lénicure-Vichy a une action dissolvante remarquable sur les calculs hépatiques. Il empêche la formation des boues biliaires en maintenant en dissolution la cholestérine, désagrège et permet l'élimination des calculs sans douleur, excite et fluidifie la sécrétion biliaire.

**Indications.** — Coliques hépatiques, Congestion douloureuse du foie et de la vésicule biliaire, Hépatite paludéenne, Cirrhoses, Constipation d'origine hépatique.

**Posologie.** — 1<sup>o</sup> Action préventive des coliques hépatiques : 8 capsules par jour, 10 jours par mois.

2<sup>o</sup> Action curative des coliques hépatiques, 12 capsules par jour.

3<sup>o</sup> Congestion douloureuse du foie et autres cas, 6 à 8 capsules par jour, 10 jours par mois.

4<sup>o</sup> Pendant la cure de Vichy : action adjuvante, de 4 à 8 capsules par jour.

L'action du LÉNICURE-VICHY peut être prolongée sans inconvénient.

Prix de vente au public : 17 fr.

**Laboratoires DALET**

24, Av. Mathurin-Moreau. — PARIS (XIX<sup>e</sup>).  
(anciennement 94, Bd des Batignolles).

## LÉNIFORME

**Composition.** — Huile à 2, à 5, et 10 p. 100 d'Essences végétales antiseptiques.

**Indications.** — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

**Forme et mode d'emploi.** — Se vend en flacons pour instillations et pulvérisations.

Est également présenté à 2, à 5 et 10 p. 100 sous forme de **Rhino-Capsules** en gélatine pour auto-injections nasales.

**L. E. V. A.**

26, rue Pétrelle — PARIS (IX<sup>e</sup>).



---

## LEOPHANI COMPOS. LEO

**Composition.** — Chaque comprimé renferme :

Acide phénylchinconinique.	0 gr. 166
Salicylate de soude.....	0 gr. 166
Iodure de potassium.....	0 gr. 083
Hexaméthylène tétramine..	0 gr. 083

**Indications.** — Rhumatisme, surtout l'arthrite.

**Présentation.** — Flacon de 50 comprimés.

**Mode d'emploi.** — Boire 3 fois par jour 2 ou 3 comprimés dissous dans un verre d'eau bouillie.

Représentant Dépositaire général :

**Ed. JUST**

11, square Marie-Louise — BRUXELLES.

Tél. : 12-28-04.

## LÉOTAMINE

**Pommade à base d'Insuline « Leo » et de Vitamines A et D.**

**Indications.** — Accélère la cicatrisation des plaies de guérison difficile chez les personnes anémiques, asthéniques, hémophiles et principalement chez les diabétiques.

**Forme.** — Tube de 15 et 30 grammes.

**Mode d'emploi.** — Application directe sur la plaie ; couvrir la plaie d'un pansement aseptique.

**Valentin AAGE MOLLER**

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire :

Pour la France : **Jean DEDIEU**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

## LEUCAGINE

*Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aiguës et chroniques.*

**Application.** — Pansements utérins. — 2 formes :

1° — **CRAYONS**

**Présentation.** — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 3, 5 et 10 micros.

**Indications.** — Métrites, Affections du col et du corps : 2 applications par semaine (Consulter la Notice).

N.-B. — Utiliser pour l'application l'appareil « *Porte-pansement* » spécial.

2° — **OVULES**

**Indications.** — Tous les cas d'infection des voies génitales. Un ovule tous les jours.

Le crayon à 1 micro : 12 fr. ; à 3 micros 18 fr.

à 5 micros : 25 fr. ; à 10 micros : 35 fr.

La boîte de 5 ovules : 30 fr.

**Laboratoires pharmaceutiques  
L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. O.**

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.  
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

# LEUCOSEPTYL

## Thérapeutique anti-infectieuse rationnelle.

**Composition.** — Le *Leucoseptyl* est un extraite leucocytaire total injectable de l'Institut biologique Mérieux de Lyon. Il est obtenu à l'aide des globules blancs de cheval éclatés par congélation. C'est une véritable préparation opothérapique spécifique, contenant les endo-ferments, les exo-ferments et le stroma leucocytaires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le *Leucoseptyl* stimule la leucopoïèse, active la phagocytose, exalte les moyens de défense de l'organisme contre les infections, constitue la base biologique de toute thérapeutique anti-infectieuse.

**Indications.** — Toutes les infections aiguës ou chroniques, localisées ou généralisées, attribuables à des agents pathogènes identifiés ou méconnus.

**Forme.** — Le *Leucoseptyl* se présente en boîtes de 5 ampoules de 2 centimètres cubes.

**Emploi.** — Injection sous-cutanée ou intramusculaire. Ne jamais recourir à l'injection intraveineuse. L'injection n'est pas douloureuse et ne provoque pas de choc.

Le *Leucoseptyl* peut être employé seul ou en association avec la Vaccinothérapie, la Sérothérapie ou la Chimiothérapie.

Injecté en même temps que les vaccins, il en décuple l'action.

**Doses.** — *Adultes et enfants* de plus de 3 ans.

Infections aiguës : 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Infections chroniques : 1 ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

*Enfants en bas âge ou nourrissons* — 1 à 2 centimètres cubes par jour.

Littérature et échantillons sur demande.

Dépositaire exclusif :

**Laboratoires de l'Opocalcium**

**A. RANSON**, Docteur en pharmacie.

121, avenue Gambetta — PARIS.

Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81, 62-82.



## LEVURE B-17

de H. BOULARD

**Levure vivante, rigoureusement pure de ferments étrangers.**  
*Isotherme* (vit et se développe à 37° C).

**Livrée** en boîtes de 6 ampoules de 3 cc. 5, contenant la levure en milieu isotonique où elle reste vivante plusieurs années.

**Propriétés.** — Elimine les ferments pathogènes de l'intestin par concurrence vitale, sans produire d'acidité notable.

**Indications.** — Diarrhée infantile, Diarrhée banale des adultes, Dysenterie amibienne ou bacillaire, Entérites, Furonculoses et Dermatoses, Colibacilloses intestinales et urinaires.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules par jour dans un liquide sucré, froid ou tiède.

La boîte de 6 ampoules : 16 francs.

Laboratoire des Ultra-Levures

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. ☉.

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine  
Membre de la Société de Pharmacie de Paris  
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

## LEVURE FRAICHE MYCÉTA

### Composition :

*La Levure fraîche Mycéta* est une levure pure fraîchement essorée, appartenant au type *Saccharomyces cerevisiae*, sélectionnée et active, sans aucune addition de matières étrangères.

### Propriétés :

Par son action fermentaire, ses diastases et ses vitamines, la levure Mycéta régularise les fonctions digestives, entrave le développement des putréfactions intestinales, agit sur les troubles de la nutrition, désintoxique le sang et augmente la résistance de l'organisme aux infections microbiennes.

### Indications :

Infections microbiennes, troubles digestifs et maladies de la nutrition, en particulier : états arthritiques, insuffisance hépatique, goutte, diabète, et maladies de peau (urticaire, furoncles, orgelets, etc.).

### Mode d'emploi :

Une dose par jour, de 15 gr. environ, en une ou deux fois, une demi-heure au moins ou une heure avant les repas. La livraison est faite par le Laboratoire tous les deux jours.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV°).

## LEVURINE EXTRACTIVE

**Description.** — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

**Action thérapeutique.** — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme vaccin polyvalent vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

**Indications.** — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**  
18, avenue Hoche — PARIS.

---

## LEVURO - MALTINE DÉJARDIN

Levure de bière fraîche, pure, sélectionnée, extrêmement riche en vitamines B anti-névritiques.

**Indications.** — Anthrax, Clous, Furonculose, Eruptions cutanées, Fermentations intestinales, Tuberculose pulmonaire.

**Posologie.** — Avant chaque repas une forte cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou d'extrait de Malt français DÉJARDIN.

**Etablissements DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## LICHÉNOSE DUCLOY

Acide fumaro-proto-cétrarique pur.

**Médicament de la nausée et des vomissement  
nauséeux.**

**Forme.** — Tabloïdes de 1 cgr. dragéifiées.

**Doses.** — 3 à 6 par jour en moyenne. On peut doubler cette dose en cas de besoin.

**Mode d'emploi.** — A avaler avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

**Indications.** — *Toutes les nausées*, mal d'auto, de chemin de fer, de bateau, d'avion, de théâtre, etc. *Nausées d'origine psychique* (émotions, dégoûts), *d'origine auriculaire* (vertiges), *d'origine digestive*, *pharyngée, gastrique, duodénale, vésiculaire, colique, affections utérines, grossesse.*

**Contre-indications.** — Aucune. Médicament atoxique.

**Laboratoires DUCLOY ET Cie**  
ARQUES (Pas-de-Calais).

## LIENTINE GRÉMY

Sels biliaires .....	0,10
Thyrénine.....	0,005
Extraits intestinaux.....	0,10
Evonymine.....	0,003
Extrait de cascara et bourdaine.	0,005
Bacterium coli.....	}      ââ 150 millions.
Entérocoques .....	
Bacterium proteus.....	
Staphylocoques .....	
pour 1 pilule de 0,55.	

### Traitement de la constipation.

Constipation par atonie intestinale, par défaut de sécrétion intestinale; entérocolite muco-membraneuse.

Agit à la fois sur la tonicité et sur la sécrétion de l'intestin.

**Laboratoires G. GRÉMY**  
14, rue de Clichy — PARIS.

## LIMOL CHURCHILL

(Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose).

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.  
Préparation de chaux et de phosphore au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable. Recalcifiant idéal.

**Indications.** — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

**Mode d'emploi.** — *Adultes :*

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intra-musculaire chaque deux jurs.

*Enfants :*

**Sirop.** — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de ce âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules — Prix 15 francs;

**PRODUIT FRANÇAIS**

**Laboratoire CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (1<sup>er</sup>).

## LIMONADE (CITROSE DE VICHY)

Voir « Citrose de Vichy ».

Citrose-Vichy

Limnade purgative à base d'eau minérale de Vichy, parfumée avec les sucs de fruits (orange et citron).

**Composition.** — Cette limnade préparée, avec les sels de fruits associés au sel naturel de Vichy, constitue un excellent purgatif d'un goût très agréable et d'une conservation parfaite.

Elle n'occasionne jamais ni coliques, ni nausées. Sa composition, par bouteille de 200 cm<sup>3</sup>, répond à la formule suivante :

Sel de Vichy.....	34, 64
Sirop sucre.....	33
Sel essentiel de tartre.....	30, 32
Ess. de citron.....	{ Q. S.
Ess. d'orange.....	
Acide citrique.....	0, 25
Eau saturée de gaz naturel de source.....	Q. S.
pour 200 cm <sup>3</sup>	

**Mode d'emploi.** — Prendre le matin à jeun au réveil :

Laxatif : Un verre à bordeaux ou un demi-verre.

Purgatif : Un verre ordinaire ou un demi-verre suivant le tempérament.

Pour les enfants : Moitié ou tiers de la dose des adultes suivant âge, tempérament et avis du médecin.

Prix spéciaux au corps médical.

Préparée par M. G. LAVERGNE, Pharmacien

Exploitation : 111, rue du Maréchal — Pétaun à VICHY — Allier.

Administration : SOCIÉTÉ PURGOS : 7, rue Galvani, PARIS (XVII<sup>e</sup>)

Toutes Pharmacies : 5 fr. la bouteille.

## LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée  
au *Citrate basique de Magnésie*.

**Avantages.** — Seule limonade liquide au citrate de Magnésie, pouvant être conservée.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées, ni coliques.

**Formes.** — Flacon pour adultes de 100 cc. ; flacon pour enfants de 50 cc.

**Mode d'emploi.** — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prescrite pure, mais étendue de une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi-verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

**Prix au public :** flacon pour adultes : 5 fr. 50 ; flacon pour enfants : 3 fr. 50.

**Laboratoires P. GODFRIN**

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE (Seine)

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n<sup>os</sup> 704-1 et 704-2.

## LINADÉLINE

### POUDRE DU BON DOCTEUR

**Composition.** — Silicate de magnésie retamisé spécial. Stéarates secs de magnésie et de zinc.

**Propriétés.** — Spéciale pour la toilette des bébés.

Evite rougeurs et démangeaisons.

**Indications.** — Feux du rasoir, Gerçures, Hâle, Transpiration, Prurits.

Recommandée aux obèses, aux malades couchés, aux marcheurs.

**Mode d'emploi.** — En applications locales.

**Présentation.** — En boîte poudreuse.

La boîte : 5 fr. 50.

**Laboratoires J. VARIOT**

151 bis, Grande-Rue — VILLEMOMBLE.

O. C. P. — C. N. P.

## LIN-TARIN

**Graine de Lin officinale** (mucilage naturel).

*préparée par les procédés de M. Tarin,*

*Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien chef de Laboratoire  
du professeur Trousseau.*

### **Phytothérapie de l'intestin.**

**Traitement intégral de la constipation.**

**Préparation.** — C'est grâce à une sévère sélection dans le choix des graines spécialement cultivées, ainsi qu'au mode scientifique de criblage et de préparation, qu'est due l'efficacité réelle et reconnue depuis de longues années du Lin-Tarin.

Après criblage et dépoussiérage par les procédés mécaniques les plus techniques et les plus modernes, la graine est soumise à un traitement physico-chimique ayant pour but d'augmenter ses vertus mucilagineuses, carminatives, digestives, et d'y incorporer un parfum la rendant agréable à absorber.

**Indications.** — Le Lin-Tarin doit être prescrit dans tous les cas de constipation opiniâtre, d'atonie intestinale ou digestive, d'insuffisance de sécrétion biliaire, de difficultés d'évacuation rénale. Ses propriétés diurétiques le font recommander dans les maladies de la vessie : son emploi n'engendre jamais de douleurs.

Le Lin-Tarin est spécialement indiqué chez les futures mères et nourrices, dont l'état ne permet pas l'absorption de purgatifs ou laxatifs drastiques.

Le Lin-Tarin doit être ordonné à titre de régime pour l'entretien des voies digestives et intestinales. C'est un lubrifiant de premier ordre, son usage constant prévient l'obésité.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à bouche matin et soir, dans un demi-verre d'eau naturelle ou de Contrexéville, ou de lait chaud. Laisser macérer l'eau et la graine le plus longtemps possible. Absorber ensuite l'eau et la graine *sans la mâcher*.

**Prix : 8 francs.**

---

**Laboratoires de PHYTOTHÉRAPIE**

**6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).**

**Tél. : Vaugirard 15-86**

## LIONCYL

**Composition.** — Caféine, quinquina, cannelle, cacao ; ions potassium, sodium, calcium, magnésium ; phosphates.

**Indications.** — Troubles de croissance, anémies, lymphatisme, neurasthénie, surmenage intellectuel, sénilité, convalescence des maladies aiguës, débilité due aux affections chroniques (tuberculose, maladies de cœur, entérites, ptose gastrique, diabète, paludisme).

**Mode d'emploi.** — 2 ou 3 cuillerées à café par jour, au début du premier déjeuner et du repas de midi.

**Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France**

6, rue Robert-Estienne — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## LIPAUROL

**Solution huileuse de Campho-Dithio-Carbonate double d'Or et de Sodium.**

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire ; Tuberculose ganglionnaire suppurée ou non ; Tuberculose pleurale ; Tuberculoses cutanées diverses ; Rhumatismes poly-articulaires chroniques.

**Mode d'emploi.** — Faire chaque semaine 2 injections intra-musculaires de 1 ampoule de 1 ou 2 cc.

**Durée du traitement.** — 3, 4, 5 mois. selon les cas.

**Présentation.** — En boîtes de 3, de 6, ou de 12 ampoules de 1 ou de 2 cc. (1 cc. correspond à 3 cg. or métal).

**Prix de vente au public :**

La boîte de 3 ampoules de 1 cc .....	15 fr.
La boîte de 3 ampoules de 2 cc. ....	24 fr.
La boîte de 6 ampoules de 1 cc. ....	27 fr.
La boîte de 6 ampoules de 2 cc .....	45 fr.
La boîte de 12 ampoules de 1 cc. ....	50 fr.
La boîte de 12 ampoules de 2 cc .....	80 fr.

**Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND.**  
14 rue Grave' — LEVALLOIS (Seine)

**Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND**  
54, Chaussée d'Antin, PARIS.

## LIPIODOL LAFAY

Huile iodée à 40 p. 100  
contenant 540 milligrammes d'iode par cc.

**Emplois en thérapeutique.** — Générale : Toutes les indications de l'iode et des iodures sans iodisme.

Locale : Sciatiques, Lumbagos, Algies diverses, etc...

**Emplois en radiologie.** — Lipiodo-diagnostic de Sicard et Forestier. Exploration du système nerveux, des voies respiratoires, de l'appareil génital de l'homme et de la femme, des abcès, des fistules, etc.

**Présentations.** — Flacons de 20 cc, 22 fr. ; boîtes d'ampoules, 12 amp. de 1 cc., 23 fr. ; 8 amp. de 2 cc., 23 fr. ; 6 amp. de 3 cc, 25 fr. ; 4 amp. de 5 cc., 25 fr. ; 1 amp. de 10 cc., 11 fr. Flacons de capsules, 20 centigr. d'iode par capsule, 50 capsules, 20 fr. ; 25 capsules, 11 fr. Etais de comprimés chocolatés, 4 centigr. d'iode par comprimé, 50 comprimés, 12 fr.

André GUERBET et C<sup>ie</sup>

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

## LIPO-BISMUTH ERCE

Bismuth liposoluble indolore.

**Constitution.** — Campho-carbonate de Bismuth, rigoureusement pur, dissous dans de l'huile d'olives.

**Présentation.** — Ampoules de 1 et 2 cc., dosées à 4 cgr. de Bi métal par cc.

**Avantages.** — Le LIPO-BISMUTH-ERCE est le « juste milieu » entre les Bi hydrosolubles et les Bi insolubles.

Il a la *rapidité d'action* des premiers sans leur brutalité d'élimination et la tolérance des seconds permettant l'*imprégnation* de l'organisme sans leurs difficultés de résorption. Aucune réaction douloureuse locale, jamais de nodules indurés, ni de stomatites ; aucune réaction rénale. Possibilité de réaliser le *traitement d'attaque* de la syphilis.

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes.

**Posologie.** — A. *Traitement d'attaque.*

Période primaire ou secondaire : chancres, plaques muqueuses, syphilitides, roséoles etc...

Deux injections par semaine. Trois séries de 10 piqûres (5 semaines séparées d'un repos d'une durée égale à celle de la série.

B. *Traitement d'entretien.* Deux séries par an, pendant 4 à 5 ans.

Dans les cas où le médecin juge qu'il faut agir vite et énergiquement, la dose habituelle de 1 cc. (4 cgr. de Bi) peut être portée à 2 cc. (8 cgr. de Bi). Dans ce cas, surveiller les muqueuses et les reins.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE  
37, rue de Bourgogne — PARIS (VII<sup>e</sup>).



## LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale.

Ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 20 d'extrait,

Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait,

**Propriétés thérapeutiques.** — Agit par ses phosphatides, lipoides et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsivant, Tonique.

**Indications.** — *Etats dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

**Dose.** — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. : Chevrematte-90 Paris.

## LIPODÉTERPÉNOL

**Composition.** — Le Lipodéterpénol est un composé d'huiles essentielles déterpénées, de camphre, de lipoides et d'huiles purifiées. Il est utilisé sous deux formes : en *pommade* et en *injections* sous-cutanées.

**Propriétés.** — Le Lipodéterpénol injectable possède une action à la fois antigénique, antihémolytique, antitoxique, leucogénétique et auto-protecteur de l'organisme.

**Indications.** — *Toutes les infections graves chroniques : larges phlegmons, septicémies, pleurésies purulentes, hématomes infectés, complications pulmonaires, etc., spécialement chez les malades manquant de réaction (37°5 à 38° de température). On obtiendra des résultats encore plus nets, notamment dans le traitement des affections graves et de l'ostéomyélite, en associant le traitement par la *Thém saline* au Lipodéterpénol. Il n'y a guère de contre-indications que dans l'hypercholestérinémie.*

**Mode d'emploi.** — Une *injection* sous-cutanée tous les deux jours dans la région du flanc ou de la cuisse. Frictions journalières de 10 minutes avec la *pommade*, alternativement sur la poitrine, le dos, l'abdomen, les reins et les membres ou localement.

**Laboratoire ZYMA**

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## LIPOÏDES ISCOVESCO

**Extraits éthéro-alcooliques imputrescibles  
de tous les organes.**

Les Lipoides H. I. par eux-mêmes, ainsi que par les vitamines lipo-solubles qu'ils contiennent, représentent dans certains cas la **totalité** et dans d'autres la **partie la plus importante** des substances actives des organes dont ils proviennent.

### Formés :

- 1° Pilules, dosées à 2 centig. de substance active.
- 2° Ampoules huileuses, de 1 cc. stérilisées à 110° pour injections hypodermiques, indolores. Elles sont titrées à 2 centig. de principes actifs.

### Posologie :

6 à 9 pilules par jour ou une injection hypodermique.

### Nomenclature :

*Adrénol Cortex*  
(Partie corticale des glandes surrénales).

*Adrénol total*  
(Glande surrénale totale) sans adrénaline.

*Androcrinol* (Testicule).

*Cérébrocrinol* (Cerveau).

*Gynocrinol* (Contient la folliculine).

*Gynolutéol* (Corps jaune).

*Hépatocrinol* (Foie).

*Mammol* (Mamelle).

*Splénocrinol* (Rate).

*Afatyl* (Thyroïde iodée).

etc., etc... Lipoides de tous les autres organes.

## LIPOÏDES ASSOCIÉS

*Andro-Polycrinol*  
(Testicule, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

*Gyno-Polycrinol*  
(Gynocrinol, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

*Gyno-Hypophysol*  
(Hormone ovarienne, Hormone hypophysaire associées).

Le tube de 60 pilules : 20 francs.

La boîte de 12 ampoules : 30 francs.

### Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII°).

Téléphone : Wagram 07-90.

Adresse télégraphique : Lipoides — Paris, 54.

## LIPOIODINE CIBA

### Produit iodé organique.

**Diiodo-brassidate d'éthyle**, 41 p. 100 d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la Lipoiodine remplace avantageusement ces deux médicaments, à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

**Indications.** — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, hypertension artérielle. Angine de poitrine. Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants* : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## LIPOSEPTINE

Antitoxine polyvalente du professeur Lemoine.

**Composition.** — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. Possède les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

**Indications.** — Toutes les maladies infectieuses, principalement celles qui sont dues au streptocoque : fièvres éruptives : scarlatine, rougeole; oreillons, érysipèle, fièvre puerpérale, fièvre typhoïde, paralysie infantile aiguë, ostéomyélites, etc., etc.

**Mode d'emploi.** — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale.

La Liposeptine se présente également sous la forme de petites pilules, pour ingestion par voie buccale. Complètent et renforcent l'action des injections. Dose moyenne : 4 petites pilules par jour.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

Recherches scientifiques  
de 1

19-09-1930

Communications à la Société de biologie

Ministère de la Santé  
de Montpellier, 18 octobre 1930

1930

Paris 12 novembre 1930, 2 février

Communication à la Société d'Histologie  
Paris 3 février 1932

Reçu : 1932

Lipides : 1932

Recherches dans les lipides  
cholestérol, extraits par un procédé spé-  
cial, établi par le Dr

Recherches

Recherches

1932

Recherches

Grosses et jeunes de conches péniles  
et d'elles

Recherches

## LIPOSPLENINE DU D<sup>r</sup> GROC

Opothérapie splénique spécifique (Soula).

### Références scientifiques propres à la Liposplénine du D<sup>r</sup> Groc :

Communications à l'Académie de médecine :  
18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Communications à la Société de biologie :  
22 décembre 1928, 16 février 1929, 21 décembre 1929.

Communication au XX<sup>e</sup> Congrès de médecine  
de Montpellier, 18 octobre 1929.

Communication au II<sup>e</sup> Congrès du Paludisme  
Alger, 19-21 mai 1930.

Communications à la Société de Thérapeu-  
tique Paris, 12 novembre 1930, 8 février  
1933.

Communication à la Société d'Hématologie  
Paris, 3 février 1932.

Thèses : D<sup>r</sup> E. Cauquil, *Rate et Rachitisme*  
(1928) ; D<sup>r</sup> Fau, *Action des Extraits*  
*Lipidiques d'organes* (1928) ; D<sup>r</sup> Radji,  
*Contribution au traitement des Anémies avec*  
*splénomégalie* (1929).

**Composition.** — 1<sup>o</sup> Lipides insaponifiables  
contenus dans la pulpe splénique, dont le  
cholestérol, extraits par un procédé spé-  
cialement établi par le P<sup>r</sup> L.-C. Soula ;  
2<sup>o</sup> l'Insaponifiable X partiellement soluble.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> *Médication spécifique*  
des :

- a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature, sauf les anémies de Biermer).
- b. Amaigrissements graves et persistants.
- c. Grossesses et retours de couches pénibles et difficiles.
- d. Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques, déminéralisations, troubles douloureux dentaires du nourrisson.

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, tous états de déchéance organique.

2° *Puissant modificateur du terrain dans* : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

**Présentations.** — 1° *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 18 fr.) séparées par un repos de trois jours.

2° *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs. Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon le rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée. (La boîte de huit ampoules : 20 fr.)

3° *Sirop*, dosé à 8 cgr. de principes actifs, par cuillerée à café. *Spécialement réservé aux enfants*. Une à deux cuillerées à café par jour. *A prendre dans l'intervalle des repas*. (Prix : 18 fr.).

4° *Gouttes* (huile à 5 p. 100 de principes actifs). Jusqu'à un an : XXX gouttes par jour, en trois prises ; de un à quatre ans : XL gouttes ; de quatre à dix ans : LX gouttes ; au-dessus de dix ans : LXXV gouttes, toujours en trois prises dans la journée. (Prix : 18 fr.).

Littérature et échantillons :

**Laboratoire des LIPIDES**

**Jean OLIVE, pharmacien.**

14, rue des Minimes — PARIS (III<sup>e</sup>).

Archives 03-94.

## **LIPOVITA (granulé)** **Vitamines liposolubles.**

### **Formule :**

**Carotène (Vitamine A) :** 4 000 unités internationales.

**Ergostérol irradié (Vitamine D) :** 40 000 unités internationales pour 100 grammes.

**Indications.** — Troubles de croissance, Rachitisme, Déperdition de chaux et de phosphate, Carie des dents, Etats ganglionnaires.

### **Doses :**

**Nourrissons :** 1 cuillerée à café par jour en deux fois.

**Enfants :** 2 cuillerées à café par jour.

**Adolescents et adultes :** 3 cuillerées à café par jour.

### **Laboratoire MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## **LISTOSE VICARIO**

Huile de paraffine chimiquement pure.  
Spécialement préparée pour l'absorption  
par voie buccale.

*(La première en date en France).*

**MANQUAT**, Académie de Médecine, 27 janvier 1914,  
(*Paris Médical*, 25 avril 1914).

**VICARIO**, Nouvel emploi pour usage interne. (*Journal de Pharm. et de Chim.*, 16 février 1914).

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimilable, non fermentescible.

La **LISTOSE** se présente sous deux formes :

**LIQUIDE** légèrement aromatisée).

**GELÉE** (consistante et sucrée).

**Mode d'emploi.** — Liquide : Une cuillerée à soupe matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café matin et soir.

**Indications.** — Constipation, Entérites, Colites, etc. Pendant la grossesse et après les opérations intestinales.

### **Laboratoires VICARIO**

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## LITA

Cuniculi-sérum Iodobenzométhylé.

**Composition.** — Mélange de sérum de lapin ayant reçu des doses croissantes de tuberculine (1 partie) et d'iodaseptine (2 parties).

**Présentation.** — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou intraveineuse.

**Mode d'emploi. Doses.** — Deux injections par semaine d'une façon continue ou par séries de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration ; continuer jusqu'à guérison.

Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. On peut associer l'action hémothérapique en prélevant 3 cc. de sang dans la veine du pli du coude que l'on mélange dans la seringue à 3 cc. de Lita. On injecte immédiatement le tout dans la masse musculaire.

**Indications.** — Toutes formes de Tuberculose pulmonaire à toutes les périodes. Tuberculoses viscérales. Pas de choc, pas d'intolérance, pas d'accidents (hémoptysies ou autres).

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS

## LITHINOFORMINE LAGOUTTE

**Composition et forme.** — Granulés effervescents, non sucrés, à base de :

Salicylate de pipérazine.....	0 gr. 20
Benzoate de lithine.....	0 gr. 20
Uroformine .....	0 gr. 10
Lactose .....	1 gr. »

Pour une cuillerée à café.

**Actions thérapeutiques.** — Dissolvant de l'acide urique, diurétique doux non toxique, antiseptique et stimulant des voies urinaires et biliaires.

**Indications.** — Lithiase rénale, gravelle, artériosclérose, hypertension, colibacillurie, infections urinaires et biliaires.

Prix du flacon de 75 gr. : 12 fr. 50.

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).



## LOBÉLIANE LALEUF

**Composition.** — Préparation exclusivement végétale à base de Lobélie, Valériane stabilisée, Aubépine, de goût et odeur agréables, dénuée de toxicité, exempte de toute addition de produits chimiques.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — Antispasmodique puissant, agissant sur le système neuro-végétatif.

Médicament de choix des affections spasmodiques névropathiques, névroses et insomnies.

La Lobéliane Laleuf est présentée sous deux formes : liquide et comprimés.

2 comprimés correspondent à 1 cuillerée à café de Lobéliane liquide.

Dose calmante : 2 à 3 cuillerées à café ; 4 à 6 comprimés par jour.

Dose hypnotique : 1 ou 2 cuillerées à café ; 2 ou 4 comprimés, après le repas du soir.

La Lobéliane se prend avec un peu d'eau ou mieux avec une infusion de tilleul.

Le flacon ou l'étui de 50 comprimés : 15 fr.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## LOBELINE BRUNEAU

Médicament spécifique de toutes les paralysies des centres respiratoires

**Composition.** — Solution rigoureusement titrée de chlorhydrate de Lobeline chimiquement pur. (Conservation indéfinie).

**Indications.** — Tous les états asphyxiques : En chirurgie (syncopes anesthésiques). — En obstétrique (asphyxie des nouveau-nés). — En médecine générale (troubles respiratoires à la suite de pneumonie broncho-pneumonaire etc., empoisonnements, électrocution, submersion).

**Posologie et mode d'emploi.**

Chez l'adulte : en injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0,010 milligrammes par dose. On peut sans aucun danger répéter les injections toutes les 10 ou 15 minutes.

Doses maxima : 0 gr. 02 par dose. 0 gr. 10 par 24 heures.

en injection intra-veineuse : 0,003 par dose. Cette injection doit être pratiquée très lentement et ne pas dépasser 0,003 milligrammes, mais on peut faire immédiatement après une injection intramusculaire ou sous-cutanée de 0,010 milligrammes.

Chez l'enfant : en injection sous-cutanée ou intra-musculaire exclusivement :

Chez le nouveau-né et pendant les 4 premiers mois 0,003 milligr. par dose

A partir de 4 mois ..... 0,005 — —

A partir de 1 an ..... 0,010 — —

**Présentation.** — Boîtes de 2-6 et 25 ampoules titrées exclusivement à 0,003 milligr. et 0,010 milligr.

**Les Laboratoires BRUNEAU et Cie**

17, rue de Berri, PARIS (VIII<sup>e</sup>)

Tél. : Élysées 61-46. — Adresse télégr. : Labomédical-Paris-45

## LOBÉLINE « SANDOZ »

**Composition.** — Chlorhydrate de lobéline pur. Alcaloïde principal de la lobélia inflata, totalement exempt d'alcaloïdes secondaires et d'impuretés toxiques.

**Avantages.** — Pureté chimique. Actions physiologique et thérapeutique toujours identiques. Solution stable dosée rigoureusement. Titre constant.

**Indications.** — Asphyxie bleue des nouveau-nés. Laryngite striduleuse, Broncho-pneumonie, Toutes asphyxies accidentelles et médico-chirurgicales.

**Posologie et présentation.** — Boîtes de 3 ampoules, dosage faible et dosage fort. 1 ampoule à la fois, à répéter si nécessaire.

### Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## LOBULINE

Insuline « per os . »

**Composition.** — Extrait des îlots de Langerhans du pancréas associé à une levure glycolytique pure.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés pour administration *par voie buccale*.

**Indications.** — Diabète.

**Avantages.** — Innocuité absolue. Simplicité d'emploi. Action très persistante.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour, suivant la glycosurie.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

## LOGAPHOS

**Composition.** — Acide monoéthylphosphorique. Noix vomique totale.

**Forme.** — Gouttes.

**Indications.** — Toutes asthénies, Tonique stomacal, Rephosphorant de la cellule cérébrale.

**Dose.** — 20 gouttes avant les 2 repas dans un peu d'eau.

**Laboratoires**

**L. BOIZE et G. ALLIOT**

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

---

## LORAGA

### Traitement rationnel de la constipation.

Emulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée, infusions, potages).

#### Composition :

Huile de Paraffine neutre et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphthaléine.

Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalis.

#### Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications ; utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices ; constipations post-opératoires. Absence totale d'inconvénients.

#### Action Physiologique :

Lubrifie l'intestin, pénètre et ramollit le résidu alimentaire, active le péristaltisme sans provoquer l'irritation ou la constipation secondaire consécutive à l'usage des purgatifs usuels.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion — ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

#### Dose et mode d'emploi :

*Adultes* : De 1 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir, au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

*Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

#### Deux modèles :

210 cc. : 17 fr. 50 — 420 cc. : 30 francs.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

**Laboratoires SUBSTANTIA**

**F. Guillemoteau, Pharmacien**

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

## LUCODAL

Se présente sous forme de perles, contenant chacune rigoureusement dosés à l'état le plus actif : Bromoforme, Codéine, Aconit, Belladone, Drosera.

**Propriétés thérapeutiques.** — La perle de Lucodal permet d'administrer son contenu sans aucune intolérance gastrique.

Elle s'adresse à toutes les formes spasmodiques, quinteuses, sèches de la toux. Toux émétisantes des tuberculeux. Toux des hépatiques, des diabétiques, etc., Toux post-grippales.

*Adultes* : 3 à 4 perles par 24 heures.

*Enfants* (seulement au-dessus de 5 ans) : 1 à 3 perles par 24 heures.

Prix : 10 fr. 50 l'étui (sans impôt).

Echantillons :

**Laboratoires CARESMEL**

2, quai Paul-Bert — TOURS. — Tél. : 19-42.

---

## LUDIN

Traitement Arséno-Mercuriel dissimulé.

### Formes :

*Sirop. — Granules.*

### Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop ou 3 granules contiennent 1 cgr. Hg. + 1 milligr. As.  
*Sans iodure, sans alcool.*

### Doses moyennes :

#### *Sirop :*

*Adultes :* de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Juniors :* 2 à 4 cuillerées à dessert.

*Enfants :* par cuillerées à café.

#### *Granules :*

*Adultes :* 6 à 12 granules par jour.

*Juniors :* 4 à 8 granules par jour.

*Enfants :* 2 à 3 granules par jour.

*Nota. —* Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

### Propriétés thérapeutiques :

Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc.). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

### Indications thérapeutiques :

Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc.

*Peut être prescrit aux enfants en bas âge en diluant le sirop dans eau ou sirop simple.*

Prix : Granules, 15 francs. Sirop, 16 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les n<sup>os</sup> 302-1 et 302-2.

**Laboratoires REY — DIJON.**

## LUGOCALCION

**Composition.** — 1 cuillerée à soupe contient :

Chlorure de calcium.....	1,50
Adrénaline sol 1/1000 .....	X gouttes.
Teinture belladone. ....	II —

*Goût agréable.*

**Indications.** — *Recalcifiant* (croissance, tuberculose, grossesse, allaitement, convalescence, etc...). *Hémostatique* (hémoptysies, gastrorragies, menstruations abondantes, toutes hémorragies, préventif des hémorragies post-opératoires). *Déchlорurant* (albuminurie, néphrite, pneumonies, etc...). *Antianaphylactique* (urticaire, éruptions digestives, rhume des foins, etc...). *Thérapeutique oculaire* (glaucome, rétinite, choroïdites, etc.).

**Doses.** — *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.  
*Adultes* : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## LUSOFORME

Formol saponiné, liquide et comprimés :

**Lusoforme médical.** — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

**Lusoforme brut.** — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Le Lusoforme est un savon légèrement alcalin contenant 20 p. 100 de formol et fabriqué à l'autoclave.

**Indications.** — Gynécologie, Obstétrique, Hyperhydroses, Pansements d'urgence.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100 250 et 500 gr., 3 fr. 50, 7 fr. et 12 fr. La boîte de 50 compr., 8 fr.

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 10 fr., 9 fr. 50 et 9 fr. 25 le kilo.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

## LYNÉVOL

### Pommade en tube.

**Composition.** — Acide orthoxybenzoïque, Métadioxybenzène, ox. de zinc, ac. boriq., Baume du Pérou, Essences et Lanoline.

**Indications.** — Erythème fessier, Crevasses du sein, Brûlures, Coups de soleil, Prurits, Impétigo, Herpès.

**Avantages.** — Ne tache pas, s'enlève facilement, est imperméable aux liquides, possède une odeur agréable, est toujours toléré par les épidermes les plus sensibles. Prix au public : 6 fr. 50 et 10 francs.

**J. FABRE, Docteur en Pharmacie  
Licencié ès Sciences.**

112, rue des Pyrénées — PARIS (XX<sup>e</sup>).

---

## LYSACRÈME L. M. L.

D'après les travaux des Docteurs Larget, Moreau et Lamare.

**Constitution.** — Emulsion savonneuse stable d'antivirus lysats concentrés à 70 p. 100.

**Avantages.** — 1<sup>o</sup> Le savon de constitution spéciale permet une concentration considérable des antivirus, et facilite la pénétration de l'émulsion d'antivirus.

2<sup>o</sup> Souches microbiennes non repiquées et fraîchement prélevées.

3<sup>o</sup> Lyse par le B. Pyocyanique facilitant la concentration des antivirus

4<sup>o</sup> Aucune réaction. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Suppurations aiguës ou chroniques de la peau et des muqueuses : furoncles, orgelets, panaris, anthrax, ulcères variqueux, pyodermes. Engelures, brûlures, coups de soleil, eczéma, conjonctivites, blépharites. Plaies de toutes natures.

**Mode d'emploi.** — Deux à trois pansements par jour, avec massage doux et prolongé si possible. Recouvrir avec un taffetas. Dans les cavités : une mèche imbibée de LYSACREME L. M. L.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS (VII<sup>e</sup>).



## LYSARTHROL

Complexe opochimiothérapique sous forme de granulé effervescent non sucré.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 mesures par jour dans un demi-verre d'eau.

**Propriétés thérapeutiques.** — Stimulant puissant de la fonction rénale par les diastases tissulaires qu'il contient. Augmente rapidement le taux des urines.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les diathèses, toutes les maladies par ralentissement de la nutrition.

Obésité, Goutte, Gravelle, Lithiase biliaire, Migraines, Rhumatismes chroniques.

Prix au public : 11 francs.

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---

## LYSAXINS L. M. L.

**Constitution.** — Trois constituants :

- 1° LYSATS PYOCYANIQUES.
- 2° CORPS MICROBIENS FORMOLÉS.
- 3° PEPTONES POLYVALENTES.

### Avantages :

Trois avantages :

- 1° Lysats *très polyvalents* (souches extrêmement nombreuses et sélectionnées). *Très actifs* (souches non repiquées, PH spécialement étudié).
- 2° Vaccins microbiens très efficaces grâce à l'atténuation par la formaline (pouvoir fixateur remarquable, conservation de la sensibilité cellulaire aux agglutinines, du pouvoir antigénique des cultures, atténuation des toxines).
- 3° Adjonction du *choc peptonique* à volonté (le choc peptonique peut être supprimé par la Panphylase).

### Indications :

- a) **LYSAXIN ANTIPYOGÈNE.** — Suppurations dues aux Pyogènes communs : furoncles, anthrax, érysipèles, otites, panaris, pleurésies purulentes.  
*Préventivement.* — Avant toutes interventions, sur les membres en particulier, larges plaies infectées, fractures ouvertes, brûlures, etc...
- b) **LYSAXIN ABDOMINAL.** — Suppurations digestives : appendicites, cholécystites, pyélonéphrites, salpingites.  
*Préventivement.* — Avant toutes interventions sur l'abdomen (intestin, appareil génital de la femme, appareil urinaire).
- c) **LYSAXIN ANTIGONOCOCCIQUE.** — Uréthrites anciennes, orchites, prostatites, vaginites, métrites, arthrites, etc.

### Posologie :

- 1° *Traitement curatif.* — Première injection : 1/2 cc. et augmenter ensuite jusqu'à 2 cc. Faire au minimum 3 injections de 2 cc.
- 2° *Traitement préventif.* — 4 injections de 1 cc. Espacer toujours les injections de 48 heures au minimum.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## MAGBROMYL (Adultes)

Bromure de sodium pur renforcé par chlorure de magnésium. Tonique et stabilisateur du système nerveux.

$MgCl^2$  augmente l'activité thérapeutique des bromures. Plus de torpeur, plus de dépression. Pas d'anaphrodisie.

**Indications.** — Toutes celles des bromures.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans 1/2 verre d'eau ou de lait.

Une cuillerée à café contient : 0,50 NaBr ; 0,25  $MgCl^2$ .

**Médecine infantile. SIROP DE MAGBROMYL**

Pour enfants (jusqu'à 12 ans).

De 1 à 8 cuillerées à café par jour.

Une cuillerée à café contient : 0,25 NaBr ; 0,10  $MgCl^2$ .

Ces préparations, de goût vraiment agréable, masquent totalement la saveur désagréable des bromures.

**Laboratoire DELISS**

**A. ROUX, Pharmacien**

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

## MAGIODYL

Soluté d'Iodure de Sodium cristallisé pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium.

*Seule préparation au goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable des iodures.*

**Avantages.** — Le Chlorure de Magnésium augmente l'activité thérapeutique des iodures, supprime les accidents d'iodisme. Emploi facile en médecine infantile et chez les personnes délicates.

**Indications.** — Toutes celles des iodures.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures, chacune prise dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucrés ou non.

Dose variable.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 25 d'iodure de sodium et 0 gr. 25 de  $Mg Cl^2$

**Laboratoire DELISS**

**A. ROUX, Pharmacien.**

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

## MAGISTÈRE DE BISMUTH « FOUCHÉ »

**Composition.** — Sous-nitrate de bismuth *pur* extra-léger, réalisant ainsi un pansement gastrique de pouvoir couvrant considérable et assurant une protection intégrale de la muqueuse gastrique.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, Gastrites, Spasmes, Aérophagie, Colites, Troubles réflexes et circulatoires paradigestifs, Diarrhées, Oxyurose.

**Posologie.** — Le couvercle rainé dans sa partie moyenne contient sensiblement 5 grammes de Magistère qu'on délaye dans un verre d'eau ; des doses plus fortes, selon les cas, peuvent être prescrites ; le produit rigoureusement insoluble est d'une *innocuité absolue*.

**Laboratoire R.-P. FOUCHÉ**  
2, boulevard Pershing — PARIS

## MAGNECYTHINE

Agent spécial de la minéralisation cellulaire.

Le rapport du magnésium au calcium est particulièrement intéressant. Calcium minéral = charpente, et magnésium minéral = activité en entretien.

Quand le magnésium s'use et disparaît, la cellule vieillit. Et quand l'âge ou la fatigue arrivent, le magnésium et ses dérivés disparaissent.

Il y a rapport de cause à effet dont on constate les résultats. La déficience magnésienne est souvent cause chez les affaiblis de l'inaction des toniques normaux : fer, manganèse, arsenic, etc...

La diminution progressive de la vitalité cellulaire en fonction du retrait magnésien est acquise scientifiquement. La cellule morte cause la déchéance générale ou locale quel que soit le nom qu'on lui donne. Et on constate que le taux magnésien est excessivement bas. Les *chlorures seuls ne sont pas supportés sans inconvénients*. Le *Magnécythine* à ce point de vue n'est comparable à aucun autre produit.

**Mode d'emploi et dose.**

**Comprimés :** de 1 à 6 par jour, généralement, 2 dans un petit verre d'eau avant ou après les repas.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**  
34, boulevard de Clichy — PARIS.

## MAGNELAX

**Composition.** — Emulsion de Magnésie et d'Huile de paraffine.

**Indications.** — Laxatif ne contenant aucun drastique, contre la constipation, les fermentations, les acidités.

**Posologie (Doses moyennes) :**

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe par jour.

*Enfants* : 1 cuillerée à dessert par jour.

*Nourrissons* : 1 cuillerée à café par jour dans le lait du biberon.

Prix : 15 fr. 50.

**Docteurs FAURE et DUSSUEL**

**Pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe**

**AIX-LES-BAINS.**

## MAGNESIO-CACODYLINE JAMMES

**Sérum cytophile, neurotonique et phagocytaire**

**Composition :**

Chl. de magnésium.....	0 gr. 20
Cacodylate de soude atoxique.	0 gr. 30
Sérum physiologique.....	Q. s. p. 3 cc.
Injections intramusculaires absolument indolores.	

**Réalise l'apport direct du magnésium au niveau de la cellule nerveuse sans léser la muqueuse intestinale.**

Combine la reminéralisation magnésienne à une médication cacodylique intensive qui a fait ses preuves.

Injections intramusculaires ou intraveineuses quotidiennes.

Boîte de 10 ampoules. Prix marqué : 22 fr.

**Laboratoires JAMMES**

**86, rue Michel-Ange — PARIS**

## MAGNÉSIUM HARDY

*Le seul chlorure de magnésium vraiment agréable.*

**Ses deux formes :**

*Sirop* (14 jours traitement) : 16 fr.

*Tablette-bouillon* (20 jours traitement) : 18 fr.

**Dose quotidienne.** — 1 cuillerée à soupe de *sirop*  
ou 1 *tablette-bouillon* contiennent 1 gr. 20  
Mg Cl<sup>2</sup> pur, sec.

Posologie recommandée par M. le professeur Delbet.

**Indications.** — Asthénie nerveuse, Régulateur  
hépatique, Dermatoses, Prurits, Verrues, Vieil-  
lesse prématurée, Prostatisme. Soutien et pro-  
longation des cancéreux inopérables. Défense des  
cancéreux opérés.

**Laboratoires PAUL HARDY**

Docteur en pharmacie. Ancien Interne des Hôpitaux.

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V<sup>e</sup>).

Tél. : Gobelins 36-96.

---

## MAGNÉSO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium (plus de 50 p. 100) associé à des acides phosphoriques organiques : glycérophosphates, anhydrooxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie, acide nucléinique.

**Présentation.** — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlorure de magnésium.

**Emploi.** — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

**Posologie.** — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

**Indications.** — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement defectueux des glandes endocrines. Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). Séquelles post-opératoires. Asthénie. Fatigue générale. Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... Affections de la peau : acné, psoriasis, eczéma. Lutte contre les tumeurs en général. Prophylaxie du cancer. Donne une sensation de grand bien-être.

### Laboratoires ROBINET

MORET-SUR-LOING (Seine-et-Marne).

« **TERRAINS MAGNESIENS ET CANCER** », par L. Robinet. — Pour la France : communiqué à l'Académie de médecine par M. le professeur P. Delbet (avril 1930). — Pour l'Alsace-Lorraine : Académie de médecine (avril 1930). — Pour l'Angleterre : Académie de médecine (juillet 1931). — Pour le Grand-Duché de Bade : Académie de médecine (juillet 1932).

## MAGNÉSOVULES

Ovules au chlorure de magnésium  
(0 gr. 25 par ovule) conservés suivant la  
**MÉTHODE SOLACTIVE**

Méthode de *conception nouvelle* donnant des résultats remarquables, consistant à conserver les ovules dans un récipient de verre neutre contenant un liquide spécial.

**Avantages.** — Fusibilité parfaite. Activité décuplée. Asepsie. Conservation intégrale du pouvoir hygroscopique.

**Indications.** — Les inflammations aiguës ou chroniques de l'utérus et des annexes. Métrites, Salpingites, Ulcérations du col. Vaginites, Prurits vulvaires etc...

**Mode d'emploi.** — Retirer du flacon un Magnésovule en le piquant avec la petite fourche, et l'introduire dans le canal vaginal, le soir au coucher. Se garnir ensuite au moyen d'un tampon de coton et d'une serviette périodique.

Les Magnésovules s'appliquent tous les soirs ou tous les deux soirs. Dans les cas aigus, ils peuvent être employés plusieurs fois dans la journée.

**Présentés de même façon, il existe des ovules à l'Ichtyol véritable, dénommés Ovules au Sulfichtyol.**

**Docteur MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.



## MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)  
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*,  
Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de  
toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital.  
Remplace avantageusement le Fer.

**Indications.** — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

**Sirop.** — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au dessous de cet âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indications du médecin traitant.  
3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 francs.

**PRODUIT FRANÇAIS**

**Laboratoire CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (1<sup>er</sup>).

## MAGSALYL Mg.

(Solution de salicylate de soude Roux.)

Soluté de Salicylate de soude cristallisé pur, associé au chlorure de magnésium à dose catalytique.

Innocuité absolue, pas de dépression, empêche l'évolution des accidents cardiaques.

*Seule préparation de goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable du salicylate de soude.*

Possibilité de traitement prolongé. Activité intense.  
Cure d'entretien.

**Indications.** — Toutes celles du Salicylate de Soude.

**Mode d'emploi.** — De 2 à 20 cuillerées à café en 24 heures par dose de 1 à 2 cuillerées prises dans 1/2 verre d'eau, d'eau de Vichy ou de lait tiède, sucré ou non.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 50 de *Salicylate de soude cristallisé*, 0 gr. 05 de *Mg Cl<sup>2</sup>*.

**Laboratoire DELISS**

**A. ROUX, Pharmacien.**

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE

## MALARSAN

Sel de quinine de l'acide acétyl-amino-oxyphényl-arsinique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement par voie buccale : du **Paludisme** (*Plasmodium vivax* et *Plasmodium malarie*) et des **Parasitoses intestinales** à protozoaires (diarrhées rebelles à amibes, spirilles ou lamblas).

**Présentation.** — Tube de 30 pilules vernies et inaltérables à 0 gr. 20 de sel actif.

**Posologie.** — 3 pilules par jour, pendant 10 jours. Activité remarquable, tolérance parfaite. Action sur l'état général.

Prix au public : 16 francs.

**Laboratoires P. AUBRY**

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 15-26.

Belgique et Congo :

**Laboratoires Belges du Quinby**

Romain Deschiens — 74, avenue Louis-Bertrand  
BRUXELLES

---

## MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé, pour tous les âges.

**Indications.** — Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes). Saveur agréable.

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

**Mode d'emploi.** — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

**Adultes :** 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

**Enfants :** 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon (usage 15 jours).

**MOSER et C<sup>ie</sup>**

8, chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

## MALT FRANÇAIS DEJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

**Indications.** — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques. Aliment des faibles, des délicats, des épuisés. Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

**Posologie.** — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

*Pour les enfants :* Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 3 fr. 30 verre compris.

**Etablissements DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## MALTOSAN

Soupe maltée en poudre.

**Composition.** — Maltose, 30 p. 100. Dextrines, 25 p. 100. Céréales, 40 p. 100. Sels minéraux, 2 p. 100. H<sup>2</sup>O, 3 p. 100. Diastases.

**Indications.** — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : dyspepsies diverses. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

**Doses.** — 2 mesures par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 mesure nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.

Retirer du feu au premier bouillon.

La boîte : 9 fr. 50.

**Etablissements WANDER**

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

## MALT PAILLETÉ

**Composition.** — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique vitaminé.

Préparé par évaporation dans le vide des liqueurs extractives du malt. Renferme la totalité de la diastase, du malt du maltose des phosphates naturels, de la lécithine des peptones et des vitamines.

**Propriétés.** — Aliment très concentré de digestibilité parfaite.

**Indications.** — Convalescents Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-Rénaux, Hépatiques.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

**Prix** : 16 francs la boîte de 300 grammes environ.

**Laboratoires PROGIL**

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## MALT WANDER ou GLOMA

### GLOMA PUR

(*Extrait de malt sec.*)

**Composition.** — Matières azotées 5,87 p. 100, Hydrates de Carbone (maltose et dextrine), 89,17 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Eau, 3,40 p. 100 ; Acide phosphorique en pour cent des substances minérales, 9 p. 100. Diastases. Vitamines.

**Forme.** — Paillettes.

**Indications.** — Aliment végétal nutritif et digestif dans les cas d'Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocolite chronique par insuffisance amylolique. Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltosées.

Le grand flacon : 15 fr. Le flacon : 10 fr.

### PEPSO-GLOMA

**Composition.** — Pepsine, pancréatine, extrait de malt diastasique.

**Forme.** — Paillettes.

**Indications.** — Insuffisances digestives : digestions pénibles, dilatation et pesanteur de l'estomac ; accidents d'anaphylaxie alimentaire : eczéma, urticaire, prurit, etc. ; maladies de la dénutrition : amaigrissement, débilité ; convalescence.

**Doses.** — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café. *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe à la fin des principaux repas dissous dans de l'eau ou une infusion, ou délayé dans un peu de compote, de purée ou de bouillie.

Le flacon : 12 francs.

**GLYCÉRO-GLOMA**

(*Gloma aux glycérophosphates.*)

**Composition.** — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 40 de Glycérophosphates combinés de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

**Indications.** — Convalescence des maladies aiguës (grippes, bronchites, typhoïdes, etc.). Surmenage, déminéralisation, anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

**Doses.** — *Enfants* : 1-3 cuill. à café 3-4 fois par jour.

*Adultes* : 1-3 cuill. à soupe 3-4 fois par jour. Au début des repas pur ou dissous dans de l'eau ou du lait.

Le flacon : 10 francs.

**CALCIO-GLOMA**

(*Gloma au Phosphate de chaux.*)

**Composition.** — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 15 de chlorhydrophosphate de chaux.

**Indications.** — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.). Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

**Doses.** — (Voir *Glycéro-Gloma.*)

Le flacon : 10 francs.

Établissements **WANDER**  
**P. BASTIEN**, pharmacien.  
CHAMPIGNY (Seine).

## MANCOBENE

Complexe opo-mangano-calcique associé à un catalyseur de premier plan, le *Carbonate de Cobalt*.

**Composition.** — Présenté sous forme de granulé dont 100 grammes contiennent :

Carbonate de cobalt.....	0,02	Chlorure de magnésium....	1,50
Nucléinate de manganèse..	0,20	Hypophosphite de chaux...	0,50
Méthylarsinate de soude...	0,20	Hypophosphite de soude...	0,50
Phosphate tricalcique.....	1,50	Surrénale.....	0,50
Glycérophosphate de Chaux.	4,50	Thymus.....	0,50

**Propriétés thérapeutiques.** — La présence d'extraits de glandes endocrines et d'un catalyseur, le carbonate de cobalt, favorise le métabolisme du calcium dans l'organisme. Récalcifiant et reminéralisateur de tout premier ordre.

**Indications.** — Asthénie, Croissance, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Lymphatisme, Prétuberculose, Tuberculose, Fractures, Carie dentaire, Grossesse, Allaitement.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 cuillerées à dessert par jour.  
*Enfants de 5 à 12 ans* : 3 cuillerées à café.  
*Enfants jusqu'à 5 ans* : 1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

**Laboratoire du Docteur TAVERNIER**

32, rue de l'Ouest — PARIS Tél. : Ségur 08-13.

## MANGAÏNE

Polyoxyde de Manganèse  
chimiquement pur.

**Forme et Dose :**

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

**Propriétés thérapeutiques :**

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

**Indications thérapeutiques :**

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

**Dose :**

4 à 6 tablettes par jour.

Prix : 12 francs.

**Pharmacie SCHMIT**

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

## MANGANESIA

Solution permanganique arsenicale  
**Traitement du Diabète.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

**Dose et mode d'emploi.** — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

**Laboratoires des Produits DANNEC'H  
BRUN et MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III<sup>e</sup>).

R. C. Seine 218.670.

---



# MANGANO PHOSPHAL

Julien

(GOUTTES)

Sans aucun toxique.

Composition :

XX gouttes contiennent :

Acide phosphorique offic. pur .	0 gr. 40
Magnésium et polyglycéroph ...	} 0 gr. 80
Sels de manganèse .....	

En solution sans alcool et sans sucre.

Propriétés et indications :

Puissant reconstituant. Sans aucun toxique, convenant à tous.

Médication mangano-phosphorée intensive.

*Enfants.* — Manque d'appétit, Retards de la dentition et de la marche, Rachitisme, Insuffisance du poids et de la taille, Troubles de la nutrition.

*Adultes.* — Anémie, Faiblesse. Neurasthénie, Surmenage intellectuel et physique, Convalescences, Carie dentaire. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Diabète.

*Vieillards.* — Dépression, Faiblesse, Troubles nerveux. Fatigue avec hypertension.

Posologie :

*Enfants :* 11 gouttes par jour, par année d'âge, dans un peu d'eau sucrée.

*Adultes :* XX gouttes à chacun des repas de midi et du soir dans 1/2 verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Prix : 15 francs. — *Flacon gratuit sur demande.*

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris  
105, rue de Rennes (angle de la rue d'Assas)  
PARIS (VI°).

## MANGARSENIC

Composé organique d'Arsenic et de Manganèse,  
Activité intense, Toxicité nulle.

**Propriétés thérapeutiques.** — Possède les propriétés classiques de l'ion As, complétées et exaltées par le catalyseur de choix qu'est l'ion Mn. Agit comme un catalyseur intense des réactions d'oxydation.

**Indications.** — Tous les états de dénutrition, Tuberculose à tous les degrés, Anorexies, Amaigrissements, Athrepsies, Hypotrophies, Diabète.

**Posologie.** — Deux comprimés midi et soir au début des repas (4 par jour).

*Enfants* : 1 comprimé midi et soir.

**Echantillons :**

**Docteur LAVOUÉ — RENNES.**

---

## MANGRATINES

**Composition.** — Nucléinate de manganèse, Extrait splénique, Sérum de cheval.

**Propriété.** — Tonique. Cytoplasmique par excellence.

**Indications.** — Toutes dépressions, anémie, chlorose, troubles de la puberté et de la ménopause. Convalescences, rachitisme, paludisme.

**Doses.** — 2 à 4 dragées par jour 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 16 francs l'étui de 40 dragées.

**Laboratoire E. VERGELOT**  
163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## MARIMINE

Le Médicament des Enfants.

**Forme.** — Granulé irradié, à base de Vitamine D et de Parathyroïde.

**Indications.** — Insuffisances pluriglandulaires, atrophies ganglionnaires et osseuses. Rachitisme, Déformations osseuses. Adénopathies trachéo-bronchiques, anémies diverses de l'enfance. Anorexie de l'enfance et du nourrisson.

**Formule.** — Glycérophosphate de chaux, de fer et de magnésie, Nucléinate manganèse. Persulfate de soude formiate de chaux. Hypophosphite de chaux. Silicate de chaux. Surrénine. Parathyroïdes ergostérine irradiée.

**Doses.** — *Enfants* au-dessous de 3 ans : 1 cuillerée à café rase aux repas ou dans un des biberons.

*Enfants* au-dessus de 3 ans : 1 cuillerée à café aux deux repas.

La Marimine se prend dissoute dans l'eau ou crémée.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-2.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires HOCQUETTE**

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

## MARINOL

Reconstituant marin physiologique.

Inaltérable. De goût agréable.

**Composition.** — Eau de mer captée au large. Iodalgol (iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

**Particularités.** — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

**Indications.** — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe. *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.

Littérature et échantillons

**Laboratoires LA BIOMARINE**

DIEPPE (Seine-Inférieure).

## MARRUBENE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzoate de soude.

**Propriétés.** — Possède la triple action : *Fluidifiante, Expectorante, Aseptisante*, sur les produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

**Indications.** — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

**Mode d'emploi.** — Le Marrubene se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulés et d'elixir. Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café de granulés, ou 2 à 3 cuillerées à soupe d'elixir.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**  
2, place des Vosges — PARIS.

## MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

**Formes.** — Dragées et sirop.

**Propriétés.** — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

**Indications et Posologie.** — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

*Infections, Dysenteries* (selles nombreuses) : 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures.

*Entérite chronique* : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n<sup>os</sup> 103-3 et 4.

Prix : 14 francs.

**COMTE, Pharmacien,**  
60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

## MARRUCOL

**Composition.** — Sulfogaïacolate de potasse, Marrube blanc, Glycérophosphate de chaux, Méthylarsinate de soude, Noix vomique pulvérisée.

**Indications.** — Agit particulièrement comme Traitement d'entretien dans les Bronchites aiguës ou chroniques, Pleurésies, Pneumonies, Congestions pulmonaires, Maladies de Poitrine. Est également indiqué dans Toux, Rhume, Catarrhe, Asthme, Grippe, Crachats persistants, Anémie, Rachitisme.

**Propriétés.** — Antiseptique pulmonaire et modificateur de la muqueuse respiratoire. Fluidifie les sécrétions et facilite l'évacuation des mucosités filandreuses et transparentes. Calme la toux, Recalcifiant, Reminéralisant, Tonique, Excite l'appétit.

**Mode d'emploi.** — Un cachet matin, midi et soir, avant les repas.

Prix : 12 francs.

**Laboratoire COIRIER**

69, avenue du Maine — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

---

## MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay.

**Indications.** — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

**Composition.** — Vin : Muscat de Samos et Maté.  
Prix : 20 fr.

Elixir : Crème de Cacao et Maté. Brix : 18 fr.

Granulé : Maté glycérophosphaté composé.

Prix : 12 francs.

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice, sur demande adressée au Dépôt général :

**PHARMACIE ANGLAISE  
DES CHAMPS-ELYSEES**

62, avenue des Champs-Élysées — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Elysées 22-52.

## MÉDICOFERMENT

Ferment pur de raisins.

*Culture pure et active de Levure de raisins sélectionnée, acclimatée à hautes températures et physiologiquement préparée pour usage thérapeutique.*

**Propriétés.** — Action phagocytaire puissante, glycolytique, diastases et vitamines.

**Indications.** — 1° *Dermatoses* (furoncles, acné, orgelets, rougeurs, eczéma, dartres, démangeaisons, etc.).

2° *Troubles digestifs* (dyspepsie, intestin diarrhée, constipation, etc.).

3° *Maladies de la nutrition* (diabète, arthritisme, etc.).

4° *Maladies infectieuses.*

La dose pour une cure d'environ 3 semaines : 21 fr. 50.

**Mode d'emploi.** — Un petit verre à liqueur avant les repas de midi et du soir dans un demi-verre d'eau sucrée avec un demi-morceau de sucre scié.

*Cas rebelles* : 3 verres à liqueur par jour.

*Enfants* : 2 à 6 ans, demi-doses.

Ne pas confondre le Médicoferment avec les jus de Raisins stérilisés ou autres.

Littérature et échantillon gratuits.

Laboratoire pour la culture des Ferments de Raisins.

G. CÉSAR et B. BOSS

10, rue de la Viotte — BESANÇON (Doubs).

## MÉNATOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 363-2.

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Poudre d'ovaires, Marron d'Inde, Genêt, Rhamnus, Viburnum, Capsicum, Hydrastis, Hamamélis.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Vaso-constricteur utérin. Tonique et décongestif du réseau veineux. Opothérapie ovarienne.

**Indications.** — Troubles de la ménopause. — Règles douloureuses. — Régulateur des fonctions utéro-ovariennes.

**Mode d'emploi.** — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

L'étui : 15 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## MÉNOSÉDINE

Extraits végétaux associés à calmants minéraux et substance protéidique tirée de l'ovaire. Sans toxicité.

**Indications.** — 1° Sédatif utérin. Calme les phénomènes douloureux et malaises qui accompagnent et précèdent les règles.

2° Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles espacées.

**Deux formes : Comprimés. Liquide.**

**Comprimés.** — 3 comprimés dès le début des malaises occasionnés par la menstruation avec une infusion chaude ou dans un peu de confiture. — 3 comprimés une demi-heure après, si besoin est.

**Liquide.** — Une cuillerée à bouche, une deuxième une demi-heure après, si la première n'a pas suffi (de préférence dans une infusion chaude).

Prix : 10 francs.

**LABORATOIRES DEMASLES**

à VIENNE (Isère).

## MÉNOVARINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

**Deux indications :**

Maladies veineuses, Troubles congestifs de la fonction ovarienne.

**Posologie :**

Deux dragées à chaque principal repas.

Prix au public : 14 fr. 85 pour dix jours de traitement.

**Laboratoires MONDOLAN**

211, rue de la Convention — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## MENSUOSEDYL

**Sédatif spécifique inoffensif  
des Douleurs Menstruelles.**

### Composition :

Un analgésique .....	Pyramidon.
Un diurétique . . . . .	Théobromine.
Un antispasmodique .....	Extr. Valériane.
Un sédatif .....	Extr. Anémone.
Un tonique .....	Guaranine.

(Procédé spécial de conservation.)

**Avantages.** — 1° La suppression de la douleur et des troubles nerveux, quelle qu'en soit la cause, est presque instantanée; 2° La théobromine (physiologiquement contrôlée) décongestionne le rein, généralement hyperémié pendant cette période et pallie à l'inconvénient du pyramidon vis-à-vis de certains reins ; 3° La fonction ovarienne n'est pas influencée autrement que par la sédation et la décongestion pelvienne ; 3° La guaranine soutient heureusement le coeur et évite toute dépression possible par le pyramidon.

**Indications.** — Malaises menstruels et douleurs des suites de couches. Troubles nerveux de la vie génitale. Adjuvant à tout traitement de la dysménorrhée.

**Posologie.** — 1 cachet dès l'apparition des douleurs. 3 cachets par 24 heures.

*(Aucune contre-indication)*

**Paul AUGIER, pharmacien**

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris  
2-4, rue des Lombards — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## MESOFORME

### BACTÉRICIDE PUISSANT

Désodorisant — Antiseptique — Désinfectant.

Non caustique, non irritant, non toxique.

(Ne tache pas le linge.)

**Composition.** — Solution saponifiée de thymol et de paraldéhyde, avec adjonction de sels alcalins supprimant toute causticité.

**Indications.** — *Gynécologie* : Hygiène de la femme, Leucorrhée, Métrite, Salpingite, *Accouchements*. — *Laryngologie* : Angines, Amygdalites, Abscess. — *Stomatologie* : Gingivites, Carie.

**Mode d'emploi.** — *Action prophylactique* : 1 cuillerée à dessert pour 2 litres d'eau bouillie, chaude. — *Accouchements* et *Gynécologie* : 1 ou 2 cuillerées à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Laryngologie* : 2 cuillerées à dessert pour 1 litre d'eau bouillie chaude. — *Stomatologie* : XXX gouttes dans 1 verre d'eau.

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS

## MESOGASTRINE

Μηκος (milieu). γαστρ (estomac).

Normalement, le chyme possède au moment de passer dans l'intestin une concentration moléculaire constante répondant au degré cryoscopique  $\Delta = 0,38$ .

La MESOGASTRINE en solution (1 cuill. à café de poudre dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion non sucrée) possède ce même degré cryoscopique. Elle servira à diluer le contenu gastrique pour ramener à « un juste milieu » ses écarts de concentration moléculaire ; assurer l'évacuation normale et supprimer toute douleur liée à un trouble de cette évacuation.

**Action.** — Physique, sur la fonction musculaire.

Ne trouble en rien le chimisme gastrique.

(Évite les gastrites médicamenteuses secondaires.)

**Indication.** — Véritable traitement « omnibus » pour tous syndromes douloureux gastriques, qu'ils soient liés à un fonctionnement hyper ou hypo de l'estomac.

**Composition.** — Poudre composée soluble (Phosphate de soude + Citrate de soude + Lactose).

**Mode d'emploi.** — 1 cuill. à café dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion non sucrée (1 tasse à thé = 120 cc. ou 8 cuill. à soupe d'eau).

Bien respecter ces proportions pour obtenir une solution à degré cryoscopique  $\Delta = 0,38$ .

Laboratoires du Dr BAREY

37, avenue J.-Coutant — IVRY-SUR-SEINE

## MÉSOTHINE

Comprimés radioactifs à base de Bromure de Mésothorium, associé à la médication dialytique du Professeur HAYEM (lithine-citrate de soude-hexaméthylène tétramine).

**Action.** — 1° La MÉSOTHINE augmente la solubilité de l'Acide urique et de la Cholestérine.

2° Elle en ralentit la production en les détruisant en partie au moment de leur formation par activation des ferments uricolitiques (travaux de Sarvonat et Rebattu sur l'émanation du Radium).

**Diathèse arthritique.**

**Indications.** — Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Hypertension, Maladies de la cinquantaine, Affections vésico-rénales et biliaires.

Tubes de 20 comprimés.

Prix de vente au public : 10 francs.

Prix médical : 6 fr. 30.

Chaque fabrication de nos produits radioactifs porte un numéro de série. Un échantillon de cette série est dosé par le Service des Mesures de l'Institut du Radium de Paris pour sa teneur en produit radioactif et le numéro du certificat délivré par cet Institut figure sur chaque produit.

**Laboratoires RHEMDA**

**S. MOGAN, Pharmacien.**

17, rue d'Hauteville — PARIS (X<sup>e</sup>).

Usine : 51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. : Seine 255.068 B.

## MÉSOTHORIUM RHEMDA

**Solution isotonique de Bromure de Mésothorium en ampoules.**

**Primesol.** — 1/5 de micro par centimètre cube. Boîtes de 6 ampoules de 1 cc. Traitement prolongé des états morbides peu graves : arthritisme, convalescence des maladies infectieuses, lymphatisme. Traitement d'une douzaine de jours : 1 à 3 cc. par jour.

Prix vente au public : 9 fr. — Prix médical : 5 fr. 65

**Primesol.** — 1 micro par centimètre cube. Boîtes de 3 ampoules de 1 cc. Angine de poitrine, artériosclérose, hypertension, manifestations goutteuses, rhumatisme.

1 à 3 cc. par jour pendant une douzaine de jours.

Prix vente au public : 17 fr. — Prix médical : 10 fr. 70

**Trimesol.** — 2 micros par centimètre cube, 2 ampoules de 5 cc. par boîte. Utilisé pour effet rapide, infections de haute gravité. (Prompte amélioration de la formule sanguine), traitement palliatif et analgésique du cancer.

5 à 20 micros par jour pendant 8 jours.

Prix vente au public : 59 fr. — Prix médical : 37 fr. 15

Chaque fabrication de nos produits radioactifs porte un n° de série. Un échantillon de cette série est dosé par le Service des Mesures de l'Institut de Radium de Paris pour sa teneur en produit radioactif et le numéro du certificat délivré par cet Institut figure sur chaque produit.

**Laboratoires RHEMDA**

**S. MOGAN, Pharmacien**

17, Rue d'Hauteville, Paris (X<sup>e</sup>)

Usine : 51, Rue d'Alsace, COURBEVOIE (Seine)

Téléphone : Wagram 58-89 — R. C. Seine 255-068 B.

## MÉTACUPROL

Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique, ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

**Propriétés.** — Efficacité certaine dans toutes Streptococcies et Staphylococcies.

**Indications.** — *Gynécologie* : Leucorrhées, Métrites, Démangeaisons, Hygiène intime.

*Dermatologie* : Furunculose, Anthrax, Impétigo, Eczémas, Brûlures, Affections suintantes.

**Forme.** — Comprimés effervescents de 1 gramme. Ampoules pour injections intraveineuses au 1/200.

**Posologie.** — *Gynécologie* : 1 à 2 comprimés par litre d'eau. Position couchée.

*Dermatologie* : 1 comprimé par litre d'eau.

Une ampoule par jour, deux dans les cas accentués.

**Laboratoire du MÉTACUPROL**  
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
Téléph. : Auteuil 35-25.

---

## MÉTAFORMINE

(COMPRIMÉ)

**Formine** spéciale, purifiée, à 0,50 par comprimé.

**Indications.** — Reins, Vessie, Infections.

**Posologie.** — Par jour : 2 à 4 comprimés dissous dans un verre d'eau.

Comprimés solubles. Prix : 14 fr.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle sous le n<sup>o</sup> 88-2.

**Laboratoire du Docteur E. AUBERT**  
3, place Jussieu  
PARIS (V<sup>e</sup>).

Approvisionnement pharmaceutique pour  
la France O. C. P. PARIS

## MÉTAFORMINE

### GRANULÉ EFFERVESCENT.

Une Formine à faible dose.

Ext. total de rein.....	3 gr.
Anhydro-citrate de Formine....	2 gr.
Tartrate de Pipérazine.....	2 gr.
Citrate de Lithine.....	2 gr.
Sucre effervescent... Q. S. pour	100 gr.

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à café par jour (états chroniques.)

5 à 6 cuillerées à café par jour (états aigus.)

Faire dissoudre dans un grand verre d'eau.

**Indications.** — Goutte, Gravelle, Rhumatisme...

Diurétique doux, non toxique, Anti-Urique.

Boîte de grande contenance, 135 gr. : 16 francs.

**Laboratoire du Docteur AUBERT**

3, place Jussieu — PARIS (V<sup>e</sup>).

Approvisionnement pharmaceutique pour la France  
O. C. P. Paris.

## MÉTA-TITANE

Pommade introduisant le titane en thérapeutique.

**Indications.** — *Prurits, Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo, Brûlures du 1<sup>er</sup> degré, Coups de soleil, Engelures, Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.

**Propriétés et Avantages.** — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Prof. Nicolas, Tourneux, Juster etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

**Remarque.** — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus par un procédé tout particulier qui n'est pas encore publié. Ils sont *rigoureusement purs.*

**Présentation :**

Tube : 15 fr. — Tube d'essai : 7 fr.

**Laboratoires METADIER**  
**TOURS.**

## MÉTA-VACCIN

Vaccin en pommade aux antiviruses de Besredka.

**Indications.** — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abscès, Panaris, Pyodermites, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites, tous pansements après accouchement.

**Avantages.** — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

### Emploi :

1. *Immunisation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze, et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunisation générale* : Dans les cas de furunculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles, et même d'introduire du Meta-Vaccin dans le rectum.

**Présentation.** — En tubes grand modèle 18 fr., et en tubes d'essai : 7 fr.

**Laboratoires MÉTADIER  
TOURS.**

## MÉTHYLARSINATES BOUTY

Tous les produits arsénicaux présentés par les **LABORATOIRES BOUTY** sont à base d'acide méthylarsinique remplaçant avantageusement, dans tous les cas, l'acide cacodylique.

<b>Gaïarsol Bouty.</b>  (Méthylarsinate de Gaïacol.)	1° ampoules de 1 cc. renfermant 0,05 de sel.	Bronchites chroniques. Catarrhe. Tuberculose, pulmo- naire.
	2° solution renfermant 0,05 de sel par XX gouttes.	
	3° sirop renfermant 0,04 de sel par cuillerée à soupe.	
	4° dragées renfermant 0,02 de sel.	
<b>Sérosthényl Bouty.</b>  (Méthylarsinate de strychnine glycérophosphaté.)	1° ampoules de 1 cc. renfermant 0,001 de méthylarsinate de strychnine et 0,10 de glycérophosph. de soude.	Convalescence. Surmenage. Fatigue nerveuse. Anémie. Asthénie.
	2° solution dosée par XX gouttes comme une ampoule.	

**Laboratoires BOUTY, 3, rue de Dunkerque — PARIS**  
Téléphone : Nord 32-52, (2 lignes).

## METOPHAN

**Composition.** — Acide carbolquinolique, ferments lactiques, Formine citratée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antisep-tique par l'acide carbolquinolique où le radical phényl si souvent nocif pour le rein a été neutralisé grâce à notre procédé spécial de préparation.

Eliminateur d'acide urique, bactéricide par ses ferments lactiques, antipyrétique, analgésique puissant.

Aucune action nocive sur l'estomac, le cœur, les reins et le système nerveux.

Plus actif que les produits similaires.

**Indications.** — Tous les cas de rhuma-tismes, goutte, lumbago, sciatique, névral-gies, etc...

### Mode d'emploi :

1 à 6 cachets par 24 heures, avant les repas, *dans les cas aigus.*

1 à 2 cachets par jour, pendant 20 jours, *dans les cas chroniques.*

Doit être accompagné de boissons alcalines abondantes, à prendre aux repas.

---

M. HY, Pharmacien

61, avenue de Choisy — PARIS (XIII<sup>e</sup>)

## LA METRICINE

**Formule.** — Tanin, Borate de Soude, Acide Borique, Bicarbonate, Perborate, Coumarine, Vanilline, Musc, Essence de Lavande.

**Indications.** — Traitement de toutes les affections organiques de la femme. Métrites, Leucorrhées, etc.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à soupe pour 2 litres d'eau chaude, en injection.

Prix : 14 fr. 95.

Echantillon sur demande :

laboratoire **R. LEBRETON**

23, Grande-Rue — ASNIÈRES (Seine).

---

## MÉTRITOLS

Comprimés Gynécologiques effervescents, antiseptiques alcalins, astringents.

**Composition.** — Acide picrique, oxyquinoléine, oxycyanure de Hg, thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptiques, alcalins, astringents, les Métritols donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

**Mode d'emploi.** — Injections vaginales. Un comprimé dans un litre d'eau bouillie chaude 40° à 45°. Position couchée, bock très bas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire **LEES**

Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V°).

**MIALBAÏNE**

Solution d'ouabaïne Mialhe à 1/1000,  
XXV à C gouttes par 24 heures.

---

**Laboratoire du Docteur MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

---



## MICELLIODE

Iode colloïdal micellaire électro-positif.  
Préparé à partir de foies frais.

### Composition :

Iode métalloïdique libre..... 0 gr. 15  
Glycogène extrait du foie frais. 2 gr. 50  
Pour 100 gr. de pseudo-solution aqueuse.  
Soit 0 gr. 0015 (1 mgr. 1/2) d'iode libre par gr. ou cc.

**Avantages.** — Résultats cliniques surprenants à doses infinitésimales d'iode libre grâce à la forme colloïdale.

### Jamais d'iodisme

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les indications de l'Iode.

### Présentation :

- 1° *Gouttes* pour la voie buccale (flacon avec compte-gouttes).
- 2° *Ampoules* injectables (boîte de 10 ampoules de 2 cc.).

### Posologie :

**Gouttes :** Doses par 24 heures à fractionner en 2 fois dans la journée.

*Adultes :* LX à C gouttes.

*Adolescents :* L à LXXX gouttes.

*Enfants :* XXX à L gouttes.

*Nourrissons :* XV à XX gouttes.

### Ampoules :

*Adultes :* une ampoule de 2 cc.

*Adolescents :* 1 cc. 1/2.

*Enfants :* 1 cc.

*Nourrissons :* 1/2 cc.

Tous les 2 jours jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives représentant une série à renouveler selon besoin.

### Prix :

*Gouttes :* Le flacon..... 18 fr.

*Ampoules de 2 cc. :* La boîte de 10.. 18 fr.

Echantillons sur demande :

**Laboratoires de l'HEPATROL**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV°).

# MICROLYSE

**Nouvel antiseptique de synthèse à pouvoir fortement bactéricide sur le**

## COLIBACILLE

**et sur les autres microbes des voies INTESTINALE  
et GÉNITO-URINAIRE.**

**Travaux du professeur Louis Gaucher**

(Communication à l'Académie de Médecine du 24 janvier 1933.)

**Action.** — Eclaircit rapidement les urines; Tarit l'urétrite et arrête la pyurie; Calme la douleur; Remonte l'état général; Pas de toxicité ni d'action congestive.

**Composition.** — C'est le premier antiseptique conçu dans un but thérapeutique déterminé et étudié d'après les données de la pathogénie moderne.

Son efficacité rapide et constante est due à la synergie de ses deux facteurs  $\alpha$  et  $\beta$ .

<p><math>\alpha</math></p> <p><b>Chlorhydrate de 6-méthyl-8-oxyquinoléine.</b></p> <p>Imprègne l'organisme grâce à son élimination lente et progressive par le foie et l'intestin.</p>	}	<p>Action bactéricide sur le terrain entéro-hépatique.</p> <p>et sur l'ensemble des systèmes sanguin et lymphatique.</p>	}	<p>Syndrome entéro-hépatorenal de Heitz-Boyer et Desgeorges.</p>
--	---	--	---	--

<p><math>\beta</math></p> <p><b>Chlorhydrate d'ortho-oxyquinoléine.</b></p> <p>Passe rapidement dans le courant circulatoire et se libère par les voies urinaires.</p>	}	<p>Action bactéricide et sédatrice sur l'arbre urinaire.</p> <p>Action élective sur le Coli-bacille et le Gonocoque.</p>	}	<p>Chimiothérapie anti-colibacillaire et anti-gonococcique par voie buccale ou sanguine.</p>
--	---	--	---	--

### Indications :

**COLIBACILLOSES.** — Infections des voies intestinales et biliaires, Entérocrites, Cholécystites, Lithiases.

**INFECTIONS URINAIRES.** — En général : Pyélonéphrites, Cystites.

**GONOCOCCIES.** — Urétrites, Métrites Salpingites.

### Mode d'emploi.

**Comprimés :** 3 à 4 par jour pendant les repas.

Prix : 18 fr.

Pour 10 jours de traitement.

**Laboratoires de la Microlyse**

10, rue de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

## **MICTASOL**

### **DÉCONGESTIF PELVIEN**

#### **Composition.**

**Comprimés :** Bromure de Camphre 0,02, Formine 0,05, Noix de Malva purpurea 0,25.

**Suppositoires :** Stovaïne 0,01, Ext. de Jusquiame 0,05, Ichtyol 0,25, Malva purpurea 0,50.

#### **Propriétés thérapeutiques.**

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Inocuité absolue. Sans contre-indication.

#### **Indications thérapeutiques.**

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence, Cystites, Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites, Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes.

#### **Mode d'emploi.**

*Comprimés :* 6 à 10 comprimés par jour, matin, midi, soir, avec un peu d'eau.

*Suppositoires :* 1 ou 2 par jour.

Comprimés : 14 fr. — Suppositoires : 15 fr.

#### **Laboratoires du MICTASOL**

**COUDERC**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
28 et 30, rue du Four — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Téléphone : Littré 17-42.

## MICTOPHILE RICHER

**Antiseptique. — Diurétique. — Analgésique.**  
Comprimés glutinisés au bleu de Méthylène.

### Composition :

Bleu de méthylène .....	0,02
Lactose .....	0,28
Extrait de belladone .....	0,003
— de mauve .....	0,05
pour 1 comprimé glutinisé.	

**Indications.** — Syndromes entéro-rénal et vésical. Cystites aiguës ou chroniques, Pyérites, Pyélonéphrites, Blennorragies, Prostatites, Colibacillurie.

**Mode d'emploi.** — 3 à 6 comprimés par jour (de préférence avant les repas). Avaler sans croquer avec un peu d'eau.

Le flacon de 40 comprimés. Prix : 15 fr.

**Laboratoire RICHER**

**Docteur en pharmacie.**

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien  
PARIS

## MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide).

**Composition.** — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

**Indications.** — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorragie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

**Doses.** — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ;  
*Enfants* : par demi-cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires B. C. L.**

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique,  
71, rue du Temple, PARIS (III<sup>e</sup>) — et ses succursales.

## MICTUALINE

**Antiseptique, Sédatif, Décongestif.**

### Composition :

Collargol à 80 p. 100 Ag. pur.....	0 gr. 02
Urotropine recristallisée.....	0 gr. 10
Bleu de méthylène pur.....	0 gr. 01
Bromure de camphre.....	0 gr. 02
Extrs. d'Uva-ursi et seneçon, q. s. p. 1 pil.	
1/2 molle enrobée de.....	0 gr. 50

**Indications.** — 1° *Maladies des voies urinaires* (Urétrites, Cystites, Pyélonéphrites, Prostatites, Hypertrophie de la Prostate, etc...

2° *Maladies des voies génitales* des deux sexes.

3° *Maladies intestinales* dans leurs rapports avec le Tractus Génito-Urinaire (Syndrome *Entéro-Rénal*, *colibacilloses*), etc...

**Posologie.** — 6 à 9 dragées par jour avec un peu de liquide.

**Laboratoire H. CLUZEL**

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

## MINERGIL

**Médication minérale sous forme organique assimilable.**

**Propriétés.** — Apporte tous les éléments minéraux indispensables à la constitution des tissus comme au bon fonctionnement de l'organisme. Donne toutes les vitamines qui, directement ou indirectement, son ou peuvent être intéressées à l'utilisation des matières minérales.

**Indications.** — Tous les cas de menace de déminéralisation de l'organisme (grossesse, lactation, tuberculose, diabète). Croissance, convalescence, anémie. Rachitisme, dépression nerveuse, etc.

**Conditions d'emploi.** — Avant chaque repas, matin, midi et soir : *Enfants* : 1 comprimé. *Adultes* : 2 comprimés. Ces doses pourront être augmentées suivant avis du médecin. Elles seront doublées et triplées dans les cas de rachitisme.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

**Laboratoires PROGIL**

77, Rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

# MIROXYL

## FORME SIROP

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, Expectorant d'action antiphlogistique certaine. Phagocytogène. Puissant modificateur de toutes les bronchites aiguës ou chroniques.

**Propriétés actives.** — Action synergique du Méthylarsinate de Codéine et du Sulfogaïacolate de Potasse.

Une cuillerée à bouche contient :

Méthylarsinate de codéine.....	0 gr. 024
Sulfogaïacolate de potasse .....	0 gr. 60
Iodhydrate de codéine.....	0 gr. 0048
Cinnamate de soude.....	0 gr. 0168

Préparation agréable au goût, pas d'intolérance, pas de constipation.

**Posologie.** — *Affections aiguës* : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures éloignées des repas.

*Affections chroniques* : 1 cuillerée à soupe matin et soir.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes affections des bronches; Bronchites sous toutes ses formes, Tuberculose, Toux rebelles et émetisantes, Grippe, Asthme, Emphysème.

Prix : 15 fr.

## FORME GOUTTES

**Composition.** — Méthylarsinate de Codéine associé à l'éther de Kay et au Chlorhydrate d'Ephédrine. Action renforcée par l'adjonction de teinture de serpolet, thym, gélsemium, grindelia, drosera ; ballote, aconit et belladone.

**Indications thérapeutiques.** — Toux spasmodique et quinteuse en général. Coqueluche, Grippe, Toux rebelles et nerveuses, Asthme, Toux émetisante, Toux laryngée, Médication symptomatique de l'adénopathie, Trachéo-Bronchique.

**Mode d'emploi.** — A absorber loin des repas dans un liquide tiède, sucré de préférence. Tisane béchique, eau, grog ou lait.

**Doses moyennes par jour, en 4 fois.** — *Adultes* : CCXL gouttes\*

*Enfants* : XII gouttes par année d'âge à partir de deux ans.

Dans les Coqueluches, doses fractionnées et croissantes.

**Doses initiales.** — *Adultes* : CXX gouttes.

*Enfants* : VIII gouttes par année d'âge à partir de deux ans.

A prendre en 3 à 4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

En cas de somnolence accentuée, interrompre le traitement pendant 24 heures.

Prix : 15 fr.

Laboratoires TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS.

Tél. : Ségur : 08-13.

Pour la BELGIQUE : HERMAN Labor. S. A.

19, rue des Cultivateurs — BRUXELLES.

## MITIGANS

(Phénacéthéïnopyrazolone)

**Analgésique** puissant, anti-rhumatismal. Les propriétés thérapeutiques du Mitigan en font un spécifique de l'élément douleur.

**Médication** aussi inoffensive qu'efficace. Aucune intolérance.

**Indications.** — Toutes les algies, névralgies, migraines, rhumatismes, etc

**Doses.** — 1 à 4 cachets par jour.

**Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France.**

6, rue Robert-Estienne — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

---

## MOLENE

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse); adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative; tuberculose pleurale; tubercules cutanées diverses.

**Contre-Indication.** — Néphrite avec albuminurie abondante.

**Mode d'emploi.** — Voie intraveineuse ou voie intramusculaire. La dose moyenne est d'une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours; chez les grands fébricitants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

**Présentation.** — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhydride Molybdique pur).

**Prix de vente au public :** 25 fr. la boîte de 12 ampoules.

**Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND**  
14, rue Gravel — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

**Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND**  
54, Chaussée d'Antin, PARIS.

## MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Ethyle : solution huileuse à 25 p. 100  
(Ampoules de 2 cc.)

*Traitement de la tuberculose pulmonaire.*

**Indications.** — L'action du Moréthyl se fait sentir sur toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et fait, dans certains cas, rétrocéder les lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées.

Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

**Posologie.** — 20 injections quotidiennes successives par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## MORISLAND IRRADIÉ

(Granulé fondant.)

**Composition.** — Ergostérine irradiée, Lipoides de Foie de Morue, Iode, Tanin, Lécithine, Cholestérine, Glycogène, Acide nucléinique. Glycérophosphates de Chaux, Soude, Magnésie.

**Indications.** — Engorgements ganglionnaires, tous états de Faiblesse générale, Rachitisme, Bacillose.

**Posologie :**

*Adultes* : 2 cuillerées à dessert par jour.

*Enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr.

Echantillons sur demande :

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).



## MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arsénée (entièrement assimilable).

**Forme.** — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

**Compos.** — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique : méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

**Action physiol.** — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoïétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

**Indicat.** — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

**Posologie.** — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour ; de 5 à 10 ans 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le n° 586-10.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, Avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

Téléphone : Roquette 14-12.

## MORRHUÉTINE JUNGKEN et MORRHUÉTINE JUNGKEN VITAMINÉE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

**Forme et Composition.** — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (Nao, Cao, Manganèse), en tout 15 cgr. par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

**La Morrhuéline Jungken Vitaminée** est le même produit avec, en plus, toutes les Vitamines d'huile de foie de morue.

**Propriétés.** — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

**Indications.** — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

**Doses et Mode d'emploi.** — *Enfants* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau ou au début des principaux repas.

BRACQUEMOND et C<sup>ie</sup>

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine)

R. C. Paris 207-767 B.

## MORRHUXINE

**Composition.** — Iode organique. — Brome. — Glycérophosphates alcalins et arrhénal à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glyciné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

**Propriété.** — Apéritif tonique, reconstituant anti-lymphatique.

**Indications.** — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

**Doses.** — *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.  
*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 12 francs.

**E. VERGELOT, Pharmacien**

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 48-22.

---

## MORSINE

**Forme.** — Elixir reconstituant, de goût agréable.

**Composition.** — Méthylarsinate de soude, Huile de foie de morue, Glycérophosphate de chaux, Glycérophosphate de soude, Vin généreux.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Neurasthénie, Rachitisme, et toutes affections provenant d'un vice de la nutrition.

### Posologie :

*Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 2 cuillerées à café ou à dessert suivant l'âge, avant le repas.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires LECONTE**

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Louvre 53-16.

## MORUBIASE

**Extrait hépatique total de morue irradié et sans corps gras.**

### Principes actifs :

Lipophosphatides, acide morrhuïque, vitamines.

### Formes :

**Pilules et granulé.** Une pilule ou une cuiller à café de granulé contient les principes actifs de 30 gr. d'huile de foie de morue.

### Avantages :

Petit volume, aucun goût, parfaite digestibilité, sans corps gras, se prend l'été comme l'hiver.

### Indications :

Celles de l'huile de foie de morue : Anémie, Lymphatisme, Rachitisme, Affections chroniques des voies respiratoires.

### Posologie :

**Adultes :** 6 à 8 pilules, par jour au début ou à la fin des repas.

**Enfants :** 2 à 6 cuillers à café suivant l'âge.

**Arrhéno-Morubiase :** Synergie thérapeutique : extrait hépatique et méthylarsinate disodique (0,005 mgr. par pilule).

**Gaïaco-Morubiase :** Extrait hépatique et 0,05 carbocinnamate de gaïacol par pilule.

**Laboratoires MEYNET-CROSNIER**

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

## MORUXASE

### Deux formules :

**1° Gouttes de Moruxase concentrée : 15 fr.**

XX gouttes renfermeront :

Triiodure d'arsenic ..	5 centigr.		Extrait iodotannique	50 centigr.
— de manganèse	5 —		Glycérine .....	50 —

<b>Doses.</b>	{	2 à 7 ans .....	XX gouttes	{	deux fois par jour.
		7 à 15 ans .....	XL —		
		Adultes .....	L —		

**2° Moruxase, sirop : 12 fr.**

1 cuillerée à soupe renferme :

Triiodure {	de fer .....	5 centigr.
	d'arsenic .....	5 —
	de manganèse .....	5 —

Extrait iodotannique .....	50 —
----------------------------	------

Lactophosphate de chaux .....	40 —
-------------------------------	------

Sirop au suc naturel de groseilles .....	20 grammes.
--	-------------

<b>Doses.</b>	{	2 à 7 ans .....	1 à 2 cuill. à café	{	deux fois par jour.
		7 à 15 ans et adultes .....	1 à 2 cuill. à soupe		

**Indications.** — Carence physiologique, Anémie, Lymphatisme, Troubles de croissance, Inflammations ganglionnaires.

Action catalytique puissante du manganèse. Le sirop fait à froid contient intactes les vitamines du suc de groseilles.

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

3, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE (Hte-Garonne)

## MOVEBIL

Le nouveau régulateur de la sécrétion biliaire.

**Composition.** — Alcoolé d'une seule plante, la Chirette, originaire des Indes, l'*Ophelia Chirayta* (Himalaya), renferme de l'acide ophélique et de la chiraytine qui, en s'hydrolysant, donne de l'acide ophélique et de la chiraytogénine.

**Propriétés thérapeutiques.** — MOVEBIL modère la sécrétion biliaire si elle est trop forte et l'augmente si elle ne l'est pas assez.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Congestions du foie, Cirrhose, Auto-intoxications.

**Formes.** — Gouttes et Pilules.

**Prescription.** — X à XXX gouttes, trois fois par jour, dans une cuillerée à soupe d'eau, 10 minutes avant les repas, midi et soir. — 1 à 2 pilules, 3 fois par jour. — Innocuité absolue : les doses mentionnées peuvent être dépassées, sans inconvénient, si le docteur le juge nécessaire.

**Laboratoire L. GOUZERH**

5, place Bisson — LORIENT.

---

## MUCICARBOS

**Composition.** — Charbon animal chimiquement pur (Carbos), associé à un mucilage pur pour éviter la constipation.

**Forme.** — Granulé rond : *Mucicarbos simple*; *Mucicarbos benzo-naphtolé*.

**Indications.** — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocolites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires E. MILLET**

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

## MUCILAXINE

**Composition.** — Huile de Paraffine de haute viscosité et neutre, associée à un mucilage pur sans cellulose (*action purement mécanique sans aucune addition de produit laxatif*).  
*Suppression du suintement.*

**Forme.** — Crème-émulsion facile et agréable à prendre.

**Indications.** — Rééducation et pansement de l'intestin. Constipation. Colite. Entérocolite muco-membraneuse. Constipation des opérés, des accouchées, des enfants, des nourrissons, etc.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à soupe, à dessert ou à café par jour, suivant l'âge et au début des repas.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires E. MILLET**  
**RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).**

---

## MUCINUM (Comprimés de)

### Composition :

Entérokinase.....	0 gr. 005
Erepsine.....	0 gr. 005
Pancréase .....	0 gr. 005
Bile .....	0 gr. 010
Atropa Belladonna.....	0 gr. 005
Cassia acutifolia.....	0 gr. 075
Phenolphthaléine.....	0 gr. 075

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif doux, n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

**Forme.** — Petits comprimés, très friables, sans saveur, pouvant être croqués ou avalés.

**Posologie.** — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

**Laboratoires CHANTEREAU**

26 bis, rue Dombasle — PARIS.

## MUCOBISMUTHINE

Pansement du tube digestif (Carbonate de bismuth pur en suspension dans un mucilage végétal, à l'exclusion de tout autre produit de remplacement).

Une cuillerée à soupe contient 2 gr. 50 de carbonate de bismuth.

**Indications.** — Syndromes douloureux, gastriques et duodénaux. Hyperacidité, Ulcérations, Colites, Entérites aiguës saisonnières, Fermentations intestinales, Oxyurase.

**Doses et modes d'emploi.** — Suivant les cas, 2, 3 ou 4 cuillerées à bouche; la présence d'un mucilage permettant de diminuer les doses habituellement données de carbonate de bismuth.

Prix au public : le flacon : 18 francs.

Le 1/2 flacon : 10 francs.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD 

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES.

## MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses  
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

**Composition.** — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

**Propriétés.** — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

**Indications.** — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigation.

Le flacon : 8 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-1.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).

Téléphone : Invalides 12-63.

## MUCYLLIUM

### Traitement rationnel et moderne de la constipation par le plus parfait des Mucilages.

Semences sélectionnées, cultivées spécialement et purifiées scientifiquement de **Psyllium noir**.

Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucune toxicité. Pas d'action irritante. Aucune contre-indication.

**Indications du Mucyllium.** — Le Mucyllium doit être employé dans toutes les constipations, qu'elles soient d'origine atonique ou spasmodique, par stase ou par dolichocôlon, et ce, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

On peut prescrire par conséquent dans tous les états pathologiques où la constipation est en cause, tels que troubles toxiques, état saburral des voies digestives, gastrites, colites segmentaires ou totales, fermentations intestinales, états dysentériques, colites ulcéreuses et hémorragiques, hémorroïdes, fissures anales, appendicite chronique, cholécystes, troubles cutanés, acné, furonculose, manifestations anaphylactiques, eczéma, urticaires, migraine, bouffées de chaleur. Syndrome entéro-rénal, coli-bacillurie.

**Doses.** — *Enfants* : suivant l'âge, 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe. *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe ou plus, au moment des repas, dans un peu d'eau, de purée ou de potage.

Littérature et échantillons médicaux sur demande :

**Laboratoires BERNARD-GARCIN**

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON (Vaucluse) — France.

Eugène GRAS, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, Ex-interne des Hôpitaux.

## MURONES DU D<sup>r</sup> ROBERT JACQUES

1<sup>o</sup> **MURONE aérogène.** — Redressement fonctionnel du poumon par activation des échanges respiratoires et oxydation.

**Indications.** — S'adresse aux anémiés, aux troubles de la croissance, et à tous les *menacés* de tuberculose.

**Composition.** — Essences oxydes et essence phénol en proportion juste : ampoule n<sup>o</sup> 1, et essence diffusible : ampoule n<sup>o</sup> 2, contenues dans la même boîte.

**Mode d'emploi.** — Injecter quotidiennement en alternant ampoule 1 et ampoule 2 pendant 24 jours, repos 6 jours. Traitement : trois mois.

2<sup>o</sup> **MURONES A. B. C.** — Oxygénation et oxydations intratissulaires par oxydoréduction.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, osseuse, laryngée, suppurations pulmonaires, bronchites fétides.

**Composition.** — Murone A : essences oxydantes à doses plus actives ; Murone B : balsamique très diffusible ; Murone C : doué de grande activité infertilisante, ne doit être employé qu'après amélioration des signes généraux et fonctionnels.

**Mode d'emploi.** — Alternier les injections chaque jour, au début dans l'ordre A. B. A. B. A. B., puis A. B. A. B. A. B., puis A. B. C., B. A. B. C.

Voir notices et formules dans chaque boîte. — Prix en France : 15 fr.

Fabrique par les laboratoires **AUG. LUMIERE**

Dépôt et vente :

Etablissements **SILBERT et RIPERT**

30, rue Bénédit — MARSEILLE



## MUSCULOSINE BYLA

**Suc de viande crue** hyperactivé par les oxydases et la catalase du sang et les vitamines musculaires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antihémorragique, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

**Indications.** — Convalescence, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse ou non.

**Les Etablissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

**Indications.** — Syphilis à toutes ses périodes.

**Dose normale :** Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth métal.  
Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

**Double dose :** Ampoule de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth métal.  
Boîte de 10 ampoules : 40 francs.

**Dose infantile :** Ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 cgr. 6 de bismuth métal.  
Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 jours ou 2 ampoules tous les 5 jours. Dans les cas rebelles : 2 ampoules tous les 2 jours.

**Traitement de sécurité :** Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

**Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

R. C. Seine 143.981.

## MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN.

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

### Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Pastilles de Mycolysine, 15 à 20 pastilles par 24 h.

**Indications.** — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## MYODEN

**Elixir Antirhumatismal et Antigoutteux**  
au Phospho-Hexahydroparadiazine-ammonium.

**Composition.** — Phospho-hexaparadiazinammonium, Sel de Gregory, Extrait stabilisé de belladone, Extrait fluide de bulbes de colchique stabilisés, Teinture de digitale pourprée, Ethanol pur, Eau bi-distillée.

**Indications.** — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

*Enfants au-dessus de 10 ans* : 2 demi-cuillerées à café par jour.

**Nota.** — Le MYODEN peut être prescrit par le Corps médical pour les Assurances Sociales.

Médicament enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 726-1.

**Laboratoires E. DAUPEZ**

37, rue des Lois — TOULOUSE (Haute-Garonne).

Tél. : 224-55.

## MYORAL

Le MYORAL est un sel d'or insoluble en suspension huileuse. Il correspond à la formule de l'aurothioglycolate de calcium, soit 64,16 d'or métal et 6,54 de calcium.

C'est le sel le plus riche en or métal employé jusqu'ici, ce qui lui assure une *remarquable efficacité*.

Son insolubilité, d'une part, sa présentation en suspension dans l'huile, d'autre part, en font le *mieux toléré* de tous les sels d'or.

Il doit être utilisé en injection intra-musculaire qui est *absolument indolore*.

Le MYORAL est présenté en ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc., on peut sans inconvénient en injecter 2 doses de 3 cc. par semaine jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc.

### Mode d'emploi :

2 injections intra-musculaires par semaine.

En commençant par des doses faibles, arriver le plus vite possible à injecter dans la même semaine 2 ampoules de 3 cc. Jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc., soit environ 3 à 4 gr. d'or métal pour une série.

Attendre deux mois avant d'entreprendre une deuxième série.

Le MYORAL est également indiqué comme traitement d'attaque et comme traitement d'entretien et il convient particulièrement de l'employer chez des sujets ayant présenté des accidents d'intolérance au cours de traitements antérieurs.

**Laboratoires du MYORAL**  
20, rue des Ecoles — PARIS (V<sup>e</sup>).

## MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

**Indications.** — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticolis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

**Mode d'emploi.** — Étendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 13 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

## MYOVARSYL

**Composition.** — Dérivé méthylène-sulfonate du Dioxy-diamino-arsénobenzol.

**Forme.** — Poudre jaune se dissolvant aisément et rapidement dans l'eau ou le sérum en fournissant une solution injectable sans douleur, par la voie sous-cutanée ou intramusculaire.

**Présentation** en tubes scellés aux doses suivantes : 6, 12, 18, 24 cgr. — 30, 36, 42, 50 cgr. — 1,5 et 3 cgr.

**Indications.** — Traitement commode, aisé, sûr, de la syphilis à toutes ses périodes.

**Usines Chimiques**

**des Laboratoires Français**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 58-43.

---

## NAIODINE LOGEAIS

**Formule :** 1° *Normale*, solution aqueuse à 1 % d'iodure de sodium stabilisé (pour intramusculaires ou intraveineuses) :

2° *Concentrée*, solution B aqueuse à 5 %. *Spéciale pour intraveineuses*.

### Formes :

*Solution normale à 1 % :*

Boîte 6 ampoules de 10 cc. : 23 fr. net.

Boîte 6 ampoules de 20 cc. : 30 fr. net.

*Solution B à 5 % :*

Boîte 6 ampoules de 10 cc. : 27 fr. net.

Boîte 6 ampoules de 20 cc. : 35 fr. net.

Boîtes vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps Médical. Prix courant réduit sur demande.

**Propriétés.** — *Solution normale : sédatif type de l'élément douloureux dans les algies rebelles*, grâce à l'action neurophile intense de NaI stabilisé (imprégnation nerveuse par l'ion I de la NAIODINE).

**Véritable traitement spécifique de la sciatique**, c'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, toxicomanies, néoplasmes, etc.).

*Solution B à 5 %.* — Action antiseptique et anti-infectieuse puissante par voie intraveineuse dans le traitement des maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Cure intraveineuse des algies rebelles.

La NAIODINE est atoxique, stabilisée, indolore à l'injection, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires.

**Indications.** — *Solution normale.* Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciatique, Lumbagos, Zonas, Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme déformant, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Asthme, Emphysème, Toxicomanies, etc.

*Solution B à 5 %.* — Maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Algies rebelles.

**Posologie.** — *Solution normale :* Traitement d'attaque à doses massives : 20 à 40 cc. par jour, en une seule séance, jusqu'à sédation. Injections intramusculaires indolores lentes (loco dolenti si possible). Ni réactions, ni incompatibilité. ni contre-indications. Pas d'iodisme, ni d'accumulation.

*Solution B.* — *Injections strictement intraveineuses* très lentes : 20 à 40 cc. par jour pendant dix jours, 20 jours de repos entre chaque série d'injections.

Laboratoires J. LOGEAIS

BOULOGNE-SUR-SEINE, près Paris.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

## NARCYL

Médicament spécifique de la Toux.

*Laryngites, Bronchites, Coqueluche.*

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl par cuillerée à soupe (chlte d'éthyl narcéine synt.).

Comprimés dosés à 0 gr. 02 de narcyl et 0 gr. 25 de benzoate de Na.

### Doses :

Sirop :

*Adultes* : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

*Enfants* : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.

— 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour.

— 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill. à bouche par jour.

Comprimés : *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

Sirop, le flacon : 14 fr. — Comprimés : 14 fr.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## NASARGINE

Solution à base d'argyrol de Barnes et de résorcine.

**Avantages.** — Associés à la résorcine, les sels d'argent ont une action antiseptique plus efficace sur les muqueuses.

**Indications.** — Rhinites, Coryzas, Grippe, Sinusites, Adénoïdites, Otites et toutes les affections du rhinopharynx et du larynx.

### Modes d'emploi :

<i>Nourrissons</i> : I à II gouttes	} dans chaque	
<i>Enfants</i> : III gouttes.		narine 2 à 3
<i>Adultes</i> : IV à VI gouttes.		fois par jour.

Badigeonnages. Pulvérisations.

**Laboratoires MAIRE**

171, rue de Belleville. — PARIS.

## **NASOBORE (Comprimés)**

**Puissant désinfectant des voies respiratoires.  
Non irritant, Non toxique.**

**Composition.** — Chloramine T, associée aux essences balsamiques et aux principes de plantes sélectionnées.

**Formule.** — Chloramine T, Baume du Pérou, Borate de Soude, Bicarbonate de soude, Essences aromatiques.

**Indications.** — Antisepsie des voies respiratoires, Affections de la gorge, Enrouement, Angines, Laryngites, Trachéites, Trachéo - Bronchites, Sinusites, etc.

**Mode d'emploi.** — 1° *Inhalations* : 2 à 3 comprimés dans un bol d'eau bouillante. Respirer les vapeurs plusieurs fois par jour.

2° *Gargarismes* : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau bouillie chaude.

**Laboratoire J. BRESSIER**

**Docteur en Pharmacie.**

102, rue Vincent — MARSEILLE.

## **NASO-SULFOLARSAN**

**Antiseptique sulfureux sans odeur.  
Non caustique, non toxique.**

**Indications.** — Affections du nez et de la gorge : Coryza aigu ou chronique, Sinusites, Ozènes, Erysipèle, Otites, Muguet, Angines.

**Présentation.** — Pommade en tube à embout nasal.

**Mode d'emploi.** — Gros comme un pois, 2 à 3 fois par jour.

Le tube : 10 francs.

**Laboratoires DOMERGUE**

**AGEN (Lot-et-Garonne).**

## NATIBAÏNE NATIVELLE

Seule association renfermant 1/3 de **Digitaline Nativelle** et 2/3 d'**Ouabaïne Arnaud**.

**Formes.** — Solution au 1/1000. Ampoules à 3/10 de mgr. pour injections intraveineuses.

**Indications.** — Myocardites avec Tachycardies, Arythmie complète avec troubles du tonus, Hypertension artérielle avec tendance à la Tachycardie, Dissociation atrio-ventriculaire avec ébauche de décompensation.

**Doses.** — *Per os* : Doses faibles (d'entretien) : XV gouttes de **Natibaïne** par jour pendant 5 jours.

Doses moyennes (de soutien) : XXX gouttes de **Natibaïne** par jour pendant 5 jours

Doses fortes (d'attaque) : L gouttes de **Natibaïne** par jour en deux fois pendant les 5 premiers jours, puis XX gouttes par jour les 5 jours suivants.

**Injections** : 1 cc. d'une ampoule par jour pendant 4 jours.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (15°).

## NATIROSE

**Dragées de Trinitrine à noyau liquide.**

**Composition.** — Chaque dragée renferme :

Trinitrine..... 0 gr. 00065

Chlorhydrate de Codéthy-

line ..... 0 gr. 003

Sulfate neutre d'Atropine. 0 gr. 0001

Essence de menthe.

**Indications.** — Angine de poitrine, Aortite, Artérite, Asthme cardiaque, Bradycardie, Hypertension artérielle, Œdème aigu du poulmon.

**Doses.** — 1 à 2 dragées au moment de l'accès sans dépasser 8 à 10 dragées par 24 heures.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (15°).



## NATROSYL

**Forme pharmaceutique.** — Soluté.

**Composition.** — Soluté alcalin à base de baume du Pérou et d'essences antiseptiques aromatiques.

**Action.** — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

**Indications.** — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie en injections vaginales.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires**

**du Dr Pierre ROLLAND**

Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V<sup>e</sup>).

## NAZINETTE

(Baume Nasal.)

**Composition.** — Mélange complexe d'essences choisies d'après leur pouvoir antiseptique et d'après leur coefficient de volatilité. *Pas de menthol. Pas d'adrénaline. Pas de toxiques. Pas de poudres insolubles. Pas de produits chimiques.*

**Avantages.** — Homogénéité absolue. Consistance fluide, fusible à 36°. Laisse les narines libres. Adhère aux muqueuses (action prolongée) et partiellement absorbable par elles (action immédiate et exceptionnelle). Tient lieu d'inhalation. Usage prolongé possible. N'irrite jamais. Ne tache pas le mouchoir.

**Présentation.** — Tube d'étain pur avec une canule permettant l'introduction facile dans les narines.

**Prescription.** — Un tube de *Nazinette* : introduire gros comme un petit pois dans chaque narine.

**Propriétés.** — Calmant, décongestionnant, bactéricide. Supprime les irritations de la muqueuse.

**Indications.** — Rhumes de cerveau, rhinites et toutes inflammations de la muqueuse rhino-pharyngée, végétations, sinusites (action remarquable), ozène, surdité, etc. ; prévention des maladies infectieuses, coqueluche, etc.

**Laboratoires Biologiques**

**E. GILBERT, Docteur en Pharmacie**

6, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## NÉALGYL BOTTU

**Composition et présentation.** — Comprimés constitués d'une association de deux groupements médicamenteux : un noyau antalgique à base d'une nouveauté : la chloralopyrine de Bottu et un groupement correctif des effets nocifs secondaires sur le cœur et le rein (caféine-hexaméthylène-amine).

Les comprimés dragéifiés sont insolubles mais faciles à déglutir. Présentés en boîtes de 12 comprimés dont chacun représente 0,27 de chloralopyrine, 0,10 d'oxyéthylacétanilide, 0,05 de caféine et 0,07 d'hexaméthylène.

**Indications et posologie.** — Toutes les algies depuis les bénignes (courbatures, céphalées, odontalgies) jusqu'aux douleurs tenaces et rebelles (goutte, sciatique, mensturalgies). A ordonner spécialement chez les malades dont l'estomac ou le rein ne peuvent supporter les spécifiques anti-douleur courants.

Pour un effet immédiat et massif, 2 comprimés d'emblée suivis à 20 minutes de distance d'un troisième et, si besoin, d'un quatrième. Pour une action prolongée et soutenue, 6 à 8 comprimés par jour toutes les deux heures, avant ou pendant les repas, mais jamais pendant le travail de la digestion.

Pour les algies vespérales et insomnies douloureuses, 2 comprimés d'emblée le soir dans un liquide très chaud.

**Laboratoires BOTTU**

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## NÉOARSITE

(Liquueur de Fowler spéciale.)

**Propriétés.** — Les composés arsenicaux, tels que cacodylates, méthylarsinates, etc. ont été adoptés thérapeutiquement pour remplacer les sels arsenicaux anciens, arseniates, arsenites, mais leur efficacité n'est réelle qu'à des doses importantes, c'est-à-dire à des doses voisines de leur toxicité spécifique.

De tous les arsenicaux, seule la liqueur de Fowler a une valeur thérapeutique bien définie. Aussi le prof<sup>r</sup> Roger a-t-il étudié pour ce médicament de toute efficacité les conditions optima de son absorption sous des formes nouvelles.

**Formes :**

1<sup>o</sup> *L'Ampoule isovisqueuse de Néoarsite*, grâce à sa viscosité qui est égale à la viscosité moyenne du Myoplasma sanguin, est résorbée presque instantanément et sans réaction.

2<sup>o</sup> *Les Perlules de Néoarsite*, solubles seulement dans l'intestin, suppriment les inconvénients de l'absorption gastrique. Chaque perle correspond à IV gouttes de Liqueur de Fowler et à un milligramme de quassine.

**Posologie :**

*Ampoules :* 1 par jour.

*Perlules :* 1 au repas du midi. 1 au repas du soir.

Prix : Ampoules, 20 fr. ; Perlules, 15 fr.

Dépôt : Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

## NÉO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique  
(Syn. Arrhénal)

**Indications thérapeutiques.** — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique. Un long emploi (depuis 1900) a établi la supériorité de cette préparation.

**Doses et mode d'emploi.** — *Pilules* à 0,01 : 4 à 5 ou plus par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise.

*Ampoules* à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme et l'anémie des pays chauds.

Prix de vente au public : pilules : 11 fr. 25 ;  
ampoules : 12 fr. 50.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## NÉOBIOL

**Composition.** — Soufre colloïdal et complexe hydrocarbure spécial, dégraissant et d'odeur agréable.

**Indications.** — *Séborrhée* et ses manifestations : chute des cheveux, pellicules, peaux grasses, points noirs, acné.

**Mode d'emploi :**

**Au visage :**

En applications externes quotidiennes.

En frictions douces avec un tampon de coton hydrophile.

**Au cuir chevelu :**

Écarter les cheveux par quelques raies faites au peigne, et procéder de même qu'au visage.

Prix au public : 18 fr. 90.

**Laboratoire L. JAUFFRET, Pharmacien**  
**Ex-Interne des Hôpitaux.**

4, place du Val — VANNES (Seine).

## NÉO-CALCILINE

**Reconstituant biologique, para-hépatopancréato-splénique.**

**Composition.** — Os frais épiphysaire, Parathyroïde Thymus, Surrénale, Diastase pancréatique, Poudre de Muqueuse intestinale, Extrait lipoïdique de Foie, Extrait lipoïdique de Rate.

**Doses.** — 2 comprimés, 2 cachets, 2 mesures (granulé) avant chaque repas.

*Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires Gastro-Entérologiques  
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 69-13.

---

## NÉO-CARDYL

**Butyl-thio-laurate de Bismuth oléosoluble.**

**Indications.** — Bismuthothérapie de la syphilis acquise ou héréditaire, par voie intramusculaire.

**Présentation et posologie.** — Néo-Cardyl (pour adultes), solution huileuse dosée à 0 gr. 05 de Bi métal par cc. Ampoules de 1 cc. 5 contenant 0 gr. 075 de Bi métal (boîtes de 12 ampoules). Série de 12 injections bi-hebdomadaires ; intervalle de 5 semaines environ entre deux séries consécutives.

Néo Cardyl infantile : Solution huileuse dosée à 0 gr. 015 de Bi métal par cc. Ampoules de 1 cc (boîtes de 10 ampoules). Dose par injection, suivant le poids de l'enfant (consulter la notice détaillée).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## NÉO-CHLORAL-NAU

Une nouveauté thérapeutique.

Antiseptique puissant, ni caustique, ni irritant. Décongestif, astringent, analgésique, hémostatique.

**Formule.** — Thymol crist. 2 gr. — Hydrate de chloral, 100 gr. — Résorcine, 50 gr. — Novocainum, 2 gr. 50. — Adrénaline au 1 000<sup>e</sup>, 25 gr. — Excipient aqueux spécial, 1 000 gr. — La nouveauté consiste en la **solubilisation** (sans intervention de sels sodiques ou autres) et la **stabilisation** du thymol cristallisé en milieu rigoureusement aqueux.

### Indications :

1<sup>o</sup> Affections du RHINO-PHARYNX : Angines, rhinites, amygdalites, etc...

2<sup>o</sup> En **STOMATOLOGIE** : interventions traumatisantes, abcès, pyorrhée alvéolaire, etc...

**Posologie.** — 1 à 2 cuill. à café dans un grand verre d'eau bouillie chaude, en bains de bouche, gargarismes, etc...

1 à 3 cuill. à soupe par litre d'eau en lavages de la gorge, irrigations nasales, etc...

**Présentation.** — En flacon de 2 grandeurs :

P. M. à 8 francs ; G. M. à 16 francs.

**Laboratoires du NÉO-CHLORAL-NAU**

21, Grande-Rue — ARGENTEUIL (.S-et-O.).

---

## NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (80 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergiques dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïne pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïne pour frictions dans maladies infectieuses.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la coli-bacillose et l'appendicite chronique

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Laboratoires du **D<sup>r</sup> MAR TINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

## NÉO-DMÈGON

**Vaccin curatif des complications de la gonococcie.**

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonocoques* et de *synocoques* traitées par le fluorure de sodium.

**Indications.** — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmègon agit notoirement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules à étiquette blanche et bleue. Voie hypodermique ou intra-musculaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## NÉO-DMÈTYS

**Vaccin curatif et préventif de la coqueluche.**

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traitées par le fluorure de sodium.

**Indications.** — Traitement et prophylaxie de la coqueluche.

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue. Une injection intramusculaire, de préférence (ou sous-cutanée), en principe tous les 2 jours ; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule à la troisième ou quatrième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Le traitement comporte en général de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules à étiquette blanche et bleue.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## NÉOL

**Constitution.** — Préparation aqueuse peroxy-sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

**Propriétés.** — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophylactique, kératoplastique et décongestif.

**Indications.** — Brûlures par le feu, le radium ou le froid. Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédoniques. Métrites, angines, pharyngites.

**Mode d'emploi.** — L'eau néolée (*Néol*, 1 partie, eau, 4 parties) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications. — Attouchements, badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrites et Endométrites) : *Néol pur*. — Pansements (Brûlures, Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : *une cuill. à soupe par verre d'eau* avec une pincée de bicarbonate de soude. — Injections, grands lavages : *Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau*.

**Laboratoires BOTTU**

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---



## NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

### Laxatif.

**Composition.** — Suc d'orange et manne.

**Forme.** — Sirop.

**Indications.** — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

**Ne renferme ni produits chimiques, ni phtaléine du phénol, ni drastiques, ni stupéfiants.**

Peut être donné aux enfants, même nouveau-nés.

### Posologie

*Enfants* du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.

*Enfants* de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.

*Enfants* de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.

*Adultes* : une à deux cuillerées à soupe. S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet actif pour revenir ensuite à des doses moindres, mais suffisantes.

### Laboratoires CHAPOTOT

56, boulevard Ornano

PARIS (XVIII<sup>e</sup>)

Téléphone : Nord 28-90.

R. C. 231917 B.

## NÉOLYSE et NÉOLYSE RADIOACTIVE

Préparations à base de sels silico-magnésiens.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement des affections cancéreuses par les composés magnésiens.

**Propriétés thérapeutiques.** — La Néolyse est établie d'après les observations du Prof. Robin et les arguments cliniques de MM. Richet, Delbet et J. Regnault (*Acad. de médéc.*, avril 1918).

**Formes usuelles :**

Néolyse : *Cachets* (en boîte de 60). — 20 fr.

*Ampoules* (en boîte de 4). — 10 fr.

*Compresses* (en boîte de 10). 15 fr.

Néolyse radio-active : *Ampoules* (boîte de 4).

Prix : 20 fr.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (Xe).

## NÉO-NEUROSINE PRUNIER

Saccharure granulé à base de :

Phospho-glycérate de calcium  
pur ..... 0,05 centigr.

Glycéro-phosphate de sodium  
pur ..... 0,10 —

Chlorure de magnésium pur.. 0,15 —  
par cuillerée à café, soit 5 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication tonique, phosphorée, calcique et magnésienne. Prophylaxie des affections cancéreuses.

**Posologie.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre en nature ou dans de l'eau.

Dépôt général :

**CHASSAING, LE COQ ET Cie**

(Anc. M<sup>on</sup> Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIERES (Seine).

# NÉOPANCARPINE

Solution d'Extrait total de Jaborandi.

**Formes.** — Gouttes, Granules, Ampoules injectables.

**Indications thérapeutiques :**

**Traitement de fond** des troubles vago-sympathiques, en particulier des *altérations de la sensibilité organique* (nerf pneumogastrique et annexes).

## ASTHME

**RHUME DES FOINS-CORYZAS SPASMODIQUES**

**TOUX QUINTEUSES**

**COQUELUCHE**

Accidents respiratoires et digestifs  
post-anesthésiques au cours des  
opérations.

**Manifestations anaphylactiques.**

**URTICAIRE - ECZÉMA**

**Mode d'emploi :**

Commencer toujours par des doses faibles. S'en tenir ensuite aux doses moyennes. Augmenter les doses en cas d'insuffisance d'action.

**Doses moyennes :**

*Gouttes : Enfants : III à X gouttes.*

— *Adultes : VIII à XV gouttes.*

3 à 4 fois par jour, immédiatement après les repas.

*Granules : Adultes : 1 granule 3 à 4 fois par jour.*

*Ampoules : Adultes : Commencer toujours par 1/2 ampoule, puis 3/4 d'ampoule, puis l'ampoule entière. Continuer à la dose la mieux tolérée.*

Le traitement par ampoules peut être continué sans toxicité pendant toute la période du rhume des foins, combiné avec le traitement interne et les instillations nasales et oculaires de **RHINOFLUINE**.

Dans l'asthme, il peut être poursuivi par périodes de plusieurs semaines, 3 à 4 fois dans l'année comme traitement de fond jusqu'à disparition des crises.

**Laboratoire de Pathologie Générale de Paris**

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Auteuil 35-25.

## NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires : Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas. Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injections intramusculaires tous les 2 jours du contenu total d'une ampoule n° 1 et de 1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 100 fr. la boîte de 12 ampoules

**Laboratoires JAMMES**

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## NÉO-PHYSIO

**Admise dans les Hôpitaux de Paris**

*Toutes infections de moyenne intensité.*

**Indications thérapeutiques.** — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections.

**Forme.** — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Prix : 22 francs.

## PHYSIOSTHÉNINE

*Toutes infections graves.*

**Formes.** — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
**RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).**

## NÉOPULMINE

Affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

### Composition :

Sulfogaiacolate de potasse .....	1,00
Benzoate de sodium. ....	1,50
Extrait thébaïque .....	0,02
Dionine .....	0,02
Teinture de belladone.....	0,65
— de drosera.....	0,65
— de grindelia .....	0,65
Sirop de baume de tolu. ....	15,00
Excipient aromatique Q. s. p. 100 cc.	

**Indications.** — Trachéite, laryngite, bronchite aiguë et chronique, asthme, grippe, catarrhe, etc.

**Mode d'emploi.** — 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes et 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 6 ans.

Prix · 13 fr.

**Laboratoires RICHER**

Docteur en pharmacie.

45, Fg Saint-Denis — 1, r. d'Enghien, PARIS.

## NÉO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié (Nucléinate de Strychnine défini et Cacodylate de Soude).

Injections hypodermiques et comprimés.

**Indications thérapeutiques.** — Hypotension artérielle, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc. (Spécificité). Amyosthénie. Corps nouveau défini, à effets réguliers et constants.

**Mode d'emploi.** — *Ampoules* : Tous les jours une ampoule (en injections intramusculaires de préférence), deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

*Comprimés* : Un comprimé à chaque repas, avaler sans croquer.

Prix de vente au public : 18 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## NÉO-RIODINE

$C^3 H^6 O^4 I S Na$

**Composition.** — Dérivé sodique à 40 p. 100 d'iode organique en solution aqueuse.

**Formes.** — Boîtes de 10 ampoules de 2, 3, 5 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Action immédiate et intensive.* Aucune intolérance.

**Indications.** — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension, Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée à effets rapides est indiquée.

**Doses et mode d'emploi.** — Par voie buccale : 1 ampoule par jour le matin à jeun dans un peu d'eau. En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## NÉOSALIODE

**Huile Iodo-salolée purifiée en injections intramusculaires indolores.**

**Composition.** — Iode, Salol, Camphre, Huile d'olive purifiée.

**Indications.** — Rhumatisme chronique : Arthrites, Névralgie sciatique, Rhumatisme déformant.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une injection tous les 2 jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.

**Injections** faites profondément dans la région fessière, en évitant l'action du produit sur le tissu sous-cutané.

Prix, la boîte de 5 ampoules : 25 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments.

**Laboratoires S. GABAIL**

5, rue Lefebvre — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## NEO-SETI

**Solution buvable de soufre et d'iode.**

**Propriétés thérapeutiques.** — L'association de Soufre sous forme de Rhodanate de Potassium et d'Iode sous forme d'Iodure de Sodium, permet le traitement *per os* de toutes les manifestations douloureuses de la Diathèse Rhumatismale et de l'Arthritisme.

**Indications.** — Rhumatismes chroniques, Arthrites, Névralgies rebelles, Hypertension artérielle.

**Mode d'emploi.** — Prendre XXX gouttes, 3 fois par jour aux repas, dans un peu d'eau pure ou sucrée.

**Laboratoires BRISSON**

**Dr DEDET ET Cie, Pharmaciens**

**Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.**  
157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

## NÉOSPASMODYL

Anciennement : **NÉOSPASMINE « Vély »**

**Composition.** — Dragées glutinées à base de : Salicyl. Amidopyrine, Phényléthylmalonylurée, Camphre brom., Extrait Crataegus, Extrait de Belladone, Extrait de Valériane.

**Indications.** — Régulateur neuro-végétatif : instabilité nerveuse, angoisse, éréthisme cardiaque, Nervosisme prémenstruel, Angor pectoris, spasmes vasculaires, Menstruations douloureuses. Déséquilibre du vague et du sympathique.

**Posologie.** — 1 à 3 dragées avec chacun des deux principaux repas, pendant 12 à 15 jours, et après un repos de 8 jours, nouvelle cure.

**Laboratoire des Produits Vely**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Tél. : Passy 87-85.

## NÉOSULINE

**Hormonothérapie anticancéreuse par voie buccale.**

**Principe actif.** — Insuline-Fornet (Cf. *Pommade-Fornet*, page 929) plus hormone régulatrice de la croissance, extraite de la moelle d'os longs d'animaux jeunes.

**Indications.** — Affections cancéreuses de toutes natures et de toutes localisations.

**Posologie.** — 3 pilules 3 fois par jour une demi-heure avant les repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Amélioration presque instantanée de l'état général, disparition de l'anorexie, rétablissement des forces, soulagement des douleurs, ralentissement, arrêt du développement, et même décroissance de la tumeur.

Prix : 49 francs.

Vente et échantillonnage :

**Laboratoire de Microbiologie**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Gutenberg 03-45.





# NÉOTHORIUM MILLOT

## Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Energiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes :

### Ovules Néothorium Millot.

*Métrites* : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 9 francs.

### Crayons Néothorium Millot.

*Endométrites* : 2 à 3 par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 12 francs.

### Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : 1 ou 2 dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 8 francs.

### Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

**Nota.** — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

### Laboratoires MILLOT

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 0-69

## NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le bismuth métalloïdique pur.

Médication spirillicide intramusculaire dosée à environ 96 p. 100 de Bi élément en milieu aqueux isotonique. (Ampoules de 2 centimètres cubes.)

Adopté par le Ministère de l'Hygiène, l'Assistance et tous les services publics.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 fr.  
— 12 — : 36 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE. O. ✱. O. I. 🌿,

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris,  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

## NÉOTROPHÈNE

Tablettes au Chlorure de Magnésium d'un goût agréable.

**Composition.** — 0 gr. 20 de Chlorure de Magnésium cristallisé par tablette. Excipient : Q. S.

**Posologie.** — 6 tablettes en moyenne par jour, après les repas de préférence. Action laxative à jeun.

**Indications.** — Dermatoses, Eczéma en particulier, Prurits, Acné, Reconstituant très efficace dans les asthénies nerveuses. Facilite le travail. Convalescence. Cholagogue, régularise les fonctions digestives. Laxatif. Prophylactique du cancer. Nourriture de la cellule.

Prix : La boîte de 44 tablettes, 12 fr. 50.

« Laboratoire de CHIMIE APPLIQUÉE DE  
NANTERRE »

G. LEFRANC, Pharmacien

31, rue du Chemin-de-Fer. — NANTERRE (Seine)

## NEPHRYL

du Dr Lobry (Comprimés)

**ALBUMINURIE, OLIGURIE,  
COLIBACILLURIE**

et toutes affections des voies urinaires.

**Composition.** — Lactate de strontium, Chlorophylle pure, Extrait de rein, Cantharis (à dose homéopathique), Extraits de Lawsonia, de Chymaphyla, d'Aphloïa, d'Uva ursi.

**Mode d'emploi.** — 6 comprimés par jour. Suivre l'avis du médecin.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires du Docteur LOBRY**  
6, rue Parrot — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## NEPTAL

Hydroxy - mercuri - propanolamide de l'acide ortho-carboxy-phénoxy-acétique.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide.

*Indications :*

**Oligurie des affections cardio-rénales, Œdèmes, Anasarque, Ascites, Épanchements pleuraux.**

**Présentation :** Boîte de 3 ampoules de 1 cc. 5 (sol. à 9,2 p. 100).

**Posologie et mode d'emploi.** — Injection intramusculaire du contenu d'une ampoule à renouveler éventuellement après 6 à 10 jours. En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques, les fébricitants et les azotémiques à partir de 1 gr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## NERGINE HEUDEBERT

**Composition.** — La Nergine apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

**Indications.** — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques : neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde, surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

**Mode d'emploi.** — Pour le nourrisson, délayer dans un peu de lait, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillerées à café par jour, dans une infusion tiède ou mélangée aux aliments habituels.

### Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## NERTOSE

**Pansement gastro-intestinal complet.**

**Composition.** — Poudres inertes, sensibilisées par adjonction des Hormones iléo-cœcales.

**Indications.** — Toutes les affections du tube gastrique et de ses annexes. Intoxication intestinale provenant ou non d'une affection hépatique.

Dermatoses, Diarrhées entériques, *Constipation*.

**Dose.** — 2 à 6 comprimés par jour, délayés dans un peu d'eau ou de lait.

« **PROTHERAPIA** ;

**Laboratoire G. CHAMAGNE**

Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie,  
Lauréat de l'Académie de médecine

132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

# NERVOCITHINE (HÉPATISÉE)

du Docteur TISSOT

HEPATOCITHINE

**Ampoules buvables, Dragées, Sirop.**

(Hémoglobine et extrait de foie.)

Méthode de Whipple complétée et activée par sels organiques.

**Composition et formes.** — Sirop, dragées, ampoules buvables par boîtes de 6 ou boîtes de 12.

*Hémoglobine et Extrait de Foie frais* activés par sels organiques.

Puissance effective supérieure à celle de ces produits pris séparément. Tout mauvais goût supprimé.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les fatigues, anémies, faiblesses, diminution de résistance, anorexie, pertes de forces, convalescences, épuisements, etc. (Paludisme, maladie du foie, etc.).

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour ; 1 à 2 dragées à chaque repas ou 1 à 2 cuillerées de sirop (très agréable)

*Enfants* : Au-dessus de 7 ans, moitié dose.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**

34, boulevard de Clichy — PARIS

---

**NESAL**

**Produit granulé à dissoudre dans l'eau sucrée.**

**Composition et formule  
pour une mesure :**

Tartroborobromol .....	0 gr. 816
Phényléthylmalonylurée .....	0 gr. 03
Extr. Hydr. Alc. de Belladone..	0 gr. 01

Sédatif et hypnotique, sûr, actif, inoffensif.

*La plus intéressante synergie sédative hypnotique de la thérapie moderne.*

Aucune intolérance.

**Indications spéciales.** — Epilepsie, Neurasthénie, Chorée, Troubles nerveux de la puberté et du retour d'âge, Insomnie, Anxiété, Convulsions de l'enfance, Angoisse, Neurasthénie sexuelle, Surmenages intellectuels, Gastralgies nerveuses, Migraine, Mal de mer, etc...

**Posologie.** — 1 à 3 mesures par jour.

Dans l'épilepsie, on peut donner jusqu'à 5 mesures par jour, en surveillant la tolérance du malade.

**Laboratoires LOBRU**

26, rue Vauquelin — PARIS (V<sup>e</sup>).

Tél. : Glacière 28-33.

## NESTOGÈNE

**Lait en poudre Nestlé.**

Lait en poudre demi-gras et sucré (sucres variés) obtenu par le procédé du brouillard.

**Composition :**

Matière grasse.....	12	p. 100
Matières protéiques.....	20	—
Lactose .....	30	—
Maltose-dextrine .....	15	—
Saccharose .....	15	—
Cendres.....	4,7	—
Eau.....	3,3	—

*Riche en vitamines, de longue conservation, de haute valeur nutritive et de grande digestibilité.*

**Indications.** — Allaitement normal dès les premiers jours des nourrissons sains, des intolérants au lait, des prématurés et des dystrophiques.

**Posologie.** — (Voir tableau spécial des dosages sur l'étiquette de la boîte.)

**Société NESTLÉ**

6, avenue Portalis — PARIS (VIII°).

## NESTOSYL

**Anesthésie superficielle par contact.**

**Caractéristiques.** — Association d'éthers des séries phtalique et paraaminobenzoïque. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

**Propriétés.** — Puissante anesthésie de surface par simple contact, pourvu que l'intégrité de la peau soit modifiée, soit accidentellement (ablation, érosion ou même distension), soit naturellement (muqueuse).

Suppression rapide et inoffensive de toute douleur, quel qu'elle soit, provient ou est accompagnée de plaie, érosion, excoriation, inflammation, irritation, éruption, œdème ou qui a son siège sur une muqueuse.

Dans les cas aigus, guérison locale.

**Formes de présentation.** — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

*Solution huileuse au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

*Suppositoires au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

*Ovules au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

**Laboratoires du NESTOSYL**

**P. BAUDE, Pharmacien**

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII°).

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl-27 PARIS.

## NEURÈNE

### Solution et Comprimés.

Bornéol soluble, principe actif inodore de la valériane associé au principe actif antispasmodique du serpolet.

### Doses et mode d'emploi.

Le Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1° La *solution*, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

*Adultes* : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2° Les *comprimés* : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucrer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

### Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Le Neurène est admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86.

Précéd. : 8, rue de la Source — PARIS.

## NEURÉOL

**Présentation et composition.** — Association soluble de Véronal, Pyramidon, Valériane, Cratægus, Extrait de Coca.

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

**Avantages.** — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

**Posologie et mode d'emploi.** — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant le dîner ou de se coucher.

Prix : 14 francs.

Laboratoires LAFARGE

6, boulevard Arago — PARIS.



## NEURIDOR

**Forme.** — Solution aromatisée.

**Composition.** — Pyramidon, Chloral, Chloralosane, Valériane, Passiflore, Cratægus Saule blanc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique. Régulateur, tonique et sédatif du système nerveux.

**Indications.** — Névralgies, Migraines, Neurasthénie, Insomnie, Tics nerveux, Agitation, Convulsions, Epilepsie.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Ne peut être administré aux enfants au-dessous de 15 ans.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires SAUBA**  
MONTREUIL (Seine).

## NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche stabilisée, renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée soluble. Renferme 0 gr. 15 de Diéthylmalonylurée pure par comprimé ou cuillerée à café de solution.

**A. Dose et mode d'emploi.** — 1° Sédatif : 1 cuillerée à café, ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée ; 2° Hypnotique : de 1 à 4 cuillerées à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher.

**Enfants :** 1/2 dose. — **Nourrissons :** quelques gouttes.

**B. Indications.** — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladie de Basedow, Tics, Alcoolisme aigu et autres délires toxiques, Erethisme cardiaque, Palpitations, Tachycardie, Excitation générale, Dermatose d'origine nerveuse, Prurit, Surmenage.

**Contre-indication :** Néant.

Prix : Solution : 16 fr. — Comprimés : 10 fr.

**Laboratoire A. GENEVRIER**  
45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS

## NEUROBORE

**PUR.** — *Solution.*

**Composition.** — Solution inaltérable de tartrate borico-potassique pur. — 1 gr. par cuill. à café.

**Prop. thérap.** — Spécifique des affections nerveuses. Calmant antispasmodique.

**Indications thérapeutiques.** — Agitation, Insomnies, Convulsions, Troubles névropathiques, Epilepsie, etc.

**G. ASSOCIÉ.** — *Cachets.*

**Composition.** — Tartrate borico-potassique, 1 gr. Phényléthyl-malonylurée, 0,05 ; correctif, par cachets.

*Médication d'Attaque.*

Après effet obtenu, substituer le *Neurobore pur*.

**Laboratoire E. BOUTEILLE**

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## NEUROCALCIUM

**Présentation.** — Sirop aromatisé agréable au goût.

**Composition.** — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du Bromure de Calcium les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du Chlorure de Calcium.

**Indications.** — Toutes les excitations nerveuses, spasmophilie, troubles de la dentition, convulsions, insomnies.

**Formule** { Chlorure de Calcium. 0,20 } par cuille-  
{ Bromure de Calcium. 0,05 } rée à café.

**Posologie.** — Nourrissons : 2 cuillerées à café par jour et jusqu'à 6 cuillerées à café en cas d'accidents aigus.

Après 1 an : 2 à 5 cuillerées à dessert par jour.

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France**  
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

## NEUROFLORINE

**Sédatif Nervin.**

**Antispasmodique, Cardiotonique.**

**Présentation.** — Solution et Comprimés.

**Composition.** — Synergie phytothérapique non toxique de : Passiflore, Valériane stabilisée, Saule, Cypripedium, Crataegus.

**Avantages.** — Sédatif puissant inoffensif et sans accoutumance ; véritable régulateur du système nerveux. *Il redonne la stabilité.*

Inodore.

Tolérance parfaite des voies digestives, du foie et des reins.

Sans dépression secondaire. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Nervosisme, Etats spasmodiques et anxieux, Insomnies.

**Posologie.** — *Dose sédatrice* : 1 à 2 cuillerées à café ou 2 à 4 comprimés à chaque repas dans un peu d'eau.

*Dose hypnotique* : 2 à 3 cuillerées à café ou 4 à 6 comprimés en une seule fois dans une infusion chaude, une heure avant le coucher.

**Laboratoires CROSNIER**

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

## NEUROPLASMA

**Composition.** — Ampoules de 1 cc.

Cacodylate de soude . . . . .	} aa 0.0025
— de magnésie . . . . .	
Glycérophos. de soude . . . . .	} 0.01
Caféine . . . . .	
Cacodylate de strychnine . . . . .	
	0.0005

**Indications.** — Neurasthénie. Dépression physique. Convalescences. Asthénie. Faiblesse circulatoire.

**Avantages.** — Piqure indolore. Synergie pharmacologique.

**Doses.** — Une ampoule tous les deux jours.

**Emploi.** — Injection sous-cutanée ou, de préférence, intramusculaire.

Prix : 15 fr.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault, COURBEVOIE (Seine).

## NEUROPLASMA MASSIF

**Composition.** — Ampoules de 5 cc. contenant cacodylate de soude, 0,25 ; cacodylate de magnésie, 0,05 ; glycérophosphate de soude, 0,10 ; caféine, 0,01 ; cacodylate de strychnine, 1/2 milligr.

**Indications.** — Etats cachectiques, convalescences, tuberculose et pré-tuberculose, anémie, etc.

**Avantages.** — Piqûre indolore. Tonique immédiat, relèvement rapide du malade.

**Doses.** — Une ampoule tous les 2 jours ; après un repos de huit jours une nouvelle série de 12 ampoules.

**Emploi.** — Injection intramusculaire.

Prix : 20 fr.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault  
COURBEVOIE (Seine).

---

## NEUROSINE PRUNIER

(*Phospho-Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier*).

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant du Système nerveux.

**Mode de présentation.** — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

**Indications.** — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, Pré-tuberculose, etc.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuillerée à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Dépositaires généraux :

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

## NEUROTROL

(Sérum neurotrophique).

Médication strychno-cacodylique.

**Composition.** — Cacodylate soude : 0,05 ; glycérophosphate soude : 0,10 ; cacodylate strychnine : 0,001 ; sérum isotonique : Q. S. p. 1 cc.

**Indications.** — Asthénie, Neurasthénie, Dépression nerveuse, Diabète, Prétuberculose, Paludisme, Convalescence.

**Doses.** — *Deux formes.*

- 1° En ampoules de 1 cc. ; 1 à 3 injections sous-cutanées par jour et progressivement. Les injections sont *absolument indolores*. — 18 francs la boîte de 12 ampoules.
- 2° En gouttes : de XX à LX gouttes par jour et progressivement. — 15 francs le flacon.

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

3, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE  
(Haute-Garonne). — Tél. : 1306.

## NEUROTROPHOL BYLA

*Elixir, Granulé, Dragées.*

**A base de nucléorquine Byla, d'acide nucléinique, de glycérophosphate de soude et de méthylarsinate disodique.**

**Doses et mode d'emploi.** — *Elixir* : 1 verre à liqueur *après* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants.

*Granulé* : 1 cuillerée à bouche *avant* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants.

*Dragées* : Adultes : 4 à 8. Enfants : 2 à 4 par jour

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique neuromusculaire. Excitant de la nutrition.

**Indications.** — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Epuisement, Psychoses génitales, Chlorose.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## NEUROVAROL

Traitement de l'Insuffisance ovarienne et de ses troubles secondaires (excitabilité nerveuse, états congestifs, etc.).

Chaque cachet contient :

1 comprimé de...	{	Thyroïde.....	0 gr. 0025
		Ovaire. ....	0 gr. 10
		Ext. valériane stabilisée Dausse ..	0 gr. 10
Poudres végétales à propriétés vaso-constrictives..	{	Hydrastis. ....	0 gr. 10
		Gossypium. ....	0 gr. 10
		Viburnum.....	0 gr. 10
		Hamamélis. ....	0 gr. 30

**Posologie.** — 1° Troubles par hypo-fonction ovarienne, 1 à 2 cachets par jour.

2° Ménopause physiologique ou opératoire, 1 à 2 cachets par jour pendant 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 233-1.

**Laboratoires DOUETTEAU frères**

20, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (8°).

---

## NEUTRALCAOL

### Composition.

15 0/0 de carbonate de bismuth chimiquement pur.

10 0/0 de Magnésie hydratée chimiquement pure.

10 0/0 de Talc flotté électrolytique.

65 0/0 de Kaolin colloïdal.

**Avantages.** — *Le plus efficace des pansements gastriques bismuthés.*

*Le plus facile à prescrire parce que meilleur marché qu'une prescription.*

**Indications.** — Traitement type du syndrome hyperchlorhydrique (régurgitations acides, brûlures, douleurs, vomissements, sialorrhée, flatulences, etc.).

Aérophagie, Ulcus de l'estomac, du pylore et du duodénum.

**Prix :** la boîte : 15 fr., contient 100 gr. de poudre, soit 12 à 15 jours de traitement.

**Laboratoires BENDERITTER et C<sup>ie</sup>**  
**VENDOME (Loir-et-Cher).**

## NEVORAL RAFEY

Le NÉVORAL est parfaitement toléré par les estomacs délicats ; c'est en même temps un fortifiant, un tonique et un fébrifuge. Il ne contient aucun composé ou dérivé de l'opium, ni aucun hypnotique. Les actions des divers produits pharmaceutiques qui le composent se multipliant l'une par l'autre lui donnent un pouvoir thérapeutique considérable, quelles que soient l'origine et la cause de la douleur.

**Indications thérapeutiques.** — Névralgies, Rhumatismes, Migraines, Maux de tête et de dents, Courbatures, Fièvre grippale, Sciatique, Lumbago, Zona.

Le **NEVORAL** supprime la douleur, tandis que d'autres médicaments ne font que l'endormir.

**Dose et mode d'emploi.** — Adultes, 1, 2 ou 3 cachets par jour. Si 1 cachet n'a pas suffi, en prendre un second 1 heure après le premier. Enfants, le 1/4, le 1/3 ou la moitié du contenu d'un cachet à prendre dans un liquide sucré, de la confiture ou du miel.

La boîte de 12 cachets : 9 francs.

Dépôt général :

**Laboratoires RAFEY**

**Raoul FEIGNOUX**, pharm. de 1<sup>re</sup> classe  
95, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).



## NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets).

**Analgésiques — Antithermiques — Fébrifuges.**

**Indications.** — Grippe. Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques. Rhumatismes. Migraines.

**Doses et mode d'emploi.** — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : 9 fr. la boîte de 12 cachets.

4 fr. 70 la boîte de 6 cachets.

0 fr. 80 le cachet.

**Laboratoire CORNAUD et BROSSARD**  
1, rue des Cordouans — LA ROCHELLE.  
Echantillons sur demande des Docteurs.

---

## NEVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

**Composition.** — Teinture de Cratægus, Passiflore, Alcoolature de ballote.

**Action.** — L'action bien connue du Cratægus et de la Passiflore est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principalement sur l'irritabilité neuro-végétative).

**Indications.** — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, etc.

**Doses.** — Action sédative : LX gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : XX gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

**Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

**Forme.** — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux, alcool, arsenic, ni strychnine; 20 gouttes = 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

**Dose.** — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson, sans interruption nécessaire jusqu'à effet obtenu.

**Propriétés.** — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage. Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS.

---

## NIGÉRINE VINCENT

*Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.*

Fixateur par excellence des toxines  
et alcaloïdes.

**Forme.** — Poudre noire sans odeur ni saveur.

**Indications.** — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

**Doses.** — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

**VINCENT, pharmacien,**

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

## NISAMELINE de TROUETTE-PERRET

**Préparation** à base d'extrait de Guaco ; doit être employée « INTUS et EXTRA » — action physiologique, à l'intérieur sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale ; à l'extérieur sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

**Indications.** — Prurits, Dermatoses, Névralgies.

### *Traitement interne :*

**Pilules** Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 10 extrait de Guaco). 2 à 5 pilules à chacun des deux repas. Prix : 16 fr.

**Sirop** Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 20 extrait de Guaco). 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas. Prix au public : 20 fr.

### *Traitement externe :*

**Poudre** Nisaméline TROUETTE-PERRET. 1/2 flacons ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc. Prix : 16 fr.

**Pommade** Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 10 fr.

En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

**Savon** Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 5 fr.

Pour lavages et soins hygiéniques,

Bien spécifier : **NISAMÉLINE**  
« **TROUETTE-PERRET** » pour avoir le véritable Guaco.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels — PARIS  
(XI<sup>e</sup>).

## NITIUM

Bromure de radium suractivé enrichi  
en rayonnement alpha.

**Crayon.** — Traitement des métrites chroniques et hémorragiques. Curetage médical.

**Ovules.** — Vaginites, Ulcérations du col.

**Pommades.**

**Pommade A :** Dermatoses, Bartholinites, Chancre mou, Lupus érythémateux, ulcérations diverses, ulcères variqueux, herpès génital, ulcères de la cornée.

**Pommade B :** Ulcérations étendues et infectées, ulcères variqueux rebelles.

**Pommade O :** (Pommade porphyrisée pour l'usage des ophtalmologistes).

**Bougie :** Uretrites chroniques.

Chaque crayon, ovule, bougie ou tube de pommade contient 6 microgrammes de bromure de radium suractivé.

Prix de vente au public :

Crayon, ovule et bougie : 33 fr. Pommade : 25 fr.

étui de 3 crayons, 3 ovules, 3 bougies : 75 fr.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

**R. MOREUX, Pharmacien**

Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>)

## NITROYL LEISYN INJECTABLE

Symbiose de Sels de Terres Rares activés électriquement  
(procédé « EVOO »).

Médicament à effets immédiats, même dans les cas anciens.

**Composition.** — Yttrium, Samarium, activés.

**Présentation.** — Boîte de 15 ampoules de 1 cc. environ pour injections hypodermiques et intramusculaires, en nombre proportionné au volume des articulations (hanche, creux cotyloïde : 4 à 6. Epaule, genou, malléoles : 4 ou 5. Coude, poignet : 3. Phalanges : 1 ou 2, par 24 heures). Chaque injection de 1 ampoule entière. On injectera donc, par exemple, 4 à 6 ampoules divisées en 4 à 6 points différents, à la même séance, dans une arthrite de la rotule. f

**Indications.** — Rhumatismes aigus et chroniques, articulaires et musculaires, Ankyloses, Arthrites, Sciatiques, Lumbagos, etc..., etc... Amène la disparition extrêmement rapide de la douleur et des phénomènes morbides, ainsi que la réapparition de la liberté des mouvements. Innocuité absolue. Aucune contre-indication. Non toxique.

Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine

**Les Laboratoires LEISYN**

bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Adr. télégr. : Laboleisyn Paris.

Tél. : Auteuil 14-73.

## NOCTISEDYL

**Spécifique de l'insomnie relevant de la douleur ou d'un état nerveux.**

**Composition.** — Pyramidon, Valériane, Anémone, Diéthylmalonylurée (0 gr. 25) Théobromine.

(Procédé spécial de conservation)

**Avantages.** — Combinaison atoxique très active. La théobromine assure l'élimination naturelle de l'hypnogène et respecte le rein.

**Posologie.** — 1 à 2 cachets au coucher, avec une infusion.

**P. AUGIER, pharmacien.**

2, rue des Lombards — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénédine caféinée.

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

**Mode d'emploi.** — Comprimés : 2 à 3 par jour. Granulés : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques. Grippe, etc.

Le tube : 4 francs.

**Laboratoires VICARIO**

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## **NORMACOL**

**Mucilage Évacuant  
puissant, facile à ingérer, actif.**

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermenescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

**Action.** — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

**Forme.** — Granulé dragéifié très menu.

**Dose (moyenne).** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

### **Différentes préparations :**

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol sans sucre : avec bourdaine (diabétiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

### **Laboratoires NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). Tél. Laborde 08-00

---

## **NORMALARINE**

### **Traitement Phytothérapique de la constipation.**

#### **Composition :**

Sons torréfiés et déshydratés traités selon la technique du professeur H. Salomon, de Buenos-Ayres.

#### **Action :**

Augmente le bol fécal, et favorise le péristaltisme intestinal.

#### **Indications :**

Constipation — Atonie du tube digestif — Ictères catarrhaux.

#### **Avantages :**

**Sans aucun laxatif.**

**Sans accoutumance.**

**Ne fait pas engraisser.**

**N'irrite pas l'intestin.**

#### **Deux formes :**

*Paillettes* : dose journalière : 2 à 4 cuillérées à soupe par jour, aux repas.

*Longuets* : dose journalière, 2 à 6 languets par jour.

**Laboratoires DEPRUNEAUX**

18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## NORMATENSOL BOURET

### Composition

Tartrate borico-potassique .....	1 gramme.
Lactose.....	3 grammes.
Mélange sucro-édulcorant .....	Q. S.
pour un paquet.	

**Effets physiologiques.** — Par le *Bore* agit sur la thyroïde (Loeper) et libère la sécrétion interne de cette glande hypotensive (De Cyon), est diurétique et débarrasse l'organisme des produits de déchet. Par le *Potasium* il a des effets modérateurs sur le myocarde et les fibres lisses des vaisseaux (Claude Bernard).

**Indications.** — Hypertension artérielle, Néphrites chroniques, Céphalées persistantes, Dermatoses dues à une insuffisance de l'épuration urinaire.

**Avantages.** — Pas de toxicité, pas de contre-indication, parfaitement toléré par le tube digestif.

**Mode d'emploi.** — 1 paquet le matin à jeun et 1 le soir en se couchant, dans 1/2 verre d'eau froide ou tiède, 12 jours par mois ou 2 périodes de 6 jours.

Prix au public : 12 fr.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## NOVACÉTINE PRUNIER

(Saccharure granulé à base de Sulfosalicylate de Pipérazine, Lithine et Soude).

**Antiarthritique énergique  
agréable à prendre.**

Indiqué contre les manifestations rhumatismales et goutteuses de l'arthritisme.

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à café par jour (suivant les cas et l'avis du médecin), à prendre au moment des repas, dissoutes dans un peu d'eau.

Chaque cuillerée à café contient 0 gr. 30 de sulfosalicylate composé.

Dépositaires généraux :

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

(Ancienne maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).



## NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin  
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore.

**Composition.** — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaïne : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm. cube.

**Propriétés.** — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

**Indications.** — Accidents syphilitiques.

**Mode d'emploi.** — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Prix : 15 francs.

Laboratoires **ANDRÉ GUILLAUMIN**  
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## NOVARSENOBENZOL BILLON

Dioxy-diamino-arsénobenzène méthylène-sulfoxyate de sodium.

Teneur en arsenic : 20 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions *neutres* injectables exclusivement par voie veineuse.

*Indications :*

**Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Plan, Protozooses, Charbon, Sodoku.**

**Posologie et mode d'emploi.** — Séries d'injections intraveineuses graduées : 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Le **Novarsénobenzol Billon** est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## NOVATROPINE

### Bromométhylate d'Homatropine.

Action thérapeutique égale à celle de l'Atropine. Toxicité 50 fois moindre.

**Indications.** — Dyspepsie hyperacide, Douleurs intestinales, Sueurs des tuberculeux, Entérite muco-membraneuse, Ulcère stomacal et duodéal, Angine de poitrine.

**Formes.** — Comprimés de 0 gr. 0025.  
Ampoules de 0 gr. 0025.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

1 à 2 ampoules par jour, en injection sous-cutanée, intra-musculaire; ou intraveineuse.

**P. BASUYAUX, Pharmacien**

94, rue Pasteur — FONTENAY-SOUS-BOIS  
(Seine).

---

## NOVIODE

Comprimés dégageant *en solution aqueuse* 0 gr. 025 d'Iode naissant, entièrement dissous.

**Indications thérapeutiques.** — Tous usages de l'iode, Antisepsie générale, Accélération des cicatrisations, traitement curatif des plaies infectées, Préparation des champs opératoires, Chirurgie stomatologique, Injections vaginales, Révulsions, Gargarismes. etc. Stérilisation des eaux et tous usages internes de l'iode.

**Posologie et Mode d'emploi.** — Voir notice.  
La boîte de 2 tubes de chacun 20 comprimés, soit 40 comprimés / 12 francs.

**Laboratoire SALVOXYL**

237, rue Lafayette — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 78-07.

## NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes, avec addition de lupulin et de phosphates;  
(Bromure non spécifié.)

*Préparation et marque absolument françaises.*

Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

**Indications.** — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

**Mode d'emploi et dose.** — Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante sur les tablettes de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle.

Na Br chim. pur 1 gr. par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour. — Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour. — *Enfants nerveux* : 1 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppement spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain paraffiné — dépôt de garantie.)

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès. — BOULOGNE-SUR-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86.

(Précéd. : 8, rue de la Source — PARIS).

## NOVOLACTOL DAGUIN

**Forme.** — Granulé agréable pour les enfants.

**Composition.** — Papaine extractive, Benzonaphtol, Ferments lactiques, Magnésie hydratée.

**Dose.** — *Nourrissons* : 3 demi-cuillerées à café délayées dans un peu d'eau dans l'intervalle des tétées.

*Enfants de 2 à 3 ans* : 3 cuillerées à café dans l'intervalle des repas.

*Enfants de 5 à 12 ans* : 3 cuillerées à dessert.

**Indications.** — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons. Intoxication alimentaire.

Etablissements DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

## NOVOLUG

Elixir.

### Composition :

Arrhénal .....	0,01
Hydrarogyrophénoldisulfonate de soude (hermophényl) ....	0,20
Sirop aromatisé à la groseille framboisée .....	Q. S. pour 100 gr.

**Indications.** — Syphilis et hérédosyphilis.

### Dose :

Adultes :	2 cuillerées à soupe par jour.
3 à 6 ans :	2 cuillerées à café par jour.
6 à 14 ans :	2 cuillerées à café par jour.
14 à 20 ans :	2 cuillerées à café par jour.

**Observation importante.** — Produit au goût très agréable. Etiquette discrète présentant le produit comme tonique, dépuratif et reconstituant.

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

## NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée avec le méthylarsinate de soude méthylarsiné.

Granulé. Comprimés. Ampoules injectables.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 4 à 6 cuillers mesure, 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

**Indications.** — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

**Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## NUCLÉASINE

**Composition.** — Iode, Phosphore, Arsenic organique directement assimilables. Extrait hépatique, Vitamine.

**Propriétés.** — Excitant du métabolisme général. Reconstituant puissant.

**Indications.** — Croissance, Amaigrissement, Anémie, Dépression nerveuse, Surmenage, Fatigabilité.

**Doses.** — Une cuillerée à café à la fin des repas.

Le flacon de granulé : 16 francs.

**Laboratoire E. VERGELOT**

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

---

## NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates et d'acide nucléinique.

**Granulé :** glycérophosphate de chaux et de soude et acide nucléinique.

**Injectable :** glycérophosphate de soude pur et acide nucléinique.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes :* 4 à 6 cuillerées-mesures de granulé aux repas ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

**Indications.** — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la déferescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

**Laboratoires M<sup>co</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## NUCLÉIGÈNE

Puissant reconstituant général.

Deux formes :

1<sup>o</sup> **Granulé irradié.** — Ergostérine irradiée, Nucléinates Soude et Manganèse, Glycéro de chaux, Arrhénal, Ext. de Kola et vanille ; 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr.

Prescrire : Nucléigène irradié granulé.

2<sup>o</sup> **Elixir.** — Acide nucléinique, Arrhénal, Glycéros, Muscat, Vanilline.

Prix : 16 fr.

**Indications.** — Prétuberculose, Tuberculose, Rachitisme, Anémies.

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## NUCLÉOCARDYL

Médication spécifique de l'angine de poitrine.  
Toni-cardiaque et Hypotensive.

**Composition.** — Nucléosides vaso-motrices, Chlorophylle spéciale, Extraits de cœur et d'aorte, Chlorure de calcium.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action vaso-dilatatrice, toni-cardiaque, hypotensive, diurétique et eupnéique.

**Mode de présentation.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications.** — Artério-sclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Asystolie compensée, Œdèmes circulatoires, etc., Maladies infectieuses, Pneumonies, Rhumatismes.

**Posologie :**

**Traitement d'attaque :** 4 à 6 comprimés par jour.

**Traitement d'entretien :** 2 à 4 comprimés par jour.

Prix : 18 francs.

**Laboratoire DEFFARGE**

Docteur en Pharmacie

2, rue Lauzac — BORDEAUX

## NUCLÉOPHORÉNE

Reconstituant, Accélérateur de la Nutrition.

**Composition.** — Nucléinate de soude, Phosphate disodique, Méthylarsinate Na, Maté, Kola, Essence spéciale.

**Indications.** — Neurasthénie, Lymphatisme, Bronchites chroniques, Convalescence de Grippe et de Maladies infectieuses.

**Formes.** — Elixir.

**Doses :**

*Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire Moderne  
d'Opothérapie et Biologie Médicale**  
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

## NUCLERGOL

Granulé à base de Manganèse, Phytines, Lipides spléniques, Carotènes (Vitamines A), Oxalate de fer.

Reconstituant général des forces physiques et du système nerveux. Chlorose, Asthénie, Convalescence, Dénutrition, Troubles de la croissance.

**Posologie :**

*Adultes* : 1 cuillerée à dessert au début de chaque repas.

*Enfants* : à partir de huit ans, une cuillerée à café.

Dépôt général :

**Laboratoires UNIS-SPÈS**  
14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

## NUJOL

### Huile de paraffine.

**Description.** — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

**Indications.** — Le NUJOL est spécialement indiqué pour le traitement de la constipation. Il est particulièrement recommandé pendant la grossesse et la période d'allaitement. Le NUJOL peut être administré en toute confiance à tous les âges et dans toutes conditions de santé.

**Doses.** — Pour les adultes : Une cuillerée à bouche soir et matin, à jeun.

Pour les enfants : Une demi-cuillerée à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Dépôt Général :

**Société Générale**

**d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

---

## NUTRO

### Lait en poudre Nutricia.

**Composition.** — Lait en poudre Nutricia, partiellement écrémé, entièrement soluble, préparé spécialement pour l'alimentation infantile, garanti rigoureusement pur.

**Avantages.** — Contient toutes ses vitamines, digestion facile, préparation instantanée.

**Indications.** — Gastro-entérites des nourrissons.

**Mode d'emploi.** — Variable suivant l'âge de l'enfant. Consulter la notice.

**Léon CLAEYS**

1, Boulevard St-Martin — PARIS (III<sup>e</sup>).

Téléphone : Turbigo 92-60.



## OCRÉINE GRÉMY

Traitement des insuffisances ovariennes  
de la puberté à la ménopause.

**Formule** : Chaque pilule correspond à  
0<sup>gr.</sup>, 20 de corps jaune frais.

Existe sous 3 formes pharmaceutiques.

*Pilules* : 4 à 6 par jour.

*Gouttes* : 30 à 50 par jour dans un peu  
d'eau.

*Ampoules* : 1 injection intramusculaire  
tous les 2 jours pendant la période du  
traitement.

### Indications :

Permet de réaliser, en association avec  
la **Follestrine Grémy** (Voir à ce nom)  
le cycle ovarien normal chez les ménopausiques.

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, bouffées de chaleur, migraine, obésité, rhumatisme de la ménopause, acrocyanose et toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne.

14, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ŒNOPHOS

*Acides hydro-éthylène-phosphoriques.  
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET  
de Dijon.

**Formes.** — Elixir, granulé, gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Neurotonique, reconstituant énergétique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (voir fiche DOLOMA). Médication phosphorique rationnelle.

**Indications.** — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose.*

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'Elixir ou 2 cuill. à café de Granulé ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante, voir « DOLOMA ».

Prix:	La boîte granulé Œnophos.	15 fr.
	Le flacon gouttes	12 fr.
	— élixir	18 fr.

Laboratoire général d'Etudes Biologiques  
S. A., 29, place Bossuet — DIJON.  
Téléphone : 16-42.

## OÈRÉLIODE

**Iode de l'Otorhinolaryngologiste.**

La plus active et la mieux tolérée des préparations iodées.

Solution huileuse d'Iode d'absolue pureté, *non combiné*, entièrement diffusible à froid.

Huile violette, neutre, indolore, non irritante.

**Indications.** — Rhinites, Affections catarrhales et inflammatoires du nez, Infections et congestions des muqueuses naso-pharyngées, du larynx, des amygdales, otites, otites mycosiques.

Echantillons gratuits sur demande.

**Laboratoire BOUVOT**  
AUVERS-SUR-OISE (S.-et-O.).

## ŒSTROBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré  
achloruré et bromuré  
associé à une solution de Folliculine  
titrée physiologiquement.

*Tablettes.* — 1 tablette contient :

NaBr ..... 1 gramme.  
Folliculine ..... 50 unités murines.

**Modes d'emploi et doses.** — 1 à 2 tablettes  
2 fois par jour : matin et soir.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait dissoudre  
1 ou 2 tablettes d'ŒSTROBROL « ROCHE » :  
on prépare ainsi un bouillon savoureux qu'il  
convient d'absorber le plus chaud possible.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les troubles  
nerveux accompagnant une dysfonction ova-  
rienne : Aménorrhée, Dysménorrhée et surtout  
Ménopause.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie**  
10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## OLBIA

**Spécifique de la Syphilis.**

Solution huileuse de Bismuth.  
(Dicamphocarbonate de Bismuth.)

**Indications.** — Syphilis et parasymphilis.

**Formes :**

- 1) Ampoules de 2 cc. pour injections intra-muscu-  
laires indolores.
- 2) Ampoules de 1 cc., pour injections intra-muscu-  
laires indolores.

**Posologie :**

*Adultes :* Injecter dans la région fessière une am-  
poule de 2 cc. tous les 4 jours.

*Enfants :* Injecter dans la région fessière 1 ampoule  
de 1 cc. tous les 4 jours.

**Etablissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert,  
VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis  
(Seine).

## OLCALAN

### Composition :

Borate de soude, Huile d'Olive stérilisée,  
Eau de chaux, Lanoline.

Trois présentations : OLCALAN SIMPLE,  
OLCALAN SALICYLIQUE, OLCALAN  
RESORCINE.

Tubes de pommade.

A employer dans toutes les irritations de l'é-  
piderme : Eczémas, Brûlures, Rougeurs  
des Nouveau-Nés, Prurit, etc...

Le tube : 6 fr.

**Laboratoires SERRE**

7, place Pey Berland

BORDEAUX (Gironde).

## OLÉOCIDASE

### ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

*Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur*, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint l'Acide Oléique Paul Thibault réalise, avec effet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

**Indications.** — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholécystites lithia-  
siques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques,  
Evacuation des calculs de Cholestérine par désagrégation.

**Posologie.** — 3 capsules le matin à jeun, 3 capsules dans le milieu de  
la journée et, si besoin, 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale  
bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon,  
Vals, etc.).

**Nota.** — Pour éviter l'emploi d'acides oléiques impurs, prescrire tou-  
jours : capsules d'Oléocidase Paul Thibault.

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire National n° 218-9.

## OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

### Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre.....	0,20
Hexaméthylènetétramine.....	0,25

**Indications.** — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

**Présentation.** — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Prix : 12 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques  
CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
Téléphone : Carnot 78-11.

## OLÉO-MEL

### « LE LAXATIF DE RÉGIME »

Gelée de miel à l'huile de paraffine.

**Formule.** — Huile de paraffine extra neutre à viscosité maxima et spéc. raffinée pour l'usage interne. } P. E.

— Miel surfin premier choix.

**Indications.** — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, pour le traitement de la **Constipation et des Affections gastro-intestinales**, de toutes les indications et de la posologie même de l'huile de paraffine. **Action mécanique. Innocuité absolue.**

**Préparation.** — L'Oléo-Mel, préparé par un procédé spécial, se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable; il conserve tout l'arome et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

**Laxatif idéal des enfants et des personnes délicates.**

Prix : 10 francs.

**Laboratoire DELFOUR**  
à POUILLON (Landes)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 246-1.

## OLÉOVULES

**Seuls ovules à l'acide picrique  
à la Rubacrine et au Sulfostérol.**

**Action thérapeutique des composants . :**

**L'Acide picrique**, kératoplastique et microbicide bien connu, peut être employé sans aucun ennui grâce à l'excipient spécial des Oléovules ;

**La Rubacrine** (rouge d'acridine) renforce puissamment ce pouvoir antiseptique ;

**Le Sulfostérol** est un cicatrisant et un décongestionnant de grande valeur.

**Indications.** — Infections de toutes natures des voies génitales inférieures (Blennorragie après la phase aiguë, Infections streptococciques post-puerpérales, etc.). Principalement : Métrites, Cervicites, ulcérations et érosions du col, Vaginites.

**Posologie.** — 2 ou 3 ovules par semaine.

**Mode d'emploi.** — Mettre l'ovule le soir au coucher, si possible après une injection vaginale chaude ; le fixer avec un tampon de coton.

La solution de borate de soude enlève facilement la coloration jaune de l'acide picrique au cas où la garniture aurait été insuffisante.

Pour les pays chauds, prescrire les *Oléovules G*, moins sensibles à l'action des températures élevées

Les Oléovules sont couramment employés dans les services de gynécologie des hôpitaux.

**Littérature.** — Thèse de G. Donet ; Communication à la Société de gynécologie du 20 février 1933 ; Travaux de MM. Chéron, Vigneron, Thiéry, Fuchs, Fayot, etc.

Prix : 15 francs la boîte de 6 Oléovules.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## OLIRICYL HARDY

**Ex-Oliricin.**

Associe à l'huile de ricin et à l'huile d'olive saponifiées les propriétés cholagogues et laxatives de la bile dépigmentée et du soufre.

Huile de ricin.....	0 gr. 05
Huile d'olive.....	0 gr. 10
solidifiées par saponification sodique.	
Bile dépigmentée.....	0 gr. 04
Soufre pur.....	0 gr. 03
Extrait Rhamn. Frang.....	0 gr. 03
Belladone pulv.....	0 gr. 01

par comprimé dragéifié glutinisé, ne se décomposant pas dans l'estomac.

Laxatif cholagogue parfait : doux, régulier, sans accoutumance : ne contient aucun drastique dissimulé (scammonée, jalap) et *surtout pas* de phtaléine du phénol ni d'huile de croton.

**Posologie.** — 1 à 5 comprimés par jour avant ou après le repas, ou le soir avant de se coucher.

Prix : Le tube de 40 dragées : 12 francs.

Pour 15 à 20 jours de traitement normal.

**Laboratoires PAUL HARDY**

**Docteur en Pharmacie,**

Ancien interne des hôpitaux

42, bd Saint-Marcel — PARIS (V<sup>e</sup>). Tél.: Gobelins 36-96.

## OLISOL

Traitement des affections du nez et des voies respiratoires.

**Composition.** — Essences antiseptiques végétales, Résorcine (1 p. 100), Huile d'olives.

**Formes.** — Liquide et capsules.

**Indications thérapeutiques.** — Rhinites, Sinusites, Coryza, Laryngites, Trachéites.

**Mode d'emploi.** — Instillations et pulvérisations avec l'Olisol liquide. Auto-injections nasales avec les capsules.

Prix : *flacon* petit modèle, 5 francs ; grand modèle, 9 francs.

*Capsules* : 9 francs.

## OLISOL EPHÉDRINÉ

**Composition.** — Ephédrine (1 p. 100), Essences antiseptiques végétales, Huile d'olives.

**Mêmes formes, Indications et mode d'emploi** que pour l'OLISOL.

Prix : *Flacon* petit modèle : 6 francs ; grand modèle, 12 francs.

*Capsules* : 12 francs.

**Laboratoires SAUBA**

**MONTREUIL — PARIS**

## OLIVÉOL

**Olivéol** pilules, 6 par jour.

**Olivéol** globules, 1 à 2 par jour.

**Olivéol** gouttes (pour enfants) X à XL,  
gouttes suivant l'âge.

### SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE

augmente la sécrétion biliaire,  
se retrouve dans la bile hypersecrétée,  
dissout le calcul de cholestérine.

### Laboratoire de l'OLIVÉOL

**Ed. BRUN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

Ancien interne des Hôpitaux de Lyon

TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône).

## ONCTION ANGELINI

**Guérison de la Gale.**

Sans bains.

Sans frotte — En une seule application. — Adoptée  
par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.

L'Onction Angelini est en usage permanent dans  
les hôpitaux maritimes de Brest, Cherbourg,  
Lorient, Rochefort, Sainte-Anne à Toulon.

### Formule :

Soufre .....	33 gr. »
Huile de Cade .....	2 gr. 50
Essence d'Eucalyptus.....	0 gr. 50
Camphre.....	0 gr. 50

Pour 100 grammes.

Prix au public : 10 francs.

**ANGELINI, pharmacien**

61, rue de Seine — PARIS.

Tél. : Danton 92-73.



## ONCTION LEISYN

**Adoucissante, Cicatrisante, Décongestionnante, Antiprurigineuse, Antiseptique, Respectant l'intégrité des tissus cicatriciels les plus délicats, Médicament nouveau à l'Yttrium, Samarium, Lanthane, Titane, Caesium, Extraits et Sécrétions bulbo-glandulaires, préparé par procédé EV00, Non caustique. Non toxique.**

**Indications.** — Toutes les dermatoses, même chroniques. Tous les prurits. Eczémas chroniques et aigus du nourrisson. Ecthymas. Syco-sis, Impetigo. Psoriasis. Hémorroïdes externes et internes. Prurit anal et vulvaire, Ulcères variqueux de toutes natures, Fluxions rhumatismales, Goutte, Crevasses du sein, Brûlures, Engelures, Phlébites, Plaies atones ou suppurantes, Blessures. Radiodermites, Lupus, Ophtalmologie, Gynécologie.

Ne donne aucun résultat vis-à-vis de l'urticaire, des dartres, de l'acné et du lichen.

**Action.** — Efficacité et rapidité d'action inconnues jusqu'ici. Calme instantanément les prurits les plus violents et les plus rebelles. Pénètre profondément dans les tissus et les imprègne de ses principes actifs. Permet d'obtenir des guérisons souvent presque immédiates. Médicament constant, fidèle, réellement efficace et de toute sécurité. Communication à l'Académie de Médecine.

**Mode d'emploi.** — Étendre sans frotter 2 fois par jour en couche épaisse et recouvrir d'un taffetas chiffon.

Prix en France : 15 francs. Corps médical : 10 fr. 50.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Adresse télégraphique : Laboleisyn Paris.

Tél. Auteuil : 14-73.

## ONGUENT FREVAL

**Composition.** — 45 p. 100 de mercure ; 2 p. 100 d'extract frais de Belladone et 10 p. 100 d'extract frais de ciguë.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiphlogistique, Résolutif, Antiseptique, Calme immédiatement la douleur et localise l'infection.

**Indications.** — Tout traitement mercuriel par frictions (très recommandé pour les enfants ou comme traitement discret chez les adultes).

**Tout état inflammatoire :** Piqûre infectée, Furoncle, Phlegmon, Panaris, Anthrax, Hémorroïdes, Phlébite, Orchite, Arthrite aiguë, Adénite.

**Tumeurs blanches et autres tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires.**

**Mode d'emploi.** — Étendre l'onguent, le recouvrir d'un linge propre ou d'une gaze et faire tenir.

**Dose journalière.** — Chez l'adulte : gros comme une noisette en une ou deux fois.

**Laboratoire du DELTA**

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Trudaine 45-18.

## OPHTALMINE

**Indic. therap.** — Antisepsie oculaire. Arrêt de la cataracte, par deshydratation du milieu oculaire. Conjonctivites, Blépharites, Presbytie prématurée, etc..., etc.

**Doses et Mode d'emploi.** — Pomade, deux applications par jour.

Prix de vente au public : 10 francs.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour  
PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## OPOBYL

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-3.

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Cholagogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques, Décongestif du foie et des intestins.

**Indications.** — Hépatites. — Ictères. — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 dragées au début ou à la fin des repas, 2 ou 3 fois par jour.

L'étui : 12 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

# OPOCALCIUM

## du Dr GUERSANT

*Reminéralisation — Polyopothérapie.*

**Composition.** — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde, surrénale, thymus, hypophyse, (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

**Formes.** — Cachets comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

**Propriétés thérapeutiques.** — La décalcification et d'une façon générale la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

**Indications.** — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures carie dentaire, grossesse, allaitement.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 2 à 3 cuillers-mesures de poudre.

*Enfants* jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

*Enfants* jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre.

**OPOCALCIUM ARSÉNIÉ** (avec un centigramme de méthylarsinate disodique), une seule forme : cachets.

*Adultes* : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

**OPOCALCIUM GAIACOLÉ** (avec sulfo-gaiacolate de potasse), antiseptie pulmonaire et reminéralisation associées.

*Adultes* : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

**OPOCALCIUM IRRADIÉ** (voir plus loin).

**OPOFERRINE** (avec fer organique et extraits organiques).

*Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

*Enfants* : 2 à 4 comprimés par jour.

**Laboratoires de L'OPOCALCIUM**

A. RANSON, Docteur en Pharmacie  
121, avenue Gambetta — PARIS (XX<sup>e</sup>).  
Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81 et 62-82.

## **OPOCALCIUM IRRADIÉ** **du D<sup>r</sup> GUERSANT**

### **Composition :**

**Ergostérine** activée par les rayons ultraviolets (Vitamine D), associée au Complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium.

### **Formes :**

Cachets, Comprimés, Granulé.

### **Propriétés thérapeutiques :**

L'Opocalcium irradié ajoute aux principes de *Reminéralisation intégrale* les propriétés centuplées de l'huile de foie de morue.

### **Indications :**

Rachitisme, Croissance, Carence, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

### **Doses journalières et mode d'emploi :**

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* : 3 cuillerées à dessert.

*Enfants* jusqu'à 10 ans : 3 cuillerées à café.

*Enfants* jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café.

### **Littérature et échantillons :**

### **Laboratoires de l'OPOLCACIUM**

A. RANSON, Docteur en Pharmacie,  
121, avenue Gambetta — PARIS (XX<sup>e</sup>).  
Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81 et 62-82.

# OPOCHOL

## Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah.

## Forme pharmaceutique :

Comprimés dragéifiés glutinisés.

## Indications thérapeutiques majeures :

*Affections hépatico-biliaires.* — Hépatites, Cirrhoses, Petite insuffisance hépatique, Cholémie simple familiale de Gilbert et Lereboullet, Lithiasse biliaire, Angiocholite, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Ictères.

*Affections intestinales.* — Constipation par insuffisance de chasse biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.

## Indications thérapeutiques secondaires :

*Maladies de la nutrition.* — Diabète par hypohépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, Etats hypercholestérinémiques.

*Affections de l'appareil circulatoire avec participation du foie.* — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, hémophilie, certaines Anémies.

*Infections. Intoxications.*

*Neuro-psychiatrie.* — Psychasthénie avec signes hépatiques, Mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

## Mode d'emploi :

**A. En période de crise.** — 4 comprimés par 24 heures, 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

**B. Dans l'intervalle des crises.** — 2 comprimés par 24 heures, 1 comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

## Incompatibilités :

Aucune incompatibilité.

## Prescrire :

*Opochol* : comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 15 francs.

Laboratoire de MÉDECINE  
) EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4-84

Echantillons et littérature à la disposition  
de MM. les Docteurs.

## OPOCRINASES

**Ampoules opothérapiques buvables de 10 cc.  
Non injectables.**

### Composition :

Plasma hépatique .....	25 gr.
— splénique .....	10 gr.
— surrénal .....	10 gr.
Hémoglobine .....	5 gr.
Sérum normal.....	25 gr.
Glycérine.....	25 gr.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement rationnel et scientifique (méthode de Wipple) fatigue, épuisement nerveux (tous les syndromes neurasthéniques en général relèvent d'une insuffisance surrénale). Paludisme, Cachexie paludéenne, Bacillose, Prébacillose, Intoxication urémique, Rein cardiaque, etc...

Les OPOCRINASES produisent une augmentation rapide du poids des malades, elles stimulent l'appétit et réveillent les forces.

Aucune contre-indication.

### « PROTHERAPIA »

Laboratoire G. CHAMAGNE

Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie

Lauréat de l'Académie de Médecine,  
132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## OPODERMYL

**Onguent cutané opothérapique.**

**Composition.** — Extraits embryonnaires, albumoses et sérum hémopoïétique, tous principes actifs de la régénération cutanée.

**Mode d'emploi.** — Application permanente en couche épaisse, renouvelée aussi souvent que possible.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent spécifique de l'épidermisation en toutes circonstances.

**Indications.** — Toutes dermatoses, même aiguës, Eczéma, Prurigos excoriés, Erythème fessier, Crevasses du sein. Toutes plaies par brûlures caustiques, Pertes de substance chirurgicales ou diathésiques.

Prix au public : 12 francs.

**J. BENSIMON**

36, rue des Martyrs — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## OPOFERRINE VITAMINÉE

**Composition.** — Association des Peptonates de fer et de manganèse, à l'extrait hépatique (Méthode de Whipple) et à l'extrait splénique, en présence des Vitamines A (Carotène) et C (Chlorophylle), qui commandent le métabolisme du fer.

**Action.** — Le plus complet et le plus puissant agent de régénération sanguine.

**Indications.** — Anémies pernicieuses, anémies de toutes natures (post-hémorragiques, infectieuses, parasitaires, toxiques, cancéreuses, de l'enfance, etc...), la chlorose, les altérations et les affections sanguines, les malades hémorragipares, les déficiences spléno-hépatiques, les états post-opératoires, la convalescence, la puberté, le surmenage, les intoxications (saturnisme, oxyde de carbone, alimentaires, etc...), l'hypotension, l'amaigrissement.

**Forme.** — Granulé.

**Doses journalières.** — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à dessert.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café. A prendre au début des repas.

Aucune action toxique. Peut être prescrit aux jeunes enfants.

Laboratoires de l'Opocalcium.

A. RANSON, Docteur en Pharmacie

121, avenue Gambetta — PARIS

Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81, 62-82.

## OPONUCLYL IRRADIÉ TROUETTE-PERRET

Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium,  
Vitamine D.

Médication synergique organo-minérale.

**Composition.** — Lipoïdes médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléique, Cinnamate de manganèse et de fer, Algostérine irradiée.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Convalescence, Croissance, Surmenage, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose.

**Doses.** — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.

*Enfants* : 1 sphérule à chaque repas.

Prix au public : 16 francs.

Littérature et Echantillons :

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels  
PARIS (XI<sup>e</sup>).

## OPOPHOS GRANULÉ

**Composition.** — Glycérophosphate de chaux, Inosito-Phosphate de chaux et magnésie; Phosphate bicalcique, de magnésie, de manganèse; Protoxalate de fer, Splénine, Thymusine, Parathyroïdine.

**Indications.** — Anémies, Chlorose, Asthénie, Surmenage, Rachitisme, Lymphatisme, Carences, Troubles de Croissance et de Nutrition, Dénutrition, Caries dentaires.

**Forme.** — Granulé sucré, aromatisé. Ne contenant aucun produit toxique (arsenic, strychnine, etc.), l'OPOPHOS constitue la forme la plus facile et la plus agréable pour faire prendre fer et phosphates aux enfants et aux bébés.

**Doses.** — *Bébés* : 1/4 de cuillerée à café 2 fois par jour. — *2 à 5 ans* : 1/2 cuillerée à café 2 fois par jour. — *5 à 15 ans* : 2 cuillerées à café par jour. — *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour

**Laboratoire DENISOT**

19, rue de Fleurus — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## OPOSYNERGINES

**Formes.** — Comprimés, Gouttes, Granulés.  
Formule F. et M.

**Composition.** — Synergie endocrino-minérale.

**Indications.** — Troubles de la croissance, dystrophie infantile, enfants retardés dès la naissance, soit au point de vue du poids, de la taille, de l'état mental, de la parole, etc... Rachitisme, chlorose de la puberté, atrophie polyglandulaire précoce, tous les états d'asthénie, impuissance, migraines par insuffisance thyroïdienne, maladie de Dermum et du système endocrinien, séquelles de la vieillesse, frilosité, ostéomalacie, cancer.

**Mode d'emploi.** — 1 à 8 comprimés par jour. V à XL gouttes, 1/2 à 4 cuillerées à café de granulés, par jour.

**PROTHERAPIA**

**Laboratoire G. CHAMAGNE**

Docteur ès sciences, Docteur en pharmacie

Lauréat de l'Académie de Médecine

132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).



## OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés sous un vide profond vers 0° et présentés en comprimés dragéifiés à froid permettant une conservation indéfinie.

<b>Thyroïdine Bouty</b>	{ 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché par dragée. }	Obésité. Myxœdème.
<b>Oviginine Bouty</b>	{ 0 gr. 12 d'ovaires desséchés par dragée. }	Ménopause naturelle ou artificielle.
<b>Séquardine Bouty</b>	{ 0 gr. 10 de testicule desséché par dragée. }	Insuffisance organique.
<b>Hépatine Bouty</b>	{ 0 gr. 30 de foie desséché par dragée. }	Cirrhose, Ictère, Diabète.
<b>Surrénaline Bouty</b>	{ 0 gr. 10 de capsules surrénales desséchées par dragée. }	Basedowisme, Addisonisme.
<b>Néphrine Bouty</b>	{ 0 gr. 15 de rein desséché par dragée. }	Néphrite.
<b>Biliol Bouty</b>	{ Extrait concentré de bile de porc en dragées kératinisées. }	Ictère, lithiase biliaire, etc.
<b>Gastrozymase Bouty</b>	{ Comprimés effervescents de suc gastrique de porc. }	Dyspepsie, embarras gastrique.
<b>Liqueur à la thyroïdine</b>	{ Indication infantile, 1 cuillerée à café — 0 gr. 02 de thyroïde desséchée }	Myxœdème.
<b>Globépal</b>	{ Poudre de foie frais. 1 godet égale 125 grammes de foie. }	Anémie.

## ASSOCIATIONS PLURIGLANDULAIRES

<b>Triglandine Bouty</b>	{ Chaque dragée contient : Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse..... 0 gr. 05 Ovaire ..... 0 gr. 10 }	Sexe féminin.
<b>Triglandol Bouty</b>	{ Chaque dragée contient : Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse desséchée 0 gr. 05 Testicule desséché. 0 gr. 10 }	Sexe masculin.

Tous les produits opothérapiques ci-dessus sont également présentés en ampoules de 1 centimètre cube et de 3 centimètres cubes.

**Laboratoires BOUTY**  
3, rue de Dunkerque — PARIS  
Tél.: Nord 32-52 (2 lignes).

# OPOTHÉRAPIE BYLA

Nouvelles présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE,  
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyme, deux comprimés concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipide correspondant (procédé breveté).

**Posologie.** — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° Les « **EXO** » **BYLA**, sucs totaux inaltérables, préparés par exolyse des organes frais et aromatisés (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

**Posologie.** — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° Les **GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur.  
*Conservation indéfinie.*

Prescrire : GLANDULES DE SURRENINE BYLA.

**Posologie.** — (4 à 8 par jour).

4° Les **AMPOULES BYLA** : préparées à partir des ORGANES FRAIS ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HEPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES « ISO » BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPOULES ISO REIN BYLA, etc.,

**Posologie.** — 1 ampoule tous les 2 jours.

*Opothérapie simple, pluriglandulaire et panglandulaire.*

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

# OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO - Glandules - Exolysés - Ampoules ISO

Formule

## MÉDICATION ASSOCIÉE

1	Hypophysine. 0.10 Orchitine. . . 0.60	Myxœdème. Troubles endocriniens.
2	Hypophysine. 0.10 Ovarine. . . . 0.20	Troubles de la ménopause et insuffisances glandulaires.
3	Orchitine. . . 0.60 Thyroidine. . . 0.025	Myxœdème. Insuffisances glandulaires.
4	Ovarine. . . . 0.20 Thyroidine. . . 0.025	Insuffisances thyroïdienne et ovarienne.
5	Surrénine. . . 0.10 Hypophysine. 0.10	Asthme essentiel. Myasthénies. Insuffisances surrénales. Basedowisme.
6	Surrénine. . . 0.10 Thyroidine. . . 0.025	Retards de croissance.
7	Hypophysine. 0.10 Thyroidine. . . 0.025	Syndromes pluri-glandulaires, Sclérose, Obésité.
8	Surrénine. . . 0.15 Hypophysine. 0.05 Thyroidine. . . 0.025	Asthme essentiel. Myasthénies. Insuffisances surrénales. Maladie d'Addison.
8 bis	Ovarine. . . . 0.15 Surrénine. . . . 0.05 Hypophysine. 0.05	Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adipo-génitaux.
9	Hypophysine. 0.05 Ovarine. . . . 0.20 Thyroidine. . . 0.025	Troubles de la ménopause. Syndromes adipo-génitaux.
9 bis	Ovarine. . . . 0.20 Surrénine. . . . 0.05 Thyroidine. . . 0.025	Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adipo-génitaux.
10	Hypophysine. 0.05 Orchitine. . . . 0.60 Thyroidine. . . 0.025	Développement tardif. Myxœdème. Insuffisances glandulaires.
11	Hypophysine. 0.05 Thyroidine. . . 0.025 Surrénine. . . . 0.05 Orchitine. . . . 0.10	Infantilisme masculin. Insuffisances glandulaires. Sénilité précoce.
12	Hypophysine. 0.05 Thyroidine. . . 0.025 Surrénine. . . . 0.05 Ovarine. . . . 0.10	Troubles de la puberté et de la ménopause.

## MÉDICATION PANGLANDULAIRE

contenant toutes les glandes en proportion normale.

**PANGLANDULAIRES BYLA : Masculins, Féminins, Infantiles.**

*Exécution de toute formule sur ordonnance médicale.*

Échantillons et Littérature :

**Les Établissements BYLA, 26, avenue de l'Observatoire, Paris.**

# OPOTHÉRAPIE CARRION

## 1° POUDRES OPOTHERAPIQUES

*Les poudres opothérapiques CARRION* renferment inaltérées chimiquement les substances spécifiques contenues dans les organes frais.

**Formes.** — Elles se présentent, soit sous la forme de cachets, soit sous la forme de comprimés. Mais nous recommandons plus spécialement la forme comprimés, car elle préserve mieux la poudre contre les altérations possibles.

**Doses.** — La posologie se trouve très simplifiée, car nos *cachets* ou *comprimés* sont dosés de telle manière que le médecin peut prescrire 2 à 3 *cachets* ou *comprimés* par jour (un par repas).

Liste des principales *poudres opothérapiques* :

Corps jaune, Fiel de Bœuf, Foie, Glande mammaire, Hypophyse. Moelle osseuse, Orchitique, Ovaire, Parathyroïde, Rate. Substance grise.

## 2° DRAGÉES PLURIGLANDULAIRES

**Forme.** — Nous présentons dix formules de mélanges pluriglandulaires sous forme de dragées, mais nous pouvons, pour répondre à certaines indications opothérapiques complexes, préparer sur demande des cachets de toutes compositions.

Liste des 10 préparations :

T. O. S. H. — T. A. S. H. — T. O. H. — T. O. S. — O. S. H. — S. H. — T. A. — T. O. — O. M.

T. (Thyroïde). — A. (Testicule). — O. (Ovaire). — H. (Hypophyse). — S. (Surrénale). — M. (Mammaire).

Les formules les plus courantes sont T.O.S.H. ou T.O. (sexe féminin). T. A. S. H. ou T. A. (sexe masculin).

6

## 3° EXTRAITS INJECTABLES

*Les extraits injectables* sont en solution aqueuse et désalbuminés.

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. Chaque ampoule correspondant à 0 gr. 10 de poudre opothérapique (sauf pour la Parathyroïde et le lobe postérieur d'Hypophyse).

**Posologie.** — Une ampoule de 2 cc. tous les jours ou tous les deux jours. La liste de ces extraits injectables est la même que celle des poudres.

## 4° PER-EXTRAITS INJECTABLES

Nos préparations de *Per-Extraits* sont faites d'après une technique nouvelle en opérant sur les organes frais prélevés au moment de l'abattage ; ils sont totalement désalbuminés.

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. Chaque ampoule correspond à 1 gr. de produit frais.

**Posologie.** — La posologie des *Per-Extraits* est exactement semblable à celle des extraits injectables.

## 5° EXTRAIT INJECTABLE DE LOBE POSTÉRIEUR d'HYPOPHYSE

Nous avons deux dosages en unités internationales, pour cet extrait spécial :

Rétropituine N° 2 (deux unités internationales) pour accouchements.  
Rétropituine N° 10 (dix unités internationales) pour autres usages.

Laboratoire de Biologie Appliquée.

H. CARRION et Cie, V. BORRIEN, docteur en Pharmacie  
54, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes groupées).

## OPOTHÉRAPIE CHOAY

**I. LES EXTRAITS TOTAUX CHOAY** sont des poudres d'organes (Codex) préparées à froid (0°) et dans le vide profond, de propriétés pharmacodynamiques équivalentes à celles des pulpes fraîches correspondantes.

**Formes pharmaceutiques.** — *Cachets* et *Comprimés* présentés en tubes hermétiques.

**Posologie moyenne.** — 4 à 6 par jour.

**Nomenclature et dosage des produits les plus couramment utilisés.**

Cachets et comprimés : Hépatiques .....	25 et 50 cgr.
Hypophysaires.....	5 et 10 —
Mammaires.....	25 et 50 —
Orchitiques (ou Androïques) ..	25 et 50 —
Ovariens .....	10, 20 et 50 —
Pancréatiques .....	25 et 50 —
Spléniques.....	25 et 50 —
Surrénaux.....	10 et 20 —
Thyroïdiens..	1 et 5 mgr., 1, 2, 5 et 10 —

**Prix :** De 12 à 20 fr. la boîte de 24 à 40 cachets ou comprimés suivant dosage.

**II. LES EXTRAITS INJECTABLES CHOAY** sont des solutions aqueuses, désalbuminées, stérilisées et sensiblement isotoniques.

**Formes pharmaceutiques.** — Ampoules de 1 à 10 cc.

**Nomenclature et posologie des solutions les plus utilisées :**

Ampoules hépatiques.....	1, 2 et 5 cc.,	1 tous les jours.
— hypophysaires (glande totale).....	2 cc.....	1 tous les 2 jours
Ampoules hypophysaires (lobe antérieur).....	2 cc.....	—
Ampoules hypophysaires (lobe postérieur).....	Voir « Post-Hypophyse Choay ».	
Ampoules mammaires.....	2 cc.....	1 tous les 2 jours.
— orchitiques.....	2 cc.....	—
— ovariennes .....	2 cc.....	—
— spléniques.....	2 et 5 cc.....	—
— surrénales.....	1 cc.,.....	—
— thyroïdiennes.....	1 cc.,.....	—

**Prix :** Boîtes de 6 ampoules : de 12 à 30 fr.

Boîtes de 12 ampoules : de 25 à 35 fr.

**OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE : Syncrines Choay** (Voir ce mot)

**Laboratoire CHOAY**

48, aven. Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

## OPOTHÉRAPIE du D<sup>r</sup> FRAYSSE

### (Associations)

**THYRODOSE.** — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

**Indications.** — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc.

Prix : 20 francs.

---

**NEURODOSE.** — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, orchitine 0,20, substance grise, 0, 10.

**Doses.** — *Adultes* : 4 pastilles par jour.

**Indications.** — Epuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle, surmenage. — Infantilisme, etc.

Prix : 20 francs.

---

**PLACENTODOSE.** — Granulés de Placenta et de mammaire.

**Doses.** — 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Flaccidité utérine. — Métrorragies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc.

Prix : 20 francs.

---

**SPLENODOSE.** — Granulés de Rate. — Foie. — Surrénale. — Hémoglobine osséine.

**Doses.** — 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Déminéralisation. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Maladies infectieuses. — Paludisme, etc.

Prix : 20 francs.

---

**Laboratoire du D<sup>r</sup> FRAYSSE**

47, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 1288.

Notices et échantillons sur demande.

(Voir, aussi, *Folli-Lobine*).

## OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide.

### Endocrisines.

**Forme.** — 1<sup>o</sup> *Cachets et comprimés* :

**Doses** usuelles toutes préparées. — Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr. ; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; reins, 0, 25 cgr.

*Cachets pluri-glandulaires.*

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme, arriération.

### 2<sup>o</sup> *Ampoules* :

Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Orchitine, Rate. — Association hyposurrénale, Asthme. — Hypophyse lobe postérieur, usage obstétrical (dite **Physocrisine**).

**Formuler** : **Endocrisines-glande Fournier**.

**Solution de foie** (en ampoules buvables), amp. de 10 cc. correspondant à 150 gr. de foie par ampoule (méthode de Whipple)

**Solution de Rate** (ampoules injectables) de 3 cc. Méthode Thomas Paul. Affections eczémateuses et prurigineuses.

**Formuler** : **Splenocrisine**.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS.

## « OPOTHÉRAPIE MONCOUR »

En sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous extraits totaux d'organes desséchés à froid, dans le vide profond.

### Dosages :

(suivant extraits) 10 centigr. et 20 centigr.

### Posologie :

1 à 6 par jour, sauf hépatiques et rénales,  
1 à 16.

## SPHÉRULINES SYNERGIQUES

(associations opothérapiques.)

Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques, Thyro-surrénales, Hypophyso-ovariennes, Surréno-ovariennes, Surréno-orchitiques, Surréno-hypophysaires, Entéro-pancréatiques, Thyro-surréno-ovariennes, Hypophyso-surréno-Thyroïdiennes, - Hypophyso-surréno-ovariennes, - Hypophyso-ovaro-thyroïdiennes, - Hypophyso-thyro-surréno-ovariennes, - Hypophyso-thyro-surréno-orchitiques.

**Posologie.** — 1 à 6 par jour.

## NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Préparées de suite après demande médicale. Préparations datées. Tous organes, dosages et associations. Renseignements sur demande.

**Laboratoire « MONCOUR »**

49, avenue Victor-Hugo  
BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine).

Téléphone : Molitor 08-47.



## OPOTHÉRAPIQUES PELLISSIER

**Leur doctrine :** Clarté, Simplicité, Loyauté.  
Le procédé Pellissier utilisé pour la fabrication des produits opothérapiques est breveté. Il a fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences le 21 mars 1921, à l'Académie de Médecine le 15 mai 1923, à la Société de Pathologie comparée le 11 novembre 1924.

Les appareils de fabrication sont les plus puissants qui existent dans le monde et les poudres d'organes qu'ils permettent d'obtenir, sans aucun dégraissage, sont d'une activité incomparable, d'ailleurs reconnue et de conservation indéfinie.

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les *adultes* : le *cachet* et le *suppositoire* (Opositoire).

Pour les *jeunes enfants* : le *suppositoire* (Opositoire).

Exemple de prescription pour les adultes :

Ovaire Pellissier, cachets à 0 gr. 25, 1 boîte.

Glande mammaire Pellissier, cachets à 0 gr. 50, 1 boîte.

Pancréas Pellissier, cachets à 0 gr. 25, 1 boîte, etc.

Opositoires Pellissier de Prostate, à 0 gr. 25, 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'ovaire, à 0 gr. 25, 1 boîte, etc.

Exemple de prescription pour les enfants :

Opositoires Pellissier de thyroïde, 1 milligr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'hypophyse, à 0 gr. 05, 1 boîte.

Opositoires Pellissier de surrénale à 0 gr. 05, 1 boîte.

Opositoires Pellissier de thymus, à 0 gr. 25, 1 boîte.

Les **Laboratoires PELLISSIER** ont introduit également dans la thérapeutique :

Les *Comprimés de Silicate de soude Pellissier*, à 0 gr. 25.

Les *Ampoules de Silicate de soude Pellissier*, pour l'injection intraveineuse, pour le traitement de l'artériosclérose. Communication à l'Académie des Sciences (17 août 1920).

**Laboratoires PELLISSIER**

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Wagram 14-59.

Usine : 18, Grande-Rue — ASNIERES (Seine).

## OPO-VACUOLINE et VACUOLINE-EMULSION

### Traitement de la Constipation.

L'association de ces deux préparations constitue une médication rationnelle de la constipation et s'adresse à tous les cas.

1<sup>o</sup> L'une est active : **Opo-Vacuoline** (suc intestinal associé à une émulsion d'huile de paraffine et d'agar-agar).

**Indications.** — Constipation chronique ou aiguë, Insuffisance duodénale.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas.

Prix du flacon : 18 francs.

2<sup>o</sup> L'autre, émollissante : **Vacuoline-Emulsion** (huile de paraffine émulsionnée à des algues marines, sans laxatif, sans drastique).

Action purement mécanique.

Rééducation intestinale rapide sans irriter.

**Indications.** — Constipation, Entérite, etc. Préparation excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

**Doses.** — 1 à 2 cuillerées à soupe au milieu des repas.

Prix du flacon : 15 francs.

**Laboratoires DECHOSAL**

39, rue de la Gare — BONDY (Seine).

## OPOZONES LUMIÈRE

### Organothérapie moderne.

#### Médication des Troubles endocriniens.

**Constitution.** — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

**Propriétés.** — Les dragées d'OPOZONES LUMIERE sont obtenues :  
1<sup>o</sup> Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-dessiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait, les OPOZONES LUMIERE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale. Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.

2<sup>o</sup> Avec rapidité (inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.

3<sup>o</sup> La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIERE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs.

Les OPOZONES LUMIERE, même préparées depuis fort longtemps, demeurent inodores. *Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.*

**Doses courantes.** — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

**Formuler.** — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIERE, en spécifiant l'extrait désiré.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

45, rue Villon — LYON.

## OPSOMYL

### Sérum osmolytique.

Pour le drainage physiologique du corps vitré et des cavités lymphatiques de l'œil.

**Constitution.** — Solution chlorurée hypertonique dioninée.

#### Mode d'action.

- a. Action osmotique par solution hypertonique de NaCl.
- b. Action dialytique par la dionine.

**Présentations.** — OPSOMYL A. Pour l'usage courant.

OPSOMYL B. Solution plus concentrée pour les décollements rétinien.

**Indications.** — Drainage de la cavité de l'œil, quelle que soit la nature de l'exsudat : hémorragies, choroidites, hyalites, traitement du décollement rétinien (préventif ou curatif). Compressions, névrites optiques, myopie progressive etc...

**Mode d'emploi.** — Injections sous-conjonctivales, intraténoniennes, rétrobulbaires.

Une à deux injections par semaine, pendant trois semaines (6 injections) avec intervalle de repos d'un mois entre les séries.

Myopie maligne, 24 injections par an en 4 séries.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## OPTALIDON « SANDOZ »

**Forme et composition.** — Comprimés dragéifiés renfermant : Isobutylallylmalonylurée, 0 gr. 050 ; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125 ; Caféine, 0 gr. 025.

**Propriétés.** — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats. Laisse et restitue au malade toute faculté de s'occuper, de travailler ou de se distraire.

**Indications.** — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

**Posologie.** — Dose antinévralgique : commencer par 2 dragées prises à la fois et continuer, s'il y a lieu, par 1 dragée, de 1/2 heure en 1/2 heure. Au maximum 8 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 4 dragées 1/2 heure avant le coucher.

**Enfants :** 1 à 3 dragées par jour, à partir de 5 ans.

**Présentation.** — Tubes en aluminium de 10 dragées. Flacons de 25, de 100 et de 250 dragées.

### PRODUITS SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

## OPTIPLASTE

**Composition.** — Sparadrap caoutchouté au ZnO.

**Forme.** — Occlusive ou perforée, en rouleaux de 1 m. de long de 1 à 5 cm. de large ;  
5 m. de long de 1 à 20 cm. et plus de large.

**Avantages.** — Adhésivité parfaite, aucune irritation de la peau, grande facilité à l'enlèvement, longue conservation dépassant largement celle habituellement admise pour les produits similaires, aucune odeur.

**Indications.** — Contention des pansements ; pansements de tractions, d'extensions, etc...

**Laboratoires FISCH et Cie.**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X<sup>e</sup>).

Tél. : Lamartine 92-52.

Bain oculaire

## OPTRAEX (Famel)

Nouvelle formule médicale pour le traitement des états inflammatoires des yeux et de leurs annexes.

**Composition :** pour 100 grammes :

Extrait de <i>Potentilla Tormentilla</i> . . . . .	0 gr. 50
Extrait de <i>Polygonum Bistorta</i> . . . . .	0 gr. 50
Extrait d' <i>Erigeron canadensis</i> . . . . .	0 gr. 50
Extrait d' <i>Euphrasia officinalis</i> . . . . .	0 gr. 50
Extrait d' <i>Hamalélis Virginica</i> . . . . .	0 gr. 50
Acide borique . . . . . 1 gr.	Salicylate de soude.. 0 gr. 08
Borate de soude . . . . . 2 gr.	Sulfate de zinc . . . . 0 gr. 10
Eau distillée d' <i>Hamamélis Virginica</i> . . . . .	25 gr.

**Propriétés.** — Décongestif, hémostatique, bactéricide oculaire, inoffensif, sans aucun toxique ni contre-indications.

**Indications.** — Tous les cas de congestion ou inflammation de la conjonctive et des paupières, des voies lacrymales ; blépharites, orgelets, conjonctivites rebelles, etc...

Préventif pendant les maladies infectieuses.

Recommandé aux porteurs de verres, yeux faibles ou fatigués.

**Mode d'emploi.** — Deux à trois bains d'yeux par jour.

Prix du flacon : 12 fr. 75. Prix du double flacon : 21 fr. 20.

**Laboratoire P. FAMEL**

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## **ORARGOL AMICROS**

**Complexe colloïdal électrique  
Or et Argent.**

**Anti-Infectieux Général.**

### **I. ORARGOL INJECTABLE (0,05 %). AMPOULES**

Boîte de 6 amp. 5 cc. : 20 fr.

Tube de 1 amp. 10 cc. : 7 fr.

**Septicémies, Grippe, Fièvres, Traite-  
ment pré et post-opératoire.**

**Posologie.** — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

---

### **II. ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %).**

**Gouttes.** — Flacon de 60 gr. : 20 francs.  
**Grippes, Fièvres, Thérapeutique infantile.**

**Posologie.** — XX à C gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire sans inconvénient.

**Rhino-Orargol.** — Fl. 20 gr. : 15 francs.  
(Compte-gouttes et instillateur nasal.)

IV à V gouttes en instillations nasales.  
X à XV gouttes en gargarismes.

---

### **III. ORARGOL-COLLYRE**

**Orargol-Collyre** (solution isotonique 0,2 %).

Boîte de 4 ampoules 1 cc. 5 : 15 francs.

Toutes les indications de l'Argent colloïdal comme collyre.

---

**Laboratoire des Produits AMICROS  
8, avenue Rachel — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).**

## ORCHIDINE OPTIMA

(Comprimés correspondant chacun à 0 gr. 60 de testicules frais de bélier.)

### Indications :

Puberté insuffisante, débilité en général, insuffisance testiculaire endocrinienne, affections nerveuses, sénilité précoce.

### Doses :

4 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois

**BRUXELLES.**

## OREX " S "

**Opothérapie complémentaire féminine.**

**Opothérapie sthénique.**

**Composition.** — Extrait orchitique total désalbuminé en solution alcoolique. — 1 cc. (XXXV gouttes) = 2 grammes de glande fraîche.

**Mode d'action.** — *Chez la femme* : Active la fonction ovarienne. Remplace l'imprégnation spermatique.

*Chez l'homme* : Action sthénique sur le système nerveux.

**Indications.** — *Chez la femme* : Carence sexuelle, Troubles de la ménopause naturelle ou artificielle. Aménorrhées, Dysménorrhées rebelles.

*Chez l'homme* : Surmenage intellectuel, Asthénie génitale, Sénilité précoce.

**Posologie.** — *Chez la femme* : X à XXX gouttes par jour en 2 ou 3 fois, *loin des repas*, pendant vingt jours par mois.

*Chez l'homme* : XL à C gouttes par jour, en 2 ou 3 fois, *loin des repas*.

Prix : le flacon (600 gouttes environ) : 16 francs.

**Laboratoires UVÉ-CRINEX**

**18, rue Saint-Amand — PARIS**

## ORGANI-CALCION ENDOCRINIEN POLYVITAMINE

**Opothérapie stimulante.**

Granulé fondant de Calcium et Phosphore organiques associés à une synergie glandulaire et aux vitamines A B et D. Assimilable par voie gastrique. Association médicamenteuse très active, répondant aux plus récentes données de l'endocrinologie et de la biologie.

**Indications.** — Déficiences glandulaires, neurasthénie, pré-carences (troubles entéritiques, asthénie, anémie). Rachitisme, fractures, carie dentaire, troubles de la croissance. Toutes déminéralisations, convalescence, surmenage, débilité. Grossesse, allaitement, Tuberculose, Rhumatisme chronique.

**Posologie.** — Nourrissons : 1/2 cuillerée à café par jour ; *enfants* de 1 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café ; de 5 à 10 ans : 3 cuillerées à café ; *adultes* : 3 cuillerées à dessert. A croquer (goût agréable) ou à délayer.

Aucune contre-indication : ni arsenic, ni strychnine, ni surrénales, ni thyroïde.

Prix : 20 francs.

**Laboratoires du VIOPHAN**

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX

## ORGANI-CALCION SIMPLE

Cachets de gluconate de Ca français dosés à 1 gramme. 2 à 6 par jour. Prix : 15 francs.

Ne possède pas les inconvénients du chlorure de calcium (saveur désagréable, phénomènes d'acidose).

Utilise au maximum, grâce à sa combinaison organique, les propriétés thérapeutiques du Ca ionisé.

Son emploi est curatif et préventif : Hémostatique, coagulant, Hémorragies : opératoire, gastrique, intestinale, pulmonaire, menstruelle. Déchlorurant-diurétique (œdème, ascite, albuminurie, néphrite). Antitoxique (intoxication gastro-intestinale avec dermatoses). Anticlasique : réactions sériques, urticaire-rhume des foins, asthme. Recalcifiant : Grossesse, allaitement, tuberculose.

Troubles vago-sympathiques : hypervagotonie, spasmodie, tétanie, etc.

A noter que l'Organi-Calcion augmente considérablement l'effet thérapeutique de la médication thyroïdienne.

**Laboratoires du VIOPHAN**

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX

## ORMATOL

Contre toutes **Dermatites**, **Dermatoses**, **Affections** de la **Peau**.

**Forme.** — Tube de Pommade de 60 grammes.

**Indications.** — Eczémas, Brûlures, Impétigo, Prurits, Urticaire, Ulcères, Sycosis, Irritations, Plaies, etc.

**Composition.** — Formule nouvelle réalisant l'application de la valeur antiseptique des essences en combinaison avec des produits médicamenteux très actifs (Essences de Géranium, Origan, Thym, Verveine, Calomel, Oxyde rouge Hg, Oxyde de zinc, Acide salicylique, Lanoline, Vaseline.

**Avantages.** — Odeur très agréable, pas d'irritation, cicatrisation rapide, ne tache pas.

**E. ROBINEAU**, pharmacien

80, route des Petits-Ponts — DRANCY (Seine).

## ORTHO-GASTRINE

**Formule :**

Sulfate de Soude anhydre .....	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre .....	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude .....	0 gr. 10

Pour 1 paquet; N° 30.

**Avantages.** — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

**Indications.** — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alimentaire, etc.

**Posologie.** — Adultes : 2 à 4 paquets par jour.

*Enfants* (sucrez légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 an à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 9 francs.

**Laboratoire A. LEBLOND**

Pharm de 1<sup>re</sup> Classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.  
51, rue Gay-Lussac — PARIS (V°).

R. C. Seine 56049.



# ORTHOGENOL

**Traitement de Base des Maladies  
de l'Age mûr.**

**Formule de redressement biologique (1)  
du Docteur A. VERNIER.**

**Composition.** — Phosphore, Magnésium, Manganèse, Silice, Soufre, Lithine, Diurétine, Scille, Ac. Thyminique (solv. urique physiol.)

+ Opothérapie homostimulante, substitutive et régulatrice : Foie, Hypophyse antér., Thyro-Parathyroïdes, Glande interstitielle mâle, Sur-rénale (privée d'adrénaline).

— Régénérations cellulaires. Réactivation physiologique. Dépuration.

**Indications.** — Déficiences organiques et fonctionnelles qui constituent l'usure physiologique, Troubles biologiques intriqués de l'Involution sénile normale ou pathologique, Age critique des deux sexes. Arthritisme, Artériosclérose, Rhumatismes (2), Diabète, Obésité, Azotémie, Anuries médicales.

**Présentation.** — Deux formes : *Cachets* et *Elixir*.

**Posologie.** — L'ORTHOGENOL, traitement de Base, se prescrit à la dose minima, longtemps soutenue, de 3 cachets ou cuillerées à soupe d'élixir par jour. Dans les grandes *Anuries* (avec Anasarque, Hydropisie, Asystolie), cette posologie doit être doublée pour obtenir fidèlement les *Débâcles libératrices* sous l'action conjuguée des *Dépurateurs tissulaires*, des *Diurétiques rénaux* et des facteurs *Endocriniens* de la Diurèse (1).

(1) Sénescence et morbidité sénile, M. Mazaurio (*Thèse de Montpellier*, 1931).

(2) Dermo-révuulsion par effleurage « en raies de feu ». *Le Polycautére du Dr Vernier*, R. Grégoire (*Thèse de Montpellier*, 1933).

**Laboratoires BELIERES**

**19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).**

## ORTHOZOMINE

Principe actif du plasma musculaire total.

*Zomine* désalbuminée selon la technique du Professeur Richet.

**L'Orthozomine** présente les propriétés stimulantes de la **Zomine** sous une forme concentrée et très agréable à prendre (sirop).

### ANÉMIES. CROISSANCE. CONVALESCENCES.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

A prendre pure ou dans un peu d'eau froide.

Le flacon : 20 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## OSMO-VACCINS BRÉANT

### 1<sup>o</sup> Osmo-vaccins Bréant Colibacille :

Infections intestinales (colites, entéro-colites) et syndrome entéro-rénal.  
Par voie buccale, lavages, lavements.

### 2<sup>o</sup> Osmo-Vaccins Bréant Gynécologiques :

Traitement des métrites, salpingites, vaginites, etc.

Par tampon, mèche, injection intra-cervicale.

Existe également en : Ovules à l'osmo-vaccin Bréant gynécologique.

### 3<sup>o</sup> Osmo-Vaccins Bréant Rhino :

Pour le traitement des rhinites aiguës et chroniques, sinusites, otites (pansements et pulvérisations).

### 4<sup>o</sup> Osmo-vaccins Bréant Gonococciques :

Traitement des affections à gonocoque chez l'homme : Urétrites, blennorrhagies, Cystites, Pyonéphrites gonococciques, Prostatites, etc.  
(Par injections urétrales.)

### 5<sup>o</sup> Osmo-Vaccins Bréant Staphylococcique :

Pour le traitement des affections à staphylocoque : Furonculose, anthrax, acné, etc. (Par pansements et par voie buccale.)

La boîte de 8 ampoules..... 36 fr.

La boîte cure de 18 ampoules..... 50 fr.

**Laboratoire d'analyses BRÉANT**

11, rue de Clichy — PARIS. (Trinité 23-84.)

## OSTÉOGLANDULOL

**Granulé — Comprimé**  
**Opothérapie glandulaire**

Par l'emploi de glandes fraîches à sécrétion interne conservant toutes leurs propriétés par un procédé spécial de fabrication.  
Traitement rationnel des insuffisances glandulaires et de la décalcification.

**Indications.** — Anémie, Rachitisme, Déminéralisation, Chlorose, Croissance tardive, Décalcification, Sénilité précoce, Neurasthénie, Hypochondrie, Troubles nerveux.

**Granulé :** Une cuillerée à café contient :

Poudre d'os..... 0,10 Moelle osseuse..... 0,02  
Surrénale..... 0,01 Orchitine.... 0,10 Excipients accharolé q. s.

**Doses.** — *Adultes* : 1 cuillerée à café matin midi, et soir, directement ou dans un 1/2 verre d'eau. *Enfants* : 1/2 cuillerée à café, 2 ou 3 fois par jour suivant les indications du médecin.

**Comprimés.** — Même composition que le granulé.

Deux comprimés représentent 1 cuillerée à café.

Les comprimés peuvent être prescrits aux diabétiques.

**Doses.** — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour, en 3 fois, matin, midi et soir. *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

Peut être prescrit aux assurés sociaux.

**Laboratoire BERGER**, 14, rue des Pyramides — PARIS.

Envoi gratuit d'un flacon d'Ostéoglandulol (granulé ou comprimé) au choix du Docteur.

## OTALGOLEX

(Ex-Otalgol-Spécifique des Otalgies)

**Tube Instillateur** de soluté neutre glyciné rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

**Composition.** — Sol. d'adrénaline, stovaïne, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon glycérine chimiquement pure.

**Propriétés.** — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

**Indications.** — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

**Mode d'emploi.** — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube : 10 francs.

Dépôt général pour la France :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II°).

Téléphone : Central 83-15.

## OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif cristallisé du *Strophantus Gratus* isolé par le procédé particulier du professeur Arnaud. Désignée comme Etalon International.

**Formes.** — Comprimés à 1 mgr, Solution à 4 p. 1000, Ampoules de 1 cc. au 1/4 de mgr. pour injections intraveineuses, Ampoules de 2 cc. au 1/2 mgr. pour injections intramusculaires.

**Propriétés.** — Cardio-tonique énergique, Diurétique puissant.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques, Dilatation aiguë des cavités droites, Cardiopathies valvulaires, Asthénie du myocarde, Arythmies, Tachycardies.

### Doses

*Per os* : Doses moyennes : 2 à 3 mgr. par jour pendant les 7 premiers jours de chaque quinzaine.

Doses fortes : 4 mgr. par jour.

**L'Ouabaïne Arnaud** ne s'accumulant pas, le traitement doit être poursuivi jusqu'à obtention de l'effet désiré.

*Injectons* : Injecter une ampoule pour injections intraveineuses ou une ampoule pour injections intramusculaires par jour pendant 4 à 5 jours.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (15<sup>e</sup>)

## OUATAPLASME

du Dr Ed. LANGLEBERT.

Pansement humide, complet.  
Instantané, aseptique émollient.

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Abcès, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

**Mode d'emploi.** — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquueur de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se **sinapiser** en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

L'enveloppe entière, avec imperméable : 9 fr. 25.

L'enveloppe entière, sans imperméable : 6 fr. 60.

**Établissements SABATIER**

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## OVAIRE

### Préparations ovariennes des **Endocrisines Fournier.**

1<sup>o</sup> Ovaire total :

*Cachets* : 10, 20, 25, 30, 50 cgr.

*Comprimés* : 0,10.

*Ampoules* : correspondant à 0,50 de glande. En boîtes de 6.

2<sup>o</sup> Folliculine de l'ovaire, en ampoules.  
Solution huileuse : 200 U. souris par ampoule.

3<sup>o</sup> Lipoïde de l'Ovaire dit « **Minovarium** ». En pilules correspondant à 0 gr. 15 d'Ovaire (40 pilules).

4<sup>o</sup> Association : Ovaire - Vitamine E, dite « **Vit-E-lutéine** ».

(Vitamine E de la génération et Hormone du corps jaune.)

En pilules. Boîte de 40.

---

Notice spéciale sur demande aux  
**Laboratoires FOURNIER frères**  
7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>)

## **OVARINE OPTIMA**

(Comprimés correspondant chacun à  
50 cgr. d'ovaire frais.)

### **Indications :**

Insuffisances ovariennes, troubles de  
la ménopause, naturels ou post-  
opératoires.

### **Posologie :**

4 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois

BRUXELLES.

---

## **OVARINE TISY**

En cachets de 20 centigrammes.

---

### **Pharmacie TISY**

R. et A. FEIGNOUX, Successeurs  
95, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## OVARO-THYROÏDINE . OPTIMA

(Comprimés pluriglandulaires dosés à raison de 20 cgr. glande ovarienne fraîche et 10 cgr. glande thyroïde fraîche par comprimé.)

**Indications.** — Insuffisances endocrines, troubles de la ménopause naturels ou post-opératoires, obésité, rhumatisme chronique et déformant, troubles circulatoires relevant de la ménopause.

**Doses.** — 3 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois  
BRUXELLES.

## OVULES AU NESTOSYL

**Anesthésie superficielle par contact.**

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

**Indications.** — Suppression rapide et inoffensive de la douleur dans : Vaginites, Vaginisme, Absès du vagin, Fistules, Plaies, Tumeurs, Blennorrhagies, Métrites, Règles douloureuses, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, et tous examens et petites interventions gynécologiques (Speculum, curetage, cautérisations, dilatactions, etc.).

**Posologie.** — Délai nécessaire pour la fusion complète : 3 heures environ. Compte tenu de ce renseignement, introduire 1 ou 2 ovules en temps utile. Renouveler cette introduction chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*.

Dans les pays tropicaux où l'ovule est inutilisable, y substituer un tampon vaginal imbibé de *Solution huileuse au Nestosyl*.

**Laboratoires du NESTOSYL**

**P. BAUDE, Pharmacien**

72, rue Saint-Dominique, PARIS (VII°).

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl 27 PARIS.



## OVULES CHAUMEL

Les Ovules à la Glycérine solidifiée, et aux principaux médicaments, constituent le mode de pansements vaginaux le plus commode.

### Indications :

**Aménorrhée.** — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

**Antisepsie.** — Ovules Chaumel acide borique.

**Congestions.** — Ovules Chaumel simples et ichtyol.

**Douleurs.** — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

**Inflammations.** — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

**Leucorrhée.** — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

**Métrites.** — Ovules Chaumel ichthyol.

**Vaginites.** — Ovules Chaumel ichthyol.

### Établissements FUMOUZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS!

## OVULES INTIMA

**Composition.** — Extraits de pavots et de guimauve et glycérine solidifiée.

**Actions thérapeutiques.** — Calmants, décongestionnants et puissamment résolutifs.

**Indications.** — Métrites, annexites et pelvipéritonites de toutes natures, vaginite.

La boîte de 6 ovules : 12 francs.

Leur efficacité est heureusement complétée par l'emploi des *Comprimés Intima*.

**Antiseptiques, astringents, hygiéniques, effervescents, très solubles et délicatement parfumés.**  
Indiqués dans toutes les affections gynécologiques et les soins quotidiens de la femme. Comme les *Ovules Intima*, ils sont ni toxiques, ni caustiques et ne tachent pas le linge.

**Dose.** — 1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau.

La boîte de 32 comprimés : 10 francs.

### Laboratoire LAGOUTTE

229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## OVULES RHEMDA RADIOACTIFS

(Radiovules.)

**Composition.** — A base de terres radioactives et de Terpinéol; d'une radioactivité égale à une unité uranique.

**Action.** — Par émission de radiations amenant une action bactéricide et leucocytogène.

**Indications thérapeutiques.** — Vaginites, Métrites, Leucorrhée, etc.

Boîte de 6 ovules.

Prix de vente au public : 15 francs.

Prix médical : 9 fr. 45.

Chaque fabrication de nos produits radioactifs porte un numéro de série. Un échantillon de cette série est dosé par le Service des Mesures de l'Institut du Radium de Paris pour sa teneur en produit radioactif et le numéro du certificat délivré par cet Institut figure sur chaque produit.

Laboratoires RHEMDA

S. MOGAN, Pharmacien

17, rue d'Hauteville — PARIS (X<sup>e</sup>).

Usine : 51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068-B.

---

## OVULES « ROCHE »

au Thigénol.

(Voir également page « Thigénol »)

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules « Roche »* la sédation parfaite des douleurs, et, après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

**Indications thérapeutiques.** — Vaginites, Vulvo-vaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## OXYDOTHYRINE PÂRIS

**Composition.** — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

**Indications.** — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goître et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

**Forme.** — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

**Posologie.** — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet—PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## OXYDOVARINE PÂRIS

**Composition.** — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

**Forme.** — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

**Posologie.** — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

**Indications.** — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet—PARIS (XV<sup>e</sup>).

## OXY-INJECTEUR DU D<sup>r</sup> FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

**Indications.** — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphysème, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Bronchopneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

**Avantages de l'appareil.** — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 125 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> FIALIP**

23, av. de la Motte-Picquet, PARIS (VII<sup>e</sup>).

## OXYLÉINE

**Forme.** — Comprimés. Flacons de 50.

**Principe actif.** — Sulfate neutre d'oxyquinoléine, kaolin et hydrate d'alumine colloïdal.

### Indications thérapeutiques :

**Troubles intestinaux.** Colites, ulcérations, diarrhées, fermentations, dysenterie, flatulences, ptoses, névroses digestives, intoxications intestinales, diarrhées estivales des enfants, parasites intestinaux, excepté le ténia.

**Troubles des voies urinaires.** Toutes les infections, pyérites, cholécystites et colibacilloses.

### Mode d'emploi :

**Adultes** au-dessus de 15 ans : De 3 à 4 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

**Enfants** de 8 à 15 ans : De 2 à 3 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

**Enfants** de 4 à 8 ans : 1 comprimé à chaque repas du midi et du soir.

Avaler, ne pas croquer pour éviter le goût désagréable.

Prix : 14 francs. Durée : 8 jours.

**Laboratoires DROUET & PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## OXYMENTHOL PERRAUDIN

(Tablettes et pâtes)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaine, benzoate de soude, etc.

Tablettes et pâtes de goût agréable.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes, 6 à 10 par jour à sucer ; Enfants, 3 à 6 par jour à sucer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

**Prix au public :** Tablettes, 6 fr. ; Pâtes, 4 fr. 50.  
Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien  
21, rue Chaptal — PARIS.

## OXYMUTH SACA

**Composition.** — Hydrate d'oxyde de bismuth en suspension dans l'huile d'olive pure.

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. renfermant 0 gr. 15 d'hydrate d'oxyde de bismuth (= 0 gr. 125 de bi-métal actif).

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

**Usines Chimiques  
des Laboratoires Français**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**  
5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
Tél. : Provence 58-43.

## OXYOL LEISYN

Anti-diabétique énergique.

**Indications.** — Diabète sucré et ses complications.

**Action.** — Puissant oxydant organique activant les combustions.

**Présentation.** — Gouttes, cachets et poudre.

**Posologie.** — VI à XX gouttes dans vin aux repas ; 1 cachet à chaque repas. Dans les cas graves, deux fois par jour, tisane faite avec une cuillerée à soupe de la poudre.

**Composition.** — Convoyeurs d'oxygène, Catalyseurs, Cupra-ammonium, Méthyle Cupréine, Huile de Gabian aromatique.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Adr. télégr. : Laboleisyn — Paris

Tél. : Auteuil 14-73.

---

## OZOBIASE

**Principe actif.** — Catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux. Prix Meige 1929). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de Thérapeutique, 10 février 1926 ; Dr Moricet, Thèse de Paris 1926.

**Indications thérapeutiques.** — Amaigrissements, Nutrition du tuberculeux, Hypotrophie.

**Forme.** — *Comprimés* : Boîte de 60 et 1/2 boîte de 30.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

*Enfants* de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir.

Au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir.

Pour les *petits* : 1/2 comprimé écrasé dans du lait ou des confitures.

Pour l'*adulte* : avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.

Prix : 20 francs la boîte. 12 francs la demi-boîte.

Durée : 10 à 12 jours.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## OZOBIASE OPOTHÉRAPIQUE

**Principe actif :** catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux — Prix Meige 1929 — et 0,03 Ext. total de glandes surrénales). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de thérapeutique, 10 février 1926 ; Dr Moricet, Thèse Paris 1926.

**Indications thérapeutiques.** — Amaigrissements, Nutrition du tuberculeux, Hypotrophie.

**Forme.** — Comprimés. Boîte de 50.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

*Enfants* de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir ;  
au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir. *Avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.*

Prix : 16 fr. la boîte.

Durée : 8 à 10 jours.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## OZOTHINE

(Ozone-Térébenthine.)

**Composition.** — Térébenthine des Landes rendue assimilable par procédé spécial.

**Formes pharmaceutiques :**

**Ozothine interne.** — A prendre sous forme de gouttes. X gouttes, 2 fois par jour dans de l'eau sucrée. Augmenter chaque jour d'une goutte jusqu'à XXXV et redescendre à X gouttes.

**Ozothine externe.** — Pour inhalations, liniment.  
Pour inhalations : 1/2 cuillerée à café dans un bol d'eau très chaude.

**Propriétés thérapeutiques.**

**Ozothine interne.** — Gouttes OZOTHINE. Rhumes, bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose pulmonaire ou intestinale, Voies urinaires et génito-urinaires.

**Ozothine externe.** — *Inhalations* pour nez, larynx, pharynx, sinus.  
*Frictions ou massages.* — Affections arthro-rhumatismales. Sciatique

Prix :

Gouttes OZOTHINE.....	18 fr.
Liniment et Inhalations.....	19 fr.

**Laboratoire OZOTHINE**  
23, rue Sébastien-Mercier — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
**J. POMPANON, Pharmacien-Directeur**

## PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

**Composition.** — Le Pain Essentiel est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéines du lait solubilisées.

**Présentation.** — Chaque baguette de 10 gr. représente la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire, et renferme 6 gr. d'hydrocarbures.

**Avantages.** — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

**Indications thérapeutiques.** — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile ; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 et 4 baguettes par repas.

Dans d'excellentes panades galactagogues.

**Sans chlorure** pour arthritiques et albuminuriques.

**Produits de Régime HEUDEBERT**

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## PAIN MASSÉ « SANA »

(Formule du Professeur Rémond.)

**Composition.** — Le Pain Massé « Sana » est à base de gluten frais, combiné avec le Boldo et bicarbonate.

**Présentation.** — Sous forme de flûtes, chacun des pains représente environ 80 gr. de pain ordinaire et renferme une faible proportion d'hydrocarbures.

**Indications thérapeutiques.** — Le Pain Massé « Sana » est spécialement recommandé pour les Diabétiques et insuffisances du foie, la suralimentation sous un faible volume et les obèses. Remplace la biscotte pour le café au lait du matin.

Il se fabrique sans chlorure pour albuminuriques et arthritiques.

Pâtes spéciales pour Diabétiques, Arthritiques.

**Société des Produits « Sana »**

GAILLAC (Tarn).



## **PAIN REDEUIL**

### **Pain de régime.**

Préparé avec des procédés de fabrication spéciaux, diastasé, le PAIN REDEUIL fournit à l'organisme des aliments féculents après les avoir préalablement ramenés à une forme particulièrement apte à l'assimilation. (Transformation, par fermentation, des glucoses et saccharoses en hydrates solubles et complètement inoffensifs.)

Ne donne aucun excès de sucre, ni dans le sang, ni dans les sécrétions.

De digestion facile, il est parfaitement bien toléré par l'estomac et ne provoque pas de constipation.

De goût très agréable, comparable au pain de gruau du commerce, il ne rebute pas les malades soumis au régime, comme les biscottes, les biscuits, etc...

### **Pain frais.**

En pains de 100 grammes, se conservant une dizaine de jours, ce qui permet de l'expédier à de longues distances.

### **Pain de conserve.**

Préparé suivant les mêmes principes que le pain frais, de conservation pratiquement illimitée.

### **Biscuits aux amandes.**

### **Aliments de régime.**

Pâtes alimentaires, Chocolat, Farines, Sucre Excelsior.

### **Établissements REDEUIL**

7, rue Couche — PARIS (XIV<sup>e</sup>). — Tél. : Gob. 53-74.

## **PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT**

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

### **Pour tous régimes.**

Pain Essentiel avec ou sans chlorure (voir article spécial).

### **Dyspepsie, entérite.**

Pains grillés, Longuets et Gressins.

### **Constipation.**

Pain complet.

### **Obésité.**

Gressins, Pain Essentiel.

### **Diabète.**

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 p. 100). Spécial diabétique (régime normal, 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés).

### **Albuminurie, arthritisme.**

Pain hypoazoté, Biscottes, Longuets et Gressins sans sel.  
Pain des villes d'eaux.

**Pain de Royat** (cœur, vaisseaux), **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires), **Pain de Châtel-Guyon** (constipation), **Pain de St-Nectaire** (albuminurie), **Tranches de Plombières** (estomac, intestins), **Pain de Brides** (obésité), **Pain de Vittel** (arthritisme), **Pain d'Evian** (néphrites, artériosclérose).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

### **Produits de Régime HEUDEBERT**

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## PANBILINE

**Formes.** — Pilules et Solution.

**Définition.** — La Panbiline, spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, agit simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

**Composition.** — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glyciné: Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

**Doses moyennes.** — 6 pilules de Panbiline ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. Demi-dose pour les enfants.

Prix au public :

12 francs la boîte de pilules de Panbiline.

17 francs le flacon de Panbiline liquide.

**Laboratoire du Docteur PLANTIER**

ANNONAY (Ardèche).

# PANCARBO HARDY

Charbon Polyvalent actif

Deux formes :

Granulé fondant. — Comprimé friable.

Association des trois charbons actuellement employés en thérapeutique : animal, végétal, végétal actif (acti-carbone)

	Granulé	Comprimé
	1 cuillerée à café contient environ 0 gr. 90 de char- bon polyvalent.	Chaque Comprimé est dosé à 0 gr. 45 de charbon polyvalent.
Charbon végétal .....	0 gr. 25 } 0. 90	
Charbon actif (acti-carbone) .....	0 gr. 25 } Charbon	
Charbon animal pur .....	0 gr. 40 } total	
Formine .....	0 gr. 10	
Carbonate de Chaux .....	0 gr. 10	
Bromure de Sodium .....	0 gr. 10	
Teinture de Belladone .....	2 gouttes	
Essence de Menthe et d'Anis. . . }	Q. S.	
Sucre .....		

2 Comprimés  
correspondent à une  
cuillerée à café de  
granulé.

**Indications.** — Toutes les infections et intoxications gastro-intestinales, anti-acide. Sédatif des algies gastriques et intestinales. Digestions difficiles ou douloureuses.

**Posologie.** — Après chaque repas, croquer à sec ou diluer dans un peu d'eau 1 à 2 cuillerées à café de granulé ou 2 à 3 Comprimés.

**Prix.** — 12 fr. la boîte de granulé ou de Comprimés assurant huit à dix jours de traitement normal.

**Laboratoires Paul HARDY**

Docteur en Pharmacie, Ancien interne des Hôpitaux  
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V<sup>e</sup>). Tél. : Gobelins 36-96.

## PANCRÉANNE

**Composition.** — Association de poudre de pancréas, pancréatine, tanin, sous forme de comprimés.

**Action thérapeutique.** — Assure la digestion totale des différentes sortes d'aliments, régularise la sécrétion intestinale, excite la sécrétion interne des Ilots de Langerhans.

**Indications.** — Dyspepsie. — Entérites. — Insuffisances digestives. — Diabète (cure d'entretien et de remplacement de l'insuline injectable).

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés à la fin des repas.

Prix au public : 15 fr. 80.

**Laboratoire des VALÉROMENTHOL**

10, rue Poncelet — PARIS.

Tél. : Wagram 37-58.

## PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

**Caractéristiques.** — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe, ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

**Indications.** — Digestions difficiles et prolongées. Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

**Chez le nourrisson.** — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

**Doses.** — Enfants jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillers-mesures par jour. Grands enfants ou adultes : 6 à 12 cuillers-mesures par jour.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires DEFRESNE**

19, rue Jacob — PARIS.

## PANCRÉATOSE IDON

C17 H19 AzO <sup>3</sup> HCl . . . . .	0 50
Na Cl . . . . .	30
Carb. Ca . . . . .	50
Lactose . . . . .	30
Pancréatine . . . . .	25
Mg . . . . .	15
Na H CO <sup>3</sup> . . . . .	850

Poudre, cachets et granulé cacaoté à base de pancréatine, lactose, magnésie, chlorure de sodium, essence d'anis et un calmant.

**Indications.** — Maladies d'estomac, du foie, et des intestins.

Gastrite, gastralgie, urticaire, fermentations intestinales, dermatose, aérophagie, auto-intoxication, insuffisance hépatique.

Prix : Poudre et cachets : 10 fr. au public.

Granulé : 14 fr. au public

**Laboratoire Idon BLOCH \***

**Docteur en Pharmacie**

89, rue Saint-Georges — NANCY

## PANCRÉBILE

### Composition :

Bile décholestérinée, dépigmentée.....	0,20
Extrait total de <i>Pancréas</i> .....	0,10
Extrait total des glandes de l' <i>Intestin</i> .....	0,05
<i>Oléate de soude</i> .....	0,05
Podophyllin ( <i>Peltatum</i> )... quatre milligrammes	
Excipient alcalin q. s. p., une dragée lenticulaire, glutinisée.	

**Indications.** — Foie, Intestin, Constipations, Dermatoses.

**Posologie.** — 2 à 3 dragées avant ou après les repas.  
Constipation : 4 dragées au coucher.

Avaler sans croquer.

Dragées glutinisées. Prix : 14 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 88-1.

**Laboratoires du Docteur E. AUBERT**

3, place Jussieu — PARIS (V°).

Approvisionnement pharmaceutique pour la France  
O. C. P., Paris.

## PANCRÉPATINE LALEUF

### Capsules glutinifiées.

**Composition.** — Extrait spécial de *Pancréas* activé par addition de *Suc hépatique* et analgésine. Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — Opothérapie du *Diabète* par médication interne. Sous l'influence de la *Pancrépatine*, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie ;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie ;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal ;
- 4° Disparition des troubles secondaires, soit, polyurie, prurit, etc. ;
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

**Mode d'emploi et doses.** — Les capsules de *Pancrépatine Laleuf* doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures suivant prescription médicale.

Etui de 100 capsules : 24 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV°).

**PANCRINOL**

Asthénies, convalescences, surmenages,  
toutes déficiences.

**HÉPACRINE**

Anémies graves, insuffisances hépatiques.

**Inogyl**

Troubles de la puberté, de la menstruation,  
de la ménopause.

**Inorénol**

Néphrites, albuminurie, azotémie.

**Laboratoires du Docteur DEBAT**

60, rue de Prony — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## PANFÉBRINE

*Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres.*

**Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur.**

**Traitement du paludisme : Panfébrine AB.**

**Spécifique de toutes les pyrexies : Panfébrine B.**

**1° Panfébrine B (toutes fièvres).**

**Composition.** — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

**Son rôle.** — Antithermique dans toutes les *pyrexies*.

**Action.** — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants ;

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiéntérie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

**Posologie.** — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (peut être renouvelée 2 à 4 fois en 24 heures).

**2° Panfébrine AB (paludisme).**

**Composition.** — Panfébrine A : Acide méthylarsénique  $\text{As} = \text{O}-\text{CH}^3 (\text{OH})^2$ . Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébrine B : Composition indiquée ci-dessus.

**Son rôle.** — Action spécifique dans le paludisme (n'occasionne jamais d'accidents quinquiques).

**Avantage.** — Innocuité absolue.

**Posologie.** — Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — *Enfants* : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour ; de 7 à 8 ans, 1 cachet-comprimé B par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n<sup>os</sup> 586-11 et 586-12.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>)

Tél. : Roquette 14-12.



## PANGADUINE

### Bloc total de Vitamines et Principes actifs des Foies de Morues.

**Composition.** — La *Pangaduine* contient tous les alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, vitamines et principes actifs des foies de morue.

Elle permet d'absorber, sous un petit volume et sous une forme de goût très agréable, la valeur d'une grande quantité d'huile de foie de morues.

**Indications** (Fatigue générale). — Les indications de la *Pangaduine* sont celles de l'huile de foie de morue que peu d'enfants et de grandes personnes tolèrent.

C'est le médicament par excellence des enfants et des jeunes gens déprimés par une croissance difficile ou trop rapide, des neurasthéniques, des convalescents et de toutes les personnes fatiguées par un travail excessif ou pour toute autre cause.

C'est le médicament à prescrire dans l'insuffisance hépatique.

**Action.** — La *Pangaduine* agit :

1<sup>o</sup> Comme stimulant de la nutrition et de la circulation ;

2<sup>e</sup> Comme diurétique.

Au bout de quelques jours de traitement on remarque toujours le retour de l'appétit et la reprise des forces.

Deux formes agréables et actives :

*Adultes* : Pangaduine Elixir : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

*Enfants* : Pangaduine granulée. 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas selon l'âge.

**Docteur MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## PANGASTROL

Pansement de l'Estomac.

**Composition.** — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

**Forme.** — Sachets de 10 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

**Indications.** — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Prix : 14 fr.

**Laboratoire STOULS**

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Téléphone : Passy 68-14.

## PANGESTYL NARTY

**Nature et action.** — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

**Indications.** — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées. Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

**Formes et Mode d'emploi.** — *Granulés ou Cachets.* Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des maux dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

*Granulés* : 15 francs.

*Cachets* : 12 francs.

**Laboratoires Georges TINARD**

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII°).

## PANGLANDINE

**Description.** — Capsules glutinisées de 0 gr. 25 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaires, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales, thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

**Action thérapeutique.** — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour dans la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxoedème, l'infantilisme.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

---

## PANLABYL

Extraits biliaires, Ferments lactiques, Pancréatine, Cynara Scolymus, Palicoura.

**Posologie.** — 4 comprimés par jour un peu avant les repas, midi et soir.

En cas de dysenterie grave, la dose peut être augmentée, sans inconvénient, jusqu'à 10, 12 ou 14.

**Indications.** — Dysenteries, Dysenterie amœbienne, Infection intestinale, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Cholécystite, Angiocholite.

*Entérites à forme dysentérique.*

Le tube : 10 francs. Traitement normal : 10 jours.

**Laboratoire P. BASUYAUX**

94, rue Pasteur

FONTENAY-S.-BOIS (Seine).

## PANOSTYL

Régénérateur total

à base de sang pur de pur-sang boulonnais.

Renferme l'hémoglobine totale et les hormones en solution dans le plasma sanguin dilué-fluoruré.

**Anémie, Tuberculose, Dénutrition, Croissance, Surmenage, Convalescences, Paludisme, Déchéances organiques.**

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules. Voie buccale, réalisant l'opothérapie sanguine intégrale.

**Posologie.** — 2 ampoules par jour aux repas.

*Aucune contre-indication.*

Prix de vente au public : 18 francs.

Littérature et échantillons :

Pharmacie biologique

**G. COMBASTEL**, pharmacien,

**F. RICHSHOFFER**, successeur.

Fournisseur des hôpitaux.

57, rue Mathurin-Régnier — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## PANSOLANÉE

**Composition.** — Extrait de belladone spécialement titré.

**Indications.** — Excellent médicament susceptible d'apaiser l'état nerveux des malades anxieux, quelle que soit l'origine de cette anxiété, elle est la médication apaisante par excellence en ce sens qu'elle apaise l'excitation nerveuse de ces malades en même temps qu'elle calme les douleurs qu'ils ressentent et leur rend confiance.

**Mode d'emploi :**

*Ampoules :* 1 injection sous-cutanée par jour.

*Comprimés :* 2 à 3 par jour.

*Suppositoires :* 1 par jour le matin ou le soir de préférence après une selle.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

## PANSTOMASE

**Méthodes de Castle et de Whipple associées.**

**Composition.** — Extrait de foie de veau ; Extrait et suc frais de muqueuse d'estomac, d'antrum pylorique et de jejunum de porc. Renferme donc, outre tous les principes antianémiques, tous les ferments digestifs à l'état naissant, notamment la Pepsine et la Sécrétine.

**Indications.** — Toutes les Anémies, Cirrhoses du foie, Cholécystites et enfin dans les Achylies, Dyspepsies, Gastrites chroniques hypoacides, Entérocolites, Diarrhées.

Pas de contre-indications, sauf en cas d'hyperacidité gastrique due à certains ulcères, catarrhes ou névroses de l'estomac.

**Posologie.** — Ampoules buvables de 5 cc. : 1 à 3 par jour, aux repas.

Prix de la boîte de 10 ampoules buvables de 5 cc. : 28 francs.

**Laboratoires GENEVRIER**

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).

## PANTHÉSINE « SANDOZ »

Para-aminobenzoate de N. diéthyl-leucinol.

Anesthésique local pour l'anesthésie par infiltration, par badigeonnage, régionale, rachidienne.

**Propriétés.** — Rapidité, intensité et longue durée de l'anesthésie. Tolérance parfaite. Suites opératoires indolores. Trois fois moins toxique que la cocaïne ; toxicité relative inférieure à celle de la novocaïne.

**Présentation.** — Ampoules à 0,25 et à 0,5 p. 100 avec et sans adrénaline. — Solution à 10 p. 100 pour l'anesthésie par badigeonnage. — Collyre. — Poudre.

**BAUME PANTHÉSINE :** Calmant analgésique non révulsif pour toute douleur et névralgie accessible extérieurement et pour toute démangeaison.

Tubes de 10 et de 20 grammes.

**Produits SANDOZ**

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## **PANTOPON « ROCHE »**

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon « Roche »  
= 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,  
= 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,  
= 0 gr. 005 mgr. de morphine.

### **Posologie et modes d'emploi.**

Voie buccale :

#### **PANTOPON « ROCHE » SIROP**

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

*Adultes* : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

*Enfants* : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

#### **PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS**

(1 comprimé = 0,01 ctg. de Pantopon « Roche »).

*Adultes* : 1 à 3 par jour et plus.

*Enfants* : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

Voie Hypodermique :

#### **PANTOPON « ROCHE » AMPOULES**

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche »).

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules.

*Adultes* : 1 à 2 par jour et plus.

*Enfants* : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## PANVITA

### Vitaminothérapie intégrale.

**Composition.** — Vitamines A, B, B', C, D, E, associées aux acides aminés nobles.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent d'équilibre et de résistance aux infections, favorise la croissance.

**Mode de présentation.** — Comprimés immédiatement solubles.

**Indications.** — Troubles de croissance, Prétuberculose, Convalescence, Toutes les carences.

**Posologie.** — *Nourrissons* : 2 comprimés par jour.  
*Enfants* : 4. — *Adultes* : 6.

Prix : 18 francs.

**Laboratoire A. DEFFARGE**

**Docteur en Pharmacie,**  
2, rue Lauzac — BORDEAUX.

---

## PANXYLON

Immunisation indirecte de l'organisme contre les infections aiguës, subaiguës ou chroniques.

Injectons sous-cutanées, indolores et alternées de :

**Cinnaméine** : Cinnaméine totale du Miroxylon

Pereirae..... 0 gr. 10  
Oléum olivae neutrum deshydratée..... 5 cc.

**Campholine** : Camphorate de choline..... 0,01

Soluté physiologique stabilisé de camphre *droit*.

### Pharmacodynamie :

Notre *Cinnaméine* totale est extraite directement du Baume du Pérou, dont elle contient tous les principes actifs et *naturels*.

Elle est donc plus active que le seul Cinnamate de Benzyle préparé *synthétiquement*.

La Cinnaméine a une action bactéricide et leucocytaire intense (BROWN SÉQUARD).

La *Campholine* joint à son pouvoir cholestérinogène son action toni-cardiaque exempte de choc et une hyperglobulie intense (augmentation de 40 p. 100 du nombre des globules rouges).

L'association de ces deux produits en une synergie médicamenteuse constitue le traitement de choix de :

### Indications :

Septicémies, Leucopénies, Pyrexies, Maladies infectieuses, gripes, convalescences, anémies, asthénies, amaigrissements, cachexies, lymphatisme.

Adénites aiguës et chroniques, fistules.

Immunisation indirecte de l'organisme contre toutes les infections pulmonaires, spécifiques ou non.

Tuberculoses médicales et chirurgicales.

### Mode d'emploi :

Une ampoule CAMPHOLINE le matin, suivie le lendemain d'une ampoule CINNAMEINE, que l'on aura fait tiédir légèrement au préalable.

### Forme et prix au public :

Le PANXYLON existe en boîtes de :

8 ampoules de 2 cc. 5	4 amp. A ; 4 amp. B	16 fr.
8 — 5 cc.	4 — A ; 4 — B	19 fr.
12 — 5 cc.	6 — A ; 6 — B	25 fr.

La CAMPHOLINE existe en boîte séparée de 6 ampoules de 5 cc. et 6 ampoules de 2 cc. 5 (16 fr. et 12 fr.)

**Laboratoires Emile, LOGEAS**

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. Auteuil 40-15 et 40-16.



## PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Ferment digestif, énergétique, extrait du suc du *Carica Papaya*, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

**Indications.** — Toutes les fois que l'on digère mal.

*Pour les Adultes :*

**Elixir** « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 18 fr.  
Un verre à liqueur après chaque repas.

**Cachets** « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.  
Un à deux cachets à chaque repas.

**Comprimés** « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.  
Deux à huit comprimés à chaque repas.

*Pour les Enfants :*

## SIROP DE PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication. Prix au public : 18 fr.

Bien formuler : *Elixir, Sirop, Cachets, Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**  
15, rue des Immeubles-Industriels, 15  
PARIS (XI<sup>e</sup>).

## PAPAVERYL

Comprimés de Chlorhydrate de Papaverine chimiquement pur dosés à 4 centigrammes.

Toxicité très minime (le moins toxique des alcaloïdes de l'opium). Contrôle physiologique. Ne fait plus partie du tableau B.

**Indications.** — *Tous les spasmes musculaires lisses.* Résultats particulièrement remarquables dans : l'hypertension, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérocélite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée, etc...

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés par jour et plus (la toxicité chez l'homme est extrêmement faible); chez l'enfant, 1/4 de comprimé par année d'âge (1 centigramme). Mieux supporté et plus actif que la belladone.

**Présentation.** — Tube de 20 comprimés dosés à 4 centigr. par comprimé.

Boîtes de 6 et 12 ampoules de 2 cc. dosées à 2 centigrammes par cc.

Littérature sur demande. Thèse Baconnet 1927, Paris ; Rosenberg Mendel Wolf 1929, Paris.

**Laboratoires ORRILLARD**

245, rue de Vaugirard — PARIS.

Tél. : Ségur 41-59.

## **PAPIER IODOGÈNE EYMONNET**

### **à l'Iode naissant**

**Toute la révulsion.**

**Depuis la rubéfaction jusqu'à la vésication.**

**Remplace :** Vésicatoires, Sinapismes, Ventouses, Coton iodé.

**Aucune contre-indication.** Non toxique pour le rein.

**Mode d'emploi.** — Tremper une feuille dans un peu d'eau. L'Iode naissant apparaît. Appliquer à l'endroit voulu et recouvrir de la feuille imperméable incluse dans la pochette.

**Durée d'application.** — 2 à 5 minutes : Rubéfaction. — 5 à 10 minutes : Révulsion simple. — 10 à 20 minutes : Révulsion moyenne. — 30 à 40 minutes : Révulsion forte (légère vésication); au delà : vésication.

**Indications.** — Toutes affections pulmonaires et pleurales. Tous rhumatismes. Toutes névralgies, lumbagos, sciaticques.

La pochette, 2 feuilles. Prix : 6 fr.

**Laboratoire du Papier Eymonnet**

139, Cours Tolstoï, Villeurbanne — LYON (Rhône).

---

## PARADOL

(Dragées)

Calmant, antispasmodique (sans opium ni aucun sédatif narcotique), cholagogue et diurétique.

**Indications.** — *a.* Suppression rapide de la douleur dans les affections Hépatiques (Col. hépat.), Rénales (Col. néphr.), Génitales (Spasmes des accouchées), Rhumatismales ;  
*b.* Traitement polyvalent des manifestations arthritiques.

**Forme et Composition.** — Dragées sans sucre (sans inconvénient pour les diabétiques) contenant : Bicarbonate, Salicylate et Oléate de soude, Glycérine, Bile décholestérinée et dépigmentée, Extraits d'Artichaut, Boldo, Buchu, Pichi, Piscidia, Uva-Ursi, Maïs. L'action sédative ne revient à aucun des composants en particulier, mais à leur combinaison.

**Posologie.** — *Cas aigus* (Coliques hépatiques et néphrétiques, Douleurs rhumatismales, Spasmes utérins, etc...) ; au moment des douleurs, sans se préoccuper des repas, prescrire, de quart d'heure en quart d'heure, une dragée de PARADOL, à prendre avec un peu d'eau (maximum 5 *pro die*).

*Etats chroniques* (traitement de cure et d'entretien) : pendant deux ou trois semaines par mois, prescrire 3 à 5 dragées par jour, de préférence en dehors des repas.

Prix : 15 francs la boîte.

(8 à 12 jours de traitement suivi.)

## PARADOLINE

(Solution)

Même formule que PARADOL (moins Bile et Oléate de soude), et mêmes indications.

**Posologie.** — Un verre à madère correspond à une dragée de PARADOL.

Prix du flacon de 1/2 litre : 16 francs.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## PARAGELOSE

### Composition :

Emulsion pure d'huile de paraffine et de mucilages décellulosés. Goût agréable. Sans phénolphtaléine, sans drastiques.

### Indications :

Toutes les constipations, spasmes, etc...

### Posologie :

Une à trois cuillerées à bouche par jour au moment des repas.

Prix du flacon : 18 francs.

### Produits PASSEUR

11, rue de Clichy — PARIS

(Trinité 23-84).

## PARALACTINE BYLA

Deux formes actives :

**Comprimés sur lactose.**

**Culture pure sur lait.**

**Composition.** — La *Paralactine Byla* est constituée par une culture de ferments lactiques, d'activité et de stabilité contrôlées.

**Indications.** — Entérites aiguës et chroniques des enfants et des adultes, eczéma, urticaire, acné, herpès, toutes affections de la peau, et tous phénomènes consécutifs à l'auto-intoxication d'origine intestinale.

**Mode d'emploi.** — *Comprimés* : 1 à 3 comprimés dissous dans un peu d'eau sucrée, froide ou tiède, trois fois par jour.

**Culture sur lait.** — Quatre cuillerées à café par jour, délayées dans un peu d'eau lactosée.

### Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## PARALAXOL TULIVET

Paraffine liquide. Marque Française.

**Composition.** — Huile de Paraffine extra-pure entièrement exempte de dérivés phénoliques et benzéniques, de densité élevée, neutre, de goût agréable.

**Forme.** — 1° *Liquide* aux divers arômes (Anis, Menthe, Citron) ou sans arôme.

2° *Capsules.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Lubrifie et réédue l'intestin ; aucune action sur les muqueuses. Rendue intégralement dans les selles. Action laxative mécanique.

### Doses ;

1° **Capsules :** 3 à 6 par jour ; 1 ou 2 au début de chaque repas.

2° **Liquide :** au début du repas (1 à 3 fois par jour).

Adultes : par cuillerée à soupe.

Enfants : par cuillerée à café.

Nourrissons : par 1/2 cuillerée à café.

Se vend en flacons, demi-flacons et litres.

### Laboratoires TULIVET

G. DE SAINT-STÉBAN, docteur en pharmacie  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

## PARATHYROCALCINE

### « MONCOUR »

#### REMINÉRALISATION

Fixation des SELS de CALCIUM  
par l'utilisation, comme *MORDANT*,  
de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

**Indications.** — Prébacillose, bacillose, scrofule, convalescence, croissance, fractures, affections osseuses, décalcification dentaire, et, en général, toutes affections avec déminéralisation.

*Notre Extrait total Parathyroïdien, élément essentiel de la médication, est préparé avec des glandes soumises à un contrôle histologique régulier.*

Cachets : 1 à 3 par jour.

Comprimés : 2 à 6 —

### Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS,  
Tél. ; Molitor 08-47.

## PARATONE LEO

**Composition.** — (Paraffin. chloretone comp.)  
contient par 100 grs. :

Chloretone .....	1,00
Camphora .....	2,50
Menthol.....	2,50
Ætherol. cinnamomi .....	0,25
Paraffin. liquid.....	93,75
Total.....	100,00

**Indications.** — Catarrhe du nez et de la gorge, asthme, fièvre des foins, rhume, laryngite.

### Présentation :

- 1° Liquide en flacon de 30 cmc.
- 2° Liquide en flacon de 100 cmc.

**Mode d'emploi.** — Faire des pulvérisations.

Représentant Dépositaire Général :

**ED. JUST**

11, Square Marie-Louise — BRUXELLES.  
Tél. : 12.28-04.

## PARATYRONE

**Composition.** — La Paratyronne est l'hormone parathyroïdienne, physiologiquement titrée (1 cc. = 20 unités).

**Indications thérapeutiques.** — La PARATYRONE est indiquée dans toutes les insuffisances parathyroïdiennes, soit dans toutes les tétanies et les états spasmodiques, l'ostéomalacie, les *ulcères digestifs*, les troubles trophiques cutanées, le *rhumatisme chronique*, les diarrhées des tuberculeux, les symptômes d'insuffisance parathyroïdienne, etc...

**Présentation et posologie.** — La PARATYRONE est présentée en flacons de 5 cc. contenant 100 unités, soit 20 unités par cc. et en ampoules (boîte de 12) de 10 unités par ampoule de 1 cc. Une injection quotidienne de 1/2 à 1 cc., sous-cutanée.

Dans certains cas, il sera utile d'ajouter aux injections de PARATYRONE une cure par l'IRRASTERINE BYLA (ergostérine irradiée) dont on sait la puissance comme fixateur du calcium.

**Les Etablissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## PARLAX

Huile de Paraffine pure de haute viscosité.

**Description.** — *Parlax* est la reine des huiles de Paraffine. Inodore et insipide, limpide comme le cristal de roche, sa pureté est absolue.

**Indications.** — Son onctuosité et sa viscosité remarquables lui permettent d'assurer le rythme de l'évacuation intestinale. *Parlax* doit être prescrit : Dans tous les cas de constipation, entérites, appendicite, hémorroïdes ; aux opérés, aux femmes enceintes, aux nourrissons.

**Doses.** — *Adultes* : 1 cuillerée à potage deux fois par jour.

*Enfants* : 1 cuillerée à café deux fois par jour. De préférence pendant les repas, dans les purées de pommes de terre, de légumes secs, avec les épinards, endives et salades cuites, etc. Dans la salade assaisonnée au jus de citron. Dans les confitures, compotes de fruits.

**Laboratoires F. LATOUR**

71, rue Douy-Delcupe  
MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine).

---



# PAROLAGAR

(Marque déposée.)

Le Parolagar est une émulsion perfectionnée de 65 % d'huile de paraffine et d'agar-agar.

## Formes thérapeutiques et indications :

N° 1. *Parolagar simple* (étiquette bleue),

Huile de paraffine.....	65 %
Agar-agar, eau distillée.....	35 %
	<hr/> 100 %

Traitement de choix de la constipation habituelle, doit être employé à la suite du Parolagar phtaléiné, lorsque l'habitude de l'évacuation à heure fixe aura été provoquée.

N° 2. *Parolagar phtaléiné* (étiquette rouge).|

Huile de paraffine .....	65,00 %
Phénolphtaléine.....	0,32 %
Agar-agar, eau distillée ...	34,68 %
	<hr/> 100,00 %

Renferme la dose prudente de 5 centigrammes de phénolphtaléine par cuiller à potage.

Indiqué comme traitement d'attaque de la stase chronique et surtout pour les malades ayant abusé de purgatifs. On lui substituera la forme simple dès que l'habitude de l'évacuation régulière aura été obtenue.

## Posologie.

*Adultes* : Une cuillerée à soupe le soir, ou matin et soir, après le repas si nécessaire. Peut être pris dans de l'eau ou du lait.

*Enfants* : Une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe. Peut être mélangé aux aliments ou au biberon.

Pas de suintement. Pas d'accoutumance.

**LABORATOIRES DU PAROLAGAR**

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

## PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

**Indications.** — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

**Posologie.** — 3 *prises par jour* (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

Enfants de moins de 1 an ....	X à XXX gouttes.
— de 1 à 5 ans.....	XX à LX gouttes.
— de 5 ans et au-dessus.,	XX à C gouttes.
Adultes .....	XXX à C gout.

Prix : 11 francs.

**THIRIET et C<sup>ie</sup>**

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

---

## PASSICARBONE

**Charbon animal purifié, Charbon végétal,  
Charbon végétal activé.**

L'étude comparative des différents charbons utilisés en thérapeutique démontre que, suivant leur porosité, leur texture capillaire et leur origine, ils semblent avoir des propriétés variables d'absorption et d'adsorption. On a donc intérêt à associer les trois charbons. C'est à cette formule que répond le *Passicarbone*.

La désinfection de l'intestin doit être plus l'œuvre de moyens mécaniques doux et prolongés que de moyens chimiques : l'emploi associé de dérivés phénolés, naphtolés ou méthylés risque à la longue de déclencher des typhlo-colites douloureuses. D'autre part, l'atteinte latente ou patente de la cellule hépatique ou rénale au cours des infections intestinales contre-indique l'action prolongée d'un désinfectant chimique illusoire, mais dangereux pour l'intégrité des parenchymes essentiels. Nous n'avons donc pas retenu l'association de nos charbons avec des désinfectants chimiques.

### Usages :

*Intoxications.*

*Affections stomacales :* Gastrite infectieuse, Ulcère, Gastrite post-anesthésique, Gastro-entérite, Aéro-phagie, Pyrosis.

*Affections intestinales :* Colite ou Typhlo-colite, Colibacilloses, Diarrhées diverses, Entérite, Grippe à forme intestinale et états intestinaux toxico-infectieux, Fermentations intestinales.

*Affections hépatiques :* d'origine microbienne (Ictère etc.).

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café après chaque repas

Prix : La boîte, 15 francs.

**Laboratoires G. REAUBOURG**  
2, rue Boucicaut — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états  
névropathiques.

**Composition.** — Une cuill. à café contient  
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*  
*nata* ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;  
XX gouttes alcoolé de *Cratægus oxya-*  
*cantha*.

**Action.** — La *Passiflore* diminue la tension  
artérielle, régularise l'influx nerveux dans  
le domaine du grand sympathique et est un  
sédatif et un antispasmodique de premier  
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la  
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin  
que les auteurs américains ont comparé  
au bromure, et par le *Cratægus* dont l'ac-  
tion tonocardiaque et équilibrante du sys-  
tème nerveux est bien connue (Huchard,  
Renon, H. Leclerc, etc.).

**Indications.** — Tous états névropathiques :  
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-  
somnie nerveuse, troubles fonctionnels du  
cœur d'origine nerveuse (palpitations,  
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la  
vie génitale, etc.

**Posologie.** — Comme médicament équil-  
ibrant du système nerveux : une cuillerée à  
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : une à trois  
cuillerées à café le soir.

**G. RÉAUBOURG**, docteur en pharmacie,  
2, rue Boucicaut — PARIS (XV<sup>e</sup>)  
Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## PASSIVAL

### Antispasmodique nouveau

(Procédé Elzévir.)

Action *synergique* de la Passiflore et de la Valériane désodorisée. (La Passiflore renforce l'effet de la Valériane.)

Goût agréable.

Effet presque immédiat, et toujours constant.

Expérimenté et adopté dans les hôpitaux et cliniques de Paris.

### Posologie :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Echantillon et littérature au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PASTA PALM

(Le laxatif appétissant.)

**Forme.** — Tablettes à mâcher.

**Composition.** — Essentiellement végétale : Figs, raisins, séné.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Purgatif, Laxatif, Dépuratif.

**Indications.** — Rééducation de l'intestin. Traitement physiologique de la constipation sous toutes ses formes, paresse intestinale.

**Mode d'emploi.** — *Dose laxative.* — *Adultes* : 1 à 1 tablette 1/2, *Enfants* : 1/4 à 1/2 tablette.

*Dose purgative.* — *Adultes* : 1 1/2 à 2 tablettes. *Enfants* : 1/2 à 1 tablette. On croquera la tablette, ou, si l'on veut, on la délaiera dans un peu d'eau ou de lait.

**N. B.** — A prendre de préférence avant de se coucher, l'effet se produisant de 8 à 10 heures après l'ingestion.

A conserver dans un endroit sec et frais.

L'étui de 15 tablettes : 12 francs (en France).

Dépôt général :

**Pharmacie A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## PASTILLES M. B. C.

Chaque pastille correspond à la formule suivante :

### Composition :

Chlorhydrate de cocaïne.....	0,0002
Stovaïne.....	0,0003
Menthol.....	0,005
Borate de soude.....	0,02
Chlorate de potasse.....	0,06
Sucre et gomme Q. S. pour une pastille de 1 gr,	

**Mode d'action.** — Antiseptique, Anesthésique, Cicatrisant.

**Indications.** — Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, stomatites, etc...). — Désinfection de la bouche (fumeurs, haleine fétide, etc...). — Hygiène de la voix (chanteurs, professeurs, conférenciers, etc...)

**Mode d'emploi.** — 8 à 10 pastilles par jour.

### Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## PATE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.

(Voir à *Sirop Mireille*.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : cocaïne et chlorate de potasse).  
Même saveur plaisante.

Prix au public : 4 fr. 50 (exempt d'impôt).

LABORATOIRES LEGENDRE et C<sup>ie</sup>.

Section D. S. — Houilles (S.-et-O.).

### DÉPOT GÉNÉRAL :

*France, Colonies et Protectorats :*

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

*Belgique :* M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,  
à Bruxelles-Maritime.

## PATE SPECIA

**Granulée antidysentérique**  
selon la formule du **D<sup>r</sup> Ravaut.**

**Indications.** — Formes subaiguës et chroniques de la dysenterie amibienne.

**Présentation.** — Boîte de 150 grammes.

**Posologie et mode d'emploi.** — Cure de 20 jours : un jour sur deux 1 à 4 cuillerées à café de granulés aux deux principaux repas ; le jour intermédiaire, un sel arsenical : **Sanluol** (voir p. 1030) ou **Stovarsol** (voir p. 1137).

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes.)  
Deux formes : Ampoules et Pilules.

**Composition.** — Salicyl - arséni - oxybenzénol-magnésien.

**Indications.** — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancroïde.

**Mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de 1 centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2<sup>o</sup> Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

Prix : Ampoules, 20 fr.; Pilules, 15 fr.

**LABORATOIRES A. LEJEUNE**  
142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## PAVÉRINOL LALEUF

(Capsules glutinisées.)

**Composition.** — Chaque capsule contient très exactement :

Papavérine chlorhydrate.....	0,015
Camphre monobromé.....	0,15

**Propriétés et Indications thérapeutiques.** — Puisant stimulant respiratoire, cardiaque et circulatoire. Le PAVÉRINOL dilate les vaisseaux coronaires, amplifie les contractions cardiaques, diminue l'excitation des fibres musculaires et en empêche la paralysie passagère.

Son emploi est recommandé dans les états infectieux et spasmodiques entraînant une insuffisance cardiaque.

**Doses et mode d'emploi.** — De 4 à 6 capsules par jour, suivant les indications du médecin traitant. Maximum : 10 à 12 dragées par 24 heures.

Etui de 60 capsules : 20 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium)

*Hypnotique, sédatif, analgésique.*

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.

Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

**Indications.** — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

**Formes et posologie.** — *Ampoules de Pavéron* dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.

*Dose* : 1 ampoule à la fois.

*Dragées de Pavéron* dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. — *Dose* : 1 ou 2 dragées à la fois.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## PAXENE

**Trois synergies phytothérapiques.**

**Sédatif Nervin :** Valériane et Cypripedium.

**Antispasmodique :** Chaton de saule et Passiflore.

**Cardiotonique :** Cereus grand. et Aubépine.

**Indications :** Névropathies, Cardiopathies, Insomnies nerveuses.

**Doses. —** *Insomnies nerveuses* : 2 à 3 cuillerées à café le soir, pur ou dans un peu de tisane.

*Nervosisme en général* : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

**Médication très active, agréable, non toxique et sans accoutumance.**

Prix au public : 16 fr.

**A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

## PECTHIONOL

**Forme. —** Sirop.

Une forme adulte à 10 fr. — Une forme enfant à 8 fr.

**Composition. —** Thiocol, Benzoate de soude, Teint. de Drosera, Teint. d'Aconit, Teint. de Jusquiame, Teint. d'Extrait thébaïque, Eau de laurier-cerise, Sirop off. de Bromoforme, Sirop de Desessartz, Sirop de Tolu.

**Indications. —** Toutes affections broncho-pulmonaires, Bronchites aiguës et chroniques, Tuberculose, Grippe, Pneumonie, Toux rebelles, Asthme.

La forme « enfants » donne des résultats constants dans la coqueluche.

**Laboratoire MANSEAU**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Ancien préparateur et lauréat de la Faculté de Médecine et Pharmacie de Bordeaux.

MARGAUX (Gironde).

## PECTOBIOL

### Comprimés.

Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin et contenant :

Dionine .....	0,003
Tribromophénol .....	0,02
Terpine.....	0,10
Thiocol .....	0,15
Benz. de soude.....	0,10
Extrait d'aconit et belladone, àà...	0,005

Par comprimé glutinisé.

**Indications.** — Toux de toute nature. Puissant sédatif, expectorant. Gripes et Toux post-grippales, Asthme, et toutes affections des voies respiratoires.

**Doses :** 4 à 6 comprimés par jour. — *Adolescents :* 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 11 francs.

**Laboratoire FOSSET**

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (S.-et-O.).

## PECTOFORME GODART

Sédatif de toutes les toux non expectorantes.

(Voir à « Sulfocol Godart » pour les Toux expectorantes).

**Formule.** — Chaque comprimé dragéifié contient :

13 mgr. de Phosphate de Codéine. — 45 mgr. de Bromoforme. — 5 mgr. d'Extrait d'Aconit. — 15 mgr. de Poudre de Belladone. — 80 mgr. d'Hydrate de Terpine. — 80 mgr. de Baume de Tolu. — 80 mgr. de Benzoate de Soude.

**Action.** — Le comprimé médicamenteux est enrobé dans une cellule de gluten qui ne permet la libération des principes actifs que dans l'intestin et non dans l'estomac, ce qui assure une innocuité absolue au bromoforme.

### Posologie :

*Adultes :* jusqu'à 8 dragées en 24 heures.

*Enfants (à partir de 4 ans) :* jusqu'à 4 dragées en 24 heures.

Prix :

Le tube de 40 dragées.....	26 fr. belges.
— — 20 — .....	16 fr. —

Littérature et échantillons :

Laboratoire de la Meuse, Andenne (Belgique)  
**LEON GODART, Pharmacien.**

## PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares.

Traitement des Bacillooses subaiguës ou chroniques et des « Déficiences organiques ».

**Injections intraveineuses :**

Pélospanines A, ampoules de 2 cc.

Pelospanines B, ampoules de 4 cc.

**Injections intramusculaires :**

Pélospanines C, ampoules de 2 cc.  
(associat. lipoïdique).

**Pélospanines G. (gouttes) dites : Pelo G.**  
(Didyme, Calcium, Manganèse, Magnésium.)

Prix : A : 12 fr. — B : 18 fr. — C : 12 fr.

G : 15 fr.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## PENNÈS (Produits).

**Sel de J.-A. Pennès :**

« **Véritables bains de mer chauds.** »

Hygiénique, reconstituant, stimulant. Remplace les bains alcalins et ferrugineux et surtout les bains de mer.

Nouveau conditionnement en étui léger, souple, facile à vider, imperméable, assurant la conservation indéfinie.

**Gynécologie.** — Préventif des vergetures par assouplissement des fibres élastiques du derme :  
« Stimule les nouveau-nés chétifs ».

**Vinaigre de J.-A. Pennès.**

« **Le seul vinaigre antiseptique salicylé.** »

Hygiénique, désinfectant, rapport favorable de l'Académie de Médecine. Gynécologie. Antisepsie.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque. — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

## PENTALUÈS

Complexe arsenical pentavalent de toxicité pratiquement nulle, injectable par voie intra-musculaire ou sous-cutanée.

**Indications.** — Syphilis du nourrisson et du jeune enfant. Syphilis acquise.

### Posologie :

*Chez l'adulte* : une injection de 3 à 5 cc., deux fois par semaine, selon le poids.

*Chez l'enfant* : deux injections par semaine de 1 à 3 cc.

Totaliser 12 injections par série.

### Présentation et prix :

La boîte de 8 ampoules de 5 cc. Prix : 25 francs.  
Ampoules de 1 cc. sur demande.

Echantillons et littérature :

### Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DEINS (Seine).

## PEPIODON HENRY

**Composition.** — Combinaison de la peptone avec l'iode, présentée sous forme de gouttes concentrées renfermant 0,05 d'iode exactement titré par centimètre cube.

Le PEPIODON HENRY est la combinaison idéale de la peptone à l'iode parce que :

1° C'est un produit dérivant d'une *peptone trypsique et érepsique*, donc plus facilement assimilable que la peptone pepsique ;

2° C'est un produit où l'iode y a un dosage toujours constant de 0,05 gr. par cc. ;

3° Le PEPIODON n'est pas décomposé par le suc gastrique et n'irrite donc pas la muqueuse stomacale.

**Doses.** — *Adultes* : 20 à 40 gouttes. Ces doses peuvent être augmentées. Certains médecins prescrivent 100 et 200 gouttes par jour, sans la moindre intolérance.

*Enfants* : 5 à 10 gouttes au plus.

Flacon de 45 cc. : 16 francs.

### Laboratoires HENRY

rue de Sclessin, 39 — LIEGE.

## PEPTALAC

Le nouvel aliment digestif.

Analyse :

Fraîsse.....	22, 5 p. 100
Protéine.....	19. —
Protéine digestible.....	8. —
Lactose.....	31. —
Amidon. Hydrates de carbone.....	10. —
Matières minérales.....	6. 5 —
Eau.....	3. —
	100. 0 p. 100

Les difficultés et les inconvénients attachés à la préparation de lait pré-digéré et peptonisé à l'usage des malades et de tous ceux qui souffrent de faiblesse gastrique ont été enfin surmontés par ce produit hautement scientifique.

Peptalac est un aliment contenant du lait non écrémé et de l'amidon dextrinisé. Il est pré-digéré par un procédé nouveau et séché sur les rouleaux, dont une poudre crémeuse et floconneuse, dans laquelle une proportion de 22 p. 100 de protéine a été peptonisée et de 25 p. 100 d'amidon converti en une forme soluble et d'assimilation facile. Puisqu'il contient une proportion de farine de froment pré-digérée, il constitue un aliment idéal pour le sevrage des bébés de 8 à 9 mois prenant une nourriture plus solide. Le Peptalac se prépare instantanément par la simple addition d'eau chaude, et le patient peut le prendre sans attendre, puisque la pré-digestion a été faite au cours de la fabrication.

Société de Spécialités Diététiques et Pharmaceutiques,  
22, rue des Belles-Feuilles — PARIS (16<sup>e</sup>.)

et W. P. Wrathall.

204, rue Royale. — BRUXELLES

## PEPTALMINE

**Peptones de Viande et de Poisson**

**Extraits d'Œuf et de Lait**

**Farine de blé dans l'enrobage.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

**Indications.** — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, une heure avant chacun des trois repas.

*Enfants* : Moitié de ces doses.

**Prix au public** : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

**D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN**, pharmacien

**21, rue Chaptal — PARIS.**

## PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

**Indications.** — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholécystites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 cuillérées à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

*Enfants* : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**LABORATOIRE  
DES PRODUITS SCIENTIA**  
D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien  
21, rue Chaptal — PARIS.

---

## PEPTODIASE

### Stimulant gastrique

**Forme.** — Gouttes.

**Composition.** — 1<sup>o</sup> Association de :

Chlorure de calcium.

— magnésium.

— sodium.

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2<sup>o</sup> **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

#### **Propriétés thérapeutiques :**

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

**Indications.** — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérogastrie.

Anorexie.

**Posologie.** — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

*Enfants* : IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 15 francs.

#### **Laboratoires du Docteur ZIZINE**

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie —  
Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## PEPTO-FER JAILLET

**Composition.** — Combinaison organique chlorée de peptonate de fer.

**Avantages.** — Le fer dans le PEPTO-FER du Dr JAILLET est *animalisé* par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine dans le torrent circulatoire est rapidement augmenté, sans aucune fatigue, ni pour l'estomac ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle antianaphylactique.

Le PEPTO-FER du Dr JAILLET n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et ne constipe pas.

**Indications.** — *Anémies.*

**Forme pharmaceutique.** — Elixir.

**Doses.** — *Grandes personnes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

*Enfants* : 1 à 2 cuill. à café après les repas dans un peu d'eau.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 14 francs au public.

**DARRASSE**

13, rue Pavée — PARIS.

---

## PEPTOGIL

**Peptones gastriques et pancréatiques.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication antianaphylactique polyvalente spécifique de tous les albuminoïdes.

**Indications.** — Urticaire, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

**Conditions d'emploi.** — 3 fois par jour 1/2 heure avant les repas, 2 à 4 comprimés.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

**Laboratoires PROGIL**

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable contenant des glycéro et de la Kola.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

**Indications.** — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

**Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

---

## PEPTONAL

**Composition.** — PEPTONE de viande totale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

**Action.** — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

**Indications.** — Migraine, somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés dragéifiés. — Granulé.

**Dose.** — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou une cuiller à café de granulé.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires DURET et REMY  
et du Docteur Pierre ROLLAND  
ASNIÈRES (Seine).**

## PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer.

Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas. *Enfants* : 1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstitution du globule rouge du sang.

**Indications.** — Tous les états anémiques et chlorotiques.

**Laboratoires M<sup>ce</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

---

## PEPTONE VASSAL

Viande de bœuf digérée.

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf. Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

**Dose.** — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

**Établissements Léon DANJOU — LILLE.**

## PEPTOSTHÉNINE CHOAY

**Composition.** — Association opothérapique digestive suivant formule :

Poudre gastrique .....	15 cgr.
— entéro-pancréatique ...	15 —
— hépatique .....	15 —
— biliaire .....	5 —

Pour 1 cachet ou 1 comprimé de 50 cgr.

**Indications.** — Troubles dyspeptiques par insuffisance des glandes digestives.

**Mode d'emploi.** — Un cachet ou comprimé à la fin de chacun des principaux repas.

**Prix :** 15 francs la boîte de 24 cachets ou 30 comprimés.

### Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléphone : Auteuil 44-09 et 44-10.

---

## **PERCAÏNE CIBA**

### **Anesthésique local.**

Chlorhydrate de la diéthylène-diamide de l'acide a-butyloxycinchoninique.

Anesthésique local à l'action très intense (10 fois celle de la cocaïne) et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface. Médicalement son action analgésique est précieuse dans le traitement des états douloureux les plus divers.

*Anesthésie par infiltration.* — Solution : de 1 à 2 p. 1.000, additionnée ou non d'adrénaline.

*Anesthésie rachidienne.* — Ampoules de 20 cc. à 1 p. 1500 (Jones), et de 2 cc. à 5 p. 1.000 (Quarella).

*Anesthésie des muqueuses, — de l'urètre, de la vessie.* — Solutions de 1/1.000 à 2 p. 100 (oto-rhino-laryngologie).

### **Présentation :**

Comprimés de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tube de 20 comprimés : 18 francs.

Ampoules de diverses contenances pour infiltration et rachi (demander notice).

## **PERCAÏNAL CIBA**

**Onguent analgésique et antiprurigineux.**

Produit une analgésie sûre et prolongée de toutes les lésions ou éruptions douloureuses de la peau ou des muqueuses. Sa formule associée à la puissante action analgésique de la Percaïne les effets calmants et antiphlogistiques de ses autres composants.

**Indications principales.** — Eczémas, prurigo, crevasses, gerçures, ulcères, zona, prurit anal et vulvaire, fissure anale, hémorroïdes, etc.

Le tube : 12 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

## PERCALCINE

**Composition.** — Association d'arrhéнал, de divers sels de chaux (en particulier du silicate) de fenugrec et de girofle.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant intensif. Augmente l'appétit, l'assimilation, le poids.

**Indications.** — Prétuberculose, tuberculose, anémie, déphosphatation, carence calcique, dépressions nerveuses, Neurasthénie, Croissance difficile, faiblesse musculaire et osseuse, fractures.

Grossesse et allaitement.

### Mode d'emploi :

A prendre 20 jours par mois.

*Adultes* : 3 cachets par jour au milieu des repas.

*Enfants* : au-dessus de 10 ans : 2 cachets ; de 4 à 10 ans : le contenu d'un cachet pris en 2 fois, aux repas de midi et du soir, mélangé aux potages, aliments ou confitures.

### Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Trudaine 45-18.

## PÉRISTALTINE CIBA

Glucoside pur du *Rhamnus Purshiana* (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cc. 1/2).  
Ne produit pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation chronique : formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

*Comprimés — Cachets — Ampoules.*

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 cachets, 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — *Enfants* : 1/2 à 1 1/2 comprimé, 1 cachet. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

La boîte de 20 cachets : 8 fr. 50.

Le flacon de 20 comprimés : 7 fr. 50.

La boîte de 5 ampoules : 18 francs.

La boîte de 20 ampoules : 65 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications.** — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré tuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## PERSODINE LUMIÈRE

Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.

**Constitution.** — Préparation stable à base de Persulfate alcalin pur, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

**Propriétés.** — Active le métabolisme général et crée le besoin de s'alimenter.

La PERSODINE LUMIÈRE réalise l'oxygénothérapie interne par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs, accroît très notablement l'assimilation.

Les aliments ingérés avec faim sous son influence sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde.

**Indications.** — Toutes les fois que pour une cause quelconque l'appétit fait défaut chez une personne malade, ou simplement déprimée : tuberculose, rachitisme, convalescents de maladies aiguës, opérés, chlorotiques, neurasthéniques, hypochlorhydriques, etc.

Éviter l'usage de la PERSODINE LUMIÈRE chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.

**Doses courantes.** — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

Adultes : 3 comprimés.

Enfants de 8 à 14 ans : 2 comprimés.

Enfants de 2 à 7 ans : 1 comprimé.

**Formuler.** — Flacon de comprimés de PERSODINE LUMIÈRE.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

45, rue Villon — LYON

## PERUBORE (Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires.

Inhalations — Gargarismes.

**Composition et forme.** — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés progressivement solubles.

Chaque comprimé contient

( Baume du Pérou.....	0 03
Essences aromatiques.....	0 025
Borate de soude.....	0 60
Bicarbonate de soude.....	0 30

**Propriétés thérapeutiques.** — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1° *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2° *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

*Pulvérisation* : dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 273, r. Victor-Rauter.

## PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoiétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

### Formule :

Cacodylate de soude pur.....	20 centigr
— de magnésie pur.....	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique.....	5 cc.

### Indications :

Tuberculose, Prétuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiarisme, Etats cancéreux, Cachexies.

### Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## PHAGOSTHYL MANGANÉ

(Exempt de strychnine.)

### Formule :

Sacodylate de manganèse .....	2 centigr.
— de soude .....	10 —
— de magnésie .....	8 —
— de calcium .....	10 —
Eau distillée .....	5 cc.

**Indications.** — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

**Emploi.** — Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

L'injection des Phagosthyl est absolument indolore.  
Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**  
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## PHAGURYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-5.

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Santalol  $\beta$ , Essence de Cèdre, Térébenthine, Salicylate de Phényle, Lupulin, Formine.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Antiseptique des voies urinaires, Décongestif, Balsamique et Diurétique.

**Indications.** — Blennorragie, Rétrécissements, Urétrites, Cystites, Prostatites.

**Mode d'emploi.** — Six, huit à douze dragées par 24 heures.

L'étui : 15 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY**  
15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## PHARYNGASEPTYL

**Composition.** — Résorcine, Méthylpyrocatechine, Acides borique, salicylique, tartrique, benzoïque, Terpinéol, Cinéol, Myrthol, Pinènes et Polyterpènes purifiés.

**Forme.** — Poudre.

**Indications.** — Laryngites, Trachéites, Sinusites, Chordites, Fatigue vocale, Enrouement, Catarrhe tubaire, Stomatites, Pharyngites, Amygdalites, Angines diverses.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, 2 à 4 fois par jour en gargarismes, bains de gorge, fumigations, inhalations, vaporisations, lavages et bain nasal.

*Enfants* : 1/2 cuillerée à café.

**Laboratoire des Vaso-Rhinol**

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

## PHÉNACODINE

**Composition.** — Diéthylmalonylurée, Lactophénétidine, Codéine phosphaté. Hexaméthylène tétramine.

**Forme.** — Comprimés.

**Mode d'action.** — Hypnotique doux et inoffensif.

**Indications.** — Toutes les Insomnies : Insomnies nerveuses banales, Insomnies dues au surmenage, Insomnies de la neurasthénie, des diverses névroses, Insomnies causées par la douleur ainsi que dans les cures de désintoxication.

**Mode d'emploi.** — Avaler 1 à 4 comprimés avec de l'eau, 1 ou 2 heures avant de se coucher.

**Laboratoires des Produits VELY**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## PHILOGASTRINE

(Comprimés.)

Traitement dialytique des dyspepsies. Réalise la concentration optima du contenu gastrique. Assure l'évacuation pylorique.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 50.

**Composition p. 100 :**

Lactobiose .....	90
Citrate de soude.....	2
Bicarbonate de soude.....	8

**Emploi.** — 2 comprimés dans 125 cc. d'eau tiède 2 heures après le repas, en une fois. Même dose, par gorgées, en cas de douleurs.

**Indications.** — Toutes dyspepsies.

Action rapide sur douleurs, aigreurs, brûlures, pesanteur, etc... Usage prolongé fait disparaître les troubles sécrétoires.

**Laboratoires REVEL**

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX°).

## PHLÉBOGUIL

Thérapeutique nouvelle des *affections veineuses* (hémorroïdes, varices, troubles de la ménopause, etc.).

**Composition.** — 1° *Aesculus hippocastanum* et *hamamelis virginica* ; toni-veineux puissants ; 2° *Gui de pommier* : hémostatique veineux remarquable. Hypotenseur artériel (dans la diathèse veineuse est souvent associée l'hypertension artérielle).

*Vaso-dilatateur des capillaires* et, de ce fait, lutte énergiquement contre les troubles trophiques qui accompagnent l'état veineux (trophœdème, prurit, ulcère variqueux, etc.).

**Posologie.** — X à XXX gouttes (à dose progressive) par jour.

Expérimenté dans les hôpitaux parisiens.

Echantillons et littérature au Corps médical

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III°).

## PHLEBOTONINE

Solution d'extraits fluides ou stabilisés agissant sur le cœur (gui, genêt, aubépine) et les vaisseaux (hamamélis, viburnum, cupressus, etc...).

**Avantages.** — Aucun trouble digestif et aucune toxicité.

**Indications.** — Troubles circulatoires, varices, phlébites, hémorroïdes, etc.

**Forme.** — Liquide, flacon de 125 cc. pour un traitement de 10 à 12 jours.

**Dose.** — 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

**G. MARTINIE, Pharmacien**

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>),  
et 37, av. de l'Echo — SAINT-MAUR (Seine).

R. C. Seine 440-107.

Tél. : Roquette 86-84 ; Gravelle 04-32.

## PHOSBIOSE

Sel magnésien de l'acide anhydro-méthylène diphosphorique.

Produit naturel retiré des céréales, le plus riche en magnésium des phosphates organiques végétaux.

Se dissout dans le suc gastrique.

Contient de 18 à 19 p. 100 de phosphore, associé intimement avec les ions magnésium et calcium et une molécule organique complexe dans des proportions sensiblement les mêmes que dans les céréales à l'état vivant.

**Indications.** — Troubles de la croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie, Cancer, Convalescences longues et difficiles.

**Présentation :**

**Granulé** : la 1/2 boîte, 10 francs ; la grande boîte, 18 francs  
**Poudre pure** : le flacon, 25 francs

**Posologie.** — **Poudre** (formules magistrales) : 0 gr. 50  
à 2 gr. par jour ou une à 4 mesures de 0 gr. 25.

**Granulé** { **Bébés** : demi-cuillerée à café 2 fois par jour.  
**Enfants** : 2 cuillerées à café par jour.  
**Adultes** : 4 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires BOYER et Cie**  
12, rue Pavée — PARIS

## PHOSCAMINE

**Granulé recalcifant hématogène,  
Activateur de la nutrition.**

**Principes actifs.** — Glycérophosphates de : chaux, magnésie, fer et manganèse. Méthylarsinate de soude, acides aminés provenant de l'hydrolyse des hématies.

**Indications.** — Anémie, Convalescence, Tuberculose, Néoplasmes, Dyspepsie, Retard de développement et de croissance.

**Doses :**

*Adultes* : 2 cuillerées à café avant chaque repas.

*Enfants* : 1 cuillerée à café.

**Laboratoire MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## PHOSMA

**Puissant reconstituant général.**

**Forme.** — Liquide. Flacon d'env. 500 cc.

**Composition.** — Acide phosphorique, Chlorure de Magnésium, Vin généreux. Goût très agréable.

**Indications.** — Anémie, Convalescence, Croissance, Faiblesse, Surmenage, Stimulant du Système nerveux.

**Doses et mode d'emploi :**

*Adultes* : 1/2 verre à madère avant ou pendant chaque repas, avec ou sans eau.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à soupe.

**Laboratoire PHOSMA**

68, rue de la Chaussée-d'Antin  
PARIS (IX<sup>e</sup>).

## PHOSOFORME

**Formes.** — Solution, Solution arsénée, Gouttes.

**Principe actif.** — Acide éther éthylorthophosphorique.  
**Bibliographie :** Professeur Cavalié, Bordeaux. — Prof. Escat, Toulouse. — Professeur Gérard, Lille. — Professeur Laignel-Lavastine, Paris. — Professeur Rémond, Toulouse. — Professeur Spillmann, doyen Faculté de Nancy, etc.

**Indications thérapeutiques.** — Etats dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Lithiases. — Convalescences : Grippe, etc. — Phosphaturie. — Asthénie. — Azotémies. — Nutrition des tuberculeux et prédisposés. — Dermatoses. — Alcaloses.

**Mode d'emploi.** — *Solution et solution arsénée :* 2 cuillerées à soupe par jour, chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de boisson, de vin blanc ou rouge sucré, à absorber au cours des repas.

*Gouttes.* — C gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Prix : 20 fr. le flacon ; 12 fr. le 1/2 flacon.

Durée : 12 à 15 jours.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
 RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise.)

## PHOSOL

(Forme Elixir et forme Granulés)

### PHOSOL ELIXIR

**Composition.** — Acide phosphorique officinal, Glycérophosphate de soude, Teinture de noix vomique, Extrait de ratanhia, Phosphate bicalcique, Vin kola muscat, Excip.

**Indications.** — Suralimentation, convalescence, croissance et anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

**Mode d'emploi.** — Dans un grand verre d'eau ou de vin ; 2 cuillerées à soupe par jour pour les adultes ; pour les enfants 2 à 3 cuillerées à café. A ne pas donner aux enfants au-dessous de 9 ans.

Prix : 13 fr.

### PHOSOL GRANULÉS

**Composition.** — Sulfate manganèse, Acide phosphorique, Hypophosphite de chaux, Extrait quinquina, Extrait kola, Alc. oranges douces, Cacao, sucre vanillé.

**Indications.** — Suralimentation, convalescence, anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

**Mode d'emploi.** — *Adultes :* 1 cuillerée à dessert à chaque repas.  
*Enfants :* 1 cuillerée à café à chaque repas.

Prix : 13 fr.

Echantillons et littérature :

**Laboratoire QUINET**  
 143, rue du Temple — PARIS.

## PHOSORINE

(Pommade nasale)

### Forme pharmaceutique et composition.

— Pommade à base d'oxyde de Terpilène, camphre, alcool mentholique, essences végétales.

**Propriétés.** — Décongestionnante, antiseptique, calmante.

**Avantages.** — Très active et nullement irritante pour la muqueuse nasale.

**Indications.** — Toutes les inflammations du nez et du pharynx. Traitement préventif de toutes les épidémies.

**Présentation.** — En tube.

**Laboratoires C. VIDAL**

46, rue de Grenelle — PARIS (VII<sup>e</sup>).

---

## PHOSOTE

### LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

**Indications.** — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour.

S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## PHOSPHARSOL

**Composition.** — Préparation phosphoarsénisée organique combinée à la strychnine.

**Indications thérapeutiques.** — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser ces doses.*

Prix en France : 12 fr. 50 la boîte.

Dépôt général pour le gros :

**Laboratoires RICARDOU**

Docteur en pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Elysées 76-48.

## PHOSPHATE DE CHAUX DU DOCTEUR PINARD

Phosphate tricalcique extrait directement des os  
en particules infinitésimales  
en suspension dans un liquide isotonique.

**Doses quotidiennes :**

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à potage.

*Enfants et Nourrissons* : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Prix : 13 francs le flacon.

## PHOSPHATE DE CHAUX IRRADIÉ DU DOCTEUR PINARD

Phosphate de Chaux simple du Docteur Pinard  
et ergostérine irradiée

(750 unités internationales par cuillerée à potage)

**Doses quotidiennes :**

*Adultes* : 2 cuillerées à potage.

*Adolescents* : 2 cuillerées à dessert.

*Enfants* : 2 cuillerées à café.

Prix : 17 fr. 50 le flacon.

90, boulevard St-Denis — COURBEVOIE-PARIS  
(Seine).

## PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 avril 1894).

**Formes et doses.** — *Solution gazeuse* (de glycérophosphate de chaux): 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Granulé* (de chaux, ou composé): 2 à 4 cuillerées à café par jour.

**Propriétés et indications.** — Double action reconstituante :

1° *Action reminéralisatrice* par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci ;

2° Puissante *action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

M. MIQUET, \*, Docteur en Pharmacie  
Établissements JACQUEMAIRE  
VILLEFRANCHE (Rhône).

---

## PHOSPHOBROM

**Composition.** — Bromure, Phosphate, Citrate alcalins.

**Forme.** — Granulé fondant soluble de goût agréable.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

**Indications thérapeutiques.** — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Laboratoire SERINDAT  
22, rue Poncelet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

**Forme.** — Granulé, cachets, comprimés.

**Indications.** — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

**Dose et mode d'emploi.** — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

*Enfants* de 3 à 10 ans : 1/2 dose.

*Nourrissons* : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour : *enfants* 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé de chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 francs.

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

**Pharmacie SEGUIN**

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

## PHOSPHOGAIACOL MARY

**Nature.** — A base de sels calciques assimilables, avec addition de sulfogaiacolate de potasse et de nucléinate de manganèse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

**Forme.** — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

**Laboratoire**

**du reconstituant MARY**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

**TAVERNIER, Docteur en pharmacie.**

## PHOSPHOGÈNE FAVRICHON

Aliment de croissance pour les enfants, le plus riche en phosphates assimilables.

**Composition.** — Froment de faible densité, trié, préparé, moulu sur meules et bluté modérément. On conserve ainsi la plus grosse partie des éléments minéraux. 7 p. 100 de légumineuses amènent le taux d'azote à son optimum et donnent un peu de sels métalliques (fer).

**Indications.** — Alimentation des enfants. Plus spécialement : rachitisme, retard à l'ossification. Femmes enceintes et nourrices (contre la déphosphatation).

Surmenés et convalescents.

**Emploi.** — 1 ou 2 potages par jour.

Littérature et échantillon sur demande :

**Produits diététiques FAVRICHON**

Pharmacien-chimiste

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

## PHOSPHOLEOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue.

Reconstituant physiologique de goût agréable.

**Composition.** — *Phospholéose A* : Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique). —

*Phospholéose B* : Même composition, mais sans arsenic.

**Indications.** — Lymphatisme, pré tuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescences.

**Présentation.** — Une seule forme : liquide.

**Posologie :**

De 3 ans à 6 ans : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

Au-dessus de cet âge : une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

*Phospholéose C*. — Traitement arséno-mercuriel dissimulé associé à l'iode.

**Composition :**

Une cuillerée à soupe de PHOSPHOLEOSE C contient : 0,01 de Hg + 0,001 de As + 0,10 d'iode + 0,10 de phosphate.

**Posologie :**

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe ; *Enfants* : par cuillerées à café ;

*Enfants jusqu'à 1 an* : XX gouttes par 24 heures en 2 fois ;

*Enfants de 3 à 8 ans* : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Prix : 14 fr.

**Laboratoires DEMASLES**

à VIENNE (Isère).

## PHOSPHOMAGNÉSIUM

**Composition.** — Hypophosphite, glycérophosphate, carbonate, citrate de magnésium.

**Mode d'emploi.** — 3 comprimés par jour.

**Indications thérapeutiques.** — Le *Phosphomagnésium* protège et fortifie la cellule. Toutes les insuffisances physiologiques dues à la carence magnésienne.

**Laboratoire SERINDAT**

22, rue Poncelet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## PHOSPHOPINAL-JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

**Indications.** — *Reminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

*Fixateur des sels de chaux.* — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

**Formes et doses moyennes.** —

*Capsules* : adultes : 4 à 6 par jour.

                  enfants : 2 à 3 par jour.

*Elixir* : adultes : 2 cuillerées à café par jour.

                  enfants : 1 cuillerée à café par jour.

*Gouttes* : adultes : 40 à 60 par jour.

                  enfants : 20 à 30 par jour.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

LE PHOSPHOPINAL-JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Prix : 14 fr.

**Laboratoire du PHOSPHOPINAL-JUIN**

10, impasse Milord — PARIS.

Tél. : Marcadet 37-98.

## PHOSTYL PY

**Composition.** — Acide orthophosphorique, Méthylarsinate de strychnine, Manganèse.

**Propriétés.** — Augmente le nombre des globules rouges et les enrichit par fixation de Fer. Donne le coup de fouet nécessaire à la remise en route et agit comme un tonique d'effet rapide et cependant durable. Puissant reminéralisateur, il arrête la Phosphaturie et permet la fixation de Ca-Na-K-Mg.

**Indications.** — Anémie générale et cérébrale, Neurasthénie, Dépression, Surmenage, Convalescence, Suites de grippe, Phosphaturie, Asthénie, Anorexie, Dénutrition des tuberculeux, Migraines.

### Posologie :

<i>Adultes</i> .....	XXV	gouttes	midi	et	soir.
12 à 18 ans.....	XV	—	—	—	—
6 à 12 ans.....	VI	—	—	—	—

Prescrire : **PHOSTYL PY** : 1 Flacon.

### Laboratoire PY

58, bd Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).

## PHUSASMINE

Traitement de l'Emphysème et de l'Asthme.

### Forme :

Dragées de 0 gr. 30 (flacons de 40 dragées).

### Composition :

Combinaison de NaI avec antidyspnéiques, antispasmodiques, Diurétiques et expectorants actifs (Lobelia, Drosera, Belladone, Polygala, Digitale, Extrait Suc Capsules Papaver Somniferum.

### Indications :

Emphysème, Asthme, Oppressions, Catarrhe, Bronchite chronique.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 3 dragées par jour, une demi-heure avant les repas, et 1 la nuit, si nécessaire.

*Enfants* : Ne jamais en donner aux enfants de moins de 12 ans.

**E. ROBINEAU, Pharmacien**

80, route des Petits-Ponts — DRANCY (Seine.)

## PHYLACTONE BYLA

**Cachets et Granulé.**

Peptone spéciale à polyvalence protéidique : viande, poisson, lait, œufs.

**Dose et mode d'emploi.** — Un cachet ou une dose, une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-anaphylactique.

**Indications.** — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

**Phylactone magnésinée**

(dragées, granulé.)

*Drainage des voies biliaires.*

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## PHYLLA

**DYN**

**Chlorophylle Pure** solubilisée, assimilable.

**Propriétés physiologiques :**

1° Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé, est actif et assimilable contrairement à la chlorophylle des légumes verts crus ou cuits.

2° La chlorophylle relève la tension artérielle et la tonicité neuro-musculaire; elle renforce l'action de l'adrénaline.

3° La chlorophylle, dont la constitution chimique est proche de celle de l'hémoglobine, excite la moelle osseuse et fixe le fer sur l'hématie.

**Indications :**

*Hypotensions artérielles* (idiopathique, permanente, symptomatique). *Acrocyanoses* (adynamie circulatoire). *Anémies* (la chlorophylle active les effets de l'opothérapie hépatique et apporte les matériaux de la rénovation sanguine).

*Asthénies, Surmenage, Convalescences* (la chlorophylle n'est pas toxique pour le foie et le rein).

*Anorexie du nourrisson, Hypotrophies, Rachitisme* (la chlorophylle sensibilise l'organisme à l'action des préparations irradiées).

**Posologie :**

XX à XXX gouttes avant les trois repas, une quinzaine sur deux.

Le flacon compte-gouttes = 18 francs.

Remboursable par les caisses d'assurances sociales (n° 734-2).

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Diderot 37-93.

## PHYMO-STERYL LEISYN

(Perfectionnement du Koch-i-cide Leisyn)

Complexe métallo-organo-végétal pour la chimiothérapie intensive des Tuberculoses de toutes natures.

Le traitement se compose d'injections intra-veineuses et de pilules kératinisées.

**Composition.** — Ampoules de 2 cc. pour injections intra-veineuses : Yttrium, Samarium, Caesium. Non toxiques.

**Pilules :** Métaux précieux, Hg. Terres rares, Organates, Thymolates, Terpènes et Sulfonates polyvalents, Bornéine, Chlorure de Tétraméthylaminodiphénylpenthiiazimium, Phénylacrylate d'acétylène.

**Médication adjuvante :** Ampoules de 5 cc. pour injections intramusculaires ; Magnésie, Chaux, Organates de Potasse, Soude, Alumine, Albumine, Acides Acétique et Citrique.

Ces trois préparations sont hyperactivées par procédé spécial «EVOO».

**Action.** — Médication extrêmement diffusible dissolvant l'enveloppe circo-graisseuse du B. K. et créant autour du bacille un milieu où il ne peut subsister. Hyperantiseptique à l'égard du B. K.

**Propriétés.** — Action très rapide se manifestant par l'arrêt des expectorations. Stérilisation des foyers tuberculeux. Négativité des crachats. Baisse thermique. Liberté respiratoire. Aération auscultatoire. Augmentation de poids. Suppression de la transpiration. Aucune toxicité. Aucune contre-indication. Aucun inconvénient.

**Posologie.** — 1 injection intra-veineuse tous les deux jours. Pilules : 3 à 15 pro die. Ces deux formes constituent le traitement de base, auquel on peut adjoindre : ampoules de 5 cc. pour injections intramusculaires, 1 tous les deux jours.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Adresse télégraphique : Laboleisyn Paris.

Tél. : Auteuil 14-73.

## PHYSIOSCYAMINE

Médication du vague et du sympathique.

**Composition.** — Combinaison définie d'atropine, d'hyoscyamine et d'ésérine activée par la présence de pepsine spécialement préparée, unie à un excipient approprié.

**Indications.** — Troubles nerveux ressortissant à la dyspepsie hyperchlorhydrique, à la dilatation et à la ptose gastriques tels que : vertiges, congestions postprandiales, migraines gastriques, palpitations de cœur d'origine digestive, tremblements, somnolence, bâillements, constipation d'origine sympathique, etc..., etc...

**Posologie.** — Un cachet 10 à 15 minutes avant les trois repas.

**Présentation.** — Boîte de 30 cachets.

Prix de la boîte : 15 francs.

Dépôt général

Laboratoires BORDELAIS

49, rue Maleret — BORDEAUX

## PHYSIOSTHÉLINE

Admise dans les Hôpitaux de Paris.  
*Toutes infections graves.*

**Indications thérapeutiques.** — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre Typhoïde, Fièvre Puerpérale et toutes les infections.

Injections intramusculaires, région rétro-trochanterienne au point de Barthélemy ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

**Formes.** — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.  
Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

## NÉO-PHYSIO

*Toutes infections de moyenne intensité.*

**Forme.** — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 francs.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

---

## PHYSOCRISINE

Solutions de lobe post. d'hypophyse.  
(Opothérapie Fournier : Endocrisines.)

1° *Ampoules de 1 cc.* (boîte de 5), usage obstétrical seul.

2° *Ampoules de 10 cc.* (boîte de 3).  
Injections intraveineuses toutes préparées. Trait. des Hémoptysies.

**Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## PHYTINE CIBA

Phosphate naturel extrait des graines végétales, contenant 22 p. 100 de phosphore en combinaison organique. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

**Indications.** — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences difficiles, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

**Doses.** — *Adultes* : 1 gr. par jour (2 cachets, 4 comprimés, 2 cuillerées à café de granulé).

*Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

La boîte de 20 cachets, le flacon de 40 comprimés : 14 francs.

Le flacon de granulé : 16 francs.

*On peut aussi formuler la Phytine magistralement.*

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

---

## PHYTOGÉNINE BYLA

**Composition.** — Complexe bio-minéral et opothérapique, intégralement assimilable : Phytosphosphine, fluorure de sodium, nucléinate de manganèse associés aux : thymus, rate, surrénales, parathyroïdes, foie, moelle osseuse et os épiphyseaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reminéralisateur intensif, modificateur puissant des échanges nutritifs.

**Indications.** — Troubles de la croissance, tuberculose, rachitisme, dépression nerveuse, convalescences, phosphaturies, anémies et tous états de déchéance organique.

**Dose et mode d'emploi.** — *Granulé* : 3 cuillerées à dessert par jour, à croquer. — *Cachets* : 2 à 4 par jour. — *Comprimés* : 4 à 8 par jour. (Enfants : demi-dose.)

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS



## PHYTO-LÉCITHINE

Médication phosphorée organique de l'anémie, la fatigue, les troubles nerveux, les croissances lentes, etc...

**Propriétés thérapeutiques.** — A toutes les propriétés de la Lécithine de l'œuf dont elle possède une composition globale identique, mais, d'origine végétale, extraite de graines oléagineuses, elle ne contient aucune substance capable de provoquer des phénomènes toxiques ou anaphylactiques.

**Indications.** — Particulièrement indiquée dans la convalescence d'affections aiguës ayant provoqué de l'amaigrissement et laissant derrière elles de la fatigue; dans les surmenages de tous ordres, physiques ou intellectuels, dans les périodes de puberté et de grossesse.

**Conditions d'emploi :**

*Pour enfants :* 3 comprimés par jour.

*Pour adultes :* 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

**Laboratoires PROGIL**

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## PHYTOMARINE

**Formes.** — Elixir, Gouttes.

**Composition.** — Extrait cytoplasmique et complexes organo-minéraux de l'algue marine. (*Laminaria flexicaulis*.) (Chaux, iode organique, phosphore, manganèse, glycérine, eau de mer isotonique).

**Indications.** — Anémie, rachitisme, scrofule, bacillose, prébacillose, neurasthénie, affections pulmonaires, troubles de croissance, goitre, diarrhées chroniques, dyspepsies gastriques, ulcères gastro-duodénaux.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées et II à XXX gouttes par jour.

« PROTHERAPIA »

**Laboratoire G. CHAMAGNE**

**Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie,**

Lauréat de l'Académie de Médecine,

132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PHYTOMENSYL

Régulateur des *fonctions menstruelles*.

Stimulant et tonique des fonctions *utéro-ovariennes*.

Association harmonieuse d'extraits végétaux *atoxiques*, (*hamamélis, hydrastis, viburnum, marron d'Inde, anémone, pulsatille*) présentée sous une forme agréable et facile à prendre (*gouttes*).

**Indications.** — Tous les troubles de la Menses-  
truation : Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagies.

Action complémentaire efficace dans les insuffisances veineuses.

**Posologie.** — XXV à XXX gouttes, dans un peu d'eau au repas de midi et au repas du soir, pendant quinze jours par mois.

Laboratoires **STELVIA**

**Georges BLAQUE**

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences

59, rue Boissière — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Kléber 88-70.

## PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Synergie opothérapique et minérale : lipoides spléniques, poudres de thymus, moelle osseuse rouge, surrénales, parathyroïdes, d'os frais, Nucléinate de fer et de manganèse, composé phosphoré organique végétal et Vitamine A stabilisée.

**Propriétés.** — A tous les âges relève le tonus neuro-végétatif, active les échanges, reminéralise, favorise la croissance staturale et pondérale.

**Indications.** — Asthénies, Allaitement, Amaigrissement, Anorexie, Convalescences, Croissance, Déminéralisation, Dentition, Grossesse, Fractures, Rachitisme et pré-rachitisme, Spasmophilie.

**Présentation.** — En granulés aromatisés (150 grammes : 18 francs) et en dragées également aromatisées (50 dragées : 18 francs).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (Fac. Pharm.) sous les n<sup>os</sup> 82-7 et 82-8.

**Posologie.** — Prescrire avant ou au cours de deux repas journaliers :  
*Nourrissons* : 1 cuiller à café de granulé.

*Enfants* : 2 cuillers à café de granulé ou 2 dragées.

*Adolescents et adultes* : 3 cuillers à café de granulé ou 3 dragées.

Laboratoires **J. PLÉ**

Docteur en Pharmacie.

111 bis, rue de Turenne, PARIS (III<sup>e</sup>).

Tél. : Archives 83-52.

## **PILULES du D<sup>r</sup> DEBOUZY**

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée, et boldine.

Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

**Dose.** — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Le flacon de 100 pilules : 15 francs.

— 50 — : 8 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## **PILULES du D<sup>r</sup> SEJOURNET**

Antidiabétiques.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement du DIABETE sans régime trop rigoureux, le guérit souvent, l'améliore toujours sans crainte d'inconvénients. Evite les complications.

**Doses et mode d'emploi.** — Complexe sous forme de pilules dosées à 0 gr. 01 de Santonine, avec excipient balsamo-résineux.

Reconstituant de premier ordre, etc.  
1 Pilule à chaque repas.

Prix de vente au public : 18 fr.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

**Composition.** — A base d'Hélénine cristallisée, protoxalate ferreux et quassine.

**Indications.** — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du Dr E. PARIZOT) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

**Mode d'emploi.** — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

*Echantillon et littérature sur demande* .

**Laboratoires LACROIX**

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## PILULES LITHURANÉES

du Docteur BOVEIL

Traitement du diabète

**Composition.** — *Uranium* : Radio-actif, active la sécrétion des glandes.

*Helonin* : Décongestif du foie et du pancréas.

*Benzoate de lithine* : Dissolvant de l'acide urique, en excès chez les diabétiques.

*Arséniate de soude* : Tonique général. Stimulant des glandes endocrines.

*Géranium Robertianum* : Tonique et astringent.

**Indications.** — Le diabète sous toutes ses formes.

**Doses et mode d'emploi.** — 6 pilules par jour ; 2 avant chaque repas avec un demi-verre d'eau de Vichy ou de Vals.

Traitement normal : 2 mois environ.

*Echantillon et littérature sur demande.*

Prix : 12 fr. l'étui de 60 pilules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 346-2.

**Marc PARIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

## PILULES MYOSOTIS

Molles

### Composition :

Bichlorure de Hg. ....	0,005
Poudre d'opium .....	0,005
Poudre fraîche de coca.....	0,15
Extrait de gentiane. ....	0,04

**Indications.** — Traitement mercuriel *per os* suivant technique adoptée par le Dr Vernès.

### Emploi :

- 1<sup>re</sup> semaine : 1 pilule par jour au repas de midi.  
 2<sup>e</sup> semaine : 2 pilules par jour aux repas : midi et soir.  
 3<sup>e</sup> semaine : 3 pilules par jour aux repas : matin, midi et soir.  
 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> semaines : 4 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 1 soir.  
 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> semaines : 5 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 2 soir.  
 8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> semaines : 6 pilules aux repas : 2 matin, 2 midi, 2 soir.

En cas d'intolérance, redescendre à la dose immédiatement inférieure.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien  
 41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>)  
 Tél. : Laborde 08-00.

## PILULES V. E. DOUMER

### Formule :

Chaque pilule contient 5 centigr. de bleu de méthylène *chimiquement pur*.

### Doses :

De 4 à 10 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

### Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

Laboratoires BOMEL  
 ANNONAY (Ardèche) — France.

## PIPERAZINE MIDY

Diéthylène Diamine,  $\text{NH} \begin{array}{c} \text{CH}^3\text{-CH}^3 \\ \text{CH}^3\text{-CH}^3 \end{array} \text{NH}$ , alcalin organique du groupe des Pyridines (inscrit au Codex français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0 cgr. 20, de PIPERAZINE pure par cuillerée à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif ; 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique : réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

**Indications.** — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sclérotique, Artério-Sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue (cœur, estomac, vaisseaux).

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## PITULOBINE BYLA

(En ampoules.)

**Composition.** — Extrait épuré de lobes postérieurs d'hypophyses, *titré physiologiquement* sur utérus de cobaye. Quatre dosages en *unités internationales* : AMPOULES : O = 10 u. i. (1/16 lobe), A = 20 u. i. (1/8 lobe) ; B = 40 u. i. (1/4 lobe) ; E (intraveineuses) = 40 u. i. (1/4 lobe).

**Indications.** — Inertie utérine, hémorragie de la délivrance, salpingites chroniques, métrites, etc. Hémoptysies des tuberculeux, défaillances du myocarde, constipation, hémorragies, épistaxis.

**Mode d'emploi.** — Injections hypodermiques dans tous les cas, sauf pour les hémoptysies, où l'on emploie la voie intraveineuse (ampoules E).

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## PLASMA DE QUINTON

*Nom déposé en 1907.*

**Composition.** — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite, transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques. mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

**Le Plasma de Quinton** (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) *est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.*

**Bibliographie.** — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références in R. QUINTON : *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2<sup>e</sup> éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références in JARRICOT : *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

### Indications :

**Traitement prénatal.** Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'armes plus puissantes. On sait qu'il a été fondé (D<sup>r</sup> ARNULPHY, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1<sup>o</sup> de conduire à terme le produit conçu ; 2<sup>o</sup> de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3<sup>o</sup> d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

**Entérites des adultes et des grands enfants.** Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

*Gastro-entérites des nourrissons.* Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme), la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

*Intolérance lactée, Athrepsie.* L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsique s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

*Maladies de la peau (Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées); Maladies du Système nerveux (Névralgies, Enuresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie); Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.* Les succès sont habituels; impressionnants parfois de rapidité.

**Régimes, doses d'injections.** — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine au Plasma de Quinton, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

**Présentation.** — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

**Renseignements et littérature** (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance; envois de notices sur les applications et la posologie du Plasma de Quinton : DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrivée, Paris (Gare Montparnasse).

**Commandes et ordres d'expéditions :**

LABORATOIRES DE BIOLOGIE APPLIQUÉE.

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>,**

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél.: Elysées 36-64 et Elysées 36-45.

Adressé télégr. Rioncar-Paris-123.



## PLEXORINE

(Médication bromée discrète.)

Dragées glutinisées à base de :

Tri-bromure de sodium, ammonium, strontium,  
Codéine, Levurine extractive, Paullnia sorbilis.

**Action thérapeutique.** — Calmant du système nerveux, antispasmodique.

**Avantages.** — Élimination rapide. Pas d'action secondaire sur la tension sanguine ni sur le myocarde ; pas de dépression intellectuelle.

**Indications.** — Sédatif de l'excitabilité motrice et vasculaire. Puissant analgésique non toxique chorée, tics, hystérie, crises nerveuses. États sympathicotoniques.

**Mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> Action sédatrice (émotifs anxieux), doses légères réfractées : 2 à 4 dragées par jour ; 2<sup>o</sup> Action hypnotique, doses relativement massives : 4 à 8 dragées le soir, une heure avant le sommeil.

**Laboratoires des Produits VÉLY**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Tél. : Passy 87-85.

---

## PLOMBYL

**Principe actif.** — Diéthylphosphate de plomb, corps nouveau, **non toxique** aux doses thérapeutiques.

**Indications thérapeutiques.** — Cancers et toutes tumeurs malignes.

**Forme.** — Ampoules de 5 cc. en boîte de 10.

**Dose.** — Une ampoule tous les 3 jours, injections intramusculaires.

Prix : 60 francs.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## PLURIBIASE

**Indications.** — Dyspepsies hyposthéniques.

**Composition.** — Comprimés à 2 noyaux.

Le 1<sup>er</sup> externe, pepsine T. 500 ; Ext. Belladone ; Ext. Jusquiame, Sucre.

Le 2<sup>e</sup> interne, Boldo, Bile dépigmentée, Pancréatine (T. 200), Kinase, Erepsine, Ferments lactiques.

**Doses.** — 2 comprimés avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires Gastro - Entérologiques  
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV<sup>e</sup>).  
Tél. : Ségur 69-13.

---

## PLURION COUTURIEUX

**Description.** — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

**Indications.** — 2 à 4 ampoules par jour dans les ANÉMIES GRAVES. 1 ampoule par jour dans les anémies des CONVALESCENTS, PALUDEENS, SYPHILITQUES, CANCEREUX. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS

## PNEUMOGÉINE RENARD

**Composition.** — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combiné à l'iode et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE, par son action :

**régulatrice respiratoire**, assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel;

**cardio-tonique**, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle;

**éliminatrice**, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

**Indications.** — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphyseme, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

**Posologie.** — Pendant les crises paroxysmiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour dans de l'eau bien sucrée. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées.

S'il est possible, verser le matin la dose prescrite dans un verre d'eau sucrée qu'on absorbe par petites gorgées dans le courant de la journée.

**Laboratoires RENARD**

35, rue de Paris — CLICHY.

## PNEUMOGÉNOL

*Deux formes* : Sirop. — Dragées.

*Deux formules* : S. (sans digitale). — D (avec digitale).

Codéine, 0,01 ; Morphine chl., 0,000625 ; Extrait Ipéca, 0,005 ; Extrait Belladone, 0,005 ; *Extrait Digitale*, 0,002 ; Extrait Aconit, 0,025 ; Extrait Drosera, 0,025 ; Eau de Laurier-Cerise, 0,50 par cuillerée à café et par dragée.

**Indications principales.** — Toux rebelle, Bronchites chroniques, Catarrhe, Asthme, Emphysème, Tuberculose.

**Doses et mode d'emploi.** — 4 cuillerées à café ou 4 dragées dans la journée. 1 cuillerée à soupe ou 2 dragées le soir au coucher.

Prix : 12 fr.

Echantillons et littérature :

**Laboratoire de THÉRAPEUTIQUE**

EPINAL (Vosges)

74, Faubourg d'Ambrail.

## PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

Formule et technique du Docteur Victor Simon.

**Composition.** — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olives camphrée débarrassée de ses acides. Trois concentrations (doses progressives) n<sup>os</sup> 1, 2, 3.

**Mode d'emploi et indications.**

INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES  
INTRA-PULMONAIRES : Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes.  
Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme.  
Emphysème.

INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES : Tuberculoses laryngées.

INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES : Tuberculoses méningées.

INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES : Tuberculoses péritonéales.

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES : Prétuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections grippales, bronchites chroniques, infections urinaires (prostatites, etc.).

Littérature et échantillons sur demande :

**Laboratoires H. YVRARD**, 17, rue Soufflot — PARIS (V°).

Tél. : Odéon 56-67.

## PNEUMOSTYL DAGUIN

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. et ampoules de 6 cc.

**Composition.** — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyie, camphre, goménol, eucalytol, essences de labiées et huile d'olives neutre.

**Mode d'emploi.** — 1° Pneumostyl hypodermique (2 cc.). Boîte de 12 ampoules : 18 fr.  
2° Pneumostyl intratrachéal (6 cc.). Boîte de 7 ampoules : 24 fr.

**Indications.** — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

*Echantillons sur demande aux*

**Etablissements DAGUIN**

**SAINT-MAUR (Seine).**

## POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)  
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Association du *phosphore* avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 milligr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

**Indications.** — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

**Sirop.** — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indications du médecin traitant.  
**3 formes : sirop, comprimés, ampoules.** — Prix : 15 francs.

**PRODUIT FRANÇAIS**  
**Laboratoire CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (1<sup>er</sup>).

## POLYBROMURE GONNON

Bromures de sodium, potassium, ammonium et strontium.

### Forme et Posologie.

*Sirop* : 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure).

*Poudre* : 1 mesure : 1 gr. de polybromure.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium qui est un excellent eupeptique.

**Indications.** — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Prix : Sirop, 12 fr. Poudre, 9 fr.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## POLYCAUTÈRE

Révulsion par effleurage en **Raies de feu sans cicatrices** avec le POLYCAUTÈRE (1) du D<sup>r</sup> A. Vernier. Breveté S. G. D. G. (Déposé.)

**Polycautère « Raies de feu »** avec câbles pour tableau..... 200 fr.

**Polycautère « Raies de feu »** avec coffret réducteur 110 v. alternatif, 25 périodes..... 945 fr.  
50 périodes..... 925 fr.

**Polycautère « Raies de feu »** avec coffret contenant une commutatrice 110 volts continu ou alternatif..... 1 250 fr.

Tous autres voltages et pièces chauffantes interchangeables sur demande.

**Affections pleuro-broncho-pulmonaires et rhumatismales, Algies diverses.**

**P. MICHEL, ingénieur-constructeur**  
90, avenue Gambetta — HYERES (Var).

Dépôt et vente :

**PHARMACIE NORMALE**

19, rue Drouot — PARIS.

(1) R. Grégoire, *Thèse de Montpellier*, 1933.

## POLYFERMENTS LALEUF

**Granulé et Tablettes.**

**Composition.** — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de MAGNÉSIUM.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

**Mode d'emploi et doses.** — Une ou deux cuillerées à café ou 2 à 4 tablettes, à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

L'étui de granulé ou la boîte de 48 tablettes :  
16 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## POLYIODURE GONNON

(*Iodures de Sodium, Ammonium, Strontium.*)

**Forme.** — Sirop comprenant 1 gr. par cuil. à soupe d'iodures alcalins, associés aux écorces d'oranges amères et au vin de Bordeaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique dépuratif, non toxique, action rapide, tolérance parfaite.

**Indications.** — Engorgements, tumeurs, abcès, asthme, rhumatisme, goutte.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au milieu des repas.

Prix : 15 francs.

**Produits GONNON**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## POLYMINÉRAL FORT

GRANULÉ

**Composition.** — Adrénaline, fluorure de sodium, phosphate de manganèse, hydrate de magnésie, formiate de chaux, phosphate de potasse, lactate de chaux, glycéro phosphate de chaux.

**Indications.** — Reminéralisateur pouvant être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes de croissance, etc.

**Formes et doses.** — Existe sous formes de :

**Polyminéral adultes** (Adrénaline, 0,001 ; Fluorure de sodium 0,02 par mesure).

Doses : 2 à 6 mesures par jour.

**Polyminéral enfants** : Adrénaline, 0,0005 ; Fluorure de sodium 0,01 par mesure).

Doses : Bébés de 1 à 3 ans : 1/2 à 1 mesure ; enfants de 3 à 8 ans : 2 à 3 mesures ; enfants de 8 à 15 ans : 4 à 5 mesures.

**Polyminéral irradié** (ergostérine irradiée, vitamine D).

Doses : Enfants jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuill. à café par jour ; enfants 5 à 15 ans : 2 à 3 cuill. à café par jour ; adultes : 4 à 6 cuill. à café par jour.

Prix : 12 francs ; irradié : 16 francs.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE.

## POLYPEPTINE

du Docteur **ROGER WEBER**

Comprimés hyperdigestifs friables.

**Formule.** — Pepsine, 0,50 ; pancréatine, 0,20 ; muqueuse gastrique, 0,10 ; muqueuse duodénale, 0,10 ; muqueuse intestinale, 0,10 ; bile intégrale, 0,03 ; sulfate de magnésie, 0,05 ; belladone stabilisée, 1 mgr. ; carbonate de chaux, 0,05, pour 1 comprimé.

**Indications.** — Dyspepsie (mauvaises digestions), Gastrite, Douleur, Spasme, Gastro-Entérite.

**Posologie.** — 1 à 3 comprimés au milieu de chacun des 2 principaux repas, croquer sans goûter le ou les comprimés et avaler à l'aide d'une gorgée d'eau.

Prix (la boîte de 30 comprimés) : 18 francs.

**Gros : Laboratoire de la POLYPEPTINE**

61, rue de Seine — PARIS. Tél. : Danton 92-73.

**ANGELINI, Pharmacien.**

et chez tous les Commissionnaires et Droguistes.

Détail : Dans toutes les Pharmacies.



## POLYPEPTONAL

**Composition.** — Peptonates polyvalents de magnésie associés à des digestats chlorhydropeptiques de foie total et d'albumines des principaux légumes.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés dragéifiés.

**Action.** — Draine la vésicule et les voies biliaires. Préviend la crise hémoclasique. Stimule les fonctions hépatiques.

**Indications.** — Migraines, urticaires, asthme eczémas, prurits, congestion du foie, atonie vésiculaire, troubles anaphylactiques et digestifs.

### Posologie :

**Adultes :** 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant les principaux repas, dissous dans un peu d'eau.

**Enfants :** 1 comprimé une demi-heure avant les repas dissous dans un peu d'eau pure ou sucrée.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires DURET et REMY**  
et du Docteur Pierre ROLLAND réunis  
ASNIÈRES (Seine).

## POLYVALINE du Dr Bayle

**Nature.** — Extrait spléno-surrénal.

**Indications.** — Les maladies infectieuses : Grippe, Typhoïde, Paratyphoïdes, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Erysipèle, Fièvres éruptives, Oreillons, etc., où il agit comme un sérum spécifique très actif.

**Emploi.** — 1 ou 2 injections par jour (intramusculaires à la fesse ou sous-cutanées abdominales) jusqu'à la défervescence.

**Doses.** — *Adultes :* POLYVALINE injectable A (10 cc.).

La boîte de 2 ampoules de 10 cc. : 20 francs.

*Enfants :* 1 cc. par année d'âge de POLYVALINE injectable B.

La boîte de 4 ampoules de 5 cc. : 20 francs.

**Nota.** — Il existe aussi des comprimés de POLYVALINE que l'on peut employer à la dose de 4 à 10 par jour à titre prophylactique dans les épidémies.

**Laboratoires CHAIX**  
8-10, rue de l'Orne — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact.

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

**Indications.** — Suppression rapide et inoffensive de la douleur ou démangeaison dans : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire ou anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Dermite infantile, Prurigo, Hémorroïdes, Brûlures, Engelures, Gerçures, Crevasses du sein, Phimosis, Vaginisme, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, Gelures de doigts ou d'orteils, Pansements douloureux, Plaies post-opératoires, Escarres, Radio-dermites, Zona, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Lupus, Eruptions ou Tumeurs lépreuses, Chancres, Fractures compliquées, Gale, Urticaire, Herpès, Ampoules, Intertrigo, Erythèmes solaires, Boutons de chaleur, Piqûres d'insectes, en résumé tous les Prurits, Plaies, Dermatoses, Lésions des muqueuses.

Dans les cas aigus, *guérison locale*.

**Conditions d'efficacité.** — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse); un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion sous forme de pansement.

**Posologie.** — Aucune limite ni dans les doses, ni dans la durée du traitement.

**Laboratoires du NESTOSYL** — P. BAUDE, pharmacien.

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl 27-PARIS.

---

## POMMADE BERTOL-VICHY

**Composition.** — Benzénol chim. pur. Résine fluide, Benjoin. Acide orthoxybenzoïque, sol. d'Adrénaline, Peroxyde de zinc chim. pur, Sérum homopoiétique, Acide nitrique de Bismuth neutre de Benzoate.

La Pommade « Bertol-Vichy » est un médicament de premier ordre calmant les douleurs, désodorisant et facilitant une rapide *cicatrisation esthétique*; une désensibilisation et un régime appropriés plus la Pommade « Bertol-Vichy » feront un traitement qui ne sera plus décevant.

**Indications.** — Ulcères variqueux rebelles, Eczéma variqueux, Eczéma des nouveau-nés, Eczéma chronique, Hémorroïdes, Démangeaisons, rougeurs, boutons, brûlures et toutes lésions de la peau.

**Mode d'emploi.** — En pansements renouvelés tous les jours.

**M. HY, Pharmacien**

61, avenue de Choisy — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

## POMMADE FORNET

### A l'Insuline Fornet.

**Principe actif.** — L'Insuline Fornet véhiculée dans un excipient de choix à pouvoir transdermique remarquable. Titrage régulier. Aucun adjuvant.

**Indications.** — Ulcères variqueux. Plaies de toutes natures. Affections peaussières. *Cancers* ulcérés de la peau (communications récentes). Rhumatisme diabétique, etc...

*Bien spécifier le nom : FORNET.*

Prix : 15 francs le tube.

Vente et Echantillonnage :

**Laboratoire de Microbiologie**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Gutenberg 03-45.

## POMMADE KLÉOS

### Pommade Kléos Douce.

**Indications.** — Feux, rougeurs, eczéma, éruptions dues à la dentition des bébés. Brûlures. Gerçures. Coups de soleil.

**Composition.** — Silicate de magnésie hydraté, Baume du Pérou, oxyde de zinc, Dermarone, excipient glycéro-aqueux. Essences naturelles.

**Forme.** — Pommades non grasses renfermées en tube étain.

### Pommade Kléos Forte.

**Indications.** — Maladies de peau anciennes, gomme, acné, intertrigo.

**Composition.** — Essences naturelles, Baume du Pérou, Ichtyol, Acide borique. Soufre, Oxyde de zinc, excipient.

**Forme.** — Pommades non grasses renfermées en tube étain.

Ces pommades étudiées spécialement pour les enfants sont tout indiquées pour les épidermes particulièrement délicats.

Prix du tube : 5 fr. 50.

Le double tube : 10 fr.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires GUERET,**

2, rue des Cordeliers — MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret)

## POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine.

Trattement spécifique des *dartres chroniques* ; s'adressé exclusivement à ces *eczémas* à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la tenacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en découpant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrave la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sébum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruques plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *favus*.

**Mode d'emploi.** — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## POMMADE LOGEAI

(Rectaméline)

### Composition :

Extrait d'Hamamélis.....	6 gr.
Sulfoichtyolate de Soude....	6 gr.
Lanoline .....	9 gr. 50
B. Cacao.....	9 gr. 50
Onguent populeum Q. S. pour 100 gr.	

Ni cocaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

**Propriétés.** — Atoxique, analgésique, décongestionnante et doucement vaso-constrictive. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication. Ne tache pas le linge d'une manière indélébile.

**Indications.** — Hémorroïdes externes. Prurits anal et vulvaire. Gerçures des seins. Prostatites.

**Mode d'emploi.** — Après lavage, onction matin et soir avec le doigt enduit d'une forte couche de Pommade Logeais et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes). Nous joignons une canule à chaque tube, ce qui permet de traiter les hémorroïdes internes par la Pommade Logeais.

Prix de vente au public : 15 francs.

**Laboratoires Émile LOGEAI**

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

## POMMADE MIDY

(Adrénq-styptique.)

Adrénaline .....	0 gr. 0066
Stovaine .....	1 gr.
Anesthésine .....	1 gr.
Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé .....	2 gr. 50
Extrait d'Hamamélis .....	0 gr. 50
Pour 100 grammes de pommade.	

**Mode d'emploi.** — Une application matin et soir, et après les garde-robes. Précéder d'une application, pendant 10 minutes, ou de glace ou de compresses à 45°.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptie.

**Indications.** — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes, haut placées.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## POMMADE NOELLINE

**Composition.** — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

**Action.** — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés.

**Mode d'emploi :**

a. Gerçure des seins. *A titre préventif* : en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

*A titre curatif* : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : le tube, 6 fr.

**Laboratoire de la NOELLINE**

GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

## POMMADE RAIMOA

**Principes actifs.** — Aristol. Éther. Cicatrisants très actifs. Analgésiques.

**Indications.** — Brûlures à tous degrés. Plaies de tous genres, infectées ou non. Eczémas. Ulcères.

**Mode d'emploi.** — Avec ou sans lavage d'éther préalable, une application matin et soir.

**Laboratoire des Produits RAIMOA**

Collignon-Savers,

264, boulevard Voltaire — PARIS (XI<sup>e</sup>)

Téléphone : Diderot 54-96.

## POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET Optima

**Pommades** en tubes à canule dévissable et stérilisable, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Ecarlate, Cuivre (hémocuiivre), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmium, Zinc Tuménol, Zinc Ichtyol, Calomel, Fondante ( $KI + CaCl^2$ ), Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Ektogan, Collargol, Argyrol, Azotate d'argent, Protargol. Cocaine, Stovaine, Ethylhydrocupréine (Optochine), Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence du Niaouli (Goménol), Aïrol, Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet rose, Colorant Composé, Eserine, Euphtalmine, Scopolamine, Atropine, Pilocarpine, Adrénaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu.

**Radio Bleu** (Radio Active au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

**Ampoules fondantes chloro-iodo-calcique** (Bains d'yeux pour cataracte).

**Œillères Chibret** a rebord caoutchouté.

**Pommade pour le nez** : Baume du Pérou, Adrénaline.  
(Voir à Collyres la suite des Produits Chibret).

**LABORATOIRES CHIBRET.**

5, rue Saint-Herem — CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

## POMMADE V. E. DOUMER

### Formule :

Bleu de Méthylène .....	1 gr.
Essence de Thym .....	0 gr. 50
Essence de Romarin .....	0 gr. 50
Essence d'Eucalyptus...	0 gr. 50
Essence de Serpolet.....	0 gr. 50
Glycérolé d'Amidon .....	30 gr.
Lanoline.....	70 gr.
Huile de Cade.....	0 gr. 25

La Pommade V. E. Doumer s'emploie en applications quotidiennes dans les brûlures, l'eczéma, les ulcères variqueux, etc... Toutefois son emploi, en raison de sa coloration, semble contre-indiqué dans les affections de la face.

**Laboratoires BOMEL**  
ANNONAY (Ardèche) — France.

## POSTERISAN

**Composition.** — Contient comme principe actif l'antivirus du colibacille.

**Propriétés.** — Spécifique par excellence des *hémorroïdes* et de toutes les *affections cutanées*, causées ou activées par des bactéries intestinales. Arrête les hémorragies, décongestionne, calme les douleurs, guérit. Innocuité absolue pour adultes et enfants. Incolore : ne tache pas le linge.

**Forme.** — Pommade, suppositoires.

**Indications.** — Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurits de l'anus et de la vulve, eczéma.

**Posologie.** — *Hémorroïdes externes* et affections cutanées : Une application de pommade matin et soir et après les garde-robes.

*Hémorroïdes internes* : Un suppositoire matin et soir et après les garde-robes ; ou se servir de la canule rectale s'adaptant au tube et permettant d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées. Pas nécessaire de nettoyer et de stériliser la canule après usage.

**Laboratoires D. C. E.**

**Henri HOFSTETTER**

6, rue des Cigognes — STRASBOURG (Bas-Rhin).



## POST-HYPOPHYSE CHOAY

**Nature.** — Extrait purifié injectable, désalbuminé, stérilisé, de lobe postérieur d'hypophyse.

**Formes pharmaceutiques et mode d'emploi :**

**Post-hypophyse n° 2.** — Solution *obstétricale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 5 unités internationales.

**Indication.** — Inertie utérine secondaire, en l'absence de toute dystocie. Injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc., à dilatation complète (tête fixée).

Prix : 10 fr. la boîte de 3. — 15 fr. la boîte de 6 ampoules.

**Post-hypophyse n° 4.** — Solution *chirurgicale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 10 unités internationales.

**Indications.** — Prévention des hémorragies opératoires : 1/2 à 1 cc. avant l'intervention.

Parésie intestinale : 1/2 à 1 cc. Diabète insipide : 1 cc. par jour.

Prix : 15 fr. la boîte de 3, 20 fr. la boîte de 6 ampoules.

**Post-hypophyse n° 5.** — Solution *hémostatique* diluée dans du sérum. Ampoules de 10 cc. titrées à 5 unités internationales.

**Indication.** — Hémoptysies des tuberculeux : Injection intraveineuse à pousser *très lentement*.

Prix : 15 fr. la boîte de 3 ampoules.

**Laboratoire CHOAY**

48, aven. Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

## POTION ADOL

**Composition.** — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Spartéine, Stovaine, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

**Action thérapeutique.** — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

**Avantages.** — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

**Indications.** — Douleurs aiguës, quelle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lumbago, sciaticques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

**Mode d'emploi.** — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 16 francs

**Laboratoire ADOL**

**L. GIROUD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

78, cours de la Liberté — LYON.

## POUDRE CASSARINI

**Médication Sédativè du Système Nerveux**  
**ÉPILEPSIES - HYSTÉRIE - NÉVROSES DIVERSES**  
**(En Comprimés)**

Nouvelle combinaison antitoxique bromée aux extraits végétaux.

Spécifique héroïque des épilepsies et des affections nerveuses avec hyper-excitation du système nerveux.

Prix au public : 22 fr. 50 la boîte (un mois de traitement environ).

### Posologie :

*Adultes* : 6 comprimés par jour. 2 avant chacun des trois principaux repas. Dissous dans un demi-verre d'eau.

*Adolescents* : 10 à 15 ans : 3 jusqu'à 4 comprimés par jour. Un ou deux avant les trois principaux repas, dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage.

*Enfants de 6 à 10 ans* : 2 jusqu'à 3 comprimés par jour, un avant le petit déjeuner, un avant le repas du soir, dissous dans n'importe quel liquide.

*Enfants au dessous de 5 ans* : Demander doses spéciales.

Littérature sur demande :

**Raoul COLUMEAU, Pharmacien spécialiste**  
 19, rue Saint-Bazile — MARSEILLE.

## POUDRE CHAUMEL

### Hygiène de la Femme.

Borate de soude et Essence de Lavande, entièrement soluble dans l'eau, Odeur agréable et discrète.

**Indications.** — Décongestionnante, Anti-septique, Adoucissante.

Hygiène intime de la femme ;

Hygiène des yeux (blépharites, conjonctivites). Traitement des plaies.

**Mode d'emploi.** — Un sachet pour un à deux litres d'eau chaude.

Boîte de 20 sachets.

**Etablissements FUMOUE**

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

## POUDRE DANICA

Anisée, d'une finesse extrême, se délaye très facilement, très agréable dans l'eau gazeuse, calme la soif instantanément.

**Composition.** — Carbonate de Ca et Mg, Silicate de Mg.

**Indications.** — Toutes affections d'estomac, intestin et foie, Solarites, Régularise les garde-robes. Efficace contre hyperacidités et hypertension. Equilibre le pH sanguin. Stimule la fonction rénale. Fait passer dans le sang des chlorures de Ca et Mg et des silicates solubilisés. Reminéralise. Prévient le cancer. Supprime l'insomnie digestive.

**Mode habituel d'emploi.** — Toutes variantes possibles. Une 1/2 cuillerée à café avant les repas : une cuillerée à café au coucher et au réveil.

La boîte : 12 fr. 50.

**P. BLOUIN, Pharmacien**

50, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmatiques.

**Composition.** — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1<sup>er</sup> choix).

**Indications thérapeutiques et formes.** — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foin, fins de coqueluche, etc.

**Mode d'emploi.** — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

**Prix de vente :** 9 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

**Laborat. ESCOUFLAIRE** — Baisieux (Nord).  
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

## POUDRE ET CIGARETTES ZANI

Anti-asthmatiques.

**Composition.** — Datura Stramonium, Belladone atropa, Digitalis purpurea, Croton Eluteria, Styrax benzoin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Oppression, Catarrhes, Coqueluche, Suffocation, Bronchites chroniques, Toux nerveuses, Asthme des foin.

**Mode d'emploi.** — Respirer largement la fumée. Faire brûler une cuillerée à café de poudre ou en plein air fumer les cigarettes.

4 fr. 50 la boîte.

**G. DE SAINT-STEBAN**

Docteur en Pharmacie

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

---

## POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

**Forme et composition.** — Insuline purifiée de fabrication française en poudre et en pommade.

**Mode d'action.** — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

**Indication.** — Ulcères variqueux, plaies atones, fermeture rapide de la plaie.

**Mode d'emploi.** — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de l'ulcère, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

**LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE  
GÉNÉRALE**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 26-87

## **POUDRE LAXATIVE DE VICHY** **du docteur Léonce Souligoux.**

Composée de principes végétaux et aromatiques et d'un soufre spécialement traité, la Poudre laxative de Vichy s'emploie à la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, le soir en se couchant. Très agréable, facile à prendre. De résultat constant.

**CHASSAING, LE COQ et Cie**  
1, Quai Aulagnier  
**ASNIÈRES (Seine).**

## **POUDRE MASS PLASTIQUE**

La POUDRE MASS, nouveau composé oléique sulfureux, assouplit la peau et la tonifie. Son usage fréquent assure le rajeunissement de la cellule et la régénération de la peau.

**I. Indications chirurgicales.** — Escharres, garniture intérieure des appareils plâtrés et orthopédiques.

**II. Indications médicales :** Eczéma, Prurit, Zona, Acnés, Plaies suintantes non suppurées, Impétigo, Varices et Ulcères variqueux, Phlébites, Proliférations cornées, Arthrites (simples ou déformantes). Maladies infectieuses cutanées : Rougeole, Scarlatine, Varicelle, Fièvre typhoïde.

Adénopathies, Tuméfactions douloureuses.

Rides du visage, Peaux grasses, Moiteur, Hyperhydroses.

### **Présentation :**

Boîtes de POUDRE MASS pour massages, pansements, petites applications.

Coussins de POUDRE MASS (voir indications ci-dessus) type standard : 30 cm. × 11 cm. Sur demande spéciale du Chirurgien ou du Médecin, adressée directement à nos laboratoires, nous établissons des coussins de toutes dimensions et de toutes formes.

Pour tous renseignements, s'adresser :

**Laboratoires H. YVRARD**  
**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
**17, rue Soufflot — PARIS (V<sup>e</sup>).**

## POUDRE NOELLINE

### Composition.

Poudre à base de Dermatol et Acide Borique.

### Indications.

Rougeurs des bébés, Intertrigo, Escarres.

### Mode d'emploi.

En application locale tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Prix. La boîte poudreuse : 6 fr.

Boîte décorée de luxe, pour table de toilette : 18 fr.

**Laboratoire de la NOELLINE**  
**GUINGAMP (Côtes-du-Nord).**

## POUDRE PATERSON

### Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, *léger*. Magnésie calcinée. Sucre pur.

### Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses.*  
*Le seul saturant gastrique* neutre présenté en *pastilles*, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Très supérieur au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin).

### Indications :

*Poudre en paquets* : Pansement gastrique. Saturation. Gastropathies douloureuses. Dyspepsies. Hyperchlorhydrie. Acidités anormales. Ulcus gastrique et duodénal. Entérites et infections intestinales. Dyspepsies gravidiques. Troubles digestifs du nourrisson.  
*Pastilles* : Traitement d'entretien. Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la **grossesse**.

### Formes et posologie :

*Paquets* : (2 gr.) 2 à 5 par jour, et plus, au moment des crises douloureuses.

*Pastilles* : 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.

Prix au public : Poudre, la boîte (40 paquets), 15 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 8 fr. Pastilles : La boîte, 7 fr. 50 ; la demi-boîte, 4 fr.

**Laboratoires des Produits PATERSON. G. et M. Armingeat.**

46, rue de Saintonge — PARIS (III<sup>e</sup>).

## POUDRE ROCHER LAXATIVE

### Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

**Composition.** — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

**Posologie.** — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

Echantillon franco à Messieurs les Docteurs.

**Laboratoires E. FERRÉ**

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## POUDRE SATINE

### Composition :

Stéarates .....	24 gr.
Acide borique.....	6 gr.
Silic. de Magnésie.....	4 gr.
Carbonate de chaux.....	6 gr.

Par boîte.

**Propriétés thérapeutiques.** — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

**Indications.** — Toilette des bébés. Irritations cutanées, escarres des malades alités, feux du rasoir. La boîte : 7 francs.

**Laboratoires NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

## POUDRE STOM

Mélange en proportions étudiées de Carbonate de chaux, Bicarbonate de Soude, Benzonaphtol, Ferment Lactique, Belladone. Aromatisé à la Menthe.

**Indications.** — Digestions pénibles, pirosis, Renvois, Fermentations.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café (après les repas) délayée dans 1/2 verre d'eau.

---

**Laboratoire des Produits Français**

**L. HERIN, Ex-Interne des Hôpitaux**  
 98, rue Jeanne-Maillotte  
 LA MADELEINE (Nord).

---

## PRAGMOLINE

Solution stable de bromure d'Acétylcholine.  
 Hypotenseur et excito-moteur des fibres lisses.

**Indications.** — Accidents de l'hypertension en général. Affections spasmodiques d'origine artérielle (artérites sténosantes des membres, maladie de Raynaud, localisations cérébrales, rétiennes, auriculaires, etc.). Hypovagotonie. *Sueurs des Tuberculeux.*

**Présentation et Posologie.** — Boîte de 10 ampoules.

**Solution A :** Dosée à 6 p. 100 de bromure d'acétylcholine (ampoule de 1/2 cc.).

**Solution B :** Dosée à 12,5 p. 100 (ampoule de 1 cc.).

Injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0 gr.03 à 0 gr. 06 pour les sueurs des tuberculeux ; 0 gr.25 à 0 gr. 50 pour les angiospasmodiques. Débuter par de petites doses.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
 21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## PRÉCIKASE

**Laxatif cholagogue.**

Soufre, 0 gr. 025 ; Calomel, 0 gr. 01 ; Extrait de Boldo, 0 gr. 005 ; Extrait de Belladone, 0 gr. 005 ; Adjuvants divers.

**Posologie.** — Cholagogue léger : 1 pilule tous les soirs.  
Laxatif : 2 à 6 pilules au repas du soir.

**Avantages.** — La Précikase ne détermine pas de douleurs abdominales. Elle exalte le péristaltisme de l'intestin sans irriter la muqueuse.  
Elle détermine une sécrétion hépatique (cholérétique) et une excrétion biliaire (cholagogue) efficaces et très appréciées des malades.

**Indications.** — Constipation, Etats hépatiques, Paresse intestinale. Maladies de peau : Acné, Séborrhée, etc.

La boîte de 60 pilules : 12 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE**  
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

## PRÉVALIDINE

**Forme.** — Pommade résorbable en tube gradué.

**Composition :**

- 1° Camphre et huiles essentielles aromatiques ;
- 2° Baume du Pérou, Acide cinamique ;
- 3° Extrait opothérapique de peau animale.

**Indications.** — Grippe, Bronchite, Broncho-pneumonie, Emphysème, Coqueluche, Tuberculose, etc.

**Mode d'emploi.** — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

**Présentation.** — Tube gradué par onction.

Prix : 9 francs.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE.

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

Tél. : Lamartine 92-52.

## PRÉVARSYL

**Composition.** — Acide métacétylamino-para-oxyphénylarsinique.

**Forme.** — Présenté en comprimés de 0 gr. 25 de substance active. Doses spéciales de 1 et 5 cgr. pour enfants.

**Indications.** — Indiqué dans le traitement arsénical par la voie buccale de la syphilis, des trypanosomiases, de l'amibiase et du paludisme.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour.

**Usines Chimiques**

**des Laboratoires Français**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**

3, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 58-43.

## PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie  
antivénérienne.

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

**Composition.** — En trois tubes d'étain de couleur différente :

1<sup>o</sup> Pommade de Metchnikoff (calomel 33 p. 100) ;

2<sup>o</sup> Gelée au protargol à 2 p. 100 ;

3<sup>o</sup> Poudre de savon ;

4<sup>o</sup> Une cartouche de ouate hydrophile.

**Présentation.** — Grand modèle (15 fr.), pour 8 à 10 applications.

Petit modèle (8 fr.), aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires MARCHAND et LEROY,**

74, rue des Jacobins — AMIENS (Somme).

## PREZYMASE

### Cure de désensibilisation.

**Composition.** — Peptone de poisson, peptone de viande, extrait sec de quinquina.

**Mode d'action.** — Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal, Méthode de Pagniez, et Pasteur-Vallery-Radot).

**Posologie.** — Une à deux dragées une demi-heure avant chaque repas.

**Laboratoires LEBOIME**

3, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII<sup>e</sup>)

## PRIMULYSE

### Composition :

Racine de primevère. (Extrait mou stabilisé).....	0,05
<i>Travaux des Docteurs H. Leclerc, Wasicky, Kosler, etc.</i>	
Bromoforme. Combinaison organique stable.....	0,01
Codéine et Dionine, ââ.....	0,005
Extraits mous de Grindélia.....	0,01
Belladone et Aconit, ââ.....	0,002

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif de la toux.

**Indications.** — Affections broncho-pulmonaires. Toux rebelles, Bronchites, Asthme, Catarrhe, Grippe, etc., etc.

### Forme et mode d'emploi :

*Adultes* : 6 comprimés par 24 heures.

*Enfants* : 2 ou 3 comprimés selon l'âge.

Prix : 14 francs.

**Etablissements GOY**

23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## PROBIOS

### Thérapeutique mixte Antivirus. Bactériophage.

La supériorité de nos produits sur les produits similaires est obtenue grâce à l'association du bactériophage aux antivirus des bactéries devenues résistantes au principe lytique (C. R. *Société de biologie*, t. CII, p. du 21 mai 1930).

### PROBIOS ANTIPYOGÈNE EN POMMADE

**Présentation.** — En tubes d'étain.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophages. Anti-Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

**Indications.** — Acné, Sycosis, Furonculose, Anthrax et toutes les staphylococcies. Abscesses, plaies suppurées, brûlures infectées, etc.

### PROBIOS ANTIPYOGÈNE

#### Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage. Anti-Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

**Indications.** — Infections pyogènes : Abscesses, Phlegmons, Panaris, Plaies suppurées, Brûlures infectées, Pyodermites et toutes les suppurations. A titre préventif sur les plaies en chirurgie, avant, pendant et après les interventions septiques.

### PROBIOS ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

#### Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage Anti-Staphylococciques.

**Indications.** — Acné, Sycosis, Furoncles, Anthrax et toutes les infections à Staphylocoques.

### PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

#### Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

De plus, chaque boîte contient un instillateur nasal.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage, Anti-Pneumococciques, Streptococciques, Staphylococciques, Friedländer, Proteus, Antivirus Pfeiffer.

**Indications.** — Coryza, Sinusites, Rhinites, Ozène, Otites, Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, certaines formes d'Asthme. Préventif dans la Grippe et le Coryza.

### PROBIOS ANTI B. COLI

#### Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage Anti-B. Coli, B. Para-Coli, Friedländer et Proteus.

**Indications.** — Toutes infections se rapportant à *B. Coli*, Para-*Coli*, Friedländer et *Proteus*, notamment, Bactériuries, Cystites, Pyélites, Pyélonéphrites. Cholécystites, Vulvo-Vaginites, etc.

### PROBIOS INTESTINAL

#### Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage Anti-*B. Coli*, Dysentériques, Typhiques et Para, Friedländer, *Proteus*, Staphylococciques, Streptococciques, Entéroccocciques, Pyocyaniques, Antivirus *Perfringens* et *Sporogenes*.

**Indications.** — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal ; Stases et tous états toxi-infectieux : Diarrhées des nourrissons ; Diarrhées des enfants ; Diarrhées saisonnières ; Dysenterie bacillaire.

### PROBIOS INTESTINAL EN COMPRIMÉS

**Présentation.** — Une boîte de 5 tubes de 10 comprimés chaque.

**Principes actifs.** — Voir Intestinal Ampoules.

**Indications.** — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases et tous états toxi-infectieux, Dysenterie bacillaire.

### PROBIOS BUCCO-DENTAIRE

#### Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage Anti-Streptococciques, Staphylococciques, Pyocyaniques, Pneumococciques, Friedländer.

**Indications.** — Préventif et curatif de toutes les manifestations suppuratives au cours du traitement des dents infectées, des Abscès, Phlegmons, Ostéites, Infections périapiculaires, Gingivites, Stomatites, Pyorrhées, Alvéolites post-opératoires, etc.

### PROBIOS BUCCO-ADHÉSIF

En extrait concentré pour pansements vaccinnants adhérents aux tissus mous.

**Principes actifs.** — Voir Bucco-Dentaire.

### PÂTE DENTIFRICE PROBIOS

La Pâte Dentifrice des Pyorrhéiques.

**Principes actifs.** — Voir Bucco-Dentaire.

#### Laboratoires PROBIOS

1, avenue Pasteur — PARIS (XV°).

Tél.: Invalides 25-73.

## PROCALCOYL

(Granulé.)

Régénérateur complet du sang et recalcifant intégral.

**Composition.** — Adjonction à l'extrait hépatique et à l'extrait splénique de sels de fer, de Manganèse, de Chaux et de Magnésie dont le métabolisme est assuré par la présence de Vitamine A (Carotène) et de sels d'or (dose catalytique).

**Propriétés.** — Synergie thérapeutique d'une activité remarquable dans tous les cas de fléchissement de l'état général : Anémies, Déminéralisation, Rachitisme, Allaitement, Prétuberculose et toutes convalescences, Résultats surprenants.

**Forme.** — Granulé fondant, d'un goût délicieux.

**Posologie.** — Une seule, de l'enfant de 3 ans au vieillard : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

Durée du traitement : environ 3 mois et demi.

Remise aux pharmaciens : 40 p. 100.

### CONSORTIUM SCIENTIFIQUE

2, place Meissonier — LYON.

## PRODYNASE

**Médication** Phosphorée, Calciqye, Magnésinée.

**Composition.** — Comprimés comprenant :

Méthyl phosphate de Chaux..... 0 gr. 20

Méthyl phosphate de Magnésie..... 0 gr. 05

**Propriétés.** — Produit introduit nouvellement en thérapeutique par les auteurs. Médication spécifique du système nerveux. Puissant facteur de croissance. Contribue à la formation du squelette. Régulateur de la Nutrition.

**Indications.** — Surmenage, Croissance, Dystrophie phosphocalcique, Rachitisme, Fractures, Altérations dentaires, Grossesse, Allaitement, Tuberculose, Diabète, Asthénie, Cancer.

**Mode d'emploi :**

**Adolescents :** 1 comprimé au début des repas, midi et soir.

**Adultes :** 2 comprimés au début des repas midi et soir.

**Laboratoires A. GUILLAUMIN et A. GERARD**

**Docteurs en Pharmacie**

12, rue Charles-V — PARIS.

## PROGASTER

(Nom déposé.)

Sous forme de comprimés.

**Composition.** — Per-oxyde de magnésium préparé par une méthode spéciale (procédé Hély), permettant sa décomposition instantanée en présence du suc gastrique en oxygène et en chlorure de magnésium naissant.

**Propriétés.** — Désinfectant remarquable du tube digestif, amélioration surprenante de l'état général. Action combinée de l'oxygène et du chlorure de magnésium à l'état naissant.

**Indications.** — Troubles digestifs, hépatiques, arthritisme, artériosclérose, diabète, toutes asthénies, caries dentaires, convalescences, etc.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par 24 heures, pas de contre-indications, pas d'accoutumances du nourrisson au vieillard.

Remise aux pharmaciens = 40%.

**Usines NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

---



## PROGONE

**Chimiothérapie anti-infectieuse par l'acridine.**

Ampoules pour injections intraveineuses et comprimés.

**PROGONE (Ampoule).** — Chlorhydrate du 2-7 diméthyl, 3-6 diéthanol amino-acridine en solution à 0,05 p. 100. Ampoules de 10 cc.

**Indications.** — Le Progone est un puissant agent anti-infectieux ; il permet l'acridinothérapie des septicémies, des infections urinaires et surtout de la blennorragie avec les meilleurs résultats et sans aucun incident thérapeutique.

**Propriétés.** — Le Progone ne donne pas de choc acridinique ni d'accidents rénaux ou hépatiques, il ne sclérose pas les veines et ne tache pas les téguments.

**Posologie.** — *Blennorragie aiguë* : 5 injections par semaine pendant 2 à 3 semaines.

*Blennorragie génito-urinaire chronique* de l'homme et de la femme.

*Complications. Infections urinaires* diverses : 1 injection tous les deux jours par série de 15 injections.

*Septicémies* : un jour sur deux, 2 à 8 injections selon l'état du malade.

Compléter l'action des injections de PROGONE en prescrivant les jours intercalaires 3 à 6 comprimés de PROGONE.

**PROGONE (Comprimés).** — Les comprimés de Progone associent au dérivé d'acridine de la forme injectable :

La Kawaïne (seul balsamique utilisable à la période aiguë).

L'Arbutine :

Le Bleu de méthylène : } calmants et antiseptiques bien connus.

**Indications.** — La blennorragie masculine et féminine à toutes ses périodes : urétrites, cystites, prostatites, etc.

Les infections urinaires (pyélonéphrites, colibacilliose, etc).

**Posologie.** — *Blennorragie aiguë* : 3 à 6 comprimés par jour.

*Blennorragie génito-urinaire chronique* de l'homme et de la femme.

*Complications. Infections urinaires* : 3 comprimés par jour.

Présentation et prix

Progone ampoules : la boîte de 5 ampoules de 10 cc... 14 francs.

Progone comprimés : le flacon de 30 comprimés ..... 14 francs.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## PROMÉTHINE

**Cholagogue et Décongestionnant physiologique.**

**Forme.** — Granulé de saveur agréable.

**Composition.** — Peptone sèche pure, Sulfate de magnésie anhydre, Salicylate de soude, Excipient spécial.

**Indications.** — Insuffisances hépato-biliaires, Lithiasse biliaire, Congestion hépatique et vésiculaire, Ictère, et tous troubles d'origine hépatique.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café, le matin dans 1/2 verre d'eau tiède.

Laisser passer la phase aiguë des Cholécystites. Tâter la susceptibilité des Lithiasiques en commençant par des doses faibles.

Prix : 17 fr. 50.

**Laboratoires R. GOUIN**  
20, rue des Ecoles — PARIS  
Tél. Danton 81-53.

---

## PROPEPTASE

**Formes.** — Poudre et cachets.

**Composition.** — Carbonate de bismuth, carbonate acide de soude, carbonate de chaux associé à un complexe de ferments organiques ; papaïne, pepsine, pancréatine et d'hormones des muqueuses gastriques et intestinales du porc.

**Indications.** — Gastrites, atonie, ptose, dilatation gastrique avec pesanteurs, digestions lentes, renvois, ballonnements, crises de bâillement accompagnées ou non de troubles cardiaques, respiratoires ou cutanés.

**Mode d'emploi.** — 1 cuiller à café ou 2 cachets par repas.

« PROTHERAPIA »

**Laboratoire G. CHAMAGNE**  
Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie  
Lauréat de l'Académie de Médecine  
132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.

(voir ci-dessous).

Vaccination cutanée.

### Indications :

Toutes plaies suppurées ou exposées à la suppuration. — Furoncles, Brûlures, Ulcérations, Engelures, Excoriations, etc.

**Mode d'emploi.** — Applications deux fois par jour ; recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

## PROPIDON PANSEMENT

Présentation du Propidon en ampoules de 5 cc. pour applications locales.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du professeur Pierre Delbet. L'association de cultures de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

### Indications :

**Staphylococcies fébriles, Anthrax, Phlegmons, Lymphangites, Érysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination pré-opératoire.**

### Posologie et mode d'emploi :

Injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde du contenu d'une ampoule (4 cc.). A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à trois ampoules.

L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'ailleurs bien supportée.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## PROSTAPHILE LEISYN

Médication à action élective sur la Prostate. Innocuité absolue. Aucun inconvénient. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Congestion, Hypertrophie et Sclérose de la Prostate, Prostatismes, Prostatites, Complications de l'Hypertrophie de la Prostate, Cancer de la Prostate.

Action immédiate.

**Présentation.** — Ampoules de 2 cc. environ, injectables tous les jours ou tous les deux jours, soit hypodermiquement, soit dans la glande elle-même.

**Composition.** — Acide acétique, Acide citrique, Acide phosphorique, Alumine, Ammoniaque, Chaux, Chlore, Magnésie, Potasse, Soude, Sucre. Préparé par procédé spécial au Sodium et gaz acétylène à hautes températures et à très hautes pressions.

Les Laboratoires LEISYN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Adr. télégr. : Laboleisyn Paris.

Tél. : Auteuil 14-73.

---

## PROSTATOLS BEAUXIS LAGRAVE

Suppositoires calmants, fondants, décongestifs, anti-infectieux, résolutifs de toutes affections prostatiques, aiguës ou chroniques.

**Composition.** — Ion Hg + (petite dose), extrait de solanées et de papavéracées, Hamamélis, Hormones prostatiques totales.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes douleurs, Inflammations (prostatites aiguës ou chroniques) Blennorrhagie et ses complications génito-urinaires, Tenesmes, Contractures, Spasmes divers, Pollakiurie nocturne, Pesanteurs et irradiations périnéales.

Hypertrophie (adénomes-tumeurs) et toutes affections de la prostate, opérables ou non.

**Mode d'emploi.** — Le plus habituel, un le soir au coucher.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

74, quai de Jemmapes — PARIS.

Tél. : Botzaris 38-78.

## PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergétique.

**Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.**

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 centigr. de fer et 5 milligr. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

**Laboratoire GALBRUN**

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## PROSTIGMINE « ROCHE »

Médicament synthétique destiné au traitement de la parésie intestinale post-chirurgicale.

**Composition.** — Ester de l'acide diméthyl-carbaminique et du m-oxypényltriméthylammonium-méthylsulfate en solution de 0,5 p. 1 000 pour injections sous-cutanées ou intramusculaires.

**Propriétés.** — Action nettement supérieure à celle de la Physostigmine (Esérine) et sans aucun effet sur l'activité cardiaque et sur la pression sanguine.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> *Pour provoquer l'évacuation des gaz* : 1 ampoule de 1 cc. le lendemain de l'opération.

2<sup>o</sup> *Pour provoquer l'évacuation alvine* : 1 ampoule de 1 cc. suivie d'un lavement de 200 cc. environ d'une solution glycinée à 10 p. 100 une demi-heure après l'injection.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## PROTENSÈNE LEJEUNE

**Composition.** — Cinq gouttes contiennent :

Iode bisublimé.....	1 cgr.
Peptone de cœur.....	4 cgr.
Extrait fluide stabilisé de gui.....	5 cgr.
Extrait fluide stabilisé de genêt.....	1 cgr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Propriétés de l'iode et des iodures sans *iodisme*.

La *Peptone de cœur* est un agent thérapeutique précieux de la débilité myocardique constitutionnelle et de la dégénérescence myocardique acquise.

L'*extrait de gui* est un hypotenseur éprouvé, il régularise les battements du cœur.

Le *genêt* est en même temps un toni-cardiaque et un diurétique.

**Indications.** — Hypertension, artériosclérose, affections cardiaques.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes à chacun des 2 principaux repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

---

## PROTIODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

**Composition.** — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses iodées, et chlorure de calcium.

**Formes.** — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injectons hypodermiques indolores.

Jamais de **choc**, ni de **réactions anaphylactiques**.

**Propriétés.** — Par ses effets **préventifs** et **cura-tifs** des infections fébriles et des intoxications, la **Protiodyne** est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

**Indications.** — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, **puerpérales**, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furunculose ; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique : Asthme vrai, Asthme des foin, Migraines, etc.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

*Enfants* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

**La Protiodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.**

Prix : La boîte 4 ampoules Protiodyne, 18 fr.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

*Littérature et Echantillons sur demande au*

**Laboratoire général d'Études Biologiques**

S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

## PROTIODYNE DRAGÉES

**Composition.** — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

**Propriété.** — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

**Indications.** — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

**Doses et mode d'emploi.** — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées. *Enfants* : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau. Prix : la boîte de 50 dragées Protiodyne : 15 fr.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoire général d'Études Biologiques**  
S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

## PROVEINASE MIDY

(Comprimés) type de l'Endocrino-Phytothérapie.

**Composition :**

1° Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : Cupressus, Genêt, Marron d'Inde, Hamamélis et Viburnum.

2° Poudres *titrées* d'organes *frais*, prélevés aux abattoirs de Paris, obtenues dans nos Laboratoires par procédé spécial MIDY : Thyroïde, Surrénale et Hypophyse.

Ces poudres sont mises en comprimés *dès fabrication*.

**Propriétés thérapeutiques.** — Synergie régulatrice de l'Insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictives de plantes soigneusement sélectionnées.

**Indications.** — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

**Mode d'emploi :**

Etats chroniques : 2 à 4 comprimés par jour.

Etats aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## PROXYTOL

Association des Proxytases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).  
Spécifique des affections gastro-intestinales.

**Mode d'action.** — Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse ; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

**Indications.** — 1° Les dyspepsies ; 2° les entérites ; 3° l'insuffisance hépatique ; 4° les gastro-entérites des nourrissons.

**Forme.** — Boîte de 36 comprimés.

**Doses.** — *Adultes* : Croquer de 4 à 6 comprimés par jour le matin à jeun ou loin des repas.

*Enfants* : Demi-doses.

*Nourrissons* : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL**  
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---

## PRUNINE SENTINI

aux Prunes d'Ente d'Agen.

**Principes actifs.** — Pruneaux d'Agen, Phtaléine, Cephaelis Ipécacuanha.

**Indications.** — Laxatif et Purgatif doux.

**Présentation.** — Délicieux bonbons d'extrait de Pruneaux d'Agen, enrobés de chocolat. Goût exquis, efficacité parfaite.  
Pas d'accoutumance, pas de coliques.

*Laxatif* : Un bonbon le soir au souper.

*Purgatif* : 2 à 3 bonbons le soir au souper.

*Enfants au-dessus de cinq ans* : Mêmes doses.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoires DOMERGUE**  
AGEN (Lot-et-Garonne).

## PSORÉON

### Spécifique du Psoriasis.

Pommade au chryshydrargyre, association mercurielle, cadique pure, sans odeur, avec l'acide chrysophanique.

**Spécialité type.** — Seule médication *externe* préparée exclusivement contre le *psoriasis*, le PSOREON constitue un traitement nouveau et rationnel autant que pratique de cette dermatose.

Exclusif comme emploi, Unique en son genre, Unique en son but, Unique comme efficacité. Le PSOREON possède des propriétés thérapeutiques indiscutables devant toujours être utilisées contre le PSORIASIS.

S'emploie en applications pendant la nuit.

Présentation en tubé pour la clientèle.

Peut être fourni en vrac aux Hôpitaux seulement.

**Laboratoire ÉON**

DINAN (Côtes-du-Nord).

## PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

**Indications thérapeutiques.** — Psoriasis, parakératoses, Psoriasis arthropathiques.

**Présentation.** — Ampoules de 3 cc. avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. sans anesthésique pour injections intraveineuses.

**Posologie.** — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule au maximum, et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Séries de 30 injections.

Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

*Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire* : Psothanol en amp. de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 25 francs.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X°).

## PULMACARDIA

**Cardiotonique-Régulateur** de la circulation de la pression sanguine, doublé d'une action antiseptique sur les sécrétions pulmonaires.

**Composition.** — Synergie médicamenteuse à cinq éléments constitutifs :

Extr. Ail, Extr. Cratægus, Camphora, Eucalyptol, Spartéine.

Le tout en pilules glutinisées, s'absorbant seulement en milieu intestinal et sans action malodorante sur l'haleine.

**Indications.** — Tous états pathologiques associant cœur et poulmon.

Hypertension, solitaire ou associée, avec Syndrome aortique, Sclérose rénale, Gangrène pulmonaire, Bronchites fétides, Abscès du poulmon, Catarrhe, Emphysème, Dyspnées asthmatiformes, Adjuvant dans les tuberculoses pulmonaires à forme conjective, et avec expectoration.

**Doses.** — 6 à 10 pilules par jour, prises de préférence par 3 ou 4, une heure avant les repas.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire BERGER**

14, rue des Pyramides — PARIS.

---

## PULMOCARDINE

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Angine de poitrine, maladies du cœur et des vaisseaux, etc.

**Présentation.** — Dragées faciles à prendre.

**Composition :**

**Iodure de Caféine** : fluidifie les sécrétions bronchiques, régularise le cœur et restitue l'énergie à la systole.

**Grindelia** : Expectorant et antispasmodique puissant, diminue la tachycardie et la dyspnée.

**Lobélia** : détend la contracture et supprime l'angoisse.

**Quebraco** : eupnéique, augmente l'amplitude des mouvements respiratoires.

**Doses.** — 2 dragées au début des 2 repas.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoires J. PERROCHON**

57, rue Origet — TOURS.

## PULMODION

1° *Comprimés* à base de Dionine.

Chaque comprimé représente :

Dionine (chlorhydrate d'éthylmorphine).....	0,004
Extrait d'Aconit .....	0,003
Extrait de Belladone .....	0,003
Extrait de Marrube .....	0,10
Extrait de Drosera .....	0,01
Terpine.....	0,05

2° *Sirop* à base de Dionine, Sulfogaïacolate de potasse, Bromoforme.  
**Indications.** — Affections respiratoires, Traitement énergique de la toux et de l'oppression dans les cas de bronchite, Trachéite, Laryngite, toux nerveuses.

Grâce à la Dionine, activité remarquable sans *accoutumance* et tolérance parfaite par l'estomac.

### Mode d'emploi :

Par 24 heures :

1° *Comprimés* : enfants à partir de 10 ans : 2 à 4 comprimés suivant l'âge.

*Adultes* : 4 à 6 comprimés à prendre en dehors des repas.

Avaler sans sucer ni croquer.

2° *Sirop* : enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 5 cuillerées à café.

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe.

A prendre le plus loin possible des repas. Prix : 14 fr.

**Laboratoires JUIN**

10, Impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## PULMOGROG

Seul sédatif de la toux ne produisant ni constipation, ni inappétence, ni dépression.

Aucune notice intérieure.

**Pulmogrog adultes, sans stupéfiants.**

Elixir agréable (Dionine, bromoforme, aconit, noix vomique et cannelle).

### Doses :

3 à 5 cuillerées à café de 5 à 10 ans.

3 à 5 — à dessert au-dessus et vieillards.

3 à 5 — à bouche pour les adultes.

**Pulmogrog enfants, sans toxiques.**

*Sirop* agréable aux bromures (Ca, Mg, AzH<sup>4</sup>, chloral et belladone). Toux spasmodiques, coqueluche.

### Doses :

Par demi-cuillerées à café jusqu'à 1 an.

3 à 5 cuillerées à café de 1 à 3 ans.

3 à 5 — à dessert de 3 à 5 ans.

Par cuillerées à soupe au-dessus.

**Laboratoire FERCOCQ**

Licencié ès sciences

SAINT-MAUR (Seine).

## PULMOSERUM

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des  
Médicaments sous le n° 363-7.

**Forme.** — Solution.

**Composition.** — Infusion de Pulmonaire. — Infusion de Carragahen. — Phospho-Gaïacolate de Codéine. — Acide phosphorique.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Modificateur de l'expectoration. Sédatif de la toux. Antisepique des voies respiratoires. Reconstituant de l'état général.

**Indications.** — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à soupe, matin et soir, ou au milieu des repas, dans un peu d'eau.  
Le flacon : 14 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## PULMOVERNE

**Antisepsie des voies respiratoires.**

**Composition.** — Solution neutre, sans sucre, ni stupéfiants, contenant par cuillerée à dessert Gaïacol cristallisé 0,075 et Bromoforme 0,033.

**Propriétés.** — Modificateur des sécrétions bronchiques. Antisepique, antispasmodique, sédatif de la toux. Sans action sur l'estomac, ne constituant pas.

**Indications.** — Rhumes, toux rebelles, catarrhes, bronchites aiguës ou chroniques, toutes affections de l'appareil respiratoire. Grippe, séquelles de rougeole et de coqueluche.

**Posologie.** — 2 à 4 cuillerées à dessert, dans une boisson (lait, tisane, eau sucrée). Enfants par cuillerées à café.

Le flacon : 12 fr.

**Laboratoire VERNE**  
GRENOBLE.

## PULSAMONE

Phytothérapie antispasmodique.

Médication exclusivement végétale associant pour la première fois la **Pulsatille** (*Anemone Pulsatilla*), excellent modérateur de l'excitabilité nerveuse et douloureuse, à trois autres plantes également douées de propriétés antinerveuses : **gui**, **saule blanc** (châtons) et **passiflore**.

C'est donc le prototype de l'*anti-spasmodique végétal*, sans stupéfiant, ni toxique dont l'action n'est jamais suivie de dépression.

La **Pulsamone** ne comporte pas de contre-indication et n'offre aucun danger d'accoutumance. C'est pourquoi elle peut être conseillée aux moins résistants : vieillards, enfants, etc., ainsi qu'aux malades particulièrement susceptibles : cardiaques, hépatiques, etc.

**Indications.** — Véritable médication équilibrante du système nerveux, la **Pulsamone** sera prescrite dans : Neurasthénie, Irritabilité, Angoisse, Anxiété, Psychonévroses, Insomnies, Troubles nerveux de la menstruation et de la ménopause, Troubles cardiaques d'origine nerveuse, Insomnie des biliaires, Excitation nerveuse des hépatiques, Aérophagie.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à café, dans un peu d'eau, avant chaque repas ; et, dans les *insomnies*, deux à trois cuillerées à café, dans une infusion chaude, au coucher.

Prix : 15 francs.

---

Laboratoires de la **PULSAMONE**

6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol, eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

**INDICATIONS.** — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.*

— Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du cavum, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

*Affections respiratoires.* — Trachéo-bronchites, gripes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

*Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies ; dentifrice* en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

**MODE D'EMPLOI.** — **Poudre** : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche.

**PASTILLES.** — 8 à 10 par jour.

Prix : Poudre : 12 fr.

— Pastilles : 4 fr. 75.

Laboratoire du PULVÉOL

10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Téléph. : Marcadet 37-98.

## PULVITA

Poudre des 4 Gluconates (Mn, Mg, Ca, AzH<sup>4</sup>).

Licence exclusive Sandoz.

**Pulvita** est employé en pansement local dans les affections pulmonaires en particulier.

Traitement appliqué en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur électrique ou à alcool, dit pulvérisateur « Pulvita » (pulvérisateur genre Lucas-Championnière perfectionné). Appareil indispensable pour pouvoir suivre un traitement par **Pulvita** dans de bonnes conditions.

**Pulvita** est admis aux Assurances sociales.

Pour toute documentation écrire aux

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86.

(Précéd. : 8, rue de la Source. — PARIS)

## PURAGAR

### Cachets.

Laxatif rééducatif de l'intestin.

**Composition.** — Agar-Agar pulvérisé et stérile. 1 gramme pour un cachet.

**Indications.** — Toutes constipations avec matières fécales, durcies et desséchées.

**Posologie.** — 3 à 10 cachets par 24 heures.

Laboratoire de **Thérapeutique Normale**

**CH. LAVIRE**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

46, rue de Rome

MARSEILLE (B.-du-R.).

---

## PURGANOL DAGUIN

(C<sup>20</sup>H<sup>24</sup>O<sup>4</sup>)

**Forme.** — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 25 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

*Enfants* : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage, Laxatif préféré des nourrices.

*Echantillons sur demande aux*

**Etablissements DAGUIN**

SAINT-MAUR (Seine).



## PURGOS

Eau Minérale purgative, Sulfatée sodique et magnésienne. Contient tous les principes de l'Eau Minérale Naturelle de Vichy alliés aux Sels purgatifs  $MgO - NaO$ ; 60 grammes de Sulfates par bouteille 1/2 litre.

*Dose purgative* : 1 à 2 grands verres.

*Dose laxative* : 1 verre à bordeaux le matin à jeun.

Dans le cours des voyages, dans les localités où l'Eau de Purgos viendrait à manquer, on peut lui substituer les

### COMPRIMÉS PURGOS

qui, dissous dans une Eau Minérale de Vichy, offrent, sous une présentation pratique, toutes les qualités de l'Eau Purgative.

*Dose purgative* : 4 à 6 comprimés.

*Dose laxative* : 2 à 3 comprimés.

Le matin à jeun.

En tubes de : 24 comprimés.

Prix spéciaux pour le Corps Médical.

### Société PURGOS

Administration :

7, rue Galvani — PARIS.

Exploitation :

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY (Allier).

## PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyogène.

**Composition.** — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pommade ni un pansement gélosé. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyogène (*staphylocoques*, *streptocoques*, *B. coli*, *entérocoques*, *B. pyocyaniques*).

**Avantages.** — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

**Indications.** — Abcès, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intertrigo, Eczémas suintants, Ulcères, Sycosis, Mastites, Orgelets, Plaies infectées, Brûlures, etc...

**Mode d'emploi.** — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

Prix : 15 francs.

Laboratoires des AMPHO-VACCINS.

A. D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie, 6, rue Rothschild — NICE.  
62, rue Charlot — PARIS

## PYODERMASE

**Forme.** — Pommade sous tube.

**Composition.** — Eléments actifs de l'eau d'Alibour associés à l'oxyde jaune d'hydrargyre, ichtyol, baume du Pérou, etc.

**Indications.** — Toutes PYODERMITES ou affections de la peau secondairement infectées ou impétiginées : Ecthymas pustuleux, Impétigos, Streptococcie sèche du visage, Herpès circinné, Sycosis de la barbe, et toutes folliculites, Dermatomycoses.

**Emploi.** — Avant l'application de la PYODERMASE, faire disparaître les croûtes au moyen de pansements humides ou rendre nettes les régions purulentes par l'évacuation des phlyctènes.

Prix : 8 fr. 75 le tube.

**Laboratoire de la Pyodermase,**

**Max. PAVY, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

Place du Marché — LA ROCHELLE (Ch.-Inf.).

## PYOFORMINE

**Ampoules de 2 cc.**

Mélange de leucocytes, et ferments sécrétés par les globules blancs en suspension dans une solution physiologique d'UROFORMINE GOBEY, Pyothérapie aseptique.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 ampoules par jour en injection sous-cutanée intramusculaire ou intraveineuse dans les cas graves.

**Propriétés thérapeutiques.** — Leucocytothérapie. Médication préventive et curative des infections, des Pyrexies, de toutes les Septicémies. Doit être injectée dès l'apparition des symptômes infectieux qu'elle fait alors souvent avorter.

**Indications.** — Grippe traînante ou compliquée, Suppurations, Angines, Typhoïdes et Paratyphoïdes, Colibacillose, Cholécystites, Péritonites, Pyélonéphrites, Etats puerpéraux, Infections pleuro-pulmonaires, Méningites, Encéphalites.

Prix au public :

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## PYO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

**Composition.** — Lysat de Streptocoques et de Staphylocoques.

**Indications.** — Suppurations : phlegmons, abcès, panaris, adéno-phlegmons, plaies infectées, fractures ouvertes, pyodermites du nourrisson : pemphigus, etc...

**Posologie.** — Ampoules de 1 cc. Une première injection de 1/2 de cc. les suivantes un centicube tous les jours, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 25 francs.

## PYO - VACLYDUN PANSEMENTS

Vaccination locale ampoules de 5 cc.

**Mode d'emploi.** — Imbiber de vaccin une compresse stérilisée. Mettre sur la plaie et recouvrir d'un imperméable. Pour les cavités, introduire une mèche imbibée de Pyo-Vaclydun pansement.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

Prix : 18 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Carnot 78-11.

## PYRÉLAINE COLLAS

**Composition.** — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 04 de soufre organique *combiné non oxydé* doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

**Propriétés.** — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre « per os », la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

**Indications.** — Toutes celles du soufre. *Carences Sulfurées*. Résulfuration thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, Cholécystite, Rhumatismes chroniques, Goutte, Dermopathies, Parasites intestinaux.

Pas de contre-indications.

**Forme et posologie.** — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 01 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crises aiguës : 3 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 12 fr.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT

MOUGNAUD et C<sup>ie</sup>, pharmaciens

15, 17, 19, rue Augustin-Thierry — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 28-65.

## PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

**Composition.** — Diméthylaminopyrazoline phénazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

**Emploi et doses.** — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée, 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

**Gouttes.** — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C, si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

*Enfants* : I à II gouttes par année d'âge.

**Indications antithermiques** : Donner à doses réfractées.

**Ampoules A.** — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

**Ampoules B.** — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

**Injectons intramusculaires.**

**Indications.** — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaire ; (XXV-L à répéter), chercher la dose-leviers, Disménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, *permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espace*) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L, 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — *Echantillons et Littérature.*

**Gouttes** : 18 fr. — **Ampoules A-B** : 16 francs.

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

**Laboratoires CAMUSET**

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

## PYRI-PYRIDIUM

(Phényl-azo- $\alpha$ - $\alpha$ -diamino-pyridine.)

*Un corps chimique nouveau pour la désinfection génito-urinaire par voie buccale; rend antiseptiques les urines même alcalines, pénètre et se fixe dans l'épithélium de l'appareil génito-urinaire; possède une remarquable action analgésique.*

**Indications.** — *Pyélites, Pyélo-néphrites, Cystites, Colibacillose.*

**Posologie.** — 3 à 6 comprimés par jour après les repas. (Le Pyri-Pyridium colore les urines en jaune-orangé.)

**Contre-indication.** — Urémie.

*Comprimés dragéifiés à 0 gr. 10.*

Flacon 20 comprimés : 23 fr. — Flacon 100 comprimés : 105 fr.

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS

## PYROLÉOL EDET

**Composition.** — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

**Propriétés.** — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

**Indications.** — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

**Présentation.** — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

**Mode d'emploi.** — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

**Résultats.** — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Prix au public : 13, 20 et 35 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## PYUROL

**Composition.** — C'est une combinaison de l'urotropine avec :

- 1° Deux métaux qui en suractivent les propriétés et augmentent l'acidité urinaire, le calcium qui l'oriente vers le rein, le magnésium qui augmente le flux biliaire ;
- 2° Le buchu, antiseptique urinaire, le boldo, cholagogue puissant.

**Indications.** — Action antiseptique sur l'appareil urinaire, action sur l'appareil digestif et sur le foie, action sur la diurèse.

**Forme et mode d'emploi.** — Granulé soluble.

*Adultes* : infections urinaires moyennes, 3 cuillerées à café dissoutes dans un verre d'eau ou de tisane, prises :

La première à jeun,

La seconde une heure avant le déjeuner,

La troisième une heure avant le repas du soir.

Infections urinaires aiguës, 3 cuillerées à entremets aux mêmes heures

*Enfants* : ces doses sont diminuées de moitié.

Dose pour 7 jours. Prix : 15 fr.

### Laboratoire A. LE BLOND

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,  
51, rue Gay-Lussac — PARIS (V<sup>e</sup>).

Téléphone : Odéon 20-06. — R. C. Seine 56 049.

---

## QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit.

Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

**Indications.** — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

**Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.**

**VIN :** Un verre à madère aux 2 principaux repas.

Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix : 25 fr.

**DRAGÉES :** Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes :* 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants :* 1/2 dose. — Prix : 12 fr. 50.

**GRANULE :** Convient particulièrement aux enfants.

*Adultes :* 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants :* 1/2 dose. Prix : 12 fr. 50.

Les Établissements **C. DAVID-RABOT**

**C. DAVID & ses Fils, pharmaciens**

49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).

## QUASSINE HOUDÉ

Granules titrés à un milligramme.

### Quassine Houdé

Principe actif *cristallisé* du quassia amara.

#### Propriétés thérapeutiques :

Amer, excitant énergétique de l'appétit, prescrit dans dyspepsies atoniques, embarras gastrique, contre les borborygmes, l'inappétence, etc.

#### Doses et mode d'emploi :

4 à 6 granules par jour, pris 5 ou 10 minutes avant les repas.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS.

## QUEBRALGINE « FOUCHÉ »

**Composition.** — Québrachine cristallisée, Ovarine, Extrait mammaire associés à l'Hamamelis, l'Hydrastis et le Viburnum, comme catalyseurs de l'action sédative de la Québrachine.

**Action thérapeutique et indications.** — Médication sédative des phénomènes congestifs et douloureux de l'appareil utéro-ovarien, par action tonique sur le système ortho-parasympathique ; équilibre et régularise le flux cataménial, supplée à son insuffisance ou à sa suppression naturelle (Ménopause) ou chirurgicale (Hystérectomie totale).

**Indications.** — Ménopause, Menstruations douloureuses, Métrorragies et tous les troubles fonctionnels liés à un hypo-fonctionnement de l'appareil utéro-ovarien. *Spécifique des douleurs de la Menstruation* : aucune toxicité, ne provoque jamais d'accidents.

**Posologie.** — 6 comprimés par jour, davantage suivant les cas.

**Laboratoire R.-P. FOUCHÉ**  
2, boulevard Pershing — PARIS.

---

## QUERGÉMOL

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-8.

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Extrait Cérébrique. Extrait Splénique, bromhydrate de Quinine, Méthylarsinate disodique, Nucléinate de Manganèse.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Reconstituant opothérapique du cerveau et de la rate, Antitoxique, Antihémolytique, Régénérateur des globules sanguins, antiasthénique.

**Indications.** — Paludisme chronique. — Anémie palustre. — Fièvres intermittentes, Asthénie post-grippale.

**Mode d'emploi** — 2 à 6 dragées par jour au début des repas.

L'étui : 20 fr. (en France).

**Laboratoire A. BAILLY**  
15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina.

Solution sans alcool, correspondant à 0 gr. 50 d'extrait par cuillerée à soupe.

### Mode d'emploi :

Deux à trois cuillerées à soupe par jour, avant chaque repas.

### Propriétés :

Anémiés, convalescents, tuberculeux, opérés, femmes enceintes, nourrices et dans tous les cas où l'organisme doit être tonifié.

## P. FOURNIE

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

3, place de la Miséricorde — LYON.

## QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

Extrait de quinquina Grandval associé aux Strychno-Phospharsinates.

### Propriétés thérapeutiques :

Tonique. — Stimulant général. — Apéritif.

### Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval.....	0 gr. 30
Glycérophosphates composés.....	0 gr. 30
Strychnine combinée.....	1 mgr. 60
Arsenic combiné .....	0 mgr. 18

**Indications.** — Anémie, Surmenage intellectuel et physique, Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

*Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine.*

### Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

La boîte de 32 comprimés : 12 fr.

(Toutes pharmacies.)

**Laboratoires GRANDVAL**

12 et 14, rue Féry — REIMS.

## QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique  
avec fer et arsenic assimilable.

**Composition.** — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval (à haut titre)..	0 gr. 60
Fer combiné .....	0 gr. 015
Arsenic combiné .....	0 mgr. 90

### Propriétés thérapeutiques :

**Antipaludique.** — Permet, suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

### Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

### Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique**, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 14 fr. (toutes pharmacies).

**LABORATOIRES GRANDVAL**

12 et 14, rue Féry — REIMS.

---

# QUINBY ET QUINBY SOLUBLE

**Quinio-Bismuth, formule Aubry.**

Adoptés par les hôpitaux de Paris, les Ministères de la Santé publique et des Colonies. — Produits originaux à base d'iodo-bismuthate de quinine chimiquement pur :

a. En suspension huileuse 10 p. 100 (QUINBY) ;

b. En solution aqueuse incolore (QUINBY SOLUBLE).

**Propriétés thérapeutiques.** — *Syphilis* : A toutes ses périodes et sous toutes ses formes. — *Pian*. — *Fièvre typhoïde*. — *Fièvre de Malte*. Injections intramusculaires indolores. Pas de stomatite, ni abcès, ni indurations. Aucune toxicité.

**Présentation.** — *Quinby* : 1° Ampoules normales de 3 cc. correspondant à 0 gr. 075 de bi-métal (boîtes de 12 et 6 ampoules).

2° Ampoules double dose (étiquette bleue) de 3 cc. correspondant à 0 gr. 15 bi-métal (boîtes de 12 et 6 ampoules) ;

3° Ampoules infantiles de 1 cc. 5 correspondant à 0 gr. 0375 de bi-métal (boîtes de 12 ampoules seulement).

*Quinby soluble* : 1° Ampoules de 5 cc. (*adultes*) correspondant à 0 gr. 05 de bi-métal (boîtes de 6 ampoules) ;

2° Ampoules de 2 cc. (*enfants*) correspondant à 0 gr. 02 de bi-métal (boîtes de 6 ampoules).

**Posologie.** — *Adultes* : 12 injections de 3 cc. (*Quinby*) ou 18 injections de 5 cc. (QUINBY SOLUBLE), 2 injections par semaine.

*Enfants* : idem, mais à raison de 2/10 de cc. par année d'âge.

*Fièvre typhoïde.* — Une injection tous les 2 jours et dans les cas graves tous les jours, jusqu'à concurrence de 5 à 6 injections après lesquelles la défervescence totale est obtenue.

*Fièvre de Malte.* — Douze injections environ (1 tous les 2 jours) pour obtenir la disparition de la fièvre.

*N. B.* — Dans la syphilis, les ampoules QUINBY SOLUBLE sont plus spécialement réservées au traitement d'attaque de la maladie ou de ses manifestations morbides, les ampoules QUINBY (étiquette bleue) lorsque l'on désire faire des piqûres moins fréquentes.

Toutes ces ampoules peuvent être livrées directement, en vrac, par boîtes de 25, 50 ou 100, à des prix très avantageux, à MM. les docteurs qui en font la demande directe au Laboratoire ou aux agents.

## Prix au public :

<i>Quinby</i> (normal ou étiq. bleue), la boîte de 12 ampoules .....	36 fr.
<i>Quinby</i> (normal ou étiq. bleue), la boîte de 6 ampoules .....	20 fr.
<i>Quinby infantile</i> , la boîte de 12 ampoules .....	25 fr.
<i>Quinby soluble</i> , adultes, la boîte de 6 ampoules .....	20 fr.
<i>Quinby soluble</i> enfants, la boîte de 6 ampoules .....	15 fr.

*N. B.* — En France, tous les médecins peuvent se procurer gratuitement nos ampoules, pour leurs malades pauvres, en adressant leurs demandes à l'organisme départemental créé à cet effet par le Ministère de la Santé publique.

*En Belgique*, nos ampoules peuvent être prescrites aux frais de l'État, par MM. les médecins autorisés.

## Laboratoires AUBRY

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>). — Tél. : Laborde 15-26.  
Belgique et Congo :

## Laboratoires Belges du Quinby

Romain Deschiens — 74, avenue Louis Bertrand — BRUXELLES

## QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs  
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

**Indications.** — Paludisme, grippez, asthénie, convalescences, anémies.

Prix au public : 15 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,  
21, rue Chaptal — PARIS.

---

## QUINICARDINE

**Forme.** — Comprimés à 0 gr. 20.

Ampoules à 0 gr. 50 pour injections intraveineuses.

**Indications.** — Arythmie complète permanente par fibrillation auriculaire, Arythmie extra-systolique, Tachycardie paroxystique totale, Tachycardie paroxystique par flutter non permanent, Tachycardie permanente régulière par flutter permanent, Tachycardie avec syndrome de Basedow.

**Doses.** — Consulter la notice complète qui sera adressée sur demande.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (15<sup>e</sup>).

## QUINIMUTHOL SACA

**Composition.** — Iodobismuthate de quinine en suspension dans l'huile d'olive pure.

**Forme.** — Ampoules de 3 cc. renfermant 0 gr. 30 d'iodo-bismuthate de quinine (= 0 gr. 071 de bi-métal actif).

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

**Usines Chimiques des Laboratoires Français**  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**  
5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
Tél. : Provence 58-43.



## QUININO-PHYTINE CIBA

**Phosphate organique de quinine.**

Contenant 57 p. 100 de quinine à 11 p. 100 de phosphore.

Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré. Très soluble.

**Indications.** — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

**Doses.** — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Le tube de 20 comprimés : 10 francs.

Le flacon de 50 comprimés : 20 francs.

*On trouve aussi le Quinino-Phytine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.*

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**  
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## QUINIO-STOVAR SOL

4-oxy-3-acétylamino-phényl-  
1-arsinate de quinine.

Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol ; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

### *Indications :*

**Paludisme** (prophylaxie et traitement).

### *Posologie et mode d'emploi :*

Traitement curatif : 4 comprimés à 0 gr. 25 par 24 heures (3 ou 4 séries de 10 jours, séparées par 5 jours de repos).

Prophylaxie : 1 comprimé le matin à jeun.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## QUINOFORME LACROIX

**Composition.** — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

**Avantages.** — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56 p. 100) des sels basiques ou neutres.

Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

**Indications.** — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes.

### **Formes pharmaceutiques :**

Ampoules : 6 et 12 ampoules de 0,25, 0,50, 0,75, 1 gr. 1,25 et 1,50.

Cachets : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés : 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules à 0,10.

**Laboratoires H. LACROIX**

V. Merobian et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## QUINOÏDINE DURIEZ

dérivé du quinquina.

Antiseptique du sang, tonique général et tonique cardiaque, antinévralgique.

GRIPPE, *Paludisme* et leurs séquelles : Prévention et traitement. Névralgies grippales ou palustres.

Convalescence de maladies infectieuses : Pneumonie, Diphtérie, Typhoïde, etc.

Petites défaillances, Nervosité ou Irrégularités du cœur avec ou sans lésions.

Aucun des inconvénients de la quinine, même après usage prolongé (Voir *Bull. Académie de médecine* : Communication du Dr Burdel ; communications des Drs Le Moine, Dardenne, Dujardin-Beaumontz, etc.).

0 gr. 10 quinoïdine pure par dragée. 2 à 8 dragées par jour, au début des repas, pendant plusieurs semaines au besoin.

**DURIEZ**

20, place des Vosges — PARIS.

## QUINOVARINE OPTIMA

(Sous forme de dragées et sous forme d'ampoules.)

**Composition.** — Chaque dragée ou ampoule correspond à 2 cgr. chlorh. de quinine et 50 cgr. d'ovaire frais.

**Indications.** — Aménorrhée, chloroanémie des jeunes filles, dysménorrhée, règles insuffisantes, troubles psychiques d'origine ovarienne et en général toutes les indications de l'Ovarine.

**Posologie :**

*Dragées :* 6 par jour, 2 à la fois 1 heure avant le repas.

*Ampoules :* Série de 10 ampoules en injections intramusculaires, à raison de 2 ou 3 par semaine. Repos de 15 jours, puis nouvelle série avec nouveau repos.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

## QUINQUINA GMET

**Composition.** — Extrait *total* obtenu directement et exclusivement à l'aide du quinquina succirubra. Coloration et amertume parfaitement naturelles. Sans alcool.

**Propriétés.** — Stimulant apéritif fébrifuge. *Active remarquablement la phagocytose.*

**Indications.** — Anémie, anorexie, grippe, tuberculose, épidémies, paludisme, tous les états fébriles ou non où l'activité leucocytaire doit être stimulée. Aménorrhée.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de vin *immédiatement avant un repas* ou l'absorption d'une tisane, d'un peu de lait, d'un biscuit.

Le grand pouvoir apéritif du Quinquina GMET peut occasionner (si le malade ne mange pas aussitôt après) la sensation nauséuse consécutive à la faim non apaisée.

### Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## QUINSAL

Médication Quino-salicylique-lithinée  
en tablettes glutinisées.

### ACTION THERAPEUTIQUE POLYVALENTE

**Calmant immédiat de la Douleur** par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

**Antithermique** par la Quinine.

**Diurétique et Uricolytique** par le Sel de Lithine et la Quinine.

**Spécifique antirhumatismal** par l'ion Salicylé. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

**Indications.** — Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grippales et en général toutes les Algies.

**Posologie.** — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures, de préférence loin des repas afin que l'action sédative soit plus rapide.

*Cas chroniques :* Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

*Enfants :* de 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 15 francs. Peut être prescrit aux A. S.

### Laboratoire du QUINSAL

F. BOLA, Docteur en pharmacie.

Licencié ès-sciences.

GRAY (Haute-Saône)

Echantillon et littérature sur demande.



## QUINTHÉRYL

**Composition.** — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-camphre.

**Applications.** — Traitement *curatif* de la *coqueluche*, de la trachéite, de la laryngite ; *correctif* de toutes les toux quinteuses émetisantes, de l'asthme et de l'emphysème. Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires.

### Présentation :

1° Ampoules de 1cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° Ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

**Posologie.** — Une injection *intramusculaire* (pratiquement *indolore*), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

Prix : Série A : 12 fr.

Série B : 15 fr.

DÉPOT GÉNÉRAL,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

**M. LÉONARDON, Docteur en pharmacie.**

Licencié ès sciences. Ancien Élève de l'Institut Pasteur.  
ARCACHON (Gironde).

## QUINURYL

Spécifique de l'*Azotémie*, adjuvant du régime hypoazoté. Cachets à base d'acide quinique.

**Indications.** — Symptômes de la petite azotémie. Céphalées, vertiges, éblouissements, bourdonnements d'oreilles, etc...

2 à 4 cachets par jour à prendre de préférence avec une infusion de fleurs de sureau ou de feuilles de bouleau.

La boîte : 16 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## RADIOGASTROL

Le médicament de choix des Gastropathies rebelles.

**Composition.** — Bismuth Salicylate, Charbons activés polyvalents, Carbonate de chaux.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Intoxications, Fermentations, Ulcérations, Pyrosis, Entéro-colites, Asthénie, Débilité, Carence de déminéralisation.

### Présentation :

Forme *poudre*. — Forme *comprimés*.

La grande boîte : 16 fr. — La 1/2 boîte : 10 fr.

### Posologie :

*Poudre* : 1 cuillerée à café avant les repas et une autre après, si besoin.

*Comprimés* : 4 à 6 comprimés avant les repas et autant après, si besoin.

**Laboratoires BOYER et Cie**  
12, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## RADIOPAQUE HEUDEBERT

**Composition.** — Le RADIOPAQUE Heudebert est un repas d'épreuve pour examen radiologique du tube digestif ; son opacité est obtenue par le sulfate de baryum gélatineux en suspension dans un support alimentaire composé d'hydrates de carbone, de graisses et de matières azotées représentant une valeur nutritive de 750 calories pour la dose de l'examen.

**Avantages.** — En raison de sa réelle valeur alimentaire, le RADIOPAQUE ne modifie en rien le rythme des contractions et permet l'examen du tube digestif dans son état de fonctionnement normal ; de plus, son goût très agréable de crème au chocolat le fait accepter sans répulsion par les malades les plus difficiles.

**Présentation.** — Il est présenté en flacons de 400 cc. pour examens complets et en 1/2 flacons pour examens partiels et examens des enfants. Il est prêt à l'emploi sans aucune préparation supplémentaire et son bouchage dans le vide suivi de 2 stérilisations lui assure une conservation indéfinie.

### Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4 chemin Feuillat — LYON.

## RADIOTÉTRANE GÉRARD

**Composition.** — Tétraiodo-phénol-phtaléine disodique.

**Mode d'action.** — Opacifie la vésicule biliaire aux rayons X.

**Avantages.** — Stable, de composition constante, non toxique.

1° *Forme dragées* : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.

° *Forme colloïdale* : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.

3° *Forme poudre* : préparation à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau.

4° *Forme ampoules* : pour injection intraveineuse.

**Indications.** — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

**Forme et mode d'emploi :**

1° *Dragées* : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maxima entre la 14<sup>e</sup> et la 18<sup>e</sup> heure.

2° *Forme colloïdale* : mélanger le contenu des deux flacons, immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 60 cc.).

3° *Forme poudre* : faire dissoudre dans un demi-verre d'eau et prendre en une ou deux fois.

4° *Forme intraveineuse* : Faire dissoudre dans 50 cc. d'eau bi-distillée et injecter très lentement.

Prix au public : 25 francs.

**Laboratoires du Docteur LAURENT-GERARD**

Docteur ès sciences, Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.

40, rue de Bellechasse — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## RADIOTROPINE

Complexe à radioactivité stabilisée.

Association des deux plus puissants antiseptiques internes et des deux meilleurs dissolvants de l'acide urique et des urates : **Bromure de Radium** et **Urotropine**.

**Forme.** — Granulé effervescent chimiquement pur, rigoureusement dosé et immédiatement soluble.

**Indications.** — Toute la Diathèse arthritique (goutte, rhumatisme, gravelle, etc.), les affections vésico-rénales (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, etc.), affections biliaires (cholécystites aiguës, angiocholites, ictères), et tous les états infectieux où la formine est indiquée (grippe, etc.).

**Posologie.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour ; au commencement des repas, dans un demi-verre d'eau. Une cuillerée correspond à 0 gr. 25 d'héxaméthylènetétramine.

**Établissements LABORADIUM**

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

## RÉALPHÈNE

Ether phosphorique du glucose  
et Stovarsol calcique.

Augmentation rapide et durable  
de l'appétit, du poids et des forces.

### Indications :

Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, Convalescences, Anémies, Surmenage, Entérites chroniques. Troubles généraux de la nutrition.

### Formes :

1° Comprimés ; 2° cachets ; 3° granulé ; 4° élixir

### Posologie :

*Adultes. Comprimés et cachets* (10 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par comprimé ou cachet) : 1 à 2 par jour, pendant 6 jours, et repos d'une semaine.

*Granulé* (5 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par mesure) : 2 à 4 mesures par jour, pendant 6 jours et repos d'une semaine.

*Elixir* (5 centigr. de Stovarsol sodique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par cuillerée à potage) : 2 à 4 cuillerées à potage, par jour, pendant 6 jours, et repos d'une semaine.

*Enfants* : Jusqu'à 12 ans. *Granulé* : 1 à 2 mesures par jour pendant 6 jours et repos d'une semaine

*Nourrissons. Granulé* : 1 à 3 demi-mesures par jour pendant 4 jours et 4 jours de repos (1 centigr. 1/2 à 2 centigr. de Stovarsol calcique par kilogr. de poids et par jour).

Prix de vente au public :

Granulé, comprimés, cachets : 20 fr.

Elixir : 15 fr. Coffret de 3 flacons de granulé : 50 fr.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

R. MOREUX, Pharmacien

Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## RECONSTITUANT MARY

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique de premier ordre; grande richesse thérapeutique.

**Nature** à base de Noix vomique, Arhénal, Kina, Coca, Kola, Colombo, Gentiane, etc.  
**Traitement curatif** des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

**Laboratoire  
du reconstituant MARY**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

## RECTAGINE

(Suppositoires radifères).

**Composition.** — Organate d'argent à 17 p. 100 d'argent pur, Hydrargyre, sulfo-oléo sulfonate de sodium camphré, et bromure de radium.

**Indications.** — 1° *Chez l'homme* : Agit sur les complications de la blennorrhagie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

2° *Chez la femme* : Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades; médication de tous les états congestifs ou infectieux de l'utérus, des trompes et des ovaires.

3° *Cas particuliers* : Action résolutive très nette sur : le prurit anal, les érosions de l'anus, les hémorroïdes internes et les oxyures.

**Posologie.** — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 15 fr.

**Laboratoires pharmaceutiques**

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. O.

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.  
 Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.  
 22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

## RECTANOL

Anesthésique de base par voie rectale.

**Constitution.** — Solution de Tribromoéthanol, dans l'Hydrate d'Amylène. 1 cc. = 1 gr. de Tribromoéthanol.

**Avantages.** — 1° Narcose douce, suppression du choc psychique, de l'excitation pré et post-anesthésiques.

2° Réveil calme. SANS VOMISSEMENTS.

3° Simplification des suites opératoires. L'anesthésique complémentaire par inhalation est administré, quand cela est nécessaire, à doses infimes : Aucune irritation des voies aériennes, donc moindre danger de complications pulmonaires.

**Indications.** — Toutes interventions, et en particulier, la chirurgie gastrique ou intestinale, la chirurgie des membres, de la face et du cou, du thorax, gynécologique, etc...

**Contre-indications.** — *Locales* : Interventions sur le rectum et l'anse sigmoïde.

*Générales* : Dégénérescences hépatique et rénale.

**Mode d'emploi.** — De 7 à 10 cgr. de RECTANOL par kilo, selon l'âge et le sexe, administrés en lavement à 2 ½ ou 3 p. 100, dans de l'eau distillée au moyen de la canule Erce, à champignon d'arrêt.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII<sup>e</sup>).

---

## RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdique parfait.

**Prop. thér.** — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 14 francs complète.

Tube de rechange : 12 francs.

**Laboratoire de la Varilaxine**  
SURGÈRES (Charente-Inférieure).

## RECTOPANBILINE

**Formes.** — Solution pour lavement et suppositoires.

**Définition.** — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du D<sup>r</sup> Bensauade amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

**Composition.** — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée dans les suppositoires de glycérine solidifiée.

**Indications.** — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

**Posologie.** — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Prix au public : 12 francs le pot de Rectopanbiline.  
10 francs la boîte de suppositoires.

Laboratoire du Docteur PLANTIER  
ANNONAY (Ardèche).

## **RECTOSOL (Suppositoires)**

### **Antihémorroïdaires.**

A base d'iodorésorcinosulfite de Bismuth avec excipient Rectoline.

**Indications.** — Hémorroïdes internes et leurs complications.

**Dose et mode d'emploi.** — Introduire un ou deux suppositoires le matin une heure environ avant la selle, après l'application de la Rectoline, ou le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont congestionnées et douloureuses, par suite de la fatigue de la journée.

**Laboratoire de la VARILAXINE**

**SURGÈRES (Charente-Inférieure).**

---



## RÉGYL

« Régulateur de l'estomac ».

(A base de peroxyde de magnésium hydraté, de fluorure de sodium et de ferments digestifs).

### Présentation :

Sous forme de comprimés pesant chacun 0 gr. 60.

### Propriétés :

Régulateur de l'estomac, gastralgie, dyspepsie, flatulences, fermentation, pesanteur, renvois, crises stomacales tenaces.

### Dose et mode d'emploi :

Un ou même deux comprimés après chaque repas et de préférence dans une infusion. Doubler la dose dans les états aigus.

Prix au public (en cours de variation).

Echantillons et notices sur demande.

**Laboratoire du RÉGYL**

8, rue Richer — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Téléphone : Central 16-85.

## RÉNALEPTINE

3 - 4 - di - oxyphényl - 1 - méthyl - amino - éthanol.  
(Adrénaline pure lévogyre.)

### *Indications :*

Toutes les affections où l'on recherche des effets vaso-constricteurs.

**Prévention et traitement des crises nitritoïdes.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Solution de Rénaleptine à 1/1000. Doses par 24 heures :

Voie buccale : X à XXX gouttes de la solution à 1/1000.

Voie sous-cutanée ou intramusculaire : 1 ampoule de 1 cc. de la solution au 1/1 000 ou de la solution au 1/2000.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## RENION VINCARDI

**Diurétique rénal.**

**Principes actifs.** — Théobromine pure recristallisée, Extrait Scille stabilisée, Scammonée.

**Forme.** — Comprimés se délitant rapidement dans les liquides aqueux, tisanes, infusions, eaux minérales. Ne provoque ni nausées, ni céphalées.

**Indications.** — Régulateur de la fonction rénale, Diurétique énergique et inoffensif, Affections cardio-rénales, Asthénies, Hypertension, Néphrosclérose, albuminuries.

**Doses.** — 3 à 4 comprimés par 24 heures dans infusions ou eaux minérales au milieu des repas principaux.

Littérature et échantillons sur demande :

**Laboratoire VINCARDI**

**Ph. VIGUIER, pharmacien.**

14, avenue G.-Clemenceau — NICE (A.-M.)

R. C. Nice : 9046.

## RÉNOCARDINE

**Diurétique Végétal, cardio-rénal.**

**Indications.** — Asthénies et Arythmies cardiaques, Néphrites et Cirrhoses, Œdèmes et Ascites, Artério-Sclérose, Mal de Bright, Urémie, et toutes Insuffisances Cardio-Rénales.

**Composition.** — Dragées d'extraits spéciaux, physiologiquement titrés, des plantes fraîches et stabilisées suivantes :

**Pyrola umbellata.** Diurétique rénal aussi actif que la Théobromine, mais ne provoquant ni céphalée, ni intoxication urique.

**Adonis vernalis.** Diurétique toni-cardiaque non hypertenseur, succédané de la Digitale, mais sans effets accumulatifs ni accoutumance.

**Fleur de genêt.** Toni-cardiaque non hypertenseur, diurétique légèrement laxatif.

**Doses.** — Deux dragées au début des deux repas.

Prix, la boîte : 15 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoires J. PERROCHON**

57, rue Origet — TOURS.

## RÉNOVOL

**Composition.** — Hamamélis, Hydrastis, Marron d'Inde, Viburnum, Séneçon, Piscidia, Cratœgus, Passiflora, Condurango, Cascara, Peptone iodée.

**Indications.** — Tous les accidents de la puberté, de la menstruation et du retour d'âge, douleurs des règles, maux de tête, Constipation, Varices, Hémorroïdes, Ulcères variqueux. États congestifs. Sédatif du système nerveux.

**Mode d'emploi.** — 2 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau avant les repas.

**Laboratoire du Rénovol**

**A. DEBROCK**

**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

22, rue de Paris — HOUILLES (S.-et-O.).

## RÉPARATEUR THUAU

(Vin)

Reconnu médicamenteux par la Faculté de Pharmacie de Paris après analyse du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. Sous le n° 183.

**Composition.** — Pour un verre à liqueur :

Extrait hydroalcoolique de Kola stabilisée..	0 gr. 15
Extrait hydroalcoolique de Coca du Pérou..	0 gr. 15
Extrait sec de Noix Vomique .....	0 gr. 009
Samos et bouquet cenanthique pour 20 cent. cub.	

**Mode d'emploi.** — Deux verres à liqueur par jour, après les deux principaux repas.

**Action.** — Tonique reconstituant, stimulant, anti-dépériteur. Médication pour adultes.

**Indications.** — Convalescences, épuisement, surmenage, neurasthénie, faiblesse générale.

**Présentation.** — Vin. Son prix : 15 francs.

**Fabrication.** — Laboratoire du Réparateur THUAU, Angers.

**Vente.** — Dans toutes les bonnes Pharmacies.

**Laboratoire du Réparateur THUAU**

22, faubourg Saint-Michel — ANGERS (Maine-et-Loire).

Envoie Echantillons et Littérature.

## RÉSOSAÏNE

**Pommade nasale. Non toxique.**

**Effets remarquables.**

**Pas d'accoutumance.**

**Forme.** — Pommade nasale.

**Composition.** — Adrénaline, S. G. Bismuth, Stovaïne, Résorcine, Essences antiseptiques.

**Indications.** — *Affections aiguës* : Sinusites, Coryza, Obstructions nasales, etc...

*Affections chroniques* : Rhume des foins, Ozène, Asthme, etc...

**Doses.** — Gros comme un pois dans chaque narine plusieurs fois par jour.

**Laboratoires J. BRESSIER**

**Docteur en Pharmacie**

102, rue Vincent — MARSEILLE.

## RÉSYL CIBA

**Antiseptique pulmonaire, anticatarrhal.**

Ether glycéro-gaiacolique soluble. Non caustique, libère du gaiacol à l'état naissant. Modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

*Sirop, Comprimés, Ampoules.*

**Doses.** — *Sirop* : 2 à 6 cuillères à café par jour.

*Comprimés* : 2 à 6 par 24 heures.

*Ampoules* : Une tous les 2 jours.

**Médecine infantile.** — Chez les nourrissons, XXV à CXX gouttes de sirop mélangées aux biberons.

Le petit flacon sirop .....	8 fr. 50
Le grand flacon sirop .....	15 fr. ,
Le tube de 20 comprimés.....	7 fr. ,
La boîte de 12 ampoules.....	15 fr. ,

**Laboratoires O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

# RÉTHRAGINE

(Bougies antiblennorragiques radifères).

Médication bactéricide et radio-active des affections urétrales aiguës et chroniques chez l'homme et chez la femme.

## Nature du produit :

La *Réthragine* est une composition médicamenteuse présentée sous forme de bougies renfermant, en milieu indolore, de l'argent, de l'acide urique et du bromure de radium à l'équilibre radio-actif et répondant à des constantes physiques nettement déterminées.

## Présentation :

Les bougies *Réthragine* sont vendues sous le nom de « Bougies *Réthragine H* » pour les hommes et de « Bougies *Réthragine F* » pour les femmes.

Il existe deux concentrations radifères : 1 et 2 micros (2 micros pour les hommes seulement).

Prescrire : *hommes* : Bougies *Réthragine H*. à 1 ou 2 micros ; *femmes* : Bougies *Réthragine F*.

## Mode d'emploi :

En présence d'une urétrite confirmée par l'examen microscopique, commencer les grands lavages uréthro-vésicaux au permanganate de potasse, solution à 0,25 p. 1000. Introduire ensuite une bougie et la maintenir en place en recouvrant le méat urinaire d'un tampon de coton stérile et, par-dessus, un préservatif. Il est indispensable que la bougie reste en contact le plus longtemps possible ; aussi faut-il recommander aux malades de n'uriner que cinq heures environ après l'application. Continuer les grands lavages qui seront faits tous les jours, ainsi que les applications des bougies.

## Durée du traitement :

L'application de 8 à 10 bougies est généralement suffisante, même dans les cas d'urétrites les plus rebelles.

## Prix :

La bougie <i>Réthragine H</i> . (1 micro).....	12	»
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine H</i> . (1 micro)..	55	»
La bougie <i>Réthragine H</i> . (2 micros).....	15	»
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine H</i> . (2 micros).	70	»
La bougie <i>Réthragine F</i> . (1 micro).....	12	»
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine F</i> . (1 micro)..	55	»

Laboratoires pharmaceutiques :

L. G. TORAUDE O. \* O. I. ☉

Docteur en pharmacie de l'Université de Paris.  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de médecine.

Membre de la Société de pharmacie de Paris.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

## RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

### Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ;
- 2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ;
- 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ;
- 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ;
- 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ;
- 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins et se conserve indéfiniment ;
- 7° il n'entre dans sa composition, ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

### Indications thérapeuthiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-Pneumonie ; —
- 2° Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; —
- 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

### Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ;
- 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

**Laboratoire BOUDIN**

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

## RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

**Composition.** — Essences naturelles. Terpènes. Alcool.  
(Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

**Présentation.** — 3 concentrations différentes :

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 5 fr. 50.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 6 fr. 50.

N° 3. *Pour adultes* : 8 francs.

Le **Révlusif Milko** détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. Ne *tache ni n'altère les vêtements*, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

**Action secondaire** : Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

**Indications.** — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

---

## RÉVULSIF PROCIPHA

**Forme.** — Liquide, incolore, aromatique.

**Composition.** — Mélange d'essences : Terpène, Pinène, Carvacrol, irrite légèrement l'épiderme ; odeur très agréable.

**Indications.** — Rhume, Laryngite, Bronchite, Maladies des voies respiratoires aiguës et chroniques ; Affections rhumatismales et névralgiques.

**Mode d'emploi.** — Badigeonner avec un pinceau la surface à révulser.

Pour bains de pieds, 1 à 3 cuillerées à café.

*Enfants* : diluer à 50 p. 100 avec alcool ou eau de Cologne.

Prix : 7 francs.

Laboratoires FISCHE et Cie

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X<sup>e</sup>).

Tél. : Lamartine 92-52.



## REVULSOPLASME

Adultes, BB (Enfants).

Cataplasme sinapisé prêt à poser, de conservation indéfinie, à farines séparées.

**Composition.** — Farines de lin et de moutarde sélectionnées complètement déshuilées au solvant.

**Avantages.** — Activité certaine et constante, longue durée d'efficacité.

**Indications.** — Tous les cas où une révulsion rapide et efficace est indiquée.

**Mode d'emploi.** — Faire tremper une minute dans de l'eau à 40°, appliquer directement sur la partie malade.

N.-B. — Le Révulsoplasme BB, moins actif, est spécialement préparé pour les enfants.

Prix : 1 fr. 75

**Société des Révulsifs**

4, rue Levert — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## RHAGADINE BRACQUEMOND

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

**Forme.** — Pommade en tubes.

**Propriétés thérapeutiques.** — La *Rhagadine*, à base d'un mélange de Kératine, d'une innocuité absolue, possède des propriétés durcissantes assez grandes pour raffermir l'épiderme le plus délicat ; mélangée à des corps gras, maintient à l'épiderme toute sa souplesse sans atténuer en rien les propriétés spécifiques de la substance médicamenteuse agissante.

**Indications thérapeutiques.** — Gerçures des seins, Erythèmes des nouveau-nés, Fissures anales chez les hémorroïdaires, Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies déchiquetées ou par arrachement.

Echantillons sur demande adressée :

**Pharmacie ROUSSEAU**

71, avenue de Villiers — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## RHÉANTINE LUMIÈRE

**Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.**

**Constitution.** — Stock vaccin polyvalent, formé de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisées et desséchées à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

**Propriétés.** — La RHÉANTINE LUMIÈRE est un vaccin antigonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre. Elle est toujours parfaitement tolérée, même par les malades les plus délicats et n'entraîne aucune réaction générale.

**Indications.** — Affections gonococciques locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидidymites, ophtalmies, d'origine gonococcique, etc.

Traitement le plus simple, le plus anodin et le plus efficace.

**Dose courante.** — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

**Formuler.** — Boîte de RHÉANTINE LUMIÈRE.

**AUTO-VACCINS.** — Pour provoquer chez les malades atteints de lésions complexes ou spéciales un processus humoral curatif, il faut se rapprocher des groupes infectants et le moyen de beaucoup le plus sûr réside dans l'emploi de vaccins autogènes auto-vaccins, préparés à partir du pus recueilli sur le sujet lui-même.

Les LABORATOIRES LUMIÈRE préparent des vaccins autogènes sur demande spéciale du médecin auquel ils fournissent gratuitement, le cas échéant, le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

45, rue Villon — LYON.

## RHÉSAL VICARIO

Succédané inodore du salicylate de méthyle.

Liquide rapidement absorbable par la peau, sans provoquer la moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

**Mode d'emploi.** — En onctions, deux à trois fois par jour, en recouvrant de flanelle ou même de taffetas gommé.

**Indications.** — Rhumatismes. Goutte. Névralgies.

Le flacon : 8 francs.

**Laboratoires VICARIO**

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## RHINADRARGOL

Baume nasal semi-fluide à base de sels d'argent, adrénaline, essences végétales antiseptiques en milieu paraffinique absolument neutre.

Curatif, Préventif, Désinfection sérieuse du Cavum.

*Sinustites, Coryzas, Fièvre scarlatine, Rougeole, Diphthérie et toutes les maladies infectieuses.*

Chaque boîte contient deux tubes, l'un réservé pour le malade, l'autre pour les autres membres de la famille, à titre préventif.

Prix : 7 fr. 50.

**Laboratoires P. DORDIN**

56-58, Grande-Rue — HARNES (P.-de-C.).

---

## RHINADROL

(Baume nasal).

**Forme pharmaceutique et composition.** — Vaseline semi-liquide, avec Camphre, traces de Menthol, baume du Pérou, Soufre colloïdal, Adrénaline *huileuse* et essences.

**Propriétés.** — Décongestionnant, calmant, bactéricide.

**Avantages.** — Consistance *semi-liquide*, introduction d'adrénaline à l'état huileux, ce qui assure une *homogénéité* parfaite du baume.

**Indications.** — Toutes inflammations de la muqueuse nasale. Toutes *rhinites* et à titre préventif contre les maladies contagieuses.

**Présentation.** — *En tube avec embout* pour faciliter l'introduction dans les narines.

**Prescription.** — Un tube *Rhinadrol* Falvy.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## RHINASPIR

Poudre soluble et non caustique en étui saupoudreur pour aspirations et pulvérisations nasales.

**Composition.** — Adrénaline au 1/100, Scuro-forme, Aristol, Benzonaphtol, Salicylate de soude, Lactose, Acide borique, Terpinéol, Essence de pin.

**Propriétés.** — Décongestionne et antiseptise la pituitaire, fluidifie, puis tarit les sécrétions.

**Indications.** — Coryza aigu et chronique, obstruction nasale par hypertrophie des cornets, ozène, sinusites.

**Mode d'emploi.** — 5 à 6 fois par jour, priser une pincée ou mieux la projeter dans chaque fosse nasale avec le lance-poudre Rhinaspir.

Prix de l'étui : 10 francs.

Dépôt général pour la France :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II<sup>e</sup>).

Téléph. : Central 83-15.

---

## RHINODROPS BÉRAL

*Capsules nasales à l'Huile d'Ephédra chlorétonée.*

**Propriétés.** — *Balsamiques, Antiseptiques, Décongestifs.* Assurent la perméabilité des fosses nasales. Préservent des complications naso-pharyngées.

**Indications.** — *Toutes inflammations, congestions et obstructions nasales. Insuffisances respiratoires des Adénoïdiens et des Déformés du naso-pharynx. Toutes affections aiguës susceptibles de se compliquer d'infection naso-pharyngée.*

**Mode d'emploi.** — Couper l'extrémité du Rhinodrops et en vider la moitié dans chaque narine. (Faire incliner la tête du côté injecté.)

Formuler : Rhinodrops Béral, une boîte.

**Laboratoire BÉRAL**

194, rue de Rivoli — PARIS

## RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jaborandi.  
**Forme.** — Ampoules (instillateur spécial dans les boîtes).

**Indications thérapeutiques.** — Action élective sur les terminaisons sensibles des nerfs trijumeau et pneumogastrique, au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

**Rôle essentiel : Régulation de la sensibilité des troubles congestifs et sécrétoires.**

**1° En Rhinologie.** — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

**Congestions et Obstructions Nasales**  
 (Vaso-motrices)

**Rhino-Pharyngites**

**Rhinites Atrophiques — Ozène**

**Rhume des foins**

**et Rhino-Bronchites Asthmatiques**

**Céphalées Rhinogènes**

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foins en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits de jaborandi (Néopancarpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

**2° En Ophtalmologie.** — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hypersécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensibles et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaires et périorbitaires sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

**Mode d'emploi :**

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

*Pour les yeux,* il sera toujours préférable de faire l'instillation de I à II gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

*Pour le nez et la gorge,* les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III à IV gouttes chaque fois dans chaque narine).

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

**Laboratoire de Pathologie générale de Paris,**

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI°).

Tél. : Auteuil 35-25.

## RHINOL

A base de Menthoforme, éther, non irritant, dérivé du menthol et du formol.

1° **OUATE RHINOL.** — Véritable filtre nasal, spécifique du coryza, Céphalée, Rhume des foins. Indispensable en temps d'épidémie, et dans tous les cas de grippe, influenza, bronchite, enrouement.  
La boîte : 3 fr. 50.

2° **POMMADE RHINOL.** — Vaseline au menthoforme, eucalyptol, essences volatiles. Mêmes indications.

Le tube avec canule : 6 francs.

3° **COMPRIMÉS RHINOL.** — A base de menthoforme, borate de soude, baume du Pérou, essences de pin et d'eucalyptus.

Inhalations, gargarismes, pulvérisations, dans tous les cas de rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, maux de gorge, amygdalites, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites.

La boîte : 13 francs.

**Laboratoire du Docteur DUBAT**

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

## RHINO-LIPOSEPTINE

Solution concentrée de l'antitoxine du Professeur Lemoine pour pulvérisation dans le nez et la gorge.

**Composition.** — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. — Possède toutes les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

**Indications.** — En pulvérisations ou instillations dans le nez et la gorge dans tous les cas de maladies infectieuses où ces cavités sont atteintes : Angines, Coryza, Rhinopharyngites, Ozène, Sinusites, Grippe, Bronchites, Diphtérie, Rougeole, Scarlatine.

Mais ne présente aucun des inconvénients du menthol, pas d'irritation des muqueuses.

**Mode d'emploi.** — La Rhino-Liposeptine se présente en solution huileuse et en Capsulines auto-rhino-injectables. Pulvériser ou instiller plusieurs fois par jour.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

## RHINO-SALVA

Pommade à base de :

**Composition.** — Association Adrénaline-éphédrine, Résorcine, Dermatol, Stovaine, Essences et balsamiques.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excellent remède contre toutes les affections des voies respiratoires qui, presque toutes, débutent par une infection des fosses nasales. C'est le remède spécifique du Coryza spasmodique et du Rhume des foins.

Recommandé aux chanteurs et aux orateurs pour maintenir en parfait état leurs résonateurs supérieurs et conserver la souplesse de leur timbre.

**Mode d'emploi.** — Gros comme un grain de blé dans chaque narine, matin et soir.

Prix : 7 francs.

Le RHINO-SALVA existe aussi en *solution huileuse*, pour pulvérisations nasales.

Dépôt : O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Littérature et échantillons.

10, rue de Belfort — RENNES (Ille-et-Vilaine).

---

## RHINO-SOCOLL

**Soufre colloïdal** pour le traitement de l'Ozène par la méthode des docteurs Mailho et Largeteau.

**Composition.** — Pseudo-solution de soufre colloïdal à grains très fins, concentré et stabilisé par Cataphorèse, légèrement acide, pH = 4,8 à 4,7 demeurant indéfiniment stable, dégageant par contact avec les muqueuses de l'hydrogène sulfuré, et miscible à l'eau sans précipitation ni coagulation.

Notice et échantillon sur demande.

« PROTHERAPIA »

Laboratoire G. CHAMAGNE

Docteur ès sciences, Docteur en Pharmacie,  
Lauréat de l'Académie de Médecine,  
132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## **RHINO-VACLYDUN**

**Lysats vaccins du Docteur Duchon.**

Vaccination locale.

**Composition.** — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée détermine une immunité cellulaire locale.

**Indications.** — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites, Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

**Posologie.** — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le Rhino-Vaclydun n'est pas injectable.)

**Présentation.** — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Prix : 18 francs.

Nécessaire Rhino-Vaclydun contient 2 ampoules de lysat vaccin et un petit pulvérisateur spécial.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires Pharmaceutiques CORBIERE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Carnot 78-11.

---

## **RHIZOTANIN CHAPOTOT**

**Composition.** — Tanin physiologique vivant directement assimilable, Sels de chaux et de magnésie.

**Forme :**

*Cachets* : pour adultes.

*Poudre* : pour enfants.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, Etats tuberculeux et pré-tuberculeux; Etats de consommation, Bronchites chroniques. Neutralisation des toxines, Consolidation du terrain affaibli, Amélioration rapide des accidents diarrhéiques, Exaltation des réactions défensives de l'organisme.

**Posologie.** — *Cachets* : 4 à 6 par jour.

*Poudre* : 2 à 4 cuillerées-mesure par jour, dans de la confiture ou du miel.

**Laboratoire CHAPOTOT**

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Téléph. Nord 28-80 — R. C. 231 917 B.



## RHOCYA DYN

### **Rhodate de potassium pur.**

(Solution titrée : 1 goutte = 1 centigramme).

Le rhodate de potassium possède toutes les propriétés biologiques des iodures et des préparations iodées, *sans contenir d'iode dans sa molécule* et sans en présenter les inconvénients (iodisme, réactions congestives ou thyroïdiennes).

**Indications.** — *Rhumatismes chroniques.* — Puisant effet analgésique, décongestif et trophique dans :

- 1° Les polyarthrites déformantes chroniques ;
- 2° Les séquelles des pseudo-rhumatismes infectieux, en particulier gonococciques ;
- 3° Les rhumatismes diathésiques.

*Hypertension artérielle.* — Abaissement évident des chiffres manométriques (Mx et Mn) dans les deux tiers des cas. Action directe sur l'athérôme artériel.

*Emphysème.* — Asthme vieilli, séquelles respiratoires des gazés.

*Scléroses viscérales.* — Sénescence précoce, polyscléroses, scléroses par intoxications chroniques endogènes (goutte, oxalémie) ou exogènes (saturnisme, hydrargyrisme, bismuthisme, éthylisme). Lésions scléro-gommeuses de la syphilis tertiaire.

**Avantages.** — Aucune toxicité. Ni intolérance, ni accoutumance. Action thérapeutique supérieure à celle de l'iode.

*Pas d'iode, donc pas d'iodisme.*

**Posologie.** — X à XX gouttes avant les 3 repas, 3 semaines par mois.

Le flacon compte-gouttes : 18 fr.  
remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales  
(n° 734-3).

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**  
5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII<sup>e</sup>).  
Tél. : Diderot 37-93.

## RHODARSAN

Dioxy-diamino-arsénobenzène méthylène-sulfoxyate de sodium.

Teneur en arsenic : 20 p. 100. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

*Indications :*

**Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Séries d'injections graduées de 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Applications en poudre ou collutoires comme topique local.

Le Rhodarsan est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## RHODAZIL

Benzoate de Benzyle.

Antispasmodique, non toxique.

*Indications :*

**Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée.**

**Hoquet persistant, Spasmes divers, Mal de mer.**

*Posologie :*

*Adultes :* Une demi-cuillerée à café de solution ou 2 capsules, à renouveler.

*Enfants :* IV gouttes de solution, par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## RHOFÉINE

Association d'acide acétylsalicylique (50 centigr.) et de caféine (5 centigr.) pour un comprimé ou un cachet.

La caféine dote la Rhoféine de ses propriétés toni-cardiaques.

### *Indications :*

**Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.**

*Posologie.* — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPECIA »**

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## RHOMNOL

A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.


**Indications thérapeutiques.** — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, anti-neurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

**Doses et mode d'emploi.** — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. — *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à dessert ; une cuill. à dessert aux repas, pour adultes ; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. — *Ampoules* 1 cc. (0,05 de nucléinate de soude par cc.) pour injections intramusculaires de préférence (spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës).

Prix de vente au public : 18 fr.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## RIODINE



**Composition.** — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20 % d'iode.

**Forme.** — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. *Action prolongée et durable sans iodisme.*

Pour obtenir une *action rapide et intensive* prescrire la **Néo-Riodine** : mêmes applications.

**Indications.** — Artériosclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

**Doses.** — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

**LABORATOIRES du D<sup>r</sup> P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## ROB OBERLIN

(Pour adultes, adolescents et enfants au-dessus de 5 ans)

**Par cuillerée à soupe (adultes).**

Bi-iodure de mercure .. .. .	un centigr.
Iodure de sodium .. .. .	0,06 centigr.
Arséniate de soude.. .. .	un milligr. ½

Une à 6 cuillerées à soupe par jour,

**Par cuillerée à entremets (adolescents).**

Bi-iodure de mercure .. .. .	0,006 milligr.
Iodure de sodium .. .. .	0,04 centigr.
Arséniate de soude. .. .. .	un milligr.

2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

**Par cuillerée à café (enfants de 5 à 10 ans).**

Bi-iodure de mercure .. .. .	0,003 milligr.
Iodure de sodium .. .. .	0,02 centigr.
Arséniate de soude. .. .. .	0,00 ½ milligr.

2, 3, et jusqu'à 4 cuillerées à café par jour.

Le **Rob Oberlin** se vend en flacons d'environ 420 cc.

Prix : 16 fr. 50.

## ROB CABANÈS

(Pour nourrissons et enfants jusqu'à 5, 6 et 7 ans).

**Par cuillerée à café :**

Bi-iodure de mercure.. .. .	un milligr.
Iodure de sodium.. .. .	0 gr. 006

**Par cuillerée à entremets :**

Bi-iodure de mercure.. .. .	deux milligr.
Iodure de sodium.. .. .	0 gr. 012

**Par cuillerée à soupe :**

Bi-iodure de mercure.. .. .	trois milligr.
Iodure de sodium.. .. .	0 gr. 018

Le **Rob Cabanès** se vend en flacons d'environ 280 cc.

Prix : 14 fr. 50.

**Leur présentation est discrète.**

**Laboratoire OBERLIN**

**J. TINARDON, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
de la Faculté de Pharmacie de Paris  
17, rue Cadet — PARIS

## **ROMARANTYL TROUETTE-PERRET**

est le spécifique des Affections du Foie.

Elixir Aromatique à base de :

Romarin-Piscidia-Aphloïa-Ononis-Menthe.

L'Efficacité du *Romarantyl T. P.* est due à son action cholagogue, stimulante, diurétique, antispasmodique.

### **Mode d'emploi :**

1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels

PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## ROMARÈNE

**Composition.** — Granulé de goût agréable, à base de **romarin**, *pissenlit*, *combretum*, citrate de soude...

### Action thérapeutique :

**Cholérétique :** Augmente la sécrétion biliaire et fluidifie la bile.

Indifférent envers la contractilité de la vésicule, ne provoque pas de réactions douloureuses de cet organe.

### Stomachique.

Favorise la *diurèse* et la *régularité intestinale*.

### Indications :

**Petits hépatiques** (Hépatisme, Congestion du foie, Ictères bénins, Cholémie, Insuffisance du foie...)

**Troubles gastro-hépatiques** (Dyspepsies, Etat saburral des voies digestives...)

Constipation d'origine hépatique, etc...

**Mode d'Emploi :** Prescrire à la dose d'une ou deux cuillerées à café par jour en une ou deux fois, de préférence à jeun.

Si on recherche l'effet laxatif, il est nécessaire d'augmenter la dose.

Le granulé peut être croqué, mais il est mieux de le dissoudre dans de l'eau chaude, ou, ce qui est plus agréable, dans une tisane aromatique (menthe, sauge, mélisse, boldo, et même romarin...)

**Laboratoire BEAUFOUR**

**Docteur en Pharmacie**

**Licencié ès Sciences**

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris  
Lauréat de la Faculté de Pharmacie de Paris  
**BEAUVAIS (Oise).**

## ROSALYL

### Composition

Ail.....	0 gr. 80
Thym.....	2 gr. 00
Marrube .....	1 gr. 00
Drosera .....	0 gr. 40
Grindelia.....	0 gr. 20
Bromure de sodium.....	0 gr. 60
Excipient liquide sucré et glycérimé	
Q. S. p.....	100 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant, sans toxiques, des grandes toux quinteuses et spasmodiques. Puissant désinfectant des bronches. Vermifuge par l'ail et le thym.

**Forme.** — Liquide sucré et glycérimé. Une seule forme maintenant.

**Indications.** — *Coqueluche*. Toux nerveuses. Bronchites.

**Posologie.** — 1 an et 2 ans : 4 et 6 cuill. à café par 24 heures.

3 ans et 4 ans : 4 et 5 cuill. à café par 24 heures.

5 ans et au-dessus : 6, 7, 8 cuill. à dessert par 24 heures.

Prix au public : 15 francs le flacon de 200 cc.

**Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien, Docteur ès sciences

101, rue de Paris — RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise)

## ROSASEPTOR

Poudre émolliente, astringente, décongestionnante et antiseptique. Spécifique de l'inflammation oculaire.

**Indications.** — Conjonctivites, Blépharites, Iritis, Chalazions, Orgelets, etc...

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'un sachet ROSASEPTOR dans la valeur d'un verre d'eau bouillie chaude donne environ 150 gr. d'une solution stérilisée, antiseptique, astringente et émolliente pour lavages, compresses et bains d'yeux.

Dépôt général :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II<sup>e</sup>).



## ROZODERME

Le *Rozoderme* est une pommade rose à base d'essences végétales antiseptiques (type Lucas-Championnière) et de substances chimiques (boro-zinciques) inoffensives destinées à créer et entretenir un milieu favorable à la réfection des tissus. Présentation en tubes.

**Propriétés.** — Le *Rozoderme* calme la douleur et l'irritation, aseptise les plaies en détruisant les germes nocifs, stimule la vitalité des tissus et active la cicatrisation. Convient parfaitement pour la toilette journalière des jeunes enfants.

**Indications.** — Erythème fessier, feux de dents des nourrissons, gerçures du sein, brûlures et diverses formes d'eczémas : aigu, chronique ou variqueux, dermites toxiques, zona intercostal, etc.

**Mode d'emploi.** — Appliquer une couche légère sur la partie malade, préalablement lavée et séchée, recouvrir de gaze et renouveler le pansement toutes les vingt-quatre heures.

### Laboratoire du ROZODERME

11, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## RUBYL

Iodure double de quinine et de bismuth. Suspension huileuse, injectable par la voie intramusculaire, bien tolérée. Ampoules de 3 cc. dosées à 0 gr. 10 par cc.

### *Indications :*

**Bismuthothérapie de la Syphilis.**

### *Posologie et mode d'emploi :*

Injection du contenu d'une ampoule (3 cc.) tous les trois ou quatre jours ; série de 12 injections.

*Chez les enfants :* 1/20<sup>e</sup> par année d'âge, de la dose conseillée chez l'adulte.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## RUTONAL

Phényl-méthyl-malonylurée.

Propriétés hypnotiques et anti-épileptiques très voisines de celles du Gardénal, dont il est le succédané pour les malades intolérants ou résistants à ce médicament.

*Indications :*

**Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux.**

*Posologie :*

Deux à quatre comprimés à 20 centigr. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPECIA »**

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## RYTHMOS LEISYN

Nouvelle médication à effets combinés.

**Composition.** — Muguet, Aubépine, Maïs, Crataegus, Bornéine, Gui, Samarium, Yttrium, Caesium.

Médication préparée par procédé spécial électrique « EVOO » qui lui confère son efficacité.

**Présentation.** — Liquide.

**Indications.** — Asystolie, même lorsque les succédanés de la Digitale se montrent inefficaces, Asthme, Angine de Poitrine, Arythmies, Endocardites, Eréthysme, Insuffisance aiguë du cœur gauche, Insuffisance irréductible du cœur droit, même accompagnée d'une stase abdominale considérable. Insuffisance aortique ou mitrale, Myocardites, Névroses cardiaques, Sclérose artérielle, Sténose mitrale et coronaire, Tachycardies. Tous les troubles cardiaques des maladies infectieuses.

**Propriétés.** — Toni-cardiaque de grande puissance et d'extrême souplesse. Eunoïque et Hypotenseur énergique à action durable ramenant constamment la tension artérielle à sa valeur normale. Sans action sur l'Hypotension. Régénérateur et Régulateur parfait des fonctions cardiaques. Curatif réel des Affections cardio-vasculaires par son action régénératrice sur le Myocarde. Aucun des inconvénients des médications digitaliques. Soulagement immédiat.

**Posologie.** — 1 à 6 cuillerées à café «pro die» dans un peu d'eau, ou par en cas d'urgence.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Adresse télégraphique : Laboleisyn Paris.

Tél. Auteuil 14-72.

**RYTHMOSYSTOL**

Marrube blanc, 3/4 ; adonis vernalis, 1/4.  
Formes : Dragées, Gouttes.

**Propriétés.** — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

**Posologie.** — *Dragées* : 10 par jour.  
*Gouttes* : LX par jour. — Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n<sup>os</sup> 103-1 et 2.

Prix : 14 francs.

**COMTE, Pharmacien**

60, rue Saint-Guilhem  
MONTPELLIER.

---

## SAINT-ARÉ

(Composition de l'eau de Carlsbad.)

**Sulfatée sodique à 6 p. 1000.**

Chlorurée, bicarbonatée, magnésienne, cal-  
cique.

### Propriétés thérapeutiques :

Syndromes vésiculaires et hépto-coliques.  
— Alcalose. — Propriétés cholagogues,  
régulatrices de l'intestin. — Hypoten-  
sives, diurétiques.

Traitement à domicile.

**Société des Eaux Minérales de Decize**  
(Nièvre).

Bureau à Paris, 49, boulevard de Port-Royal.

## SALANTALE

**Vaccins polyvalents polymicrobiens antiseptiques (Procédé  
breveté).**

### 1<sup>o</sup> VACCINOTHERAPIE

#### Pommade :

Vaccination par voie cutanée et application locale, traitement curatif et  
préventif, aucune contre-indication. Sans réaction locale, ni générale.

**Indications.** — Furonculose aiguë et chronique, Panaris, Ostéomyélites.  
Plaies post-opératoires purulentes, Phlegmons, Erysipèles, Impétigo  
contagieux, Pyodermites superficielles ou profondes, Plaies infectées.  
Mastites, Acné pustuleuse, Eczéma humide des seins et plis des aines  
(Intertrigo), Blessures accidentelles, etc.

**Mode d'emploi.** — a. Application locale : faire sur l'emplacement  
malade un pansement avec de la gaze enduite d'une large couche de  
SALANTALE ; renouveler le pansement matin et soir jusqu'à guéri-  
son complète et simultanément ;

b. Vaccination cutanée. A cet effet, prendre un peu de SALANTALE,  
environ la grosseur d'une demi-noisette et frictionner matin et soir une  
partie du corps éloignée du mal. Par exemple, pour un furoncle au cou,  
faire les frictions sur les cuisses ou sur les bras. Frotter très doucement  
jusqu'à absorption complète de la pommade par la peau. Après la dispa-  
rition des symptômes, continuer les frictions pendant un certain temps  
afin de prévenir les récidives.

Prix de vente : 9 fr. 75 le petit tube, 15 fr. le grand tube.

**Ovules :**

Vaccination par pansements gynécologiques.

**Indications.** — Toutes Leucorrhées et affections purulentes, Vulvo-vaginites, Urétrites, Métrites, Péri-métrites, Salpingites, Annexites, Bartholinites et toutes affections gonococciques.

**Mode d'emploi.** — Pansements gynécologiques. Ne tachant pas le linge, odeur agréable.

Prix de vente : 17 fr. 50 la boîte.

**Ophthlmo :**

(Sous forme de pommade). Vaccination par application locale.

**Indications.** — Orgelets, Blépharites, Conjonctivites purulentes et toutes autres suppurations.

**Mode d'emploi.** — Appliquer matin et soir la pommade sur les parties malades à l'aide de l'embout du tube. Répartir ensuite la pommade par un léger massage des paupières.

Prix de vente : 15 francs le tube.

**Oto :**

(Sous forme de pommade). Vaccination par application locale. Le tube muni d'une canule métallique interchangeable facilite l'application dans le conduit auditif et toujours sous le contrôle de la vue.

**Indications.** — Furonculose et affections douloureuses du conduit auditif : Eczéma impétigineux, Pansements post-opératoires. Otites moyennes et externes, aiguës et chroniques.

Prix de vente : 17 fr. 50 le tube avec canule.

Prix de vente : 15 fr. le tube sans canule.

## 2<sup>e</sup> VACCINOTHERAPIE ET THERAPEUTIQUE SYMPTOMATIQUE COMBINÉES

**Rhino :**

Pommade nasale.

**Indications.** — Rhumes, Grippe, Sinusites aiguës, Mastoïdites et autres inflammations Rhino-Pharyngiennes.

**Mode d'emploi.** — Introduire matin et soir, plusieurs fois par jour, après s'être mouché, un peu de RHINO-SALANTALE, dans les narines, puis masser légèrement l'extérieur des narines pour bien répartir la pommade.

Prix de vente : 9 fr. 75 le petit tube.

Prix de vente : 15 fr. le grand tube.

**Recto :**

Sous forme de pommade rectale (en tube avec canule rectale).

**Indications.** — Affections du Rectum et de l'Anus, Hémorroïdes.

Prix de vente : 17 fr. 50 le tube.

**Suppositoires :**

**Indications.** — Hémorroïdes, Fistules et Fissures anales.

Prix de vente : 17 fr. 50 la boîte.

**Tracho :**

Sous forme de pommade ophtalmique, tube avec embout spécial.

**Indications.** — Trachome, Kératites, Conjonctivites purulentes et autres suppurations.

**Mode d'emploi.** — Appliquer matin et soir la pommade sur les parties malades à l'aide de l'embout du tube. Répartir ensuite la pommade par un léger massage des paupières.

Prix de vente : 10 francs le tube.

Echantillons et littérature sur demande :

**Laboratoires SALANTALE  
STRASBOURG**

## **SALÈNE CIBA** (et **SALÉNAL CIBA**)

### **Analgésiques externes.**

Ethers méthyl et éthyl-glyco-salicylique possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais ayant sur ce dernier l'avantage de l'absence d'odeur et de toute action irritante.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

**Doses.** — Se formule magistralement, pur ou en liniment par 5 ou 10 gr.

Le **SALÉNAL** (pommade au Salène) est vendu en tubes de 30 gr. Prix : 10 fr.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## **SALSANOS**

A base de sels de soude

**Citrate (50 %)**

Sulfate, Phosphate, Tartrate.

**Forme.** — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

**Indications.** — Artério-sclérose, Pléthorisme, Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs, Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

**Doses.** — Une à trois cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau le matin à jeun.

Prix : 16 fr. 50.

**ROBERTS & C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Opéra : 48-91.

## SALUBRINE PHÉNIX

Liquide et comprimés.

**Composition.** — Antiseptique puissant à base de formolsulfonate de soude et de thymol.

**Formes pharmaceutiques.** — 1° Solution incolore miscible à l'eau ; d'odeur agréable, ne tachant pas le linge. 2° Comprimés.

**Indications.** — Gynécologie, accouchements, pansements, hyperhydrose.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à soupe ou 2 à 4 comprimés par litre d'eau. (Usage externe.)

**Laboratoire P. MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SALVATYL

Adopté par les Ministères de la Marine et des Colonies.

Prophylaxie antivénérienne individuelle.

Pommade polyvalente agissant à la fois contre le tréponème et le gonocoque.

**Principe actif.** — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Voir *Gambéol*).

**Mode d'emploi.** — En applications dans le canal de l'urètre sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. A employer le plus tôt possible ; au plus tard dans les 12 heures consécutives à un contact suspect.

### Présentations :

Salvatyl	G. M.....	15 francs.
—	Rech .....	10 —
—	P. M.....	5 —

**Laboratoire du SALVATYL**

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

## SALVÉ

A base de poudre grise (Hg cum creta), 1 centigramme par comprimé et 3 centigrammes par cachet et de carbonate de bismuth. Traitement bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

**Indications.** — Hérédo-syphilis, Traitement d'entretien, Insuffisance hépatique et ses manifestations, Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie, Dermatoses (eczéma, prurigo, strophulus), Helminthiase et plus particulièrement oxyurase.

*Comprimés* : avant 6 mois : 1/2 comprimé par jour.

6 mois à 1 an : 1 compr. en 2 fois.

1 an à 2 ans : 3/2 compr. par jour.

2 ans à 4 ans : 2 comprimés par jour.

4 ans à 15 ans : 3 comprimés par jour.

*Adultes* : 4 comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait, avant les repas.

*Cachets* : Traitement arsénico-bismutho-mercuriel.

*Adultes* : 2 cachets par jour.

Comprimés : 13 fr.

Cachets : 15 fr.

**Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie**  
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS

## SALVEBYL

(granulé)

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire à base de poudre grise (Hg cum creta), hyposulfite de soude et d'extraits végétaux : artichaut, boldo, romarin, etc.

1 cuillerée à café contient 0,005 de poudre grise.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, Migraines, Constipation chronique, Dyspepsie, Calculs biliaires, etc..., Eczéma, urticaire, Prurigo strophulus.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 cuillerée à café par jour.

*Adultes* : 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires RICHER**

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien,  
PARIS.



## SALVENASE LEGOUX

### Composition :

#### *Traitement interne.*

A. Comprimés non enrobés se désagrégeant très rapide- ment ; consti- tués de :	Extraits secs	(Marron d'Inde (stabilisé)
		Cupressus
		Hamamelis
		Viburnum
		Boldo
		Surrénales
	Poudre de glandes	Thyroïdes
		Ovaires

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau, de citrate de soude pur.

#### *Traitement externe.*

Sels pour bains à base de :	( Sulfate de potasse et d'alumine.
	( Hydrochlorate de soude.
	( Carbonate de soude acide.

**Indications.** — Affections du système veineux. Traitement complémentaire de la cure aux eaux ou à défaut son meilleur succédané. (Baignoles de l'Orne, La Léchère).

### Mode d'emploi :

<i>Traitement interne.</i> (Prix : 15 fr.)	{	1° matin à jeun, 1 cuillerée à café pleine de granulé, dissous dans un demi-verre d'eau.
		2° A chaque repas de midi et du soir, prendre 2 à 3 comprimés.
<i>Traitement externe.</i> (Prix : 3 fr. 75).	{	1 bain ou 2 par semaine dans lequel on aura fait dissoudre le contenu d'une boîte Salvenase (sels pour bains).

N° d'inscription au Lab. de Contrôle :

*Traitement interne.* { Comprimés 146-4.  
Granulé 146-5.

*Traitement externe.* 146-6.

**Laboratoires LEGOUX, frères**  
6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).  
Anciennement, 10, rue de Turenne,  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SALYCHLORE LAVIRE

Bain de bouche.

### Formule :

Formoline .....	0,20	p. 100
Acide salicylique....	1,20	—
Chloral.....	5,00	—

### Indications :

Angines, Maux de gorge, Gingivites, Pyorrhées, et toutes affections de la bouche et des dents.

### Posologie :

1 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède.

Prix : 9 fr. 75.

Laboratoire **LAVIRE**

46, rue de Rome — MARSEILLE.

## SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

**Composition. Propriétés.** — Extrait balsamique aux principes actifs de l'eucalyptus et du pin maritime, Bromoforme-Codéine, Belladone d'Aconit et d'Opium, Hypnal, Excipient glycéro-balsamique sucré.

Calmant énergique de la toux, Antifébrifuge, Anti-bronchitique, Anti-grippal.

**Indications.** — Rhumes, Laryngite, Trachéite, Bronchites aiguës et chroniques, Affections pulmonaires, Grippe et toutes ses formes, Coqueluche.

**Formes. Posologie.** — *Elixir (adultes)*: 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.

*Gouttes (enfants)* : jusqu'à 10 ans, X gouttes par jour et par année d'âge ; jusqu'à 1 an, I goutte par jour et par mois.

Elixir : 18 fr. Gouttes : 16 fr. 50.

Laboratoires **Georges TINARD**

134, boulevard Pereire — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SALYSÉRUM

du Docteur Jules SÉJOURNET

Composé cosalicylé

(Communication à l'Académie de Médecine.)

**Forme.** — Ampoules de 5 cc. d'acide salicylique *indolore*.

**Indic. therap.** — Rhumatisme aigu ou subaigu, Pleurodynies, Torticolis, Lumbagos, Rhumatisme gonococcique, Sciatique, Goutte.

**Doses.** — 2 à 3 ampoules chaque jour injectées au point douloureux.

**Prix :** 22 fr. la boîte de 5 ampoules de 5 cc.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## SAMBUL

Médicament végétal, *sans colchique*.

**Composition.** — A base d'un suc extrait des baies du Sambucus Ebulus. Désodorisé.

**Indications.** — Goutte ; rhumatismes ; sciatique ; névralgies ; lumbago, migraines, etc. — Antidiabétique.

**Posologie.** — Une cuillerée à café matin et soir, avant et à distance des repas. *N'est pas toxique* ; pas de contre-indications. Traitement à prolonger dans les cas chroniques rebelles de prime abord. Cures ininterrompues de 1 à 3 flacons.

Le flacon pour dix jours de traitement : 18 fr.

*Littérature et spécimens médicaux*  
sur demande :

**Société des Laboratoires du SAMBUL**  
EVREUX (Eure).

## SANAS

### Composition :

Extrait glycériné concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, facteurs A et D, sans trace d'huile, ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

### Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre-Neuve).

### Formes :

- 1<sup>o</sup> Gouttes ;
- 2<sup>o</sup> Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

### Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.  
Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

### Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

### Posologie :

*Enfants* : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

*Adultes* : Dose journalière : L à LX gouttes.

### Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 15 francs.

**A. WELCKER et C<sup>ie</sup>**

72, rue du Commerce — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés dosés à 20 cgr. d'isobutylallylmalonylurée.

**Propriétés.** — Assure un sommeil tranquille et naturel, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite.

**Indications.** — Toutes les insomnies.

**Posologie.** — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

**Présentation.** — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

### Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SANÉDRINE

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

### *Indications :*

**Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dysménorrhée, Accidents allergiques**

### *Posologie et mode d'emploi :*

Deux à six comprimés à 25 milligr. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus.

Pour l'administration par voie parentérale : ampoules de 1 cc. de Sanédrine (0 gr. 02), Rénaleptine (0 gr. 0002) — (boîtes de 10 amp.).

Pour l'usage externe : solution aqueuse de Sanédrine à 3 % (flacons de 30 cc.), solution huileuse de Sanédrine Bosc à 2 % (flacons de 15 cc.).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SANEX-INHALANT

**Composition.** — Liquide volatil antiseptique, a base d'essences aromatiques de pin sylvestre, de thym, de menthe, de camphre, de melaleuca de Gomène, d'eucalyptus, etc. en solution dans de l'acétone pure. Présenté en tube stilli-gouttes.

**Avantages.** — Permet de faire de très fréquentes inhalations antiseptiques sans appareil spécial ; il suffit de verser sur un mouchoir quelques gouttes de SANEX-INHALANT et de respirer fréquemment les vapeurs qui se dégagent pendant plusieurs heures. Ne tache pas le linge. Odeur agréable.

**Indications.** — Affections du nez, de la gorge et des bronches ; en particulier Coryza, Sinusite, Rhume des foins, Coqueluche, Asthme.

Prix : 10 francs.

Sur demande, envoi d'un spécimen à MM. les Docteurs.

**Laboratoires BOISSY**

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

---

## SANGUIL

Reconstituant complet.

**Composition.** — Association de glycérophosphate de soude, phosphate tricalcique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthyl-arsinate de soude, kola totale, noix vomique totale, surrénale.

**Action thérapeutique.** — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

### Formes :

**Cachets**, la boîte de 42 : 17 fr.

**Granulé** de goût agréable, la boîte : 14 fr.

### Mode d'emploi :

*Cachets* : Un cachet avant chacun des trois repas.

### *Granulés* :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café.

*Adultes* : trois cuillerées à dessert.

A prendre au début des repas.

---

**Laboratoires Ch. BRÉSIL**

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III<sup>e</sup>).

Téléphone : Archives 67-05.

## SANLUOL

Arsénobenzol en comprimés.

Le Sanluol permet, sous une forme commode et bien tolérée, l'administration par la voie buccale de l'arsénobenzol, méthode préconisée par M. le Dr Ravaut.

**Indications.** — Amibiase (prophylaxie et traitement). Diarrhées, Entérites.

**Posologie et mode d'emploi :**

*Traitement* : Deux à six comprimés à 10 centigr. par 24 heures, par séries de 8 à 10 jours.

*Prophylaxie* : Un ou deux comprimés par jour, une ou deux fois par semaine.

Pour la médecine infantile, le Sanluol est présenté en comprimés à 0,02 (tubes de 30).

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SANOCRYSINE DE MOLLGAARD

Thiosulphate d'or et de sodium.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, cutanée, ganglionnaire, etc  
Asthme bronchique, Maladies rhumatismales.

**Forme.** — Ampoules à doses progressives de 0 gr. 01 à 1 gramme.

**Mode d'emploi.** — En injections intraveineuses ou intramusculaires

**Posologie.** — On débute par des doses faibles en augmentant progressivement selon la tolérance du malade.

## OLÉO-SANOCRYSINE

Thiosulphate d'or et de sodium. — En suspension huileuse.

**Indications et posologie** de la Sanocrysine aqueuse.

**Forme.** — 1<sup>o</sup> En suspension à 5 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 10 de Sanocrysine.

— — 3 cc. — 0 gr. 15 — —

— — 5 cc. — 0 gr. 25 — —

2<sup>o</sup> En suspension à 10 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 20 de Sanocrysine.

— — 3 cc. — 0 gr. 30 — —

— — 5 cc. — 0 gr. 50 — —

**Mode d'emploi.** — En injections intramusculaires. *Avant l'emploi, agiter l'ampoule jusqu'à ce que la suspension soit homogène.*

**Valentin AAGE MOLLER**

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire pour la France :

Jean DEDIEU. 39, rue Fondaudège — BORDEAUX



## SANOFORMINE

**Composition.** — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

**Forme.** — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

**Indications thérapeutiques et posologiques.** —

1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;

2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre ;

3° Désodorisant : 12 comprimés pour un bain de pieds quotidien. — 10 comprimés par litre en lavage (plis de l'aine, creux de l'aisselle).

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A BRUXELLES :

**LE MARINEL, Pharmacien,**

273, rue Victor-Rauter.

## SANOGYL

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 6 fr.

## SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc.

Prix : 5 fr.,

**H. VILLETTE, Pharmacien**

Marques de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## SANOQUINOL CIBA

### Antiarthritique.

A base d'Atoquinol (Cl. ce mot), d'hexaméthylène-tétramine, de chlorure de magnésium, citrate de soude et benzoate de lithine.

Médicament spécialement préparé pour cures d'élimination uratique prolongées qui, grâce à ses composants, exerce sur l'organisme une action lixivante caractérisée par la mobilisation lente et prolongée des dépôts uratiques, par une stimulation de la fonction hépato-biliaire et de la fonction rénale, par l'augmentation de la sécrétion de la bile, par une diurèse abondante et éliminatrice des déchets de l'organisme.

Indiqué dans les diverses manifestations de l'arthritisme, après les maladies infectieuses et, à titre préventif ou hygiénique, chez les sujets à complexion pléthorique, obèses, herpétiques, rhumatisants, etc.

Doses : 1 à 4 cuill. à café de granulé par jour (aux repas).

Le flacon : 15 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND.**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON

## SANTAL-MIDY

**Composition.** — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Bombay, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

**Forme.** — Capsules.

**Caractéristiques.** — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

**Indications.** — Blennorragie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

**Doses.** — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et chaque fois un quart d'heure avant les repas.

**Laboratoire de Pharmacologie Générale**

D<sup>r</sup> Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

## SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

**Forme.** — Capsules.

**Composition.** — Chaque capsule contient :  
Essences balsamiques : 0 gr. 16.

Bleu de Méthylène : 0 gr. 02.

**Doses.** — 6 à 10 capsules par jour.

**Action.** — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

**Particularité.** — Colore les urines en bleu.

Le flacon de 50 capsules : 20 fr.

**Laboratoires MONAL et C<sup>le</sup>**  
6, rue Bridaine — PARIS.

## SANTHÉOSE

A base d'une diméthylxantine irréprochablement pure, associée selon les cas au *phosphate de soude*, à la *caféine* ou au *benzoate de lithiné*.

### Forme :

Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

- 1° **Santhéose pure** : Affections cardio-rénales, albuminurie.
- 2° **Santhéose phosphatée** : Scléroses, convalescences.
- 3° **Santhéose caféinée** : asthénie, asystolie, infections.
- 4° **Santhéose lithinée**, artériosclérose, rhumatisme, goutte.

**Dose.** — 1 à 4 cachets par jour.

### Propriétés thérapeutiques :

Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, anti-toxique.

### Indications :

Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

Vente au public : la boîte de 24 cachets : 12 francs

### Dépôt général :

4. rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.

Spécifique des Prurits. — Eczémas.

Psoriasis. — Lichens.

**Sapocrème.** — Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse. Dermites aiguës.

Prix : 11 francs.

**Sapocade.** — (Sapolan et Huile de Cade.) Psoriasis. Séborrhée, Sycosis. Le tube : 11 fr.

**Lait de Sapolan.** — Erythèmes. Le flac. : 18 fr. 50.

**Lait de Soufre Sapolan.** — Acné. Le flac. : 18 fr. 50.

**Lait de Cèdre Sapolan.** — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu. Le flac. : 18 fr. 50.

**Poudre de Sapolan.** — Dermites aiguës.

La boîte : 11 francs.

**Savon de Sapolan.** — Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables. Prix : 5 fr.

**Sapobarbe.**

Laboratoire du D<sup>r</sup> R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Détail : Pharmacie 116, bd Haussmann et toutes pharmacies.

## SARCOPTOL

Solution complexe à base de soufre colloïdal, acide-B-oxynaphtylortho-oxymétatoluïque, savons-essences.

**Indications.** — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermites microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit, Prophylaxie de la Furunculose, Parasiticide. Spécifique de la gale, qu'il guérit en une seule application sans frotte et sans bain.

**Avantages.** — Ne tache ni le linge ni la peau, d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime instantanément les démangeaisons.

En flacons de 60 grammes : 15 fr.

— 120 — 28 fr.

Laboratoire du Sarcoptol

8, avenue Rachel — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## SAUBARSINOL

Collutoire au Novarsénobenzol (1 gr. 60 %),  
à l'extrait fluide d'Arnica Montana et au  
Citrate de soude.

**Indications thérapeutiques.** — Angines  
rouges, Angines de Vincent, Angines  
pseudo-membraneuses, Angines herpé-  
tiques, Gingivites, Stomatites, etc.

**Mode d'emploi.** — En badigeonnage très  
léger sur les amygdales ou sur les gencives.  
En instillation nasale, III gouttes dans  
chaque narine, matin et soir.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires SAUBA**  
**MONTREUIL — PARIS**

---

## SAVONS A°. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE  
A°. MOLLARD

SAVONS FLUIDES MOLLARD

pour les soins du cuir chevelu  
(cèdre, cade, sulfureux, panama)

LOTION A°. MOLLARD A LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD  
(affections squameuses du cuir chevelu)

**Émile LANG et C<sup>ie</sup>**

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux  
PARIS (IV<sup>e</sup>)

Téléphone : Archives 20-71.

## SCILLARÈNE « SANDOZ »

(Adopté par les Hôpitaux de Paris).

**Composition.** — Tous les principes actifs du bulbe de scille isolés sous forme de glucosides purs.

**Forme.** — Comprimés à 0 milligr. 8 de substance active, solution à 1/2000 ; ampoules pour injections intramusculaires profondes à 1 cc. dosées à 0 gr. 0005 ; suppositoires dosés à 1 milligr.

**Propriétés.** — Produit pur, cardiotonique et diurétique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

**Indications.** — 1° Remplace la digitale quand elle n'agit pas ou n'agit plus ; 2° maintient la compensation ; 3° puissant diurétique dans les néphrites, *le diurétique azoturique vrai*.

**Posologie.** — 1/2 à 2 ampoules par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour à doses régulièrement ascendantes puis descendantes.

### Produits SANDOZ

20, rue Vernier — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## SCILLITRINE

**Composition.** — Association de Trinitrine, Scille et Gardénal. Dragées à noyau mou contenant II gouttes de la solution alcoolique de Trinitrine à 1/100. 2 cgr d'Extrait de Scille stabilisé. 1 cgr. de Poudre de Scille stabilisée et 1 cgr. de Gardénal.

**Propriétés.** — Hypotenseur par la Trinitrine et le Gardénal. Diurétique et toni-cardiaque par la Scille.

**Indications.** — Traitement d'entretien des hypertendus. Traitement des accidents aigus de l'hypertension et des crises d'angor.

**Présentation.** — Boîte contenant 45 dragées.

**Posologie.** — Traitement d'entretien : 3 dragées par jour aux repas, pendant 15 jours *chaque mois*. Traitements des états aigus : *croquer* 3 à 4 dragées en 10 minutes.

### Laboratoire PERRIER

17 bis, boulevard Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Trudaine 03-01.

## SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique  
Spécifique de l'Artériosclérose.

**Composition.** — Acide thyminique, Théobromine, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

**Indications.** — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Dose :**

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire Moderne  
d'Opothérapie et Biologie Médicale**  
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

## SCLÉROSÉRUM

Traitement des Varices, des Hémorroïdes, des Rhinites congestives et hypertrophiques, des Epistaxis et Laryngites tuberculeuses par les injections sclérosantes.

**Formule.** — Nouvelle formule à base de sels doubles de Quinine et d'Urée, en milieu hypersclérosant. (Employée dans les Hôpitaux.)

**Indications, technique et posologie.** — Demander à notre Laboratoire l'opuscule traitant ces questions et contenant quelques-unes des observations prises dans les hôpitaux de Paris.

**Avantages sur les autres solutions.** — 1° Le plus actif des sels employés ; 2° absolument indolore pendant et après l'injection (jamais de crampe) ; 3° le moins réactionnel pour les tissus périvasculaires ; 4° nullement escarrotique à des doses permettant des scléroses étendues et complètes ; 5° sa présentation permet d'obtenir automatiquement tous les taux de solution désirables.

**Traitement :** Varices : 45 francs ; Hémorroïdes : 30 francs ; O.-R.-L. : 30 francs.

**LABORATOIRES « ANA »**

Anciennement : Laboratoire de Dermatologie de Paris,  
18, avenue Daumesnil — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Dorian 52-12.

## SCUROCAÏNE

Chlorhydrate du para-aminobenzoyl-diéthylaminoéthanol.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

*Solutions* : en ampoules stérilisées à divers titres, additionnées ou non d'Adrénaline (Renaleptine), pour usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration. Anesthésie dentaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

---

## SCUROFORME

Para-aminobenzoate de Butyle normal.  
Anesthésique insoluble, non irritant, non toxique.

*Indications* :

**Plaies, Brûlures de la peau, Ulcérations des muqueuses, Dysphagie, Pharyngites, Ulcères gastriques, — Usages stomatologiques.**

*Présentations, mode d'emploi* :

- 1<sup>o</sup> Poudre en nature : applications locales.
- 2<sup>o</sup> Poudre lactosée à 1/10<sup>e</sup> : Insufflations laryngées.
- 3<sup>o</sup> Pastilles Rhodia chocolatées à 2 milligrammes : Stomatites, Pharyngites.
- 4<sup>o</sup> Solution huileuse ou glycéro-alcoolique : Badiageonnages.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## SÉCACORNINE " ROCHE "

Tous les principes actifs de l'ergot de seigle sous une forme soluble et injectable.

Toutes les propriétés de l'ergot de seigle sans ses inconvénients.

**Indications.** — Hémorragies internes, utérines et autres, Myocardites infectieuses, Congestion pulmonaire, Diarrhées, Leucorrhée, Spermatorrhée, Atonie utérine, Polypes du rectum.

**Posologie et mode d'emploi.** — Ampoules, solution, comprimés.

1 cc. ou 1 ampoule ou XL gouttes ou 4 comprimés agissent comme 4 gr. de seigle ergoté.

*Doses d'urgence :* 2 cc. ou LXXX gouttes ou 2 ampoules

*Doses moyennes :* 1/2 à 1 ampoule, XX à XL gouttes ou 1 à 2 cc. par jour.

*Thérapeutique locale :* 2 cc. ou 2 ampoules par jour en injections intra-utérines ou sous-muqueuses.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
10, rue Crillon. — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## SÉDACRINE Gouttes

A base de Sédum acre, Polygonium hydropiper et poeonia avec comme excipient :

Extrait stabilisé de marrons d'Inde et Hamamélis.

**Indications.** — Toutes affections du système veineux.

**Mode d'emploi.** — De XX à XXX gouttes avant chacun des deux repas.

**Laboratoire de la VARILAXINE**  
**SURGÈRES** (Charente-Inférieure).

## SEDARSAN

(Sédatif du système nerveux.)

En solution à prendre par gouttes.

**Composition.** — Extraits fluides à parties égales : Crataegus oxyacantha, Ballota foetida, Passiflora incarnata, les plantes ayant été stabilisées avant l'extraction.

**Indications.** — Palpitations, névroses cardiaques, hyperexcitabilité cardiaque, spasmes, dyspepsies nerveuses, troubles de la ménopause, insomnies, troubles nerveux et psychonerveux, affections spasmodiques et psychopathiques, aérophagie.

**Posologie.** — XV à XXX gouttes trois fois par jour ou plus sur indications strictes du médecin. A prendre avant le repas ou au coucher dans un peu d'eau.

**N. B.** — Le Sédarsan ne contient aucune substance toxique ou soporifique ; c'est un extrait physiologique végétal. Son action n'est pas immédiate mais curative.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

---

## SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique  
du Docteur André Gigon

**Composition.** — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

**Forme.** — Poudre desséchée.

**Indications thérapeutiques.** — Epilepsie.

**Mode d'emploi et dose.** — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé suivant avis du médecin.

Flacon de 40 gr.

**Laboratoires des Produits du Dr GIGON**

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SÉDATULINE

### Aérophagie-Palpitations.

**Composition.** — A base de passiflore, balote, cratægus, valériane (plantes stabilisées).

**Indications.** — Insomnies, états nerveux et spasmodiques, affections du cœur et des vaisseaux de l'estomac et de l'intestin.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café le matin et le soir et la nuit si besoin avec un peu d'eau pure ou sucrée.

Se fait également en pilules.

2 pilules le matin et le soir et dans la nuit si besoin.

Prix : 15 francs.

**P. BOUSQUET et E. LEROUX**

Anciens internes des Hôpitaux  
46, rue de la Barrière — ELBEUF.

---

## SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré  
achloruré et bromuré.

**Tablettes.** — 1 tablette = 1 gr. NaBr.

**Modes d'emploi et doses.** — Adultes :  
1 à 5 tablettes par jour.

*Enfants* : 1/2 à 2 tablettes par jour, selon  
l'âge.

Dans une tasse d'eau très échaude, on fait  
dissoudre une ou deux tablettes de *Sédobrol*  
« Roche » : on prépare ainsi instantané-  
ment un bouillon particulièrement savou-  
reux que l'on peut prendre à n'importe  
quel moment de la journée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médica-  
ment sédatif, hypnotique et calmant  
donnant des résultats certains et permet-  
tant d'imposer un *traitement bromuré*  
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-  
ble le régime déchloruré.

**Indications thérapeutiques.** — Insom-  
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,  
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-  
diopathies, migraines, spasmes, convul-  
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

### PRODUITS

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SÉDOFOLLINE

**Composition et propriétés.** — 1° *Folliculine* ovarienne: Dosage garanti, activité constante. — 2° *Extrait ovarien spécial*: Action naturellement synergique de toutes les hormones ovariennes à l'exclusion de l'hormone lutéinique. — 3° *Thyroïdine* (faible dose) Synergie thyro-ovarienne. — 4° *Sédobenzyl* (non toxique): Sédatif et antispasmodique.

**Forme.** — Dragées friables à enrobage soluble, dosées à raison de 12 unités physiologiques.

**Indications.** — Tous les troubles de la fonction ovarienne.

**Dosage.** — Chaque dragée est dosée à raison de 12 unités physiologiques de *Folliculine*.

**Mode d'emploi.** — 2 à 8 dragées par jour, loin des repas. Dose moyenne : 4 dragées par jour.

**Traitement.** — 8 jours de traitement, 8 jours de repos jusqu'à résultat satisfaisant. Continuer chaque mois pendant les 8 jours précédant l'époque présumée des règles.

**Laboratoires ODILIA**

**E. LACOMBE, pharmacien**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

## SEDOGASTRINE

Sédatif gastrique.

**Formes.** — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

**Composition.** — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium. Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*  
Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*  
Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

### Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

**Indications.** — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

**Posologie.** — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café.

Comprimés : quatre à six jusqu'à sédation.

Prix : 12 fr. 50.

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie  
Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des  
Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris  
et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## SEDOGRIPPINE LAGOUTTE

(Cachets.)

Spécifique de la grippe.

**Composition.** — Aconit rac. pulv., 0,01 ; Belladone rac. pulv., 0,02 ; Drosera pulv., 0,01 ; Gelsemium pulv., 0,05 ; Poudre Dover 0,10 ; Dionine, 0,01 ; Caféine, 0,05 ; Benzoate de soude, 0,05 ; Pyramidon, 0,25 et Phénacétine, 0,25 (pour 1 cachet).

**Actions thérapeutiques.** — Antithermique, Analgésique, Sédatif, Antispasmodique, Sudorifique.

**Indications.** — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Courbatures fébriles, Fièvre, Névralgies faciale ou dentaire, Maux de tête, Migraine, Insomnie.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cachets par jour.

Prix : La boîte de 10 cachets : 10 francs.

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON.

## SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine.

**Mode d'emploi et doses.** — 1° **Ampoules** : 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures ;

2° **Suppositoires** : 1 à 2 « supposédol » par 24 heures.

3° **Comprimés** : 1 à 2 « pérosédol » par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Beaucoup plus actif que la morphine à dose égale.

**Indications.** — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Spasmes, Crises tabétiques, Maladie de Parkinson, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, etc.

Prix de vente au public :

La boîte de 12 ampoules : 25 fr.

La boîte de 6 ampoules : 18 fr.

La boîte de 10 supposédol : 25 fr.

Le tube de 12 comprimés : 10 fr.

(Pérosédol)

Le Supposédol ne fait pas partie du tableau B.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

R. MOREUX, Pharmacien

Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

## SEDONEUROL DEHAUSSY

« Calme sans déprimer ».

### Composition.

Phényl-éthyl-malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine et correctifs variant suivant les comprimés.

*Comprimés jaunes* : Caféine 0,015.

*Comprimés roses* : Strychnine, 0,0002.

Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalënt avec une dose moindre de phényl-éthyl-malonylurée. Evite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs.

Pour éviter l'accoutumance à ces derniers, administrer 8 jours les comprimés jaunes ; 8 jours les comprimés roses.

Formule, posologie et indications établies d'après les travaux de Pierre Marie, Crouzon, Bouttier, Carrière, Pagniez, Sezary, etc...

### Indications.

**États spasmodiques.** — Traitement de choix de l'*Epilepsie* dans toutes ses formes. — *Maladie de Parkinson* et *Parkinsonisme*. — *Asthme rebelle*.

**États d'instabilité nerveuse.** — *Insomnies rebelles*, *Anxiété*, *Instabilité des basedowiens* et des *hypertendus*, *Prurit sénile*.



**Algies paroxystiques.** — *Migraine, Angine de poitrine.*

**Enfants et nourrissons.** — Toutes les manifestations spasmodiques de l'épilepsie, du croup, des laryngites striduleuses et aiguës, toux persistante des bronchopneumonies, coqueluche, tétanie, états convulsifs, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.

### **Posologie.**

**Epilepsie.** — Doses progressivement croissantes jusqu'à suppression des crises. Commencer par quatre comprimés chez l'adulte, deux comprimés à cinq ans.

### **Autres indications.**

*Adultes*, dose moyenne entre 4 et 8 comprimés. — *Enfants*, 1/2 comprimé par année d'âge. — *Nourrissons* (tolérance parfaite), 1/2 comprimé jusqu'à six mois, un comprimé de six à douze mois en deux prises.

(Un comprimé = 2 centigrammes et demi de phényl-éthyl malonylurée.

---

**Laboratoire DEHAUSSY**

66, rue Nationale

**LILLE.**

## SEDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

**Indications.** — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoidites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

**Trois formes.** — A) *Sedorhinol mixte*, comprend dans une même boîte :

1° Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide : adrénaline huileuse, stovaine benzoate de soude, essences aromatiques.

2° Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antiseptie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse bucco-pharyngée).

**Laboratoires A. REGAGNON et Cie**

276, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

Tél. : Vaugirard 26-30.

---

**SÉDORMID « ROCHE »**

Allylisopropylacétylcarbamide.

(Chaque comprimé est dosé à 0 gr. 25)

**Propriétés :**

Sédatif hypnogène doux et inoffensif,  
très maniable ; ne s'accumule pas.

**Indications :**

Toutes les Insomnies légères de quelque  
nature qu'elles soient ; Anxiété, Mé-  
lancolie, Symptômes hypernerveux,  
etc.

**Doses et mode d'emploi :**

Dose sédatif : 2 à 3 comprimés dans  
la journée.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés  
au coucher.

Boîte de 20 comprimés.

**Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon

PARIS (IV<sup>e</sup>).

# SÉDOSINE

## Solution

**Sédatif à action élective  
sur le système neuro-végétatif.**

### **Association synergique hyperactive :**

Dans la *Sédosine*, l'action antispasmodique bien connue de la Jusquiame se trouve considérablement renforcée par la présence de la Passiflore et du Cratægus, l'association de ces principes végétaux permettant d'obtenir un effet notable avec une dose réduite de Jusquiame (H. Leclerc).

Le mode d'association médicamenteux n'a, comme on sait, nulle part ailleurs, autant d'importance que lorsqu'il s'agit du Sympathique (Expériences de Danielopolu, de Garrelon, Santenoise et Tinel).

La *Sédosine*, à l'encontre des hypnotiques, agit par un véritable processus de détente et sans recourir à l'intoxication de la cellule nerveuse.

### **Indications :**

Etats spasmodiques. Excitation nerveuse.  
Insomnie. Neurasthénie. Psychasthénie.  
Mélancolie.

### **Posologie :**

*Contre l'insomnie* : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

*Sédatif nerveux* : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature ou mieux dans un peu de tisane.

### **Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

## SÉDOTENSYL

**Composition.** — Phényléthylmalonylurée, belladone, cratægus, gui, peptone iodée, acide phosphorique + extrait orchitique (formule M) ou ovarien (formule F).

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, hypotenseur, neurotonique.

**Indications.** — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, troubles de la ménopause (chez l'homme comme chez la femme).

**Posologie.** — 1 cuillerée à soupe, 20 minutes avant les repas de midi et du soir.

**Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France**

6, rue Robert-Estienne — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## SEIGNET' FRUITS

**Composition.** — Limonade aux sels de fruits, Extraits végétaux et Eau diurétique. Goût réputé. Purge sans nausées ni coliques.

**Propriétés thérapeutiques.** — Purgatif et laxatif.

**Indications.** — Désinfection de l'estomac, du foie, de l'intestin.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : Purgatif. Un flacon pris le matin à jeun en une ou deux fois, à 10 minutes d'intervalle.

*Enfants* : 1/4 à 1/2 flacon, suivant l'âge.

*Laxatif* : Un verre à bordeaux au réveil ou au coucher un jour sur deux.

**Laboratoire de la STAR-MONOPOLE**

route du Moulleau — ARCACHON.

## SELAMON

**Composition et présentation.** — Chlorure d'ammonium pur en comprimés à 50 centigrammes.

**Dose et mode d'emploi.** — 3 à 6 comprimés par jour au milieu des repas.

S'emploie avec succès dans tous les cas où il y a intérêt à modifier l'équilibre acide-base dans le sens de l'acidité. Médication prophylactique très active de la lithiase rénale.

Prix : 15 francs.

**Etablissements T. LECLERC**

**Dr P. Lemeland, pharmacien.**

10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## SEL DE HUNT

Alcalin type.

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

**Forme.** — Granulé friable.

**Posologie.** — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 9 fr. 50 le flacon.

**Laboratoire ALPHONSE BRUNOT**

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

## SEL D'EWALD

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac.

Le Sel d'Ewald se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonates de Chaux et Magnésie.

Le Sel d'Ewald trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyrosis, Vomissements de la grossesse.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café de granulé délayé dans un quart de verre d'eau ou de lait après les repas ou bien au moment des crises.

Le Sel d'Ewald ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

**BRACQUEMOND et Cie**, Docteurs en Pharmacie  
105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

---

## SEL DIGESTIF BÉ ME CÉ

**Forme.** — Poudre.

**Composition.** — Bicarbonate de soude, Magnésie, Carbonate de chaux léger, Lactose.

**Indications.** — Hyperacidose gastrique aiguë, Vomissements incoercibles.

**Doses.** — Une cuiller à café après chaque repas.

Prix : 7 fr. 50.

**Laboratoires Gastro-Entérologiques**

**ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 69-13.

## SELENIOL

**Description.** — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le Sélénol est une solution limpide de couleur brune; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

**Indications.** — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses, soit seul, soit associé à la Cytuline Couturieux.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

---



## SEL HÉPATIQUE U. N. ARQUEVAUX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 439-2, en vue de la possibilité de prescription aux Assurés Sociaux.

**Composition.** — Complexe alcalin hypersolvant de l'acide urique.

### Composition Centésimale :

Carbonate de Lithine .....	0 5286
Sulfate de Potasse. ....	2.6431
Chlorure de Sodium .....	2.0264
Sulfate de Sodium.....	24.2290
Citrate de Sodium .....	11.0132
Bicarbonate de Sodium .....	48.5462
Sel de Seignette .....	11.0132

**Forme:** — Poudre blanche entièrement soluble.

**Propriétés thérapeutiques.** — Insuffisance hépatique. Lixiviation de l'organisme par osmose isotonique ; action désincrustante décuplée analogue à celle des stations thermales de Carlsbad, Contrexéville, Bagnoles. Dissolvant de l'acide urique, éliminateur de toxines. Laxatif. Stimulant des fonctions de l'estomac, du pancréas, du foie, des reins et de l'intestin. Régulateur du métabolisme physiologique.

**Indications.** — Arthritisme, Traitement des troubles dus à l'acide urique (Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Névralgies, Lumbago, Sciatique, etc.), de l'Artério-Sclérose, des Phlébites et troubles trophiques, de la Constipation. Anti-acide. Antirhumatismal. Lithiases hépatique et rénale.

**Posologie.** — Une cuillerée à café rase (5 grammes) dans 200 grammes d'eau, de préférence très chaude à prendre le matin à jeun 25 jours de suite.

Le flacon : 15 fr. (pour 25 jours de traitement).  
Sans impôt.

**Laboratoires L. ARQUEVAUX**   
Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

## SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

Le Perdriel.

**Nature.** — Sels de Lithine.

**Action.** — Les sels de Lithine, en opérant sur le foie, tarissent à la source même la production de l'acide urique en modifiant la nutrition troublée.

**Indications.** — *Carbonate*, rhumatisme, goutte, *Benzoate*, coliques néphrétiques, gravelle, coliques hépatiques, albuminurie, diabète. *Salicylate*, rhumatisme articulaire, rhumatisme chronique. *Glycérophosphate*, diathèse arthritique goutteuse, accompagnée de neurasthénie, possède en même temps les propriétés reconstituantes de l'acide glycérophosphorique. *Bromhydrate*, sédatif par le brome. Par la lithine dissout l'acide urique et les urates alcalins. *Citrate*, diathèse rhumatismale.

**Posologie et mode d'emploi.** — Chaque flacon de sels de Lithine est surmonté d'un bouchon-mesure qui contient 20 centigrammes de principe actif. Faire prendre dans de l'eau sucrée ou non, ou dans de la bière ou du lait.

**Laboratoires LE PERDRIEL**

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## SELS DU JURA

Produits thérapeutiques naturels pour le traitement à domicile :

### EAUX MÈRES CRISTALLISÉES DU JURA

« Gynécomer ».

Forme : Cristaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Résorption des exsudats et engorgements, décongestion et mobilisation des organes, correction des déplacements vicieux, élimination des produits pathologiques.

**Indications.** — Traitement des Métrites et Salpingites subaiguës et chroniques, Fibromes, Déviations utérines, Cellulites pelviennes, Troubles menstruels, suites de Couches.

**Doses.** — 1 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie, chauffée à 38-40° C, à prendre en irrigation vaginale, à faible pression, dans la position allongée à observer encore 1 heure après.

Prix : 12 francs la boîte.

### SELS POUR BAINS « Jurbainsel ».

Forme : Cristaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Augmentation des échanges moléculaires, activation de la vie cellulaire, action modificatrice sur le milieu sanguin et lymphatique.

**Indications.** — Anémie, Débilité, Rachitisme, Lymphatisme, chez les enfants.

Asthénie, chez les adultes.

**Doses.** — 10 à 20 grammes par litre d'eau chauffée à 36° C au maximum, pour un bain de 10 à 20 minutes.

Prix : 10 francs le paquet.

#### Compresses.

Pour les compresses, reconstituer les eaux mères liquides en faisant dissoudre les sels « Gynécomer » dans 3 fois leur volume d'eau tiède.

Dépôt : 11, avenue de l'Opéra, Paris.

Sels du Jura

11, avenue de l'Opéra — PARIS.

Tél. : Opéra 17-26 (2 lignes groupées).

## SELUNIC

**Sel de fruits. Sel de santé.**

**Composition.** — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de citro-tartrate de soude.

**Forme.** — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

**Propriétés.** — Régulateur simple et efficace de la Santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

**Indications et mode d'emploi.** — **Maladies du foie et des intestins.** Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

**N. B.** — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

**Estomac, Impuretés du sang, maux de tête.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi-heure après les repas.

**État bilieux, indigestion, excès de table.** — Une cuillerée à dessert dans un verre d'eau en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

**Désaltérant et rafraîchissant.** — Contre la soif, état févreux, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.

**Obésité.** — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

**Comme breuvage.** — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

Dans le vin et le cidre : une pincée combat l'excès d'acidité, et produit une boisson de table pétillante.

**Présentation.** — En flacons de 200 grammes : 20 fr.  
Le modèle « Week-End » de 40 grammes : 6 fr.

**SELUNIC, grâce à son Citrate de Soude, liquéfie le Sang.**

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 333-1.

**Préparé par : Georges MIQUEL**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, 3, avenue Lowendal — PARIS.

## SÉNEÇOL

### Comprimés antidouleur.

*Règles douloureuses, Névralgies, Migraines, Grippe, Rhumatismes, Sciatique et toutes douleurs.*

**Présentation.** — Etui aluminium contenant 40 comprimés dragéifiés.

**Mode d'emploi.** — 4 ou 6 comprimés par jour, loin des repas, et de préférence dans une infusion chaude.

*Pour les règles douloureuses, commencer le traitement dès l'apparition des premières douleurs.*

#### Formule :

Chlorhydrate d'éthylmorphine.....	0,001
Caféine.....	0,025
Extrait mou de Séneçon stabilisé.....	0,05
(Travaux des D <sup>rs</sup> Murrel, Bardet, Leclerc, etc...).	
Pyramidon .....	0,10
Phénacétine .....	0,15

**Préparé par les Etablissements GOY**  
23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SÉOTRAL LEISYN

Éliminateur immédiat de l'Acide Urique, des Urates et des Oxalates.

**Indications.** — Crises de goutte ou de rhumatismes à l'état aigu, c'est-à-dire datant de six jours au plus.

**Action.** — Brusque saignée urique et oxalique par la salive, la transpiration et les urines.

**Présentation.** — Flacon contenant environ 6 cuillerées à café et 6 paquets pour préparer la tisane dans laquelle doit être pris le Séotral.

**Technique.** — A jeun, 1 cuillerée à café toutes les 2 ou 3 heures dans la tisane préparée avec les paquets, le malade étant au lit et chaudement couvert. Provoque salivation et sueurs abondantes.

**Propriétés.** — Pratiquement non toxique, cette préparation permet le plus souvent de juguler une crise de goutte ou de rhumatismes aigus en 3 à 6 heures, avec 3 ou 4 cuillerées à café du médicament.

Prévenir le malade qu'il salivera et transpirera abondamment.

**Composition.** — Méthyle Cupréine, Muguet, Oignon marin, Faible quantité de colchique électrolysée EVOO, donc non toxique (toxicité réduite de 90 p. 100 et accroissement considérable de son action thérapeutique.) Mais.

Priz : 35 francs.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Adresse télégraphique: Laboleisyn Paris.

Tél. Auteuil 14-73.

## SÉPHYDINE

**Composition.** — La Séphydine est une solution, dans le sérum physiologique, de chlorure de zinc réagissant en milieu acide sur la formaldéhyde. Médicament non irritant jouissant de propriétés particulières vis-à-vis de la peau et des muqueuses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action antiseptique et stérilisante sur la peau et les muqueuses, action microbicide puissante sans aucune irritation. Action conservatrice de l'intégrité de la cellule épidermique par saturation des liquides humoraux et par excitation des phénomènes biologiques de défense contre l'infection. En raison de ses propriétés excitantes sur la phagocytose, la Séphydine constitue un excellent réparateur des lésions cutanées et des muqueuses, action désodorisante très grande.

### Indications :

*Dermatologie* : Folliculites, furoncles, anthrax, panaris, acnés, érysipèles, ulcères variqueux et cancéreux, alopecie, pelade, sueurs fétides.

*Obstétrique* : Infections puerpérales.

*Gynécologie* : Vulvites, vaginites, métrites, cancer utérin.

*Vénérologie* : Blennorragie, chancre mou, balanite.

*Stomatologie* : Gingivite chronique, granulations de la bouche, angines, fétidité de l'haleine.

*Oto-Rhino-Laryngologie* : Otite, coryza (guérison très rapide de cette affection), laryngite.

### Posologie :

Dilution pour injections, lavages locaux, lavage de l'urètre : 1 cuillerée à café par litre d'eau.

Dilution pour gargarismes, lavage de nez et des oreilles : 2 cuillerées à café par litre.

Dilution pour pansements (chancre mou) : 4 cuillerées à café par litre.

Dilution pour ulcères variqueux, anthrax, panaris, désodorisation des pieds et des aisselles : 5 cuillerées à café par litre.

Dilution pour frictions du cuir chevelu : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 5 d'eau.

Dilution par attouchements pour piqûres d'insectes, (moustiques, guêpes, etc.) : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 3 d'eau.

Laboratoire Séphyda.

PUAUX, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

CHABEUIL (Drôme).

## SEPTICÉMINE CORTIAL

**Composition.** — Di-formine iodobenzo-méthylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, *indolore*. Aucune réaction locale ou générale.

**Propriétés.** — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Chute de la température, régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxinique; éliminateur hépatique et rénal.

**Indications.** — Infections aiguës médicales : Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhino-pharyngées.

**Infections Chirurgicales :** Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphrites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonite tuberculeuse.

**Forme.** — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

**Doses.** — Septicémies à marche rapide : 10, 20 cc. et plus dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure ou étendue de sérum. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes, Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

**Stomatologie :** pulvérisations alvéolaires et gingivales, injections intra-gingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

**Laboratoires CORTIAL**

7, rue de l'Armorique — PARIS

## SEPTOLAN

(Phénosalyl Laffort liquide.)

**Composition.** — Phénol neige, Salicylate de soude, Acide benzoïque, Menthol, Thymol et Eucalyptol.

**Indications et posologie.** — *Angines, Laryngites, Stomatites* : en gargarismes fréquents, 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie très chaude.

*Grippe, Bronchite, Toux* : en inhalations 3 à 4 fois par jour (1 cuillerée à dessert dans un grand bol d'eau bouillante).

*Plaies de toute nature* : en lavages matin et soir (1 cuillerée à soupe par litre d'eau bouillie).

*Affections du nez, des oreilles* : en lavages répétés avec 1 cuillerée à café dans un litre d'eau bouillie tiède.

*Maladies des femmes. Toilette intime* : en injections matin et soir, avec 1 cuillerée à soupe pour 2 litres d'eau bouillie chaude.

*Dentifrice journalier préventif des maladies infectieuses* : X gouttes dans un demi-verre d'eau chaude.

Autorisé par les Assurances sociales.

**Laboratoires L. LAFFORT, Pharmacien**

Licencié ès Sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (I.-et-L.).

## SÉRÉLBÉ

**Sérum anti-gonococcique**

**du Dr BLAIZOT**

Ce sérum est le seul agent abortif sûr de la Blennorrhagie et le remède le plus spécifiquement actif à lui opposer. Il est produit sur Bovidés et préparé par immunisation intensive des animaux producteurs.

S'emploie en :

**Injectons urétrales** (avec un dispositif pour maintenir le sérum en place.)

**Instillations oculaires** adopté par l'Hospice des *Quinze-Vingts*.

**Pansements vaginaux. Injections intra-vésicales.**

**Applications locales** entièrement indolores et ne provoquant aucune réaction locale ni générale.

**Boîtes** de 3 ampoules de 10 cc. **Coffrets** médicaux de 25 ampoules.

**Produits bactériologiques L.B.L.**

18, rue Daguerre — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 61-47.



## SERIFER LAURENÇON

*Traitement des déficiences sanguines par le fer  
vitalisé rendu assimilable après absorption par des  
Levures vivantes.*

**Composition.** — Ions fer et manganèse, Sérum de  
cheval, Hormones antianémiques de foie frais  
Arsenic organique.

**Indications.** — Toutes déficiences sanguines,  
Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, Etats  
hémorragiques, Suite d'Opérations, Paludisme.

**Forme.** — Délicieux granulé chocolaté. *F. 21*

### **Posologie :**

*Adultes :* 2 ou 3 cuillerées à café par jour avant les  
repas.

*Enfants :* Demi-doses.

### **Produits J. LAURENÇON**

Pharmacien, Professeur de Chimie  
et de Pharmacologie à Lyon.

**Laboratoire d'Actino-Biologie**  
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

---

## **SERODAUSSSE ANTITOXISENYL**

(Sérum activé de taureau.)

Ce sérum contient les hormones circulantes des jeunes animaux mâles et les anticorps des poisons séniles.

Le médicament est indiqué contre l'asthénie des personnes âgées ; il améliore leur capacité de travail physique et intellectuel et produit une orientation de leur caractère vers l'optimisme.

Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau, sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose de 3 ampoules prises à jour passé est suffisante.

## **SERODAUSSSE OVARIEN**

(Sérum activé de génisse.)

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Sérodausse Antitoxisenyl.

## **SERODAUSSSE INFANTILE**

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance. Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé.

Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SÉROGYNE

### Sérum de gestation recueilli sur génisses.

L'état de gestation stimule l'activité endocrinienne et accroît le taux des hormones en circulation. Le SEROXYNE est particulièrement riche en folliculine, hypophysine, thyroxine, hormones placentaires. Recueilli sur de jeunes animaux, il possède en outre les propriétés stimulantes des sérums juvéniles.

### Action physiologique :

Régularise les fonctions génitales féminines, stimule l'appareil génital mâle, stimule les glandes endocrines, relève la nutrition, revitalise.

### Indications :

Aménorrhée, Dysménorrhée, Stérilité féminine, Troubles cataméniaux, Ménopause, Castration chirurgicale, Vomissements incoercibles de la grossesse.

Frigidité masculine, Impuissance, Neurasthénie génitale, Asthénie, Cinquantaine.

Croissance déficiente, Aménorrhée des jeunes filles, Infantilisme génital dans les deux sexes.

Tous les états de maigreur et de dénutrition, Anémies.

Artério-sclérose, Vieillesse, Fléchissement vital.

### Formes et doses :

*Sirop* : Une cuillerée à soupe par jour. Cure mensuelle de 6 jours (cure moyenne) ou de 12 jours (cure intensive).

*Ampoules* (buvables) : 1 ampoule buvable par jour. Temps de cure comme avec le sirop.

### Produits bactériologiques L.B.L.

18, rue Daguerre — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 61-47.

## SÉROMA REY

Sérum granulé, activé, total.

### Composition :

100 gr. de Séroma contiennent :

Sérum normal d'équidés.....	90 gr. 90
Calcium .....	0 gr. 05
Fer .....	0 gr. 30
Manganèse .....	0 gr. 15

**Préparation.** — Sérum total de sang d'équidés, scientifiquement traité, stérilisé sans coagulation, rendu atoxique, stabilisé par dessiccation et activé par des co-ferments minéraux.

**Indications.** — Surmenage, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies. Dans les Affections chroniques, quelle que soit leur nature (tuberculose, cancer, paludisme, etc.), adjoint à la thérapeutique appropriée, il permet à l'organisme de résister, ainsi que dans toutes les maladies infectieuses.

### Doses moyennes :

*Adultes* : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

*Enfants* : demi-doses.

Prix : 16 fr. 80 le flacon  
(pour une dizaine de jours de traitement).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 302-3.

### Laboratoires REY

(Ludin) — DIJON.

*Séroma contient près de son poids  
de sérum activé.*

## SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE de HECKEL

**Composition.** — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales stabilisé dans un liquide isotonique.

**Mode d'emploi.** — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

**Action.** — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

**Indications.** — Toutes les formes d'asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, chez les cardiaques, les hypertendus et chez les sujets présentant un foyer de gangrène pulmonaire.

**Présentation.** — Sérum de Heckel pour adultes. 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 22 francs.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 16 francs.

Voir Cytophédrine page 313.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIERE**

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

## SÉRUM DE JOUSSET

Provient de chevaux longuement immunisés contre les toxines du bacille tuberculeux. Combat l'infection mais non les lésions. **Traitement de choix à la période initiale**, nuisible dans la tuberculose devenue chronique. **Convient surtout aux enfants et adolescents.** Tuberculoses aiguës ou subaiguës, hémoptysies.

**Si après une semaine d'observation** la courbe de température apparaît régulière et peu oscillante on devra aborder la sérothérapie. Température irrégulière, oscillations dépassant 2° est une contre-indication formelle.

**Posologie.** — Injection hypodermique face antérieure de la cuisse. Environ 3 cc. par kg. du poids du sujet en 3 injections à 2 jours d'intervalle (voir notice explicative, page 8). Ne pas oublier fortes doses salicylate si arthralgies le douzième jour.

**Contre-Indications.** — Asthmatiques, emphysemateux.

Demandez notice explicative :

**Les Laboratoires BRUNEAU et C<sup>ie</sup>**

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SÉRUM NEUROPSYCHIQUE

### Ampoules.

**Propriétés thérapeutiques.** — Préparation tonique et reconstituante injectable. Contre tous les cas d'anémie, dépression nerveuse, surmenage physique intellectuel, neurasthénie.

**Forme.** — Ampoules injectables.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule par jour.

**Formule.** — Glycérophosphates composés, cérébrine et moelle.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

---

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

### Composition :

Glycérophosphate de Soude : 0 gr. 10 ;  
Cacodylate de Strychnine : 1/2 milligr. ;  
pour un cc. d'eau distillée.

### Indications :

Dynamogénique puissant. Active la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et la neurasthénie.

### Formes :

1<sup>o</sup> En ampoules, boîte de 12 ampoules : 16 francs.

2<sup>o</sup> En gouttes, prix du flacon : 14 francs.

**Laboratoires FRAISSE**

8. rue Jasmin, 8 — PARIS.

## SÉRUM VÉGÉTAL

à base d'essences d'ail indolores, du docteur CUGUILLÈRE.

**Composition.** — Les extraits d'ail même les mieux préparés, provoquant en injections des abcès de fixation et par absorption des troubles gastro-intestinaux graves, cette méthode de thérapeutique a été abandonnée à maintes reprises, malgré les résultats absolument merveilleux qu'elle amenait lorsque les sujets pouvaient la supporter.

Ce qui fait la « personnalité » du *Sérum Cuguillère*, c'est qu'il est composé par des essences d'ail très finement distillées et qui de ce fait peuvent être tolérées sans aucun inconvénient.

**Références scientifiques.** — Le sérum a été étudié dès 1903 au Château de Savignac, à Saint-Denis de Piles (Gironde), sur des bovidés appartenant à M. le Marquis de Castellane qui a donné son très puissant appui aux travaux du Docteur Cuguillère.

Les guérisons cliniques des bovidés traités furent constatées par l'Éminent vétérinaire, le regretté M. Faure et c'est à l'hôpital Bichat à Paris que le célèbre anatomo-pathologiste, le Docteur H. Martin-Roux, a reconnu les guérisons sur les pièces qu'on avait adressées à son Laboratoire.

L'Académie de Médecine recevait en séance de 1908 le compte rendu complet des travaux effectués sur le sérum jusqu'à ce jour. Depuis, le sérum employé avec le plus grand succès dans le monde entier, recueille chaque jour un nombre d'adeptes de plus en plus considérable.

Un ouvrage en vente à la Librairie Norbert Maloine, 27, rue de l'École-de-Médecine à Paris : « *Guérison de la tuberculose par l'ail* », renferme les renseignements de tous les travaux consacrés depuis plus de 30 années au sérum.

**Indications.** — Le sérum végétal du Docteur Cuguillère est le traitement de choix et quasi-spécifique des *tuberculoses osseuses et ganglionnaires*. — Il guérit en quelques injections des coxalgies, des maux de Pott, remontant à plusieurs années et compliqués de mauvais état général et de fistulisations. — Il donne également des résultats intéressants dans les cas de tuberculose pulmonaire et dans les autres formes de tuberculose.

### Posologie :

a) *Tuberculose osseuse.* Pendant le premier mois, une injection à 5 cc. par semaine, puis le mois suivant 2 injections à 5 cc. par semaine et de plus une injection locale à 2 cc. 1/2 en tissu sain au-dessus du foyer pathologique.

b) *Tuberculose pulmonaire :*

1° *Formes non hémoptoïques.* Une injection à 5 cc. par semaine pendant 3 mois. — 2° *Formes congestives.* Commencer par de toutes petites doses depuis 2 cc. 1/2 tous les 10 jours pour arriver jusqu'à 2 injections à 5 cc. par semaine.

**Forme pharmaceutique.** — Le sérum Cuguillère existe :

1° En boîtes de 6 ampoules à 5 cc.. — 2° en boîtes de 3 ampoules à 5 cc. — 3° en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. 1/2 pour enfants, et pour débiter ou pour terminer une cure.

4° Le sérum est également en vente pour le corps médical en vrac à des prix tout à fait spéciaux (se renseigner directement au Laboratoire).

5° Le sérum existe également sous forme de sirop où il est associé à de l'arrhénal et du sirop iodotannique et où il donne des résultats absolument satisfaisants dans le traitement des anémies et pour être associé tout particulièrement dans les traitements des tuberculoses pulmonaires.

6° Il est présenté : 1° en flacons de 250 cc. et en ampoules buvables (présentation toute nouvelle demandée par le corps médical).

**Renseignements.** — Le docteur Cuguillère se tient à la disposition de tous ses confrères qui désireraient des renseignements particuliers pour l'emploi du sérum, il les leur indiquera par retour du courrier.

Il fera également parvenir le tirage de luxe de la collection des chefs-d'œuvre littéraires et philosophiques qu'il fait paraître régulièrement, à ceux de ses confrères qui lui feront l'honneur de lui en exprimer le désir.

**Laboratoires CUGUILLÈRE**  
19, rue des Chalets — TOULOUSE.

## SETIRTEM COMPRIMÉS

### Traitement des Métrites.

**Forme.** — Comprimés effervescents, solubles instantanément dans l'eau.

**Formule.** — Sulfate de cuivre, sulfate de zinc, alun de potasse pur, camphre, acide picrique, naphtolate de soude, trioxy-méthylène, excipient effervescent. Q. S. pour un comprimé.

**Indications.** — Pertes blanches, Vaginites, Métrites, Salpingites, Soins d'hygiène.

**Posologie.** — 2 comprimés pour une injection de 2 litres à 40°.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments sous le n° 655-8.

### Laboratoire BOUTROY

8, rue de Passy — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## SFÉOL

### (Huile grise argentique Sféat)

*Tolérance, activité, dosage rigoureux.*

**Généralités.** — L'association de l'argent et du mercure additionne leurs activités respectives et fait du Sféol, dans les syphilis viscérales et nerveuses, un agent curatif incomparablement supérieur à l'huile grise.

**Dosage.** — Le *Sféol* est dosé à 40 % d'Hg, et à 20 % d'Ag. Une division de la seringue à huile grise correspond à 0,01 d'Hg. (pour l'emploi des seringues ordinaires prescrire « *Sféol* à 16 % »).

**Posologie.** — Celle de l'huile grise, c'est-à-dire en moyenne 8 à 10 piqûres hebdomadaires de 0,08 à 0,10 de Hg.

Prix :

*Sféol* à 40 %, le flacon 5 cc. : 20 fr.

Le double flacon : 32 fr.

*Sféol* à 16 %, le flacon 10 cc. : 20 fr.

Echantillons et littérature :

### Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).



## SILGUINE

**Composition.** — Chaque comprimé contient :

0,05 Extrait sec stabilisé de gui de pommier.

0,01 Extrait sec d'aubépine.

0,10 Poudre de prêle.

0,03 Extrait de glandes endocrines mâles.

**Action.** — La « SILGUINE », à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artériosclérose.

**Indications.** — Tous les symptômes de l'« Automnosc », hypertension artérielle artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

**Laboratoires G. REAUBOURG**

2, rue Boucicaut — PARIS (XV<sup>e</sup>)

Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## SILIOYL

**Médication de base et de régime des carences siliceuses et des états artérioscléreux**, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la *lésion initiale* et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

**Principe.** — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, P.M. 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffler et Pélissier, *Acad. Sciences*, Août 1920.)

**Composition.** — Silicates de formule  $\text{Si}^2 \text{O}^{12} \text{Na}^3$  et  $\text{K}^3$  stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

**Emploi et doses.** — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

**GOUTTES :** Seule préparation titrée à 25 p. 100 de  $\text{SiO}^2$ . X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

**COMPRIMÉS :** Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse : 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

**AMPOULES :** Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscléreux, angor.).

**Résultats.** — Abaissement de la tension Mm et Ma. Viscosité ramenée à la normale. Elimination chlorurée. Diurèse. Action anti-athéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

**Indications.** — 1° Action minéralo-tissulaire : Bacilliose, Consolidation accélérée des fractures. Surdit   (Ionisation). Etats   lastopatiques.

2° Art  rioscl  rose, Hypertension, Aortite, Ath  rome aortique, Scl  rose r  nale, Angine de poitrine, Endart  rite obl  t  rante progressive. Prophylaxie de l'ath  rome et de l'h  morrhagie c  r  brale. Troubles c  r  braux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scl  reuse, Scl  rose auriculaire, Troubles oculaires, Presbytie, Fatigue et Scl  rose cardiaque, An  mie siliceuse.

Gouttes : 20 fr. — Ampoules : 16 fr. — Comprim  s : 18 fr.

Echantillons — Litt  rature :

D  p  t, Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**  
61, Bd Malesherbes. — PARIS.

**Laboratoire CAMUSET**  
18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

## SILISODE

**Forme.** — Granulé.

**Composition.** — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40

Benzoate de lithine : 0 gr. 10

**Dose.** — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

**Action.** — Hypotensive, antiscléreuse.

**Indications.** — Hypertension sous toutes ses formes. Artério-Sclérose. Aortites. Angine de poitrine.

**Laboratoires MICHELS**

9, rue Castex — PARIS. Tél. : Archives 45-12.

---

## SINAHIN

Antidiabétique.

**Forme.** — Pilules de Semen-contrà total.

**Propriétés :**

Traitement sans restrictions trop sévères dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avicenne (Communication Académie de Médecine, décembre 1913.)

**Posologie :**

Trois à quinze pilules par jour.

Prix de vente au public. La boîte, 12 francs.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

## LE SINAPLASME

**Cataplasme sinapisé instantané  
du docteur Jean Faure.**

Le premier en date. Le plus régulier.  
Le moins cher. Le meilleur de tous.

**Mode d'action.** — Agit comme un cataplasme de farine de lin sinapisé et non comme un sinapisme.

Prix de la boîte de 3 sinaplasmes doubles :  
5 francs.

**Docteurs FAURE et DUSSUEL**

**Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe**

**AIX-LES-BAINS**

## SINAQUA NUTRICIA

**Lait desséché vitaminé 100 % soluble.**

Préparé avec le meilleur lait frais, desséché à basse température par un procédé spécial qui permet de maintenir intactes les vitamines du lait tout en faisant subir aux éléments solides de ce dernier une modification physiologique qui lui donne une digestibilité plus grande. De plus, l'ajouté d'une quantité exactement dosée de *vitamines D* confère au Sinaqua des propriétés hautement antirachitiques.

**Analyse :**

Graisse.....	24,5	p. 100.
Lactose.....	38,7	—
Mat. azotées.....	25,8	—
Sels .....	8,5	—
Eau .....	2,5	—

**Indications.** — Le Sinaqua additionné d'eau constitue pour les nourrissons un aliment idéal très digestible et d'une assimilation parfaite. Il supprime les vomissements.

**Doses.** — Une cuiller à soupe de poudre de lait et 9 cuillers à soupe d'eau préalablement bouillie et refroidie (dilution normale). A modifier selon les prescriptions médicales.

**Nota.** — A consommer sans cuisson.

**« LA NUTRICIA »**

142, rue Fransman — BRUXELLES (II<sup>e</sup>).

## SINUSYL

**Indications.** — Sinusites, Coryza, Rhinites, Laryngites, Ozène.

**Composition.** — Résorcine, camphre, Myrtol, huile d'amandes douces. — Essence de violettes.

**Forme et Mode d'emploi.** — Se vend en *huile* pour instillations nasales.

En *pommade* dans un tube spécial.

En *rhino-capsules* pour auto installation.

**Laboratoires Pierre CHATEAU**

137, avenue Parmentier — PARIS (Xe).

Échantillons gratuits.

## SIROP ANTIPHLOGISTIQUE DE BRIANT

Sans alcaloïde ni produit chimique.

Doit son action uniquement aux principes extractifs de plantes adoucissantes et calmantes. Ne contient aucun élément nuisible ni dangereux. Convient donc particulièrement à la médecine infantile.

Calme la toux, provoque la transpiration et donne un sommeil paisible.

**Doses et mode d'emploi :**

*Enfants* : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

*Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

De préférence à jeun. Il peut se prendre pur ou bien dilué dans de l'eau ou de la tisane émolliente (mauve, violettes, etc.).

**Indications.** — Inflammations et irritations de l'appareil respiratoire, Enrouements, Rhumes, Bronchites, Gripes, Catarrhes.

Prix du flacon : 10 francs.

Demi-flacon : 5 francs.

**BERTAUT BLANCARD frères**

64, rue de La Rochefoucauld — PARIS (IX<sup>e</sup>)

## SIROP BRAHMA

**Composition.** — Thiocolum, benzoate de soude, codéine, dionine, aconit, belladone, grindélia.

**Action.** — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

**Mode d'emploi.** — 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, 1 heure avant ou 2 heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane.

Prix : 11 francs.

**Laboratoires G. COULLOUX**

116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).

## SIROP CASTANOL

Sédatif spécifique de la Coqueluche et des toux quinteuses rebelles.

**Composition.** — Extrait de châtaignier du Limousin, de Drosera, d'Anémone.

**Posologie :**

**Enfants :** au-dessous d'un an : quatre 1/2 cuillerées à café par jour.

—	de 1 à 2 ans :	3 cuillerées à café par jour.
—	de 2 à 4 ans :	4 — à café —
—	de 4 à 8 ans :	4 — à dessert —
—	de 8 à 12 ans :	3 — à soupe —

**Adultes :** 4 cuillerées à soupe, pris entre les repas, pur ou dans un liquide quelconque.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires du CASTANOL**

**Pierre LAOHAISE, Docteur en Pharmacie**  
9, place Municipale — TULLE (Corrèze).

## SIROP DE CRÉOSOTE VACHERON

**Composition.** — 0 gr. 15 de créosote par cuillerée à soupe.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antibacillaire et antiseptique puissant des bronches et du poumon.

**Avantages.** — De saveur agréable, nullement caustique, très bien toléré par l'estomac. Excellent sirop pectoral.

**Indications.** — Rhumes de toutes natures, bronchites aiguës et chroniques, toux rebelles, catarrhes, laryngites, grippe, influenza, etc...

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures, à prendre dans l'intervalle des repas.

Prix : 14 francs.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**  
14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SIROP DE GAÏARSOL

**Composition.** — Méthylarsinate de Gaïacol dont la supériorité sur les cacodylates est double : tolérance absolue et assimilation parfaite.

**Action thérapeutique.** — 1° Calme immédiatement la toux, désinfecte les voies respiratoires, aseptise les lésions pulmonaires ou bronchiques par le GAÏACOL.

2° Stimule la résistance organique, relève l'état général, lutte contre la cachexie par l'ARSENIC ORGANIQUE.

**Indications.** — Contre la toux en général : rhumes négligés, bronchites (chroniques ou non), catarrhe, état pré tuberculeux, etc..

Préventif des complications pulmonaires de grippe, rougeole, scarlatine, coqueluche, etc...

**Posologie.**

*Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants*, de 8 ans et plus : 2 à 3 cuillères à dessert par jour.

Moins de 8 ans : selon l'âge, par cuillère ou fraction de cuillère à café.

**Autres formes du Gaïarsol.** — Ce produit est également préparé en : Dragées, Gouttes et Ampoules avec les mêmes indications.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

## SIROP DE GLYCÉROPHOSPHATES VACHERON

**Au Gaïacol de synthèse cristallisé  
et aux glycérophosphates de chaux, de soude et de  
potasse.**

**Composition.** — Cette préparation contient par cuillerée à soupe :

0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé.

0 gr. 30 de glycérophosphates.

**Avantages et Propriétés thérapeutiques.** — Ce sirop possède le même pouvoir antibacillaire que le sirop Vacheron au Gaïacol (*voir plus loin*), et en plus l'action reconstituante des phosphates organiques.

**Indications.** — Affection des voies respiratoires, chez les anémiques, les lymphatiques, les rachitiques et contre la tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi :**

*Adultes :* 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants :* 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**

14, rue Victor-Hugo — LYON

## SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr.; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

**Dose et mode d'emploi.** — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

**Indications.** — Constipation, Embarras gastrique, Pas de contre-indications.

Prix : le flacon, 10 fr.

Dépôt : **Laboratoires H. NOGUÈS**  
7, rue Galvani — PARIS.



## SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges.....	0 gr. 02
Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia .....	0 gr. 20
Phosphate monocalcique cristallisé.....	0 gr. 25

### Posologie :

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

*Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.

Préparation très recommandée aux enfants.

Prix : 12 francs.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SIROP DU D<sup>r</sup> GELINEAU

### Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

### Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie.

### Posologie :

*Par cuillerée à soupe :*

Kbr.....	1 gr. 50
Chloral cristallisé .....	1 gramme.
Arsenic.....	1 milligr.

Une à deux cuillerées à bouche le soir au coucher.

Doses supplémentaires en cas de besoin.

*Littérature et échantillons sur demande :*

**Laboratoires J. MOUSNIER-DELERME**  
9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).

## SIROP DU DOCTEUR REINVILLIER

au Phosphate de chaux gélatineux.

Reminéralisateur entièrement assimilable grâce à son état maintenu gélatineux. A administrer spécialement aux enfants par suite de sa facilité à être attaqué par les acides de l'estomac. Chimiquement neutre. Agréable à prendre.

Contient 3 grammes de phosphate de chaux gélatineux par cuillerée à soupe.

### Doses et mode d'emploi.

*Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour au commencement ou à la fin des repas.

**Indications.** — Tuberculose, Anémie, Rachitisme, Maladies osseuses, Affections nerveuses, Grossesse, Médecine infantile.

Prix : 12 francs.

**BERTAUT BLANCARD frères**

64, rue de La Rochefoucauld — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## SIROP FAMEL

**Antiseptique.** — Lactocréosote soluble. — Cicatrisant, non caustique bien toléré.

**Calmant.** — Codéine, Aconit.

**Recalcificateur.** — Lactophosphate de chaux.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : Une cuill. à soupe le matin, avant déjeuner, et une le soir, au coucher ; délayer dans infusion chaude non sucrée. En cas de besoin, 3<sup>e</sup> cuill. à midi.

*Enfants* : de 8 à 14 ans, par cuill. à dessert ; de moins de 8 ans, par cuill. ou demi-cuill. à café, ou moins, selon l'âge, toujours dans infusion non sucrée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poulmon.

**Indications thérapeutiques.** — Affections des bronches et du poulmon : bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés, toux. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

Prix : 10 francs.

16 à 22, rue des Orteaux — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## SIROP GIRARD

Iodo-tannique.

Iode, Tannin, Lactophosphate de chaux.

**Mode d'emploi :**

*Adolescents* : 1 cuillerée à soupe avant chaque repas.

*Enfants* : 1 cuillerée à dessert avant chaque repas

**Propriétés thérapeutiques :**

Tonique, reconstituant, réminéralisateur, dépuratif  
Goût agréable. Assimilation parfaite. Le meilleur succédané de l'huile de Foie de Morue.

**Indications :**

Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Hypertrophies amygdaliennes, Végétations adénoïdes, Débilité, Rachitisme, Troubles de croissance et de formation, Toutes convalescences.

**Laboratoire A. GIRARD**

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire National n° 405-3.

## SIROP GRIBELL

**Composition.** — Baume du Canada, « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

**Indications.** — Toutes les affections des voies respiratoires.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 9 francs.

**PATE GRIBELL**

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 4 francs.

## SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

**Mode d'emploi.** — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 7 francs.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## SIROP IODOTANNIQUE GUILLIERMOND

Médicamentation iodée pratique par la facilité avec laquelle l'iode est supporté sans donner lieu aux phénomènes d'iodisme.

Saveur agréable appréciée des enfants. Conservation parfaite. Renferme l'iode et le tanin dans des proportions toujours identiques et rigoureusement contrôlées.

### Doses et mode d'emploi :

*Enfants* : jusqu'à 8 ans : 2 cuillerées à café matin et soir, à jeun.

Au-dessus de 8 ans : 2 cuillerées à soupe matin et soir à jeun.

*Adultes* : On peut donner jusqu'à 4 cuillerées à soupe par jour.

**Indications.** — Lymphatisme, Scrofule, Adénites, Tuberculose, Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Arthritisme, Rhumatisme, Médecine infantile.

Prix : 12 francs.

**BERTAUT BLANCARD frères**

64, rue de La Rochefoucauld — PARIS (IX°).

## SIROP LECŒUR

Rhus aromatica, Noix vomique, Belladone, Quinquina, Acide phosphorique ; Glycérophosphates calciques, magnésiques, potassiques et sodiques. Contre l'incontinence d'urine.

Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau, avant les repas ou le coucher.

*De 2 à 5 ans* : 1 cuillerée à café le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> soir, 2 cuillerées à café les soirs suivants.

*De 5 à 10 ans* : 1 cuillerée à dessert les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à dessert les soirs suivants.

*Plus de 10 ans* : 1 cuillerée à soupe les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à soupe les soirs suivants.

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe matin et soir pendant 2 jours, 2 cuillerées à soupe matin et soir les jours suivants.

**Laboratoires GAVIN**

VIMOUTIERS (Orne).

## **SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER**

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.  
Approbation scientifique de l'Académie de Médecine  
de Paris.

### **Indications thérapeutiques :**

Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections  
subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryn-  
gites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bis-  
muthisme.

### **Posologie :**

*Adultes* : une cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par  
jour, une heure avant ou deux heures après les repas.  
*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans ; 2 à  
3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

### **— GRANULES MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER. —**

**Composition et indications thérapeutiques :**  
Celles du sirop.

### **Posologie :**

2 granules — 1 cuillerée à soupe de sirop.

**Laboratoires CROSNIER**

**44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.**

---

## SIROP MIREILLE

Le plus *agréable* au goût, le plus *actif*, pour le **traitement polyvalent des affections de l'appareil respiratoire.**

**Calmant, sédatif, hypnotique**, par : le bromhydrate de codéine, l'eau de laurier-cerise, l'aconit et la belladone.

**Balsamique, antiseptique, diurétique**, par : la terpène et le benzoate de soude du benjoin.

**Expectorant, émollient, sudorifique**, par : des extraits de plantes pectorales.

**Doses par 24 heures et mode d'emploi :**

*Adultes* : 4 à 6 cuillerées à soupe.

De 10 à 16 ans : 3 à 6 cuill. à dessert.

De 2 à 10 ans : 2 à 6 cuill. à café.

*Se prend à toute heure ; aucune contre-indication ; pas de toxicité ; pas d'intolérance ; pas d'accoutumance.* Une cuiller à soupe prise le soir au coucher dans une infusion chaude assure un sommeil paisible.

Prix au public : 10 fr. 50 (exempt d'impôt).

---

LABORATOIRES LEGENDRE et Cie.

Section D. S. — HOUILLES (S.-et-O.).

DÉPOT GÉNÉRAL

*France, Colonies et Protectorats :*

O. C. P. 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

*Belgique* : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut à Bruxelles-Maritime.

## SIROP MORLAS

**Hérédo-syphilis des nouveau-nés et des enfants.**

Tonique et spécifique discret pour les petits malades à hérédité douteuse (végétations, glandes, eczéma, convulsions, etc...).

### Dose :

Jusqu'à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café, etc...

Echantillons sur demande.

### Pharmacie MOURE

18, rue Favart — PARIS (II<sup>e</sup>).

Dépôt général :

O. C. P., Paris et ses succursales.

## SIROP NOGUÈS

### Composition :

Alcoolature d'aconit	} $\overline{aa}$ .....	0,030
Teinture de belladone		
Teinture de grindelia .....		0,075
Bromoforme .....		0,016
Codéine .....		0,009
Benzoate de soude .....		0,079
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise .....		Q. S.
pour une cuillerée à bouche.		

**Dose et mode d'emplol.** — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

**Indications.** — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Prix : 12 francs.

### Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

## **SIROP « ROCHE » AU THIOCOL**

1 cuill. à soupe de Sirop « Roche » = 1 gr. de Thiocol « Roche ».

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. de gaiacol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour. *Enfants* : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

**Prop. théér.** — Antiseptique pulmonaire. Phagocytogène. Eupeptique. Orexique.

**Indic. théér.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques. Grippe. Pneumonie. Coqueluche. Scrofule. Anémie. Rachitisme. Dyspepsies. Entérites. Diarrhées, etc.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE** et <sup>C<sup>ie</sup></sup>  
10. rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## **SIROP SENTINI**

**Aux Prunes d'Ente d'Agen.**

### **Principes actifs :**

Pruneaux d'Agen. Cassia Lenitiva. Cephaelis Ipécacuanha.

### **Propriétés :**

Laxatif et Purgatif doux. Pas d'accoutumance. Efficacité parfaite.

### **Dose laxative :**

*Bébés* : Une demi à une cuillerée à café.

*Enfants* : Une à deux cuillerées à café.

*Adultes* : Une cuillerée à soupe le soir.

### **Dose purgative :**

Le double des doses laxatives.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoires DOMERGUE**

AGEN (Lot-et-Garonne).



## SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur  
Médecine du nourrisson.

**Indications thérapeutiques.** — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

**Doses.** — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 5 fr. 50 le flacon.

**Laboratoire TEYSSÈDRE**

34, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.

## SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté

Contenant pour 100 cc. :

Iode bi-sublimé .....	0 gr. 15
Extrait sec de ratanhia.....	1 gr. 10
Lactophosphate de chaux....	2 gr. 25
Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc.	

**Posologie.** — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

**Indications.** — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

Prix : 12 fr. 50.

**LABORATOIRE OBERLIN**

**J. TINARDON**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17. rue Cadet — PARIS.

## SIROP VACHERON

au Gaïacol de Synthèse.

**Composition.** — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de gaïacol absolu.

**Avantages.** — Le gaïacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

**Indications.** — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau à prendre dans l'intervalle des repas.

*Enfants* : De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens  
14, rue Victor-Hugo — LYON.

---

## SIROP VIANO

**Composition et propriétés.** — Le SIROP VIANO, béchique remarquable et antiseptique précieux, est composé de produits *nouveaux* :

<b>Phénylglycolate de l'éther phénylglycolique de la codéine.....</b>	<b>0 gr. 135</b>
<b>Phénylglycolate d'aminophényl diméthyl pyrazolone.....</b>	<b>0 gr. 80</b>
<b>Hélénine.....</b>	<b>0 gr. 09</b>
dont l'action est complétée par :	
Sulfogaiacolate de potassium (thiocol)....	2 gr.
Bromoforme .....	0 gr. 58
Teinture de belladone.....	1 gr. 20
Teinture de droséra .....	3 gr. 20
Eau de laurier-cerise.....	2 gr.
Sirop aromatique.....	Q. S. p. 100 gr.

Le SIROP VIANO est d'une efficacité incontestée dans le traitement de la toux, mais son emploi se justifie encore davantage par les deux qualités suivantes :

*Action réelle sur la cause de la toux* grâce à son pouvoir antiseptique, anticongestif et expectorant.

*Absence d'action secondaire* sur le système nerveux, le cœur ou l'appareil digestif.

Le SIROP VIANO n'endort pas, ne constipe pas, ne produit pas d'intolérance.

Le SIROP VIANO stimule l'appétit et remonte l'état général du malade.

**Indications.** — Toux spasmodique, Toux avec danger d'infection, Toux avec congestion et encombrement bronchique.

Le SIROP VIANO est particulièrement précieux dans le traitement de la tuberculose pulmonaire ; il peut être prescrit aux enfants et aux personnes âgées.

**Posologie.** — 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

*Pour les enfants* : de 10 à 15 ans, 3 à 5 cuillerées à dessert ; de 5 à 10 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour.

**Prix** : Le flacon de 210 cc. : 14 francs.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## SISTEX

**Médication opothérapique frénatrice  
de l'hyperactivité ovarienne.**

**Composition.** — Solution alcoolique d'extrait ovarien frénateur et d'extrait mammaire, 1 cc. (XXXV gouttes) correspond à 0,17 gr. de corps jaune et 0,5 gr. de glande mammaire fraîche.

**Mode d'action.** — Freine rapidement et régularise l'hyperactivité ovarienne.

**Indications.** — Ménorragies de la puberté, Règles trop abondantes, trop fréquentes ou prolongées, Ménopauses de la ménopause.

**Posologie.** — Prescrire X à XXX gouttes par jour à prendre en 2 ou 3 fois, *loin des repas*, pendant 10 ou 20 jours par mois, suivant les cas.

**Prix:** le flacon (600 gouttes environ) 16 francs.

**Laboratoires UVÉ-CRINEX**

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV°).

## SISTOMENSINE CIBA

**Hormones ovariennes liposolubles  
physiologiquement contrôlées.**

**Action physiologique.** — Equilibre la fonction menstruelle, limite et régularise le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

**Indications.**

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

*Comprimés, Ampoules.*

**Doses.** — 3 à 6 comprimés par 24 heures, — 1 ou 2 ampoules.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

Le — de 100 — : 30 —

La boîte de 4 ampoules : 20 —

(Voir Agomensine.)

**Laboratoire CIBA — O. ROLLAND**

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON

## SODERSEÏNE

**Indication.** — Coqueluche.

**Composition.** — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

**Forme.** — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

**Doses journalières :**

<i>Enfants</i> jusqu'à 6 mois .....	100 gr.
— de 6 mois à 2 ans .....	150 gr.
— de 2 ans et au-dessus .	200 gr.

(Echelle de doses sur le flacon).

Prix du flacon de 500 gr. : 10 francs.

**J. DEPRUNEAUX**, Pharm. de 1<sup>re</sup> classe  
18, rue de Beaune et 31, rue de Verneuil  
PARIS (VII<sup>e</sup>).

## SODOGASTROL LAGOUTTE

**Composition et formes.** — Cachets et granulé, contenant par cachet ou par cuillerée à café :

Sulfate de soude.....	1 gr.
Phosphate de soude.....	0 gr. 50
Bic. de soude.....	0 gr. 25

**Actions thérapeutiques.** — Régularise les fonctions stomacales et intestinales, Supprime les fermentations toxiques. Décongestionne la muqueuse gastro-intestinale.

**Indications.** — Gastrites, Dyspepsies nerveuses, Digestions lentes, Douleurs épigastriques, Hyperchlorhydrie, Infections gastro-intestinales, Entérite muco-membraneuse, Hépatite, Obésité, Goutte, Hypertension.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cachets ou 1 à 3 cuillerées à café de granulés, le matin à jeun à l'aide d'une infusion chaude de camomille. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient.

Prix :

<i>Cachets</i> : La boîte de 30 cachets....	10 fr. 50
— : La double boîte.....	20 fr. »
<i>Granulés</i> : La boîte de 100 grammes	9 fr. 50
— : La double boîte .....	18 fr. »

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>) (Rhône).

## SODOLACTINE

(Estomac.)

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle *facilite physiquement l'évacuation de l'estomac*.

(Thérapeutique clinique de Martinet, p. 1125.)

### Posologie :

Une mesure dans une tasse à thé d'infusion ou d'eau tiède.

*Après les repas* : Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons : (1 cuillerée à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

*Avant les repas* (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

*Remarque importante.* — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide*. (A titre indicatif : une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

Prix : 12 francs.

**Laboratoires GERDA**

163, boulevard Croix-Rousse — LYON.

# SODOTHIOL

## Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable de thiosulfates alcalins.

## Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

## Indications thérapeutiques majeures :

*Affections hépatiques.* — Coliques hépatiques, Lithias biliaire, Angiocholite lithiasique, Cholécystite calculieuse, Cholémie simple, Ictère catarrhal ou émotif, Hépatisme de Roger Glénard.

*Manifestations arthritiques.* — Lithias rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculieuse, Calculs vésicaux, Rhumatisme noueux déformant, chronique, Ankyloses fibreuses articulaires, Otosclérose, Otospongiose.

## Indications thérapeutiques secondaires :

*Dermatologie.* — Eczémas, Acnés, Accidents cutanés récidivants ou prurigineux.

*Ets congestifs chroniques* des muqueuses respiratoires.

## Mode d'emploi :

A. *Cure d'assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'entretien.* — 10 injections 6 mois, puis un an après la première série.

Dans le cas de Rhumatismes chroniques noueux ou déformants et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de complément A* bis après 15 jours de repos.

Le Sodothiol étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé tout le temps jugé nécessaire.

## Incompatibilités,

Acides, Sels acides, Iodures.

## Prescrire :

Sodothiol : 1 boîte d'ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Laboratoire de MÉDECINE  
EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe. — BEAUVAIS (Oise). Tel. : 4-84

Echantillons et littérature médicale sur demande.

## **SOL-BI FRAISSE**

Bismuth lipo-soluble.

**Composition.** — Solution de Campho-Carbonate de Bismuth.

Chaque ampoule de 2 centimètres cubes contient 0,08 de Bismuth métal.

**Indications.** — Traitement d'attaque, aussi actif que l'Arsénobenzol.

2 ampoules par semaine.

## **Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## **SOLMUTH**

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuthyle.

### **Indications :**

Le Solmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

### **Mode d'emploi :**

2 injections intramusculaires de une ampoule de 1 cc. par semaine.

### **Présentation :**

En boîte de 12 ampoules de 1 cc. (une ampoule contient 4 centigr. Bi-métal par cc.).

### **Prix de vente au public :**

25 francs la boîte de 12 ampoules.

**Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND**

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

### **Dépôt :**

**Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND**  
54, Chaussée-d'Antin — PARIS.



## SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

**Avantages.** — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle.

**Action physiologique.** — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

### Mode d'emploi :

**Ampoules :** 2 à 8 cc. par jour en médecine. 2 cc. en intraveineuse. 10 à 15 cc. par jour en chirurgie.

**Gouttes :** 25 à 100 gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée.

**Présentation.** — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc., 5 cc. et 3 amp. de 10 cc. et gouttes.

Le Solucamphre en solution et en comprimés à prendre « per os ».

**Prix :** 6 ampoules de 1 cc., 10 fr. ; 6 ampoules de 2 cc., 12 fr. 75 ; 6 ampoules de 3 cc., 14 fr. 50 ; 6 ampoules de 5 cc., 17 fr. ; 3 ampoules de 10 cc. 17 fr. ; Gouttes, 14 fr.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

## SOLUCAMPHRE SPARTÉINÉ

### Delalande.

Sel de Spartéine du Solucamphre en dissolution dans le Solucamphre lui-même.

Correspondant à Spartéine base : 0,035 par ampoule de 2 cc. et de 5 cc.

**Avantages.** — Tous les avantages du Solucamphre et de la Spartéine réunis.

Injections *indolores*.

**Indications.** — Toutes les indications de la Spartéine et du camphre.

### Présentation :

**Ampoules :** Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. .... 12 75

— — 6 ampoules de 5 cc. .... 20 ,

**Comprimés :** Tubes de 20 comprimés ..... 12 ,

### Mode d'emploi.

**Ampoules :** 2 à 4 cc. en injection intramuscul.

**Comprimés :** Adultes : 2 à 6 par jour ; Enfants : 1 à 2 par jour.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

## SOLUCAMPHRE

### Associations diverses.

**Solucamphre adrénaliné.** — Contenant 0,001 d'adrénaline naturelle dissoute dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2cc : 16 francs.

**Solucamphre caféiné.** — Camphosulfonate de caféine, 0,30 correspondant à 0,189 de caféine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2cc. : 16 francs.

**Solucamphre éphédriné.** — Camphosulfonate d'éphédrine, 0,07 correspondant à 0,032 d'éphédrine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

**Solucamphre strychniné.** — Camphosulfonate de strychnine, 0,0015 correspondant à 0,00093 de strychnine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

**Solucamphre gaïacolé.** — Camphosulfonate de gaïacol, 0,05 et camphosulfonate de strychnine, 0,00075 correspondant à 0,024 de gaïacol pur et à 0,0005 de strychnine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

**Solucamphre quininé.** — Camphosulfonate de quinine, 0,60 correspondant à 0,418 de quinine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc.

Camphosulfonate de quinine, 0,20 correspondant à 0,14 de quinine base.

Tube de 20 comprimés.

**Solucamphre cholestériné.** — Cholestérine et Lécithine, 2,50 p. 100 en suspension colloïdale dans le Solucamphre.

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. : 25 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 5 cc. : 40 francs.

**Laboratoire Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE  
(Seine).

## **SOLUTION BARDET**

**à l'Extrait sec de Quinquina.**

Adoptée par le Ministère des Colonies.  
Médaille d'Or, Strasbourg 1924. Diplôme  
d'Honneur, Exposition Coloniale Inter-  
nationale, Paris 1931.

### **Composition :**

Solution sans sucre, sans alcool, contenant  
0 gr. 50 de principes actifs par cuillerée  
à soupe et titrant au minimum 10 p. 100  
d'alcaloïdes totaux.

### **Propriétés thérapeutiques :**

Tonique de premier ordre. Fébrifuge à forte  
dose. Action rapide et fidèle.

### **Indications :**

Asthénie, Anorexie, Anémie, Conva-  
lescences, Lymphatisme, Pyrexies diverses,  
Paludisme en particulier.

### **Mode d'emploi :**

#### **Tonique :**

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe. *Enfants* :  
1 à 2 cuillerées à café au début des deux  
principaux repas.

#### **Fébrifuge :**

*Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe. *Enfants* :  
4 à 8 cuillerées à café par 24 heures.  
Se méfier des nombreuses contrefaçons et  
imitations.

Formuler : « **Solution Bardet** ».

Échantillons et littérature :

**Laboratoires BARDET**

fondés en 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

### Anesthésie de surface par contact

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique Nestosyl.

**Indications.** — 1) Anesthésie des muqueuses ou des plaies : cathéters et bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cautérisations, blennorrhagie, rectoscopie, changement de pansements, etc., et, d'une façon générale, tous examens et interventions superficielles d'urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, stomatologie et soins cliniques ; 2) Analgésie des Plaies, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions et excoriations, soit comme médication d'urgence avant l'emploi continu de la pommade, soit comme médication à suivre, dans les cas où l'excipient huileux est plus particulièrement indiqué (certains eczémas rebelles aux pommades, douleurs de la dentition chez les enfants, dents cariées, otites, etc...).

**Posologie.** — Anesthésie des canaux : instiller quelques cmc. dans le canal quelques minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution. Anesthésie de la vessie : instiller quelques cmc. (dose généralement suffisante : 15 à 20 cmc.). Anesthésie des plaies et muqueuses : déterger et sécher la région à insensibiliser et la recouvrir de solution par badigeonnage, pulvérisation, aspersion, instillation, mèche ou compresse ; pour obtenir un effet prolongé, maintenir en contact par un pansement. Anesthésie rectale : une cuillerée à entremets introduite avec une poire suivant les besoins. Anesthésie vaginale : tampon vaginal imbibé de solution.

### Laboratoires du NESTOSYL.

**P. BAUDE, pharmacien**

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VIIe)

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl, 27, Paris.

---

## SOLUTION NORMET

### Chirurgicale.

**Composition.** — Préparation à base de citrates métalliques (calcium, sodium, magnésium, fer et manganèse).

**Présentations.** — Ampoules de 20 cc. (boîte de 2).  
Ampoules de 10 cc. (boîte de 4).

**Indications.** — Grandes hémorragies, métrorragies

**Mode d'emploi.** — Par injections intraveineuses en solution à raison de 20 cc. de Sérum Normet dilué dans 1 litre de sérum physiologique (chlorure de sodium à 7 p. 1 000).

Prix : 20 francs la boîte.

---

## SOLUTION NORMET

### Médicale.

**Composition.** — Préparation à base de citrates métalliques (les mêmes que ci-dessus, mais avec une très faible proportion de manganèse).

**Présentations.** — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).  
Ampoules de 5 cc. (boîte de 12).

**Indications.** — Anémies graves, hypotension, myocardites, hémophilie, états infectieux.

**Mode d'emploi.** — En injections hypodermiques, 1 à 15 cc. En goutte à goutte rectal après dilution dans du Sérum physiologique, à raison de 20 cc. par litre de sérum. En injections intraveineuses (non dilué) à raison de 1/2 à 5 cc. et plus, en surveillant la réaction du sujet.

Prix : 25 francs la boîte.

Établissements T. LECLERC

D<sup>r</sup> P. LEMELAND, pharmacien,  
10, rue Vignon — PARIS.

## SOLUTION NORMET SCLÉROLYTIQUE

**Composition.** — Solution polycitrâtée de composition analogue à la solution Normet médicale, mais sans calcium et un peu plus riche en magnésium.

**Propriétés.** — La solution attaque par double décomposition les sels de chaux insolubles qui s'accumulent dans l'organisme.

**Présentation.** — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).

**Indications.** — La solution Normet Sclérolitique constitue actuellement le traitement le plus sûr de toutes les scléroses organiques et de l'hypertension artérielle.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule (15 cc.) en injection sous-cutanée tous les deux jours, pendant un mois ou deux, puis deux fois par semaine. Abaisser les doses à 10 cc. dès que les résultats cherchés auront été obtenus. Interrompre le traitement un ou deux mois par an.

Prix : 25 francs la boîte.

**Etablissements T. LECLERC**  
**D<sup>r</sup> P. LEMELAND**, pharmacien  
10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## SOLUTION PAUTAUBERGE

**Composition.** — Créosote pure de hêtre, 0 gr. 10 ; Chlorhydro-phosphate de chaux, 0 gr. 50 ; par cuillerée à potage,

**Action.** — A l'action anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydro-phosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac,

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Bronchite chronique, Toux, Grippe, Prétuberculose, Tuberculose, Coqueluche.

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à potage par jour avant les repas pour les adultes.

2 à 3 cuillerées à dessert par jour avant les repas pour les enfants au-dessus de 5 ans.

2 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas pour les enfants au-dessous de 5 ans.

Prix : 15 fr. le flacon de 350 cc.

**Laboratoire PAUTAUBERGE**  
10, rue de Constantinople — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

## SOLVURIC

### Forme :

Granulé effervescent à base de formine et de benzopyruvate de soude et de lithine.

### Indications :

Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

### Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

**Laboratoire P. MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SOMNICONES BÉRAL

**Suppositoires hypnotiques, sédatifs et antipasmodiques.**

**Composition.** — Chaque Somnicone contient :

Phényl éthyl barbiturate de soude .....	0 gr. 20
Scopolamine.....	1/10 <sup>e</sup> milligr.
Extrait de Valériane.....	0 gr. 10 /

**Propriétés.** — Assurent un sommeil calme, tranquille et réparateur sans mauvais réveil et sans aucun trouble des fonctions digestives. Action lente et progressive. Calmants électifs des centres hypnogènes.

**Indications.** — Insomnies au cours des affections les plus variées, Affections aiguës, Algies de toutes natures (Sciatique, Douleurs tabétiques, Névralgies), Excitations cérébrales, Douleurs méningées, Etats neurasthéniques, Préoccupations obsédantes, Névrosisme, Céphalées, Vomissements d'ordre central, Mal de mer, etc.

**Posologie.** — Un Somnicone en se couchant. Si l'effet semble insuffisant, en introduire deux ensemble ou l'un après l'autre.

Dans les affections chroniques, éviter l'accoutumance en suspendant l'emploi pendant 2 jours sur 6.

Formuler : Somnicones Béral. Une boîte.

**ROGER, pharmacien,**

194, rue de Rivoli. — PARIS.

## SOMNIFÈNE « ROCHE »

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Etienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloëtta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des Drs Perlis, Vullien, Assoignion, Kindler, Boisnière, Jourdan, Journiac, de Teyssieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bardet, etc., etc.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délire, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Epilepsie, Tétanos, etc.

### SOMNIFÈNE « ROCHE » Gouttes

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de *donner à chacun sa dose*, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

**Doses habituelles.** — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.  
*Enfants* : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

### SOMNIFÈNE « ROCHE » Ampoules

*Ampoules de 2 cc.*

pour injections intramusculaires.

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.).

*Ampoules de 5 cc.*

pour injections endoveineuses.

Delirium tremens, Eclampsie, Tétanos, Etat de mal épileptique, etc.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).



# SOMNOTHYRIL

(Traitement de l'insomnie.)

## Composition :

Une pilule =	{	Diéthylmalonylurée...	0,20 gr.
		Analgésine .....	0,05
		Thyroïdine.....	0,001
		Salicylate d'Esérine..	0,0002

**Caractéristiques.** — Seuil d'activité thérapeutique fort éloigné du seuil de toxicité.

Pas d'accoutumance, sommeil calme, et réveil agréable. Effet secondaire apaisant.

Renforcée dans son action par l'*analgésine*, sédatif à petites doses des *centres corticaux*, fixée d'une façon élective sur les cellules nerveuses des *centres mésodiencephaliques* par le complexe *ésérine-thyroïdine*, véritable « catalyseur physiologique du sommeil » la diéthylmalonylurée arrive à réaliser à *doses réduites et atoxiques* un effet hypnotique rapide et sûr.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes insomnies et particulièrement insomnies rebelles, Anxiété, Excitation psychique et maniaque, Cures de désintoxication. Insomnies de la Ménopause, Insomnies post-opératoires.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans sucer, ni croquer, avec un demi-verre d'eau ou *mieux de tisane chaude 2 heures environ après le repas.*

D'une façon générale, prendre, le premier soir, une pilule. En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à deux pilules prises au même moment.

Dans de très rares cas, il y a lieu de maintenir cette dernière dose pendant deux à trois soirs pour obtenir l'effet recherché.

Dans les cas de grande agitation (thérapeutique psychiatrique) donner trois pilules d'emblée, et essayer par la suite d'abaisser à deux et une pilule.

N. B. — Eviter l'emploi simultané de médicaments tels que la Belladone, etc..., qui peuvent contrarier l'action de l'Esérine.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires CANTIN**

PALAISEAU (Seine-et-Oise — France).  
Sabourin, 51, rue Jean-Robie, — BRUXELLES

## SONAGAR

**Composition.** — Association de farine de son et d'agar-agar aromatisé avec essence de légumes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment laxatif doux, Éducateur et régulateur de l'intestin avec action nutritive marquée.

**Indications.** — Paresse intestinale, Spasmes de l'intestin.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à bouche tous les soirs dans le potage.

## SONAMEL

**Présenté sous forme  
de cubes de pain d'épices.**

**Composition.** — Sonamel *adultes* : son, miel, bourdaine, très faible dose de phénolphtaléine. Aromatisé à l'anis et à la badiane.

Sonamel *enfants* : son, miel, manne, traces de bourdaine, angélique.

**Indications.** — Constipation, atonie intestinale, légère insuffisance hépatique.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Un cube, le soir après dîner.

*Enfants* : Un demi, ou un cube-enfant.

**Laboratoire MICHELON**

20, boulevard Heurteloup — TOURS.

## SONÈNE

**Son purifié et désamidonné**

**Propriétés.** — Action émolliente régulière sur l'intestin.

**Indications.** — Traitement végétal, préventif et curatif de la constipation.

**Mode d'emploi.** — Le *Sonène* se présente sous formes de cachets et de poudre.

**Dose journalière.** — 1 à 3 cachets par jour, ou 1 à 3 cuillerées à café de poudre.

**Laboratoires de la Liposeptine**  
2, Place des Vosges — PARIS.

---

## SONÉRYL

Butyl-éthyl-malonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

**Indications.** — Insomnies de toute nature, même celles qui sont provoquées par la douleur.

**Posologie et mode d'emploi.** — Deux comprimés à 10 cgr. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

**Dose maximum (adultes) :** 6 comprimés par 24 heures.

**Société Parisienne d'Expansion Chimique**  
« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhone**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SONERYL SODÉ

Présenté en cachets à 0,15 pour la narcose préparatoire aux anesthésies générales par l'éther (Méthode de Desplas, Launay, Chevillon.)

## SOPORALOSE

**Principes actifs.** — Chloralose et dérivés cinnamiques.

**Action physiologique.** — Agit comme calmant à la fois sur le système nerveux encéphalique et sur la moelle.

Aucune action sur la circulation, la respiration, la digestion.

Non toxique, élimination parfaite, pas d'accoutumance.

**Action-thérapeutique.** — Provoque un sommeil calme et exempt de rêves, avec sensation agréable au réveil. Pas de contre-indications.

**Posologie.** — Dose normale moyenne : 1 cachet.

**Usage.** — Contre toutes les insomnies par excitation quelle qu'en soit la cause, l'élément douleur excepté. Insomnies des surmenés, des nerveux, des neurasthéniques, des anxieux.

Convient remarquablement aux cardiaques, rénaux, hépatiques, dyspeptiques, artérioscléreux, vieillards, tuberculeux, affaiblis.

La boîte de 12 cachets : 12 francs.

**Laboratoire POINTET et GIRARD**  
30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

---

## SOPORIGÈNE DELQUÉ

**Composition.** — Cachets de buthyl-éthyl-malonylurée, dosés à 20 centigrammes.

**Action thérapeutique.** — Hypnotique, analgésique.

**Avantages.** — Le moins toxique des hypnotiques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

**Indications.** — Toutes les insomnies nerveuses et douloureuses,

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 10 cachets.

**Laboratoires J. M. RICARDOU**  
Docteur en pharmacie.

46, rue Pierre-Charron — PARIS.

## **SPASMACOL** (NORMACOL ATROPINÉ)

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alcaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du bol intestinal.

2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alcaloïde.

**Forme.** — Granulé dragéifié en grains très menus.

**Dosage.** — 4/10<sup>e</sup> de millig. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

**Indications.** — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

**Emploi.** — 1 ou 2 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

**Laboratoire NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien  
41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
Tél. : Laborde 08-00.

---

# SPASMALGINE « ROCHE »

**Antispasmodique vrai.**

**Composition.** — 1 ampoule ou 1 comprimé contient :

A. 1 centigramme PANTOPON « ROCHE »  
(Opium total injectable).

B. 2 centigrammes PAPAVERINE « ROCHE »  
(Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).

C. 1 milligramme ATRINAL « ROCHE »  
(Ether sulf-atropine, sans action sur le centre para-sympathique).

**Propriétés.** — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine* « Roche » expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

**Indications thérapeutiques.** — *Tous les états spasmodiques*, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

**Doses et modes d'emploi :**

Voie buccale.....	{	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour.
		Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
Voie hypodermique	{	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour.
ou		
intramusculaire.		Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
10, rue Crillon — PARIS (I V<sup>e</sup>).

## SPASMALONE

**Composition.** — Allylisopropylmalonylurée (anti-spasmodique et analgésique).

Diméthylaminoantipyrine (analgésique classique).

Crataegus (sédatif du système nerveux cardiaque et vasculaire).

Médicament du spasme par excellence. Sédatif du système nerveux. Analgésique puissant et rapide.

**Indications.** — *Tous les spasmes* : Laryngite striduleuse-spasme de la glotte, de l'œsophage, Hoquet, Crampes d'estomac, Coliques de toute nature, Règles douloureuses, Coliques du post-partum, etc., etc., Palpitations, Eréthysme cardiaque, Angine de poitrine. *Toutes les algies.*

**Présentation.** — Le Spasmalone est présenté sous forme de solution concentrée aromatisée, qui se prend dans de l'eau sucrée.

**Posologie.** — Une à 4 cuillerées à café par jour (1/2 doses pour les enfants). Ces doses peuvent être augmentées et même doublées sans inconvénients.

Dans les crises très douloureuses, donner 2 cuillerées à café en une fois.

Laboratoires du MALONE  
ANCENIS (Loire-Inférieure).

---

## SPASMINE JOLLY

Rigoureusement atoxique.

Combinaison physiologique stabilisée de  
Valériane fraîche et Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

**Forme.** — Elixir dosé à 0 gr. 10 de chaque substance par cuillerée à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 4 à 6 cuillerées à café par 24 heures ; 1/2 dose pour les enfants.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, hypnotique et hypotenseur, régulateur cardiaque.

**Indications.** — Névropathies et Cardiopathies.

Prix du flacon : 12 francs.

*Echantillons et littérature :*

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI°).

Tél. : Danton 49-39.

## SPASMONEURAL

Sédatif nerveux utilisant de faibles doses de Phényléthylmalonylurée renforcées par des antispasmodiques végétaux  
(Formule Méglin modifiée.)

### Composition :

Phényléthylmalonylurée .....	0,02
Extrait de Belladone.....	0,001
Extrait de Jusquiame.....	0,02
Extrait de Valériane.....	0,06

pour une dragée argentée friable.

### Indications :

**Spasmes viscéraux, musculaires et vasculaires.** Palpitations, Angors, Gastronévroses, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques (asthme, laryngite striduleuse). Tremblements, Artériospasmes, Migraines, Vertiges, Mal de mer.

**Nervosisme,** Anxiété, Angoisses, Insomnies, Prurits, Neurotonies de la menstruation et de la ménopause.

**Syndromes convulsifs,** Spasmophilie, Chorée, Tics, Mal comitial.

### Posologie :

**Enfants :** 2 à 10 ans, 1 à 3 par 24 heures (à écraser dans la confiture).

**Adultes :** 1 à 8 par 24 heures (avalier avec une infusion).

Prix du flacon (50 dragées) : 16 francs.

**Laboratoire du SPASMONEURAL**

**Jean LE COULANT, Pharmacien.**

239, cours de l'Yser — BORDEAUX.



## SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.  
(*Thérapeutique cardio-vasculaire.*)

### Composition :

Phényléthylmalonylurée .....	0 gr. 015
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 05
Extrait de Cratægus stabilisé...	0 gr. 05
Excipient q. s. pour 1 comprimé	glutinisé.

### Présentation :

Comprimés glutinisés.

### Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 à 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 jours par mois).

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires de l'hypertension (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 à 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois.)

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

### Laboratoires DEGLAUDE

*Médicaments cardiaques spécialisés.*

Digibaine, Cardibaine, Théoxanthine, etc.

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 31-85.

Belgique : Agent général : L. Prunières

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES

# SPASNEUROL

Sédatif du système nerveux.

Présentation. — Comprimés dragéifiés.

## Composition :

Ext. m. de Cratægus.....	0,03
— — Passiflore .....	0,02
— — Ballotte.....	0,01
— — Genêt .....	0,005
Intrait de Valériane.....	0,02
Bromhydrate de quinine.....	0,01
Gardénal.....	0,01
Théobromine .....	0,03

Indications. — 1° Le Nervosisme sous toutes ses formes, émotivité, Névrose d'angoisse, Pithiatisme.

2° Etats spasmodiques (spasmes de la gorge, de l'œsophage, de l'intestin, de l'estomac, spasmes des artères, migraine ophtalmique, etc.).

3° Insomnies nerveuses, agitation nocturne, instabilité des adolescents.

Posologie. — Deux comprimés matin et soir avant les repas ; à répéter après dix jours de repos.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires VISCONTI**

64, boulevard Barbès — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

## SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

**Composition.** — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

**Indications.** — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse et rhumatismale.

**Doses.** — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

*Cas chroniques* : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

*Pour les enfants et les vieillards*, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

**Dépôt général :**

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

## SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

**Composition.** — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (*Ac. des Sc.*, 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndalisation, ses substances minimales sont intactes.

**Propriétés thérapeutiques.** — 1° Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétines de Carnot) ;  
2° Agent de Leucopoïèse et de Phagocytose (opsonines) ;  
3° Action tonique générale du sérum de cheval ;  
4° Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

**Indications.** — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques, tuberculose, infections et toxi-infections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes. Pas d'accidents sériques ou infectieux.

**Mode d'emploi. Posologie.** — Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

**LANCOSME**

71, avenue Victor-Emmanuel-III  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SPICANOL

### Composition centesimale.

Menthol.....	0 gr. 50
Acide Formique.....	1 gr.
Essence de Térébenthine.....	10 gr.
Essence de lavandula spica.....	10 gr.
Chloroforme . . .	10 gr.
Salicylate de benzyle.....	5 gr.
Excipient spécial.....	63 gr. 50

Topique liquide, limpide, incolore, ne tachant pas le linge, dépourvu d'odeur désagréable.

### Indications.

- 1° Douleurs rhumatismales et névralgiques, lumbago, sciatique, torticolls, points de côté, névrites : 1 à 3 frictions par jour (pour les enfants et les épidermes sensibles, étendre de son volume d'eau-de-vie ou d'huile).
  - 2° Piqûres de moustiques et autres insectes : en frictions légères.
  - 3° Contusions, foulures, époques douloureuses, coliques hépatiques. 1 cuiller à soupe par verre d'eau tiède pour compresses humides.
  - 4° Rhumes de cerveau, enrouement, sinusites : 40 à 50 gouttes (un tiers de cuiller à café), par bol d'eau bouillante, en inhalations, 2 à 3 fois par jour.
  - 5° Affections pulmonaires post-grippales ou autres : frictions de tout le thorax matin et soir.
- Ne pas employer pur en compresses (vésication possible).

Prix : 12 fr. le flacon de 120 cent. cub.

Laboratoires de l'UMACETYL SPICANOL

54, rue de Sablonville, 1, rue de l'Ouest. — NEUILLY-PARIS

G. DURAND Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-interne des Hôpit. de Paris. Ex-pharmac. de l'Hôpit. Marit, de Berck.

## SPIROCHTAN

Bismuthique hydrosoluble indolore à faible dose associé au Mercure (catalyseur) et à l'Arsenic (antianémiant).

**Composition-forme.** — Ampoules de 1 cc. pour injections *intramusculaires* contenant 0 gr. 0166 de Bismuth à l'état de citrate soluble associé à 0 gr. 00025 de Mercure et à 0 gr. 00033 d'Arsenic inorganique.

**Posologie.** — Traitement d'attaque : 1 cc. tous les 3 jours. Traitement d'entretien : 1 cc. tous les 4, 5 ou 6 jours.

**Avantages.** — Cette synergie métallique exalte l'activité du Bismuth grâce à l'action catalytique du mercure, ce qui permet une thérapeutique antiseptique intensive et peu toxique avec de petites doses de Bi. Enfin, l'anémie bismuthique est compensée par l'arsenic agissant ici comme tonique.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

**Concentration spéciale pour enfants**

La boîte de 10 ampoules : 16 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

## SPLÉNARMONE

**Composition.** — Réunit en une préparation facile à prendre l'hormone anti-anémique, l'hormone splénique et les acides aminés (1 ampoule ingérable de 10 cc. correspond à foie frais, 50 gr.; rate fraîche, 50 gr.; acides aminés exprimés en glycocolle : 0 gr. 50.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Le foie et la rate agissent en puissante synergie pour régénérer la formule sanguine et augmenter la teneur en hémoglobine du sang. Les acides aminés reconstituent les réserves azotées tissulaires et exercent une action excito-sécrétoire sur les sucs digestifs.

**Indications.** — Energique reconstituant, indiqué dans toutes les anémies, la tuberculose, les états consomptifs, anémiques, anorexiques, toutes les déficiences du métabolisme basal. *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour. *Enfants* : 1 ampoule, dans un peu d'eau tiède ou de bouillon non salé.

**Les Établissements BYLA**  
26, avenue de l'Observatoire — PARIS

---

### SPLÉNIQUE (Extrait) du Docteur BAYLE.

L'Académie de Médecine a décerné en 1931 le prix Boggio au docteur Bayle, pour ses travaux cliniques et expérimentaux sur l'action de la rate dans la tuberculose.

Tuberculose, Anémies, Déficiences organiques (**Voir Colloïdogénine**).

Maladies infectieuses (**Voir Polyvaline**).

Ces produits, préparés selon les indications de l'initiateur de la méthode, permettent d'appliquer l'opothérapie splénique avec le maximum de résultats.

**Laboratoires CHAIX**

8 et 10, rue de l'Orne — PARIS.

## SPLÉNOCRISINE

Solutions injectables de Rate désalbuminée à haute concentration.

Splénocrisine 15

(15 grammes rate par ampoule).

Splénocrisine 30

(30 grammes rate par ampoule).

Splénocrisine 60

(60 grammes rate par ampoule).

Dermatoses prurigineuses. Voir Opothérapie Fournier (Endocrisines.)

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

---

## SPLÉNOMANGANOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Réparateur puissant, reconstituant, reminéralisateur physiologique.

**Indications.** — Convalescences difficiles, grossesse, allaitement, amaigrissement, rachitisme, bacilloses pulmonaires et osseuses, anémie, neurasthénie.

**Formule.** — Extrait de vitamine B, fluorure de calcium, extrait de rate, nucléinate de manganèse, os frais pulvérisé, surrénale, foie, moelle osseuse rouge, céréaline, arseniate de strychnine 1/2 milligr.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Dose et mode d'emploi.** — Deux à trois comprimés à chacun des deux principaux repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 403-4.

**Laboratoires HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

## SPLÉNYL

(Vitaminé.)

**Composition.** — Le SPLÉNYL est un reconstituant général, à base de : rate, foie, muqueuse gastrique, surrénale, acides aminés et vitamines B ; sa formule, rigoureusement étudiée, en fait une médication de tout premier ordre, active, bien que vendue à un prix modeste.

**Indications thérapeutiques.** — Le SPLÉNYL est le type du reconstituant général, indiqué dans toutes les Anémies, Convalescences, la Tuberculose, l'Epuisement, l'Amaigrissement, les Maladies par carence, etc...

**Présentation et posologie.** — Le SPLÉNYL est vendu sous deux formes : en *ampoules ingérables* de SPLÉNYL de 5 cc. (boîtes de 6, 12 et 30 ampoules) et *Sirop de Splényl* (flacon de 190 cc.).

**Adultes :** 2 à 4 ampoules ou 2 à 4 cuillerées à soupe de sirop par jour.

**Enfants :** 1 à 2 ampoules ou 1 à 2 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Le prix du SPLÉNYL est à la portée de tous les malades.

**Les Etablissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## SPYROLIDES

**Composition.** — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, méthylbenzénols, tannin, perborate de sodium (oxygène naissant).

**Présentation.** — Dernier mot de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques. Emploi commode et discret ; dissolution complète et instantanée : ni caustiques, ni irritants, ni toxiques. Désodorisants, décongestionnants, antiseptiques. Ne tachent pas. Parfum agréable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au contact de l'eau, les *Spyrolides* produisent instantanément un vif dégagement d'oxygène, donnant une solution puis samment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses, favorisant au contraire leur rapide régénération et assurant la défense de leur vitalité.

**Mode d'emploi.** — Un ou 2 comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou biquotidienne de propreté et d'hygiène.

**A titre curatif :** 2 à 3 comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrites, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau *Spyrolidée* par 1 ou 2 comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des aisselles, des pieds, etc.).

**Prescrire :** *Spyrolides* : 1 tube (faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer).

Tube de 28 comprimés : Prix : 8 fr. 95.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires du D<sup>r</sup> NARODETZKI**  
19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS



## STAL-KOSAL

« La poudre qui calme »

**Coréïne bismuthée.**

Pansement gastro-intestinal.

**Poudre et tablettes.**

**Formule.** — Coréïne, mucilage pur, et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au  $\text{Co}^2\text{Ca}$ .

**Indications.** — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum.

**Mode d'emploi :**

**Poudre :** Une cuillerée à soupe *bien délayée* dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

**Tablettes :** dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

Admis aux Assurances Sociales.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86

(Précéd. : 8, rue de la Source. — PARIS).

## STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique

**Indications.** — Furonculose, anthrax, acné, et toutes affections d'origine staphylococcique.

**Double supériorité :** Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

**Formes :**

**Buccale, la plus pratique** (10 ampoules de 3 cc.).

Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.

**Injectable, la plus rapide et la plus sûre** (10 ampoules de 1 cc.), une ampoule par jour.

**Filtrat, pour applications** sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

**Prix : 25 fr.**

Boîtes de 50 ampoules pour cliniques et hôpitaux.

**Laboratoires du Dr P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche, PARIS

## STANION

**Description.** — Etain colloïdal en capsules et en ampoules.

**Capsules :** contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage glutinisé (50 capsules par flacon)

**Ampoules :** contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récives sont évitées.

**Indications.** — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

**Capsules :** 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

**Laboratoires CH. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS

---

## STANNOBARDANE HENRY

L'*Étain* sous forme de *Peptonate* produit les effets suivants :

- 1° Soulage la douleur dès le début du traitement;
- 2° Arrête la marche de l'inflammation, fluidifie le pus et fait résorber le bourbillon sans qu'il soit besoin d'exercer une pression.

3° Produit rapidement la guérison ;

4° Empêche la formation de nouveaux foyers.

Il existe deux préparations à base de *Peptonate d'étain* :

- 1° Le **Stanno-Bardane Henry** (*Peptonate d'étain* + *Extrait de Bardane stabilisée*) ;

Le *Stanno-Bardane Henry* est présenté sous deux formes :

- A. *Stanno-Bardane-gouttes* (LX gouttes répondant à 0 gr. 01 d'étain pur).

**Doses.** — LX gouttes à 1 cuillerée à café 3 fois par jour dans un liquide. Le flacon : 16 fr. 50. Traitement : 5 jours.

- B. *Stanno-Bardane-pilules* (chaque pilule répondant à 0 gr. 015 d'étain pur).

**Doses.** — 3 pilules par jour. Le flacon : 19 francs pour un traitement de 15 jours.

- 2° Le **Peptonate d'Étain Henry** (solution sans *Extrait de Bardane* permettant un traitement *interne* et *externe*. Dosage en étain pur : 0 gr. 015 par XX gouttes).

**Doses.** — De XX à XL gouttes 3 fois par jour. Le flacon : 18 francs pour 10 jours.

En *lavages*, employer 1 cuillerée à café pour 100 gr. d'eau distillée, l'eau ordinaire provoquant un précipité.

**Laboratoires HENRY**

**39, rue de Sclessin — LIEGE.**

## STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique  
absolument purs.

**Indications.** — Furunculose et toutes affections à staphylocoques, acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

**Formes.** — Pour l'usage *interne* : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage *externe* : liquide, pommade.

**Avantages.** — Traitement **pratique, rapide et définitif** : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS

---

## STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylococcique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + anatoxine.

**Indications.** — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et *infections rebelles* à Staphylocoques.

**Posologie.** — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Littérature et échantillons :

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS

Tél. : Elysées 36-64 et 36-45.

## STAPHYLASE

### du Docteur DOYEN.

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

**Indications.** — Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

**Doses.** — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

**Laboratoires LEBEAULT**  
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>)

---

## STAPHYLOCIDE AUDRAS

Tablettes sucrées parfumées à la menthe, dosées à 0 gr. 25 d'Étain-Oxyde d'étain plus purs et plus solubles que les produits commerciaux, parce que « Étain d'électrolyse ».

— Croquer 2 à 4 tablettes par jour, aux repas de préférence.

— Contre furunculose, acné, orgelets, phlegmon, abcès divers et toutes infections staphylococciques.  
*Enfants et adultes* : pas de contre-indication.

**NOTA.** — Préparation particulièrement pratique, absorbable, efficace, à cause de sa forme de tablettes, nécessitant une longue trituration et division des principes actifs avec le sucre, et leur assurant en outre une fine émulsion par la salive. L'étain arrive ainsi à l'estomac dans l'état idéal pour une absorption rapide et totale.

La boîte (10 à 20 jours) : 12 fr. toutes pharmacies.  
Demander échantillon à :

**Laboratoire du STAPHYLOCIDE AUDRAS**  
112, rue de Gerland — LYON.

## STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

**Propriété thérapeutique.** — Agent de la phagocytose.

**Indications.** — Furunculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses.

**Doses et mode d'emploi.**

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour,

— : 4 à 10 comprimés —

— : 1 ampoule —

Enfants : Moitié de ces doses ou moins suivant l'âge.

Prix au public :

Solution, Comprimés ou Ampoules : 15 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

## STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les staphylococcies : Furoncle, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

**Posologie et Présentation :**

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules..... 18 fr.

Boîte de 10 suppositoires..... 15 fr.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules..... 13 fr.

Boîte de 10 suppositoires..... 12 fr.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

R. C. Seine 143-981.

## STAPHYLO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

**Composition.** — Lysat de Staphylocoques.

**Indications.** — Furunculose, Anthrax, Abscess et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

## STREPTO-VACLYDUN

**Composition.** — Lysat de Streptocoques hémolytiques.

**Indications.** — Erysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, grandes infections à Streptocoques.

**Posologie.** — Les lysats vaccins s'emploient à la dose de 1/2 cc. pour la première injection, les suivantes 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

**Présentation.** — En boîte de 6 ampoules de 1 cc.  
Prix : 25 francs.

**Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

Tél. : Carnot 78-11.

---

# STAPROLYSAT

## Vaccin neurotrope.

**Indications.** — Tous les accidents du système nerveux central ou périphérique auquel on attribue une origine infectieuse.

Névrites, Polynévrites, Névralgies, Névrauxites, Radiculites, Myélites, Encéphalites et ses séquelles, Sclérose en plaque, Tabès, Parkinson, Herpès, Zona.

**Composition.** — Autolysat neurotrope de *Staphylocoque* et de *B. Prodigiosus*.

**Forme.** — Ampoules de 1 cc. à doses progressivement croissantes divisées en quatre séries.

**Série I.** — 6 ampoules numérotées de Dose 1 à Dose 6, dosées de 0 cc. 02 à 0 cc. 75 d'autolysat neurotrope.

**Série II.** — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1, d'autolysat neurotrope.

**Série III.** — 6 ampoules semblables, dosées 0 cc. 2 d'autolysat neurotrope.

**Série P.** — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1 d'autolysat renforcé par 5 milliards de corps microbiens pyocyaniques.

**Mode d'emploi.** — Une injection *intramusculaire* tous les 2 ou 3 jours. Injecter en tous cas sans arrêt les 3 premières séries et *au besoin* la série P.

*Dans les cas aigus, difficiles ou rebelles, on choisira entre les injections intramusculaires de série P (sans passer par les premières séries) ou les injections intraveineuses de séries I et II. Associer le traitement iodé. (Nous demander renseignements.)*

Les trois premières séries sont totalement indolores et apyrétiques. La série P employée dès le début provoque une réaction fébrile légère (38° à 39°).

Prix :

Les trois premières séries : 30 francs l'une.

Série P : 35 francs.

**Nota.** — En prescrivant, bien spécifier la série demandée et rappeler :

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).



## STÉNOVARINE

**Traitement opothérapique spécifique de l'hypofonctionnement ovarien.**

### Formule :

Extrait Thyroïdien.....	0 gr. 01
— Ovarien .....	0 gr. 25
— Placentaire ...	0 gr. 10
Poudre de Valériane ..	0 gr. 10

**Présentation.** — Boîte de 30 cachets.

### « PROTHERAPIA »

**Laboratoire G. CHAMAGNE,**

Docteur ès Sciences, Docteur en Pharmacie,  
Lauréat de l'Académie de Médecine  
132, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble.

**Composition.** — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

**Indications.** — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

**Mode d'emploi.** — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

**Avantages.** — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Prix : 5 fr. le tube.

Echantillons médicaux sur demande.

**Laboratoire**  
**des ANTISEPTIQUES CHLORES**  
40, rue Thiers — LE HAVRE.

## STÉROBI

Composé bismuthique liposoluble à employer comme traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

**Composition et propriétés.** — Le Stérobi est un bismuthostérol dosé à 0 gr. 06 de Bismuth-métal par ampoule de 4 cc. (travaux de M. Auger, prof. de Chimie analytique à la Sorbonne). C'est le seul composé unissant au bismuth un dérivé du cholestérol, ce qui lui confère, entre autres avantages, une affinité élective pour le tissu nerveux, une puissance tréponémicide renforcée, une action anti-anémique compensatrice, et une résorption intégrale *rigoureusement* indolore. (Thèses de Marcovici et de Guyon, etc).

**Posologie.** — 1 à 2 injections intramusculaires par semaine.

Totaliser 12 injections par série.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de 4 cc. : 20 fr.

La boîte de 12 — — : 32 fr.

**Thérapeutique infantile.** — Ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 015 de Bi. Le Stérobi est le seul bismuth liposoluble utilisable commodément chez l'enfant grâce à ce dosage.

Prix : La boîte de 12 ampoules de 1 cc. : 22 fr.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — St-DENIS (Seine).

## STEROGYL

**Formule.** — Solution huileuse de Vitamine D cristallisée, chimiquement pure : substance inaltérable, dénuée de toute toxicité et dont l'action est constante.

**Présentation.** — Flacon de 10 cc. contenant 5 mgr. de Vitamine D (X gouttes = 0 gr. 002).

La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif, même chez les nourrissons les plus fragiles.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antirachitique, le STEROGYL est le traitement de toutes les décalcifications. La vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue qu'elle remplace dans toutes ses indications.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates ; les états ganglionnaires, les anémies pré-tuberculeuses, post-infectieuses et gravidiques, la carie dentaire. Facilite la consolidation des fractures.

**Posologie.** — Jusqu'à 1 an : X gouttes par jour ; de 1 à 10 ans : X à XX gouttes ; au delà de 10 ans et chez l'adulte : XX à XXX gouttes.

Prix au public, le flacon : 15 francs.

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---

# STHÉNOLÉINE

## HUILE OPOTHÉRAPIQUE TONIQUE ET ANTISEPTIQUE INJECTABLE

### CHOLESTÉRINÉE ET GOMÉNOLÉE

#### IRRADIÉE AUX RAYONS ULTRA-VIOLETS

POUR LA MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE DE TOUT  
ORGANISME DÉFICIENT

### CONTRE LES GRANDES INFECTIONS

Méthode d'immunisation artificielle préventive et curative  
par voie intramusculaire.

#### — PRÉSENTATION —

PRÉSENTÉE SOUS FORME D'AMPOULES DE 2 C.C.

#### — COMPOSITION —

Cholestérine pure. . . . .	0 gr. 02	Goménol . . . . .	0 gr. 05
Lipoïde de Rate. . . . .	0 gr. 02	Camphre du Japon. . .	0 gr. 05
Lipoïde de Bile . . . . .	0 gr. 001	Eucalyptol . . . . .	0 gr. 01
pour 1 c. c.			

Excipient : Huile d'olive surfine, chimiquement épurée,  
lavée à l'alcool et stérilisée.

#### — INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES — Toutes déchéances organiques

Anémies, Chlorose, Lymphatisme, Scrofule, Arriération,  
Amaigrissements, Prétuberculose, Déminéralisations.

#### Toutes maladies infectieuses

Grippe, Fièvre typhoïde, Paludisme, Rhumatisme, Pleurésies,  
Tuberculose confirmée, Pneumonie.

#### RARES CONTRE-INDICATIONS

#### — MODE D'EMPLOI ET DOSES —

La "Sthénoléine" s'injecte dans les muscles de la région fessière  
suivant la technique habituelle.

Doses moyennes pour 48 heures en une seule fois

ADULTES : Une ampoule de 2 c. c.

ADOLESCENTS	ENFANTS	NOURRISSONS
1 c. c. 1/2	1 c. c.	1/2 c. c.

tous les 2 jours

jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives

Plusieurs séries de 10 injections s'imposent parfois avec ou sans  
interruption entre chaque série.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications  
du médecin.

#### — PRIX DE VENTE IMPOSÉ —

L'étui de 10 Ampoules de 2 c. c. (Modèle unique) : 25 fr.

LABORATOIRE DU DOCTEUR L. DELALBRE

#### PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

Opothérapie - Colloïdothérapie micellaire - Phytothérapie

#### DÉPOT GÉNÉRAL

Service Commercial et Service Médical

2, R. CLAUDE MATRAT - ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)

G. R. LANG, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

## STHÉNOXAL

Médication réparatrice et reconstituante, en comprimés dragéifiés. Fer et Arsenic organiques, Kola; Strychnos.

**Indications.** — Syndromes d'hypovitalité générale. Insuffisances, appauvrissements et affaiblissements organiques. Grossesse, allaitement, vieillesse. Anémies, chlorose, hérédité. Déchéances progressives. Convalescences. Intoxications et toxi-infections.

### Emploi et doses :

**Adultes :** 3 comprimés par jour au total, aux repas; avaler sans croquer.

**Vieillards :** 2 comprimés par jour.

**Enfants :** A partir de 6 ans : 1 comprimé par jour; de 10 à 15 ans : 1 ou 2 comprimés par jour; de 15 à 18 ans : 2 comprimés par jour.

Prix : 17 francs.

Echantillons grandeur normale sur demande :

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

## STILLARGOL

Solution de protéinate d'argent convenable, aux concentrations de 1, 2, 5, 10 p. 100.

Antiseptique puissant, ne donnant pas sur le linge de taches indélébiles comme le nitrate d'argent. Son emploi, qui a été étendu aux cas les plus variés de la pratique médicale et chirurgicale, ne donne des résultats satisfaisants que si le protéinate d'argent est très pur.

**Présentation.** — En flacons compte-gouttes M.S. à pointe mousse. D'où les avantages suivants :

- 1° *Commodité* : Point n'est besoin de couper les pointes du flacon.
- 2° *Sécurité* : Aucun risque de blesser le patient par les petites aspérités résultant d'une ouverture défectueuse de la pointe.

**Usages.** — *Oculistique* : Désinfection de l'œil, quelques gouttes, 2 ou 3 fois par jour de STILLARGOL à 2, 5, 10 p. 100, suivant les cas.

*Obstétrique* : Désinfection des yeux du nouveau-né, avec 2 gouttes de STILLARGOL à 1 ou 2 p. 100.

*Rhino-pharyngologie* : Coryza, Rhinites, Sinusites, etc., STILLARGOL à 1, 2 ou 5 p. 100.

*Affections de l'oreille* : STILLARGOL à 5 ou 10 p. 100.

*Pédiatrie* : Désinfection nasale, oculaire et auriculaire.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

**LE MARINEL, pharmacien,**

273, rue Victor-Rauter — BRUXELLES.

## STOMAROL

**Estomac de porc desséché et délipoidé**  
(Méthode de Castle.)

**Composition.** — Le Stomarol est un Extrait d'estomac de porc desséché et délipoidé selon la *méthode de Castle* qui permet de conserver intégralement au produit les ferments résolutifs de la viande tels qu'ils se trouvent dans un estomac normal.

**Présentation.** — Forme poudre, insoluble, sans mauvais goût, dont :

30 gr. représentent 250 gr. estomac frais de porc.

**Indications.** — Le Stomarol est recommandé dans tous les cas d'insuffisance gastrique et particulièrement dans l'anémie pernicieuse accompagnée d'achylie.

### **Posologie :**

**Adultes :** 20 à 30 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à soupe).

**Enfants :** 10 à 15 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à dessert).

**Mode d'emploi.** — A prendre au début des repas délayé dans : potage, lait, purée de légumes, confiture, etc.

**Laboratoire Albert ROLLAND**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

# STOMAXINES

**Médication complète des affections digestives.**

## ANTISEPSINE

Phosphate de Na Charbon végétal et animal.  
Benzonaph. Bic. de Na. Citrate de Na.  
Magnésie calc. carb. de Ca.  
Médication d'attente. Embarras gastriques.  
*Fermentations.*

## NEUTRAXINE

Substances neutralisantes notamment.  
Carb. de Ca, de Magnésie. Charbon.  
*Hyperchlorhydrie.*

## EUPEXINE

Pepsine. Pancréatine (Système de conservation breveté).  
*Hypopepsie.*

## SPASMAXINE

Extrait jusquiame.....	1 cgr.
Extrait thébaïque .....	5 mmgr.
Poudre de belladone .....	2 cgr.
Stovaine .....	2 mmgr.
Sels digestifs .....	Q. s.

*Spasmes. Crises douloureuses gastriques.*  
*Aérophagie.*

## BISKAO

Combinaison de Carb. de Bi et Kaolin par procédé spécial assurant l'adhérence parfaite à la muqueuse.  
*Pansements gastriques (Poudre).*

## PURGOLAXINE

Purgatif 2 à 3 cachets.  
Scammonée Jalap Rhubarbe (poudre de belladone. Q. s.).  
*Constipation.*

## ENTEROLACTINE

Comprimés de ferments lactiques.  
*Affections gastro-intestinales.*

## HEPAXINE

Citrate de Na, Bic., de Na, Phosph. de Na, Sulf. de Na, desséchés et chimiquement purs.  
*Etats gastro-intestinaux et hépatiques.*

## Formes :

*Cachets* : 3 à 6 par jour.  
*Poudre* : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

**Les Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France**

6, rue Robert-Estienne — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

## STOMÉOL-VICHY

Poudre-Cure alcaline.

**Composition.** — Papaïne, Kaolin, Carbonate de Chaux, Magnésie, Phosphate de Chaux, Sel de Vichy, Ess. de Menthe.

**Indications.** — Le meilleur saturant des Hyperacidités gastriques. Digère les albuminoïdes. Agit aussi bien en milieu acide que neutre ou alcalin.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, après les repas ou au moment des douleurs.

Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoire **CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique* par le Kaolin.

*Antisepique* : par le Carbonate de bismuth.

*Absorbant* : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

*Sédatif* : par le bromure de sodium, la belladone, la codéine.

*Musculopoiétique* : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

*Reconstituant* : par le phosphate tricalcique et la strychnine (noix vomique) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

**Indications.** — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

**Présentation et mode d'emploi.** — *Poudre* : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

*Cachets* : 2 à 4 par jour, après les repas ou au moment des douleurs avec une infusion chaude de préférence.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires **CLAVERIE**

4, avenue de Brazza — ROMAINVILLE (Seine).



## STOMOPHILE

### RÉGULATEUR ÉNERGIQUE DES FONCTIONS STOMACALES

(Alcalin-Antiferment.)

**Forme.** — Paquets (de saturation).

**Composition.** — Alcalins (sodium, calcium, magnésium). Bismuth (professeur Hayem).

**Indications.** — Dyspepsie, Gastralgie, Gastrites aiguës et chroniques, Hyperchlorhydrie, Hypersthénie, Pyrosis, Ulcère.

(Supprime, dans de nombreux cas, l'atonie intestinale.)

**Posologie.** — Un paquet, délayé dans un peu d'eau, à la fin ou 1 heure après les principaux repas.

Dans les crises aiguës, prendre supplémentairement 1 ou 2 paquets dans le courant de la journée.

### INNOCUITÉ ABSOLUE

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires **DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier - PARIS.

## STOMOXYGÈNE

Troubles gastro-intestinaux. Constipation. Fétidité de l'haleine, Insuffisance hépatique

**Composition.** — Peroxyde de magnésie, chimiquement pur, extraits biliaires, émodine et belladone (Travaux de Tschirch).

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

Double réaction en milieu stomacal.	{	Dégagement d'O. (Naissant)	{	Action antiseptique,
		Production de chlorure de magnésium.		{ Naissant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action antifermentescible désinfectante antiseptique, anti-colibacillaires. Effets toniques et cytophylactiques des sels halogènes magnésiens. Laxatif puissant, sans accoutumance.

**Indications.** — Toutes les dyspepsies, Constipation sous toutes ses formes, Fétidité de l'haleine, Toutes les fermentations, Rééducation intestinale, colites, entérocrites, etc... et toutes les manifestations colibacillaires.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 pastilles avant chaque repas. Littérature et échantillons.

Société Française d'Extension Bio-Chimique,

2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre — SAINT-QUENTIN (Aisne).

## STOPRAL

**Analgésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement atoxique. Formule établie pour adultes seulement.**

**Comprimés à avaler, ou à déliter dans l'eau auparavant.**

**Indications. — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme. Névralgies.**

Règles douloureuses, spasmes douloureux.

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives,

Exerce sur le cœur une action tonique.

Agit rapidement.

Ne présente pas de contre-indication.

**Doses. — Pour adultes seulement :**

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et constitue la dose maxima.

Prix : 12 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**  
47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

## STOVAFER

Granulé

Médication reconstituante à base de Stovarsol, Fer, Mg, Soude, Chaux, Manganèse. 1 cuillerée à café contient 0,05 de Stovarsol.

**Indications. —** Asthénie, Anorexie, Anémie, Maladies infectieuses et parasitaires.

**Mode d'emploi. — Enfants,** à partir de 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

**Adultes :** 3 cuillerées à café par jour.

Prix de vente : 20 francs.

**Laboratoires RICHER**

Docteur en pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis-1, rue d'Enghien  
PARIS.

## STOVAÏNE

Chlorhydrate de diméthyl-amino-benzoyl-pentanol.

Anesthésique local moins toxique que la cocaïne. Vaso-constricteur et antiseptique. Pas d'accoutumance.

### *Indications :*

**Toutes les applications médicales et chirurgicales de la cocaïne.**

### *Posologie et mode d'emploi :*

Solution à 0,50 et à 1 p. 100 (Anesthésie locale), solution à 10 p. 100 (Rachi-anesthésie), Pastilles à 2 milligrammes (Affections de la bouche et du pharynx).

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## STOVAR SOL

Acide - 4 - oxy - 3 - acétylamino - phényl - 1 - arsinique.  
Forte teneur en arsenic (27,2 p. 100). S'administre par la voie buccale.

**Indications.** — Traitement des diarrhées de fermentations, parasitaires et des tuberculeux. Amibiase, Lambliose, Helminthiases, Spirochétoses intestinales, Syphilis, Pian.

### **Posologie et mode d'emploi :**

Comprimés à 25 cgr., 5 cgr. et 1 cgr.

**Doses moyennes.** — *Adultes* : 50 cgr. à 1 gr. par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 cgr. par 24 heures et par kilogramme de poids.

Le *Stovarsol sodique*, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

**Société Parisienne d'Expansion Chimique**  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## STOVÉDRINE

**Pommade nasale atoxique.**

**Solution pour pulvérisations.**

Effet puissant. Pas d'accoutumance.

Elle comprend deux principes essentiels :

**La Stovocaïne** (Chlorhydrate d'Amyléine).

**L'Éphédrine** (Chlorhydrate).

Formules	{	<i>Pommade :</i>	
		Stovocaïne .....	6 p. 100
		Éphédrine .....	5 p. 100
	{	<i>Solution :</i>	
		Stovocaïne .....	5 p. 100
		Éphédrine .....	5 p. 100
		Chloretone .....	1 p. 100

L'originalité de la formule de la STOVÉDRINE réside dans l'association de la Stovocaïne et de l'Ephédrine employés à un taux de concentration suffisant pour combattre efficacement :

1<sup>o</sup> *Affections aiguës* : Coryza, Sinusite, Céphalée, Obstruction nasale.

2<sup>o</sup> *Affections chroniques* : Asthme, Rhume des foins.

**Posologie.** — *Pommade* : Introduire gros comme un pois dans chaque narine. Masser pour répartir la pommade.

*Solution pour pulvérisations* : Pulvériser à une ou deux reprises, 3 fois par jour, dans chaque narine la solution de Stovédrine.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon

NEUILLY-PARIS. — Tél. : Maillot 17-75.

## **STROPHANTINE CATILLON**

**Forme : GRANULES DE CATILLON**

à 0,0001 de Strophantine cristallisée  
extraite du Strophantus Gratus.

Synonyme : **Ouabaïne.**

**Indications.** — Affections mitrales, Dyspnée, Oppression, Œdèmes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, Lésions cardiaco-aortiques. Artériosclérose avec ou sans néphrites.

**Posologie.** — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

## **STROPHANTUS CATILLON**

**Forme : GRANULES DE CATILLON**

à 0,001 Extrait titré de Strophantus.

**Indications.** — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

**Posologie.** — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique.*

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Prix de l'Académie de médecine.

---

**Laboratoire CATILLON**

3, boulevard Saint-Martin — PARIS.

## **STRYCHNAL LONGUET**

Toutes indications de la strychnine.

Dérivé synthétique de la strychnine, de toxicité dix fois moindre.

Affections médullaires et névritiques. — Asthénie. — Neurasthénie. — Tuberculose. — Maladies infectieuses. — Convalescence. — Anémie.

**Doses.** — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal.  
1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal par cm<sup>3</sup>.

Le flacon de 50 granules : 14 fr.

La boîte de 12 ampoules : 18 fr.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sédaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## **STRYCHNARSITOL ROBIN**

Injectable.

Glycérophosphate de soude, acide nucléinique et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

**Dose et mode d'emploi.**

Une injection Hypodermique de 2 cc.  
par 24 heures.

**Laboratoires M<sup>co</sup> ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## STRYCHNOTONINE

**Composition.** — Méthylarsinate de calcium, 0 gr. 003 ; Chlorhydrate de strychnine, 0 gr. 0005 pour un comprimé.

**Action.** — Tonique et accélérateur de la nutrition. Stimulant du système nerveux.

**Indications.** — Anémie, convalescence, Insuffisance cardiaque, Alcoolisme, Anorexie, Incontinence d'urine, Leucorrhée, Troubles de la ménopause, Tabès, Algies, Migraines, Neurasthénie, Chorée, Epilepsie, Constipation atonique.

**Doses.** — De un à deux comprimés, trois fois par jour.

**Présentation.** — Boîtes de 75 comprimés dragéifiés.

**P. BASUYAUX, Pharmacien**

94, rue Pasteur — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine)

## STUPHO

Antidiarrhéique non toxique.

**Composition.** — Lactate de Chaux, Extrait de Salicaire, Benzonaphтол.

Aux propriétés antidiarrhéiques de la salicaire signalées par d'éminents thérapeutes (de ROUVILLE, CAMPARDOU, DUFOUR) s'associe l'action remarquable du Lactate de chaux dans toute diarrhée ou dysenterie.

La présentation en comprimés ou granulés en permet l'administration aisée aux enfants les plus jeunes, la solution du granulé dans l'eau donnant instantanément une préparation vanillée très agréable au goût.

**Mode d'emploi.** — *Comprimés* : 2 à 6 par 24 heures pour l'adulte ; 1 à 4 par 24 heures pour l'enfant à délayer dans 1/4 de verre d'eau sucrée tiède.

*Granulé* : 1 à 4 cuillerées à bouche pour l'adulte.

1 à 3 cuillerées à dessert pour l'enfant.

1 à 4 cuillerées à café pour le bébé.

à croquer ou dissous dans un peu d'eau tiède.

Prix : *Granulé*, 12 fr. *Comprimés*, 7 fr.

**LABORATOIRE DU MAINQUY**

**M. BASSIN**, docteur en pharmacie — BONDY (Seine).

*Echantillons sur-demande.*

## SUCRE EDULCOR

dit le Sucre des Diabétiques.

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical.

Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

## LITHARSYNE

**Indications.** — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

**Posologie.** — *Solution* : 1 cuillerée à soupe avant les repas de midi et du soir.

*Gouttes* : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

*Comprimés* : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Echantillons gratuits à Messieurs les Docteurs.

**Laboratoires E. FERRÉ**

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## SULFA

Ampoules Sulfa de 10 cmc.

Monosulfure de sodium inaltérable, Soufre colloïdal (S. non oxydé).

**Emploi.** — Verser une ampoule dans 1 litre d'eau bouillie pour obtenir 1 litre d'eau sulfureuse artificielle type eau sulfurée de Cauterets.

Boisson, etc... (comme eau sulfureuse naturelle) gargarismes, inhalations, pulvérisations, lavage de sinus.

**Avantages.** — Pas d'oxydation par le transport, grande activité.

**Indications.** — Toutes applications O. R. L., pulvérisations, etc... et traitements sulfureux des voies respiratoires.

En méd. gén. : Bronchites chroniques, Peau, Oxyurose (lavements), etc...

Boîte de 10 ampoules : 20 fr.

Tablettes Sulfa.

Gargarisme sec Sulfo, M. boraté, cocaïné.

La boîte : 5 fr.

**Société PYRNE**

**M. LAFITTE**, pharmacien  
CAUTERETS (Hautes-Pyrénées.)



## SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de soude. Teneur en arsenic : 20 p. 100.

**Injections** (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

**Indications.** — Syphilis, Hérédo-Syphilis, Paludisme, Pian, Infection puerpérale, Blennorrhagie, Erysipèle, Alcoolisme, Anorexie des nourrissons, Goitre endémique, Angine de Vincent, Dermatoses chroniques, Zona, Pyorrhée alvéolaire, Interventions chirurgicales.

### Doses :

A	B	C	D	E	1	2	3	4
5 milgr.	1 cgr.	1,5	2	3	6	12	18	24
5	6	9	10	11	12	12	13	13
30	36	42	48	54	60	72	84	96 cgr.

Voir Arsenos-Solvant.

**Laboratoires de Biochimie Médicale**  
**Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie**  
 19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
 Téléphone : Auteuil 26-62 et 04-30.

## SULFARSIODE

### Composition et dosage :

Iode .....	0 gr. 006 par cc.
Arsenic .....	0 gr. 002 —
Soufre allylique .....	0 gr. 004 —
1 cc. représenté 42 gouttes.	

### Indications :

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

### Posologie :

Bébés, selon l'âge, VI à XII	gouttes par jour.
Adolescents — X à XX	— —
Adultes — XV à XXX	— —

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

**Forme et prix :** Gouttes : 16 fr. le flacon.

Préparé par le D<sup>r</sup> ROGER, Pharmacien.

Echantillons et vente en gros :

**H. PERRIN-BRUNO,**  
 4, rue Désirée — LYON.  
**J. MURARD,** Pharmacien.

## SULFOBYL

**Forme.** — Dragées glutinisées.

### Composition :

Soufre colloïdal.....	0,02
Extrait de bile .....	0,05
Extrait de foie .....	0,05
Entérokinase .....	0,02
Extrait de pancréas .....	0,02
Urotropine .....	0,05
Aloïne .....	0,005

Par dragée.

### Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoclasique de Widal.

### Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

### Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 10 francs.

**Laboratoire LAFARGE**

6, boulevard Arago — PARIS.

## SULFOCADOL

**Composition.** — Pommade du professeur Gaucher de l'Hôpital Saint-Louis rendue blanche et inodore.

Huile de cade désodorisée et décolorée. Soufre, camphre, acide salicylique.

**Indications.** — Traitement de l'eczéma et des affections de la peau d'origine eczémateuse. Toutes les indications de l'huile de cade.

**Avantages.** — Mieux que toutes les pommades à l'huile de cade ordinaire, parce qu'elle ne tache pas et ne sent pas mauvais.

**Emploi.** — En onctions sur la partie malade. Pour l'enlever, utiliser l'huile d'amandes ou une bonne huile végétale.

Prix : 9 francs.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

**Laboratoires Michel DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault  
COURBEVOIE (Seine).

## SULFOCOL GODART

**Antiseptique et réparateur puissant des organes de la respiration.**

*Médication pour les toux expectorantes.*

(Voir « Pectoforme Godart », pour les Toux sèches.)

Sirop au Sulfogaïacolate de Potasse, marque L. M.  
(Le SULFOgaïaCOLate de Potasse marque L. M. est alcalin, point absolument capital pour obtenir une efficacité certaine.)

**Formule.** — Une cuillerée à soupe représente :

I gr. de Sulfogaïacolate de Potasse. — 5 mgr. de Phosphate de Codéine. — II gouttes de Teinture d'Aconit.  
— 1 gr. d'eau de Laurier-Cerise. — 5 mgr. de Thymol.  
— Sirop d'écorce d'orange.

**Action.** — Provoque une expectoration abondante et calme la toux. Agréable à prendre, très digestif.

**Posologie :**

*Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe en 24 heures.

*Enfants* : 4 à 5 — à dessert ou à café suivant l'âge en 24 heures.

Prix : 22,50 fr. belges pour 400 gr. de sirop.

Littérature et échantillons :

**Laboratoire de la Meuse, Andenne**  
**LEON GODART, Pharmacien (Belgique).**

## SULFOCRÈME LILESS

**Composition.** — Crème non grasse, contenant 20 p. 100 de Soufre précipité, desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

**Indications.** — Séborrhée, acné.

**Mode d'emploi.** — Appliquer la crème à la toilette du soir, en massant la peau à chaque apport, pour favoriser sa pénétration ; les couches peuvent être légères dans les cas bénins et épaisses dans les cas rebelles.

La peau se nettoie avec des tampons d'ouate imbibés d'eau chaude ou par simple lavage.

Le jour, une couche légère reste invisible sous un soupçon de poudre de riz.

Prix : 7 francs.

**Laboratoires FISCH et Cie**  
4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Agence à PARIS :  
104, faubourg Poissonnière (X<sup>e</sup>).  
Tél. : Lamartine 92-52.

---

## SULFODERMOL FLAHAUT

**Composition.** — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

**Forme.** — Cachets.

**Indications.** — Eczémas, États séborrhéiques, et dermatoses associées, Acné, Pityriasis, Psoriasis, Alopécies, Furonculose, Impetigo, Sycosis, Urticaire, Troubles de la Nutrition soufrée des rhumatisants chroniques.

**Mode d'emploi.** — Un cachet avec un 1/2 verre d'eau avant chacun des trois repas.

**Laboratoire FLAHAUT**  
74, rue Monge — PARIS (V<sup>e</sup>).

## SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.  
Granulé. Ampoules. Pommades.

**Doses et mode d'emploi.** — Granulé :  
2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque  
cuiller contenant 10 centigr. de soufre  
colloïdal.

Injectable : 1 injection par jour dans les cas  
graves. Dans les cas ordinaires, 1 injection  
tous les 2 ou 3 jours.

**Indications.** — Troubles de la nutrition  
sulfurée. Pharyngites chroniques. Bron-  
chites chroniques. Antisepsie de l'intestin.  
Rhumatismes aigus et chroniques. Arthri-  
tismes. Syphilis.

**Laboratoires M<sup>co</sup> ROBIN**  
13, rue de Poissy — PARIS.

## SULFOSINE « LEO »

Suspension huileuse de soufre à 1 et 2 p. 100.  
(Huile soufrée stérilisée.)

**Indications.** — Paralysie générale, Syphilis nerveuse et autres affec-  
tions syphilitiques ou non du système nerveux central, telles que la  
Démence précoce, la Schizophrénie, l'Encéphalite épidémique chro-  
nique, etc.

**Forme.** — Deux dosages :

1<sup>o</sup> Faible : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 1 p. 100 de soufre

2<sup>o</sup> Fort : — — 1, 2, 5 et 10 cc. à 2 p. 100 — —

**Deux Séries :** 1<sup>o</sup> Une boîte de 10 ampoules de 10 cc.

2<sup>o</sup> Une boîte de { 2 de 1 cc.  
10 ampoules { 3 — 5 cc.  
assorties { 5 — 10 cc.

**Mode d'emploi.** — En injections intramusculaires.

**Posologie.** — Pour la solution à 1 p. 100 la dose initiale dans le premier  
traitement est de 1 à 2 cc. ; on augmente ordinairement chaque dose  
de 1 cc. jusqu'à 8 à 10 cc.

La dose de début pour la solution à 2 p. 100 est également de 1 à 2 cc.,  
mais la dose maxima n'atteint que 3 ou 5 cc.

**Valentin AAGE MOLLER**

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dét. p<sup>r</sup> la France : Jean DEDIEU, 39, r. Fondaudège, BORDEAUX  
Belgique et Luxembourg : Ed. JUST,  
11, square Marie-Louise — BRUXELLES

## SULFO-THIORINE

Soufre-Hyposulfate agréable au goût

**1<sup>o</sup> Affections des voies respiratoires (subaiguës ou chroniques)**  
Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches.

Ozone, adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites trainantes. Trachéo-bronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Expectorations tenaces (La Sulfo-thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). Bronchites persistantes des gazés. Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

La cure de SULFO-THIORINE prépare et complète la cure thermale par les eaux sulfureuses ; en cas d'impossibilité de faire la cure aux sources thermales, elle peut à la rigueur y suppléer.

**2<sup>o</sup> Auto-intoxication intestinale chronique et des affections qui en découlent :**

Accidents anaphylactiques, acné, eczéma, urticaire, etc.)

Laxatif léger. — Désinfectant sûr.

**3<sup>o</sup> Maladies par ralentissement de la nutrition.**

Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc...

**4<sup>o</sup> Adjuvant indispensable des traitements par les sels d'or, de mercure, de bismut, d'arsenic,**

Renforce leur action, — Empêche les phénomènes d'intoxication.

### Posologie

**Adultes :** 1 ou 2 cuillerées à café 3 fois par jour au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau (diminuer la dose en cas de diarrhée très abondante).

**Enfants :** 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoire de la Sulfo-Thiorine

39, rue Fondaudou, BORDEAUX

## SULFOXYL

(Hydrogène sulfuré à l'état naissant.)

**Forme.** — Pastilles très agréables à sucer ou croquer.

**Composition.** — Hydrogène sulfuré à l'état naissant.

**Doses.** — Croquer ou sucer 4 à 8 pastilles par jour.

**Propriétés.** — Médication sulfureuse active et régulière pouvant être réalisée partout et à toute époque de l'année.

**Action.** — Particulièrement antitoxique.

**Indications.** — Toutes affections du Rhino-Pharynx et des voies respiratoires, Grippe, Rhumatismes, Maladies de la peau, tous états infectieux.

Le tube de 60 pastilles : 14 francs.

Laboratoires J. BRESSIER

Docteur en Pharmacie

102, rue Vincent — MARSEILLE

## SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.  
MÉDICATION SULFUREUSE  
A DOMICILE

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie.

**Mode d'action.** — Au contact de l'eau, formation de Monosulfures de sodium et de calcium à l'état naissant.

**Indications thérapeutiques.** — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles prises à la source.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, Extinctions de voix, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales, et en lavements contre les oxyures.

Enfin l'effet curatif est surprenant dans la plupart des Eczémās, dans l'Acné et en général dans toutes les affections de la peau.

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson ou en bains. Il est des plus efficaces en vaporisations et pulvérisations.

**Mode d'emploi.** — *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait tiède, le matin à jeun ou matin et soir.

*Pour oxyures* : lavement 5 jours de suite, faire une seconde cure au bout de 10 jours.

*Pour inhalations* : 1 mesure ou mieux 1 ou 2 comprimés dans un verre d'eau très chaude.

Echantillons sur demande.

## SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte.

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix : { boisson : 10 fr. 50.  
          { bain : 6 francs.  
          { comprimés inhalants : 12 fr. 50.

Laboratoire POMPANON

62, rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V<sup>e</sup>).

## SULFURION

**Description.** — Complexe colloïdal électrique isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

**Indications.** — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

---



# SULFURYL MONAL

## Formes :

**Médicamenteuses.** — Trois formes : pastilles, granulés, comprimés inhalants.

**Hygiéniques.** — Deux formes : bain, savon.

**Usage interne.** — Pastilles et granulé agréables à sucer ou à croquer.

**Usage externe.** — Comprimés inhalants pour inhalations, humages, gargarismes, pulvérisations, etc.

**Hygiène.** — Bain tonique inodore ; savon, soins de la peau, dermatoses.

**Composition.** — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

## Doses :

**Usage interne.** — Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour ; croquer ou prendre délayé dans un peu d'eau de 1 à 3 cuillerées à café de granulé 4 fois par jour, (forme recommandée pour les enfants).

**Usage externe.** — Un comprimé dans un récipient d'eau chaude chaque 4 minutes.

**Hygiène.** — Un paquet bain SULFURYL MONAL, pour un bain d'adulte et 1/2 paquet pour un bain d'enfant. Savon de SULFURYL MONAL pour la toilette des peaux délicates.

**Propriétés.** — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison, la médication sulfureuse interne et externe.

**Action.** — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges.

**Indications.** — Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Etats infectieux et post-infectieux.

## Prix :

Sulfuryl Monal. Pastilles.....	le tube	: 12 fr,
— Granulé.....	la boîte	: 12 »
— Comprimés .....	le flacon	: 12 »
— Bains (sans odeur).	la boîte	6 »
— Savon.....	le pain	6 »

**Laboratoires MONAL et Cie,**

6, rue Bridaine — PARIS

## SULF-Y

**Composition.** — Fénugrec et soufre.

**Forme.** — Granulé sucré et anisé.

**Indications.** — Amaigrissement, affections chroniques du poumon (toux opiniâtre, bronchites chroniques, bronchites suspectes, prébacillose, bacillose) et de l'intestin (entérite bacillaire, entérites chroniques, infections intestinales).

**Mode d'emploi.** — 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

**M. SALAVERT**

SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde).

---

## SULPHIUM

(Comprimés.)

**Complexe de Soufre et d'Hyposulfites.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Le SULPHIUM permet de faire à domicile et à peu de frais la cure soufrée interne et la cure de désensibilisation.

**Indications.** — Affections chroniques des voies respiratoires, Rhumatismes chroniques, Dermatoses, Désintoxications métalliques.

**Mode d'emploi.** — Prendre de 4 à 8 comprimés par jour, de préférence aux repas.

**Laboratoires BRISSON**

**Dr DEDET ET Cie, Pharmaciens.**

**Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.**

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## SUNALCOL

Teinture de Sunoxol.

Solution alcool-acétonique de  
Chlorhydrate d'ortho-oxyquinoléine.

**Propriétés.** — Antiseptique ni irritant, ni caustique, ni toxique, ne coagulant pas les albumines, à action double: 1° antiseptique à doses infinitésimales; 2° biologique en stimulant les défenses naturelles de l'organisme.

**Indications.** — Remplace la teinture d'iode dans la désinfection de la peau et des plaies et l'alcool iodé dans les épidermomycoses. Avantage: n'étant pas caustique, peut être appliquée quotidiennement aussi longtemps que nécessaire.

**Présentation.** — Flacon de 25 cc. de solution alcool-acétonique à 2 p. 100.

**Posologie.** — N'est employée qu'à l'état pur, en badigeonnage comme la teinture d'iode.

Etablissements KUHLMANN

Produits RAL

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII°).

---

## SUNOXOL

Sulfate neutre d'o. oxyquinoléine.

**Propriétés.** — Antiseptique ni irritant, ni caustique, ni toxique, ne coagulant pas les albumines, à action double: 1° Antiseptique: arrête le développement des microorganismes à doses infinitésimales; 2° biologique: stimule les défenses naturelles des cellules.

**Indications.** — Spécifique des épidermomycoses. Antiseptique de choix dans toutes les infections de la peau et des muqueuses: badigeonnages, instillations, injections, pansements.

**Présentation.** — Solution hydroglycérinée à 33 p. 100  
2,5 cc. par litre, X gouttes par verre = solution à 1/1 000.

**Posologie.** — Suivant le cas, solution telle quelle, à 1/100 ou à 1/1 000.

Etablissements KUHLMANN

Produits RAL

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII°).

## SUPPARGYRES

### du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

**Forme.** — Adultes. — Suppositoires à 0.04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrissons : 0,01 cgr. et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0,02 cgr.

**Dose.** — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

**Nota.** — Hg. vif *est* et *reste* supérieur à tous les sels, toujours instable. Le seul anti-syphilitique *indiscutable et indiscuté*. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif. On mélange à une solution d'arséno benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'**EXTRAIT de FOIE**, les tréponèmes *sont foudroyés*. **Peuvent être prescrits comme désinfectants ou hépatogènes.**

(Expériences de Levaditi.)

**Laboratoire du Docteur TISSOT**  
34, boulevard de Clichy — PARIS

## SUPPOALGOS LAGOUTTE

### Composition :

Dionine .....	0,03
Ext. de Belladone.....	0,025
Ext. de Jusquiame.....	0,025
Ext. de Piscidia.....	0,025
Pyramidon.....	0,25
Phénacétine.....	0,25
Citrate de théine .....	0,10

**Actions thérapeutiques.** — Spécifique de l'élément douleur, agissant rapidement.

Antispasmodiques, Hypnotiques, Analgésiques, Sédatifs.

**Indications.** — Névralgies, Douleurs rhumatismales, Douleurs utérines, Spécifique des règles douloureuses, Coliques néphrétiques et hépatiques, Insomnies causées par la douleur.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 suppositoires par 24 heures

Prix de la boîte de 6 suppositoires : 12 francs.

**Laboratoire LAGOUTTE**  
229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

**FORME.** — Suppositoires.

**Composition.** — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de sénégon, beurre de cacao.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

**Mode d'emploi.** — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un **Suppo-Gynal**. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

Prix : 12 francs.

**Laboratoires LEES**

124, rue du Bac — PARIS.

## SUPPOSITOIRES A L'ESCULÉOL

Contre les hémorroïdes.

Adrénaline, stovaïne, extrait de marron d'Inde et d'Hamamelis, Euproctol.

**Avantages.** — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants.

Ne provoquent aucun choc local et atténuent rapidement les douleurs.

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire matin et soir et après chaque garde-robe pendant les crises. Pour les chroniques, un suppositoire par jour.

Prix : 12 fr.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault

COURBEVOIE (Seine).

## SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

**Anesthésie superficielle par contact.**

**Caractéristiques.** — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

**Indications.** — Suppression rapide de la douleur, antiseptie et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, Prurit anal, Fistules, Fissure, Constipation douloureuse, Plaies anales ou rectales, Prostatite, Cystite, Ténésme, Douleurs du bas-ventre, Douleurs post-opératoires, Douleurs de l'accouchement, Règles douloureuses, Coliques néphrétiques, etc.

**Posologie.** — Renouveler l'introduction d'un suppositoire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*. Dans les pays tropicaux où le suppositoire est inutilisable, y substituer la *Solution huileuse* introduite avec une poire.

**Laboratoires du NESTOSYL**

**P. BAUDE, pharmacien.**

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 96-46 — Adr. télégr. : Nestosyl 27-Paris.

## SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée, pour  
adultes et pour enfants.

**Mode d'emploi.** — Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'anus par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

**Indications.** — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments, pour leur administration par la voie rectale.

**Établissements FUMOUIZE**

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

## SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

**Composition.** — A base d'Arsénobenzol.

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

**Présentation.** — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 d'arsénobenzol.  
Prix : 18 francs.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03. id.  
Prix : 16 francs.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01. id.  
Prix : 15 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

## SUPPOSITOIRES GONNON

(Glycérine dans du beurre de cacao.)

*Pour enfants :* 1 gramme de glycérine.

*Pour adultes :* 2 grammes de glycérine.

**Indications.** — Constipation, Hémorroïdes.

Ils présentent l'avantage des lavements de glycérine sans en avoir les inconvénients ; sont appréciés par les personnes qui voyagent.

Prix : 7 francs la boîte

de 12 suppositoires pour enfants  
ou de 10 suppositoires pour adultes

**Produits GONNON**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

### 2 Titrages :

*Adultes* : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

*Enfants et Nourrissons* : 0,03 Onguent napolitain, soit 0,015 Hg. métal.

**Originalité.** — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

**Présentation dissimulée.** — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

**Posologie.** — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

**Prescription.** — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

**Laboratoires A. DUTEIL**

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

## SUPPOSITOIRES LOGEAIS

### Composition :

Extrait d'Hamamélis.....	0,33
Sulfoichtyolate de Soude.....	0,33
B. Cacao.....	Q. S.

Par suppositoire.

**Indications.** — Hémorroïdes internes et rectite concomitante. Prostatites.

**Propriétés.** — Atoxiques, analgésiques, décongestionnants, vaso-constricteurs. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite.

Ni cocaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques. Aucune contre-indication.

**Mode d'emploi.** — Introduire matin et soir, après lavage, un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Prix au public : 13 fr. 75.

**Laboratoires Émile LOGEAIS**

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.



## SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptique.)

Adrénaline .....	0 gr. 00015
Stovaine .....	0 gr. 025
Anesthésine .....	0 gr. 025
Ext. de Marron d'Inde frais sta-	
bilisé .....	0 gr. 05
Extrait d'Hamamélis.....	0 gr. 01

Pour un suppositoire.

**Dose et mode d'emploi.** — Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

**N.-B.** — Action d'autant plus active qu'un lavement évacuant (de 100 gr.) à une température de 45°, aura précédé l'introduction de SUPPOSITOIRES MIDY.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionnants, Astringents, Anesthésiques, Calmants, Antiseptiques.

**Indications.** — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SUPPOSITOIRES PACHAUT

**Huile de Palma Christi, Glycérine,  
Beurre de cacao.**

Traitement de la CONSTIPATION

S'introduisent par la grosse extrémité. Leur forme bi-conique spéciale permet, sous l'effet des contractions du sphincter, une ascension dans le rectum.

**Présentation :**

- 1<sup>o</sup> Boîte de 12 suppositoires pour *adultes*.
- 2<sup>o</sup> Boîte de 12 suppositoires pour *enfants*.

**Laboratoires PACHAUT**

130, boulevard Haussmann — PARIS

Téléph. : Lab. 16-72

## **SUPPOSITOIRES PEPET**

(Beurre de Cacao — Glycérine)  
pour Bébés, pour Garçonnetts,  
pour Adultes.

## **CONSTIPATION. HEMORROÏDES**

La boîte : 12 fr. 50.

La 1/2 boîte : 7 fr. 50.

**Henry ROGIER**

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire

PARIS.

---

## **SUPPOSITOIRES PYRAX**

Médication sédatrice et antithermique de choix dans toutes les maladies de l'Enfance. Action diurétique, tonique, désinfectante, (Quinine, Aspirine, Caféine).

**Deux dosages.** — Bébés jusqu'à 3 ans.  
Enfants au-dessus de 3 ans.

**Présentation.** — 3 étuis de 2 suppositoires par boîte.

**Emploi.** — 1 à 3 par jour.

Toutes Pharmacies, la boîte bébé : 7 fr. 50.

La boîte enfants : 9 francs.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous les N<sup>os</sup> 155-4 et 155-5.

Échantillons :

**Laboratoire CHAVIALLE**

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

## SUPPOSITOIRES ROCAV

Médication mercurielle active et d'un emploi particulièrement commode.

Les suppositoires ROCAV ne provoquent pas d'épreintes. Leur forme particulière facilite l'introduction et surtout la pénétration profonde dans le rectum, condition optima d'absorption du médicament.

**Dosage.** — *Adultes* : 0,05 Hg vif. *Enfants* : 0,025 Hg vif.

**Indications.** — Traitement d'usage. Syphilis hépatiques, Syphilis du tube digestif.

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire tous les deux jours le soir en se couchant.

Prix : *Adultes* : 20 francs. *Enfants* : 18 francs.

**NOTA.** — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

**Pharmacie ROGÉ-CAVAILLES**

**M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie**  
**Successeur**

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SUPPOSITOIRES SFÉAT

Traitement dissimulé de la Syphilis par l'huile grise argentique.

**Généralités.** — A côté de l'huile grise argentique injectable, les Laboratoires SFÉAT préparent des suppositoires à l'amalgame d'argent présentés à la vente sans aucune indication révélatrice.

Ces suppositoires possèdent sur les produits habituellement employés les avantages suivants :

**Grande activité,** la combinaison de l'argent avec le mercure ayant pour effet de renforcer la puissance de cet élément.

**Tolérance remarquable** due à l'extrême ténuité des particules métalliques mélangées à l'excipient et à la constance de la composition.

**Mode d'emploi et posologie.** — 1 suppositoire chaque soir pendant 10 à 20 jours.

Deux dosages :

Suppositoires « Adultes » à 0 gr. 05 Hg et 0,025 d'Ag.

Suppositoires « Enfants » à 0 gr. 02 Hg et 0,01 d'Ag.

**Prix :**

SUPPOSITOIRES SFÉAT adultes. La boîte de 12 : 20 fr.

SUPPOSITOIRES SFÉAT enfants. La boîte de 12 : 16 fr.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## SUPPOTONIC LAGOUTTE

### Composition :

	Adultes.	Enfants.
Méthylarsinate de strychnine.....	0,001	0
— soude .....	0,05	0,025
Nucléinate de soude.....	0,05	0,005
Glycérophosphate de soude .....	0,10	0,05
Beurre de cacao .....	3 gr.	2 gr.

Pour un suppositoire.

**Actions thérapeutiques.** — Nouvelle médication rectale agissant sûrement et aussi rapidement que par la voie hypodermique. Tonique et reconstituant énergiques de la nutrition. Anti-dépériteur, composé de produits solubles et par conséquent très vite absorbés par l'hémorroïdale inférieure.

**Indications.** — Rachitisme, Lymphatisme, Neurasthénie, Chlorose, Anémie, Cachexies chroniques, Phosphaturies, Convalescences, Faiblesses générales, Prétuberculose.

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire le soir au coucher. Faire usage de 3 boîtes en se reposant 8 jours entre chaque boîte.

Prix de la boîte de 9 suppositoires : 15 francs.

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>) (Rhône).

## SUR-BI-CAL

**Formule du D<sup>r</sup> Martin du Theil.**

**Forme.** — Cachets.

**Composition.** — Phosphate bicalcique, 0 gr. 50 ; Solution d'adrénaline au millième, 1 goutte pour 1 cachet.

**Propriétés.** — Particulièrement assimilable en raison de sa solubilité dans tous les acides faibles y compris les acides de fermentation.

**Indications.** — Toutes les indications des phosphates de chaux.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 cachets par jour au milieu des repas.

*Enfants* : 1 cachet par jour.

On peut aussi délayer le contenu du cachet dans un peu d'eau ou de lait.

**Laboratoires LACOMBE et Cie**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>)

## SURPARINE

### Formes :

Comprimés — Ampoules.

- 1 *comprimé* = chlorhydrate de la tétraéthoxybenzylisoquinoléine : 0 gr. 04;  
Bromométhylate d'homatropine :  
0 gr. 0015.
- 1 *ampoule* 2 cc. = chlorhydrate de la tétraéthoxybenzylisoquinoléine:  
0 gr. 04; bromométhylate d'homatropine : 0 gr. 0015.

### Indications :

Spasme du pylore, Ulcère stomacal,  
Vomissements d'origines diverses,  
Coliques, Cholélithiase, Cholécystite,  
Néphrolithiase, Asthme, Dysménorrhée.

### Doses :

- 1 à 2 comprimés 3 fois par jour;  
1 ou 2 ampoules par jour.

**P. BASUYAUX, Pharmacien**

94, rue Pasteur  
FONTENAY-S-BOIS (près PARIS).

## SURRASTHÉNINE

**Composition.** — La Surrasthénine est à base d'Exo-Surrénine Byla, de quinine, de nucléinates, d'hypophosphites et de glycérophosphates, dont les propriétés toniques et reconstituantes sont universellement connues.

**Indications thérapeutiques.** — La Surrasthénine est le véritable spécifique de l'asthénie et de toutes les asthénies consécutives aux maladies infectieuses. C'est, en un mot, un tonique puissant que vient renforcer l'action bienfaisante de l'Exo-Surrénine Byla.

**Posologie.** — De goût très agréable, la Surrasthénine se prend dans un peu d'eau, *au milieu des repas du matin et de midi*, à la dose de 2 ou 3 cuillerées à dessert par jour pour les adultes, et de 2 cuillerées à café pour les enfants.

**Les Etablissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## SYLCASE

**Silicium-Calcium.**

**Formule du Docteur CRETIN.**

Rachitisme, Décalcifications.

Fractures, Toutes maladies osseuses.

**Présentation.** — Comprimés, granulés, poudre.

**Posologie.** — 1 à 5 comprimés ou mesures par jour suivant l'âge.

Prix :

*Comprimés* : 15 francs.

*Granulé-poudre* : 20 francs.

**Produits chimiques du Maine.**

Laboratoires : 7, rue Saint-André

LE MANS (Sarthe).

## SYL CASE INJECTABLE

Traitement des fractures anciennes et récentes par la méthode silico-calcique du Docteur CRETIN. Le premier et le seul médicament qui permette le traitement rapide des fractures par injections *hypodermiques indolores*.

Réduction considérable de l'immobilisation. Consolidation extrêmement rapide.

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules de 3 cc.

**Posologie.** — 1 ampoule tous les 3 à 4 jours suivant les cas.

Consulter la notice.

Prix : 45 francs.

**Produits Chimiques du Maine.**

Laboratoires : 7, rue Saint-André — LE MANS.

---

## SYMPATHYL

**Chantereau.**

La première synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

**Forme.** — Comprimés.

**Indications principales.** — Emotivité, Irritabilité, Anxiété, Eréthisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires.

### **Composition :**

Extrait spécial de crataegus....	0,06
Extrait de boldo.....	0,01
Phénylméthylmalonylurée .....	0,01
Hexaméthylènetétramine .....	0,06
Peptone polyvalente.....	0,03

Pour 1 comprimé.

**Posologie.** — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

**Laboratoires du Sympathyl**

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).



## SYNCRINES CHOAY

**Nature.** — Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes glandulaires.

**Formes pharmaceutiques et posologie :**

*Cachets et Comprimés*, en tubes hermétiques :  
2 à 4 par jour.

*Ampoules* injectables, désalbuminées, stérilisées : 1 cc. tous les 2 jours.

**Nomenclature des principales formules :**

- 1..... Pluriglandulaire F.
- 1 *bis.*.. Pluriglandulaire M.
- 2..... Surréno-Hypophysaire.
- 3..... Thyro-Surréno-Hypophysaire.
- 3 *bis.*.. Thyro-Surréno-Ovariennne.
- 4..... Thyro-Ovariennne.
- 4 *bis.*.. Surréno-Ovariennne.
- 5..... Thyro-Orchitique.
- 6..... Hypophyso-Orchitique.
- 6 *bis.*.. Hypophyso-Ovariennne.
- 7..... Thyro-Hypophyso-Ovariennne.
- 8..... Pluriglandulaire digestive :  
PEPTOSTHÉNINE (Voir ce mot).
- 9..... Surréno-Hypophyso-Ovariennne.
- 10..... Placento-Mammaire.
- 11..... Ovaro-Mammaire.
- 12..... Spléno-Médullaire.

### Prix :

De 15 à 25 fr. la boîte de 24 à 30 cachets  
ou comprimés, suivant formule.

15 fr. la boîte de 6 ampoules.

### Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléphone : Auteuil 44-09 et 44-10.

## SYNERGYL VADAM

Stimulant et Leucocytogène.

**Formes.** — Ampoules et Granulé.

**Doses.** — Une ampoule tous les 2 jours (ou une cuillerée à café de granulé 2 fois par jour), chez tous les déprimés et convalescents.

**Composition.** — Nucléophosphate de soude et de chaux associé aux arsenicaux assimilables et à la strychnine (0,001 par ampoule).

Prix : Boîte 12 ampoules : 18 francs. — Boîte 200 gr. granulé : 15 francs.

Enregistré au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments sous les Nos 82-5 et 82-6.

Demander Echantillons et Litterature aux

**Laboratoires J. PLÉ**

**Docteur en Pharmacie**

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## SYNTHALINE B

Marque déposée

Médicament **antidiabétique « per os »**.

Dichlorhydrate de dodécaméthylène de guanidine.

**Forme.** — Flacons de 60 dragées à 0 gr. 005.

**Indications.** — Cas légers et moyens du diabète sucré.

**Contre-indications.** — Coma ou état pré-comateux, ainsi que diabète grave et avancé du jeune âge.

La *Synthaline* se complète avec l'Insuline et peut être employée concurremment soit pour diminuer les piqûres, soit pour renforcer l'action de l'Insuline.

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## **SYPHONÉOL**

Pilules de protoiodure Hg, arrhénal, Fer, Quinquina.

**Propriétés thérapeutiques.** — Cure d'entretien de la syphilis, Anémie, Asthénie, Action régulatrice sur le métabolisme. Cure préventive des néoplasmes (théorie de Pfeiffert). Paludisme. Ulcères variqueux.

**Posologie.** — 1, 2 ou 3 pilules par jour 1 heure avant le repas, midi et soir.

**Pharmacie BAUDE**  
**ST-AUBERT (Nord).**

---

## TABLETTES HOVA

(ou Hovalettes).

**Composition.** — Chaque tablette renferme *cinq centigrammes* d'extraits dialysés, dont un tiers de HOUBLON et deux tiers de VALÉRIANE.

**Propriétés.** — Sédation inoffensive et *progressive* du système nerveux, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

**Indications.** — *Toutes les affections d'origine nerveuse* : Surexcitation, Insomnie, Neurasthénie, Troubles de la ménopause. Se prescrit également aux enfants dont le sommeil est agité ; aux vieillards, pour combattre les battements de cœur et autres manifestations de l'artériosclérose.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 tablettes 3 fois par jour, aux deux repas et au moment de se coucher. Demi-dose pour les enfants.

**Laboratoire ZYMA**

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## TABLETTES PERROUD

La « Tablette Perroud » est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

**Composition.** — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

**Doses.** — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *Gastralgie*, *Hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la « Tablette Perroud » rendra toujours de réels services.

**Laboratoire PERROUD**

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON  
(anciennement, 7, rue des Archers)

## TABLETTES ZEVA

**Formule.** — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits secs d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola. Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

**Présentation.** — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr.03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

**Posologie.** — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois. (Aucune contre-indication.)

**Indications.** — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire H. CLUZEL**

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

## TABUROL MONAL

Dynamogène, Hématopoïétique, Leucocytogène.

**Trois formes.** — Ampoules, Dragées, Gouttes.

**Composition.** — Hémoglobine, manganèse, strychnine, fluor, méthylarsinate, glycérophosphate, acide nucléinique. Dans les ampoules, pas hémoglobine.

**Doses.** — 4 à 6 dragées par jour aux repas. Avaler sans croquer. — XV à XX gouttes avant les repas. — 1 ampoule chaque jour.

**Action.** — Stimule la nutrition cellulaire. Restaure les déficiences nerveuses. Reminéralise l'organisme.

**Indications.** — Etats anémiques, convalescences, troubles palustres, dépression nerveuse.

La boîte de 10 ampoules : 15 francs.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Le flacon de gouttes : 12 francs.

**Laboratoires MONAL et O<sup>ie</sup>**

6, rue Bridaine — PARIS.

# TACHYGASTRINE DUCLOY

Accélérateur physiologique des sécrétions gastriques totales.

**Forme.** — Liquide.

**Composition.** — Acide fumaro-protocétrarique-Albumoses-chlorures de sodium-magnésium calcium.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Eupeptique complet excitant des nerfs* gustatifs et sécrétoires par l'acide fumaro-protocétrarique amer et anti-nauséeux ; de la *sécrétion acide* par les alcalins choisis ; de la *sécrétion pepsique* par l'albumose.

**Indications.** — Toutes les insuffisances sécrétoires de l'estomac :

*Primitives* : Dyspepsies et gastrites qui s'accompagnent d'hypo-pepsie ou d'apepsie, d'hypochlorhydrie ou d'anachlorhydrie, d'achylie, atonie gastrique — cancer de l'estomac.

*Secondaires* : Intoxication cancéreuse quelle que soit la localisation du néoplasme ; — dyspepsie et anorexie des tuberculeux, des chloroanémiques, des névropathes, des enfants débilités ou rachitiques, des femmes enceintes, des brightiques anorexiques, des convalescents, des nourrices ; *diarrhées gastrogènes* des achyliques, des gastro-entérostomisés, des nourrissons ; — anorexie et dyspepsie des nourrissons.

**Contre-Indication.** — Hyperchlorhydries et hypersécrétions.

## Posologie :

*Adultes* : 2 à 4 cuill. à café par jour. On peut aller jusqu'à 6 cuill. à café par jour.

Prendre le médicament *dix minutes avant les repas* matin, midi et soir ou midi et soir seulement ; dans une demitasse à thé (50 à 60 cm.) d'eau bien chaude ou mieux de bouillon de viande ou de légumes non salé.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée sans inconvénients.

*Nourrissons* : V gouttes 2 à 3 minutes avant chaque tétée dans une cuillerée à café d'eau.

*Enfants* : De 5 à 12 ans accomplis ; VIII gouttes par année d'âge, 5 minutes avant les repas principaux.

A partir de 12 ans : comme chez l'adulte.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie  
ARQUES (Pas-de-Calais).

## TÆNIFUGE BARDET

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

**Composition.** — Préparation liquide à base d'Aspidium, Filix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

**Indications.** — Médication anthelminthique complète : Taenias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales et tous parasites intestinaux.

**Présentation.** — Dans la même boîte se trouvent : a) Le Taenifuge proprement dit ; b) Le Purgatif.

**Posologie.** — **Tænias.** — La veille, alimentation lactée. Absorber à jeun en 2 fois à 20 minutes d'intervalle le Taenifuge aux doses suivantes :

*Adultes* : la totalité du contenu du flacon ;

*Adolescents* de 15 à 20 ans : 8 à 10 cuillerées à café.

*Enfants* de 10 à 15 ans : 6 à 8 cuillerées à café.

*Enfants* de 3 à 10 ans : 2 à 6 cuillerées à café.

Une heure après, prendre le Purgatif mélangé à une infusion tiède, aux doses respectives suivantes : contenu du flacon, 4 à 5, 3 à 4, 1 à 3 cuillerées à café.

**Tous les autres vers.** — Pendant 4 à 5 jours consécutifs, donner le Tænifuge le matin à jeun aux doses suivantes :

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe ;

*Adolescents* de 12 à 20 ans : 1 cuillerée à dessert ;

*Enfants* de 3 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Le 5<sup>e</sup> ou 6<sup>e</sup> jour, administrer le Purgatif à jeun, aux doses ci-dessus. Renouveler le traitement, plusieurs fois s'il y a lieu, à intervalle de 10 jours maximum.

Formuler : « TÆNIFUGE BARDET ».

Echantillon et Littérature détaillée :

**Laboratoires BARDET**

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## **TÆNIFUGE DU D<sup>r</sup> JACQUÈME**

**Composition.** — Liquide en capsules à base d'Aspidium, Filix Mas et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

**Indications.** — Expulsion radicale du tænia.

**Avantages** — Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

**Mode d'emploi.** — Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

Effet : deux heures au maximum.

Prix : 20 francs.

---

**Laboratoires CHIARINI**

68, rue du Roi-René

**AIX-EN-PROVENCE,**



## TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D<sup>r</sup> E. DUHOURCAU

**Composition.** — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

**Indications.** — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

**Caractéristiques.** — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt du travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

**Mode d'emploi.** — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec aussi peu de liquide que possible. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

**Doses.** — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* au-dessous de 12 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 12 fr. 50.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 146-2

**Laboratoires du D<sup>r</sup> E. DUHOURCAU**

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).  
Anciennement : 10, rue de Turenne — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TÆNIFUGE KIRN

En capsules

*à base de filicine, principe actif de la fougère mâle  
dissous dans son huile grasse.*

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des tænicides, comme la pellatiérine. (Travaux de thèse de Kirn et Schmidt).

**Capsules Kirn.** — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

**Mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> Avant-veille, purgation ; 2<sup>o</sup> la veille, diète presque absolue (lait) ; 3<sup>o</sup> le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

*Enfants* : Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires.

Admis aux Assurances Sociales.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-56.

(Précéd. : 8, rue de la Source. — PARIS)

## **TÆNIFUGE LARIX** en cinq Capsules.

**Composition.** — Extraits de fougère mâle, calomel, éther et chloroforme.

**Mode d'emploi.** — Prendre les cinq capsules de 2 minutes en 2 minutes, puis 1/2 heure après, prendre 15 grammes de sulfate de soude ou 10 grammes d'eau-de-vie allemande. Pour les enfants, employer surtout le sulfate de soude.

### **Doses :**

Pour un *adulte* : les cinq capsules.  
Pour un *adolescent* : quatre capsules.  
Pour un *enfant*, à partir de 10 ans : 3 capsules.  
Très apprécié par le Corps médical.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires Félix ABADIE**

25, rue Thiers — **TARBES** (Hautes-Pyr.).

---

## **TAMAR INDIEN GRILLON**

**Laxatif végétal doux et agréable.**

**Présentation.** — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au sené; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

**Doses.** — Un bonbon le soir en se couchant.

*Enfants*: Un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : Boîte de 12 bonbons : 9 francs.

**Société du TAMAR INDIEN GRILLON**

13, rue Pavée — **PARIS (IV<sup>e</sup>)**.

## TAMARINE

Délicieuse confiture laxative à base de Casse muette et de Tamarin, infailible dans tous les cas de constipation et de stases intestinales.

### Posologie :

*Enfants* au-dessus de 5 ans : 1/2 cuillerée à café.

*Adultes* : 1/2 à 1 cuillerée à café à la fin du repas du soir.

**Laboratoire de la TAMARINE**

4, route de Médoc  
BORDEAUX-BOUSCAT

## TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

Le *Tampol « Roche »* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

**Mode d'emploi.** — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol « Roche »* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

N.-B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol « Roche »* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TANNO-CALCINE

**Médication reminéralisante.**

Gluconate de Ca, Phosphate de Ca. Extrait hépatique, Tannin purifié.

2 formules :

TANNO-CALCINE A contenant 0,05 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

TANNO-CALCINE B contenant 0,15 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

**Indications.** — Convalescence, Grippe, Surmenage, Tuberculose, Croissance, Lymphatisme, Adénopathie.

2 cachets par jour.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

62, Bd J.-Jaurès. — BOULOGNE-s-SEINE

Paris-Ouest. — Tél. : Auteuil 11-86.

(Précéd. : 8, rue de la Source. — PARIS).

## TANNURGYL

**du Docteur LE TANNEUR**

**Composition.** — Sel de Vanadium chloré.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique général puissant avec modification humorale profonde.

**Indications.** — Toutes les déchéances organiques. Les anémies graves, les convalescences pénibles, Les états cachectiques, arrête la phosphaturie, action très nette sur la colibacillurie.

**Forme et mode d'emploi :**

*Adultes* : LX à C gouttes par jour aux repas.

*Enfants* : demi-dose.

*Nourrissons* : quart de dose (dans le biberon).

**Renseignements médicaux :**

**Docteur LE TANNEUR**

87, avenue Borriglione — NICE (A.-M.).

## TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

**Forme.** — Cultures liquides.

**Composition.** — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assiègent l'individu continuellement.

**Indications.** — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites coli-bacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furonculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

**Posologie.** — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récive.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Prix de vente au public : 20 francs.

**Laboratoires MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

## TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur  
à faire dissoudre au moment de l'emploi.  
Conservation parfaite.

**Indications.** — Epilepsie, troubles névropathiques.

**Présentation.** — En boîtes de 30 tubes dosés à :  
0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr., 8 gr.

**Posologie.** — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour  
pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité,  
doit être pris chaque jour sans interruption jus-  
qu'à guérison.

**Mode d'emploi.** — Faire dissoudre le contenu  
d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en  
2 ou 3 fois dans les 24 heures.

### Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Téléph. : Lab. 16-72

## TAXOL

### Composition :

Poudre de muqueuses intesti- nales.....	0 gr. 05
Extrait biliaire.....	0 gr. 10
Agar-Agar .....	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 35.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur phy-  
siologique de l'intestin. Aucune accoutumance.  
Non toxique.

**Indications.** — Constipation, Entérite chronique,  
Entérocolite, Dermatoses.

**Doses et mode d'emploi.** — De 1 à 6 comprimés  
par jour. Commencer le traitement par deux  
comprimés avant ou après un des repas.  
Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet  
produit. Avaler sans mâcher.

Prix de vente au public : 12 francs.

### Laboratoires « LOBICA »

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## TEBEPHAGUINE FORNET

**Vaccin antituberculeux.**

**Principe actif.** — Bacilles de Koch isolés des affections tuberculeuses les plus diverses; dégraissés par le procédé FORNET, breveté en France et retenu par l'Institut Pasteur.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

**Posologie.** — 1 à 3 pilules par jour.

**Propriétés thérapeutiques.** — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la fièvre, des sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse. Augmentation du poids et des forces. Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Prix : 36 francs.

Vente et Echantillonnage :

**Laboratoire de Microbiologie**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Gutenberg. 03-45.

## TÉCARINE

Homocaféinate de sodium.

Diurétique déchlorurant.

Présente sur la théobromine l'avantage de ne pas provoquer de troubles gastriques ni de céphalée.

*Indications :*

**Toutes les indications de la Théobromine.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Voie buccale : 1 à 3 comprimés à 25 centigr. par 24 heures.

Voie hypodermique ou intramusculaire : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TÉGÉOL

### Antiprurigineux kératoplastique.

**Composition.** — Pommade répondant à la formule suivante :

Macération huileuse de fleurs de genêt..	1 gr.
Ochtyosulfate d'ammoniaque .....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	5 gr.
Vaseline	} Q. S. pour.....
Lanoline	
	30 gr.

**Action thérapeutique.** — Antiseptique, analgésique, vaso-constricteur, anti-prurigineux, cicatrisant, kératoplastique.

**Indications.** — Toutes les Dermatoses, Eczémas, amorphe, vésiculeux, séborrhéique, suintant chronique, Erythèmes, Impétigo, Dartres, Furunculose. Tous les prurits, Ulcère variqueux, Plaies atones, Brûlures, Gerçures des seins, Engelures, etc.

**Mode d'emploi.** — En applications locales avec ou sans pansements suivant les cas.

### Produits PASSEUR

11, rue de Clichy — PARIS. (Tél. : Trinité 23-84.)

## TENSORYL - D

### Médication hypotensive.

**Composition.** — Complexe végéto-minéral à base d'éléments hypotenseurs et régulateurs de l'appareil cardio-vasculaire, présenté en pilules glutinisées renfermant :

Silicate de soude.....	0,10
Nitrite de soude.....	} àà 0,05
Poudre de scille .....	
Extrait stab. Crataegus.....	} àà 0,03
— — Gui .....	
— — Muguet.....	

**Indications.** — Hypertension en général, Spasmes artériels, Angine de poitrine, Artério-sclérose et ses complications.

**Emploi.** — Une ou deux pilules avant chacun des trois repas pendant 10 jours par mois.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-3.

Prix : 15 fr. l'étui de 60 pilules.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS

**DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,**  
Docteur en Pharmacie.



**TERCODAL**

Traitement symptomatique des Toux, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Emphysème.

**Formule :**

Ephédrine .....	0,003
Terpine .....	0,10
Aconit (Extrait).....	0,001
Dionine.....	0,003

**Posologie :**

*Adultes* : Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour.

*Enfants* : à partir de 6 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS.

---

## TÉRÉBINE

**Spécifique des Suppurations et des Septicémies localisées.**

**Principe actif.** — Essence de térébenthine parfaitement rectifiée, mise sous forme colloïdale, et miscible à l'eau.

**Forme.** — Liquide. S'emploie en émulsions de 1 à 10 p. 100 dans de l'eau stérilisée ou bouillie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Leucogène très actif, la TEREbine exerce un puissant drainage leucocytaire et augmente la phagocytose.

Agit mieux et plus vite que les antiseptiques, sans mortifier les tissus.

Tarit les suppurations les plus rebelles ; active la cicatrisation.

Fluidifie l'expectoration. Guérit les catarrhes.

**Applications internes.** — En gouttes dans du lait chaud et dans des infusions.

Antiseptique des voies respiratoires et urinaires.

Anticatarrhal et antidiarrhéique.

### Applications externes :

**Chirurgie :** Pânsements ou lavages pour toutes suppurations à strepto, staphylo, pneumo... Plaies infectées, Sphacelées, Gangréneuses, Abscess, Anthrax, Furonculose, Ostéites, Ostéomyélites.

**Obstétrique :** Infection puerpérale (Injections intra-utérines).

**Gynécologie :** Leucorrhées, Suppurations post-abortionum et post-opératoires (injections et tamponnements).

**Dermatologie :** Suppurations, Impetigo, Eczéma microbien, Erysipèle, Ulcères variqueux (Compresses, pansements).

**Oto-Rhino-Laryngologie** — Ozène, Sinusites, Mastoïdites, Coryza, Toutes suppurations post-opératoires (lavages, pulvérisations, instillations, inhalations gargarismes).

**Ophthalmologie :** Blépharites et Conjonctivites purulentes. Toutes suppurations post-opératoires (Compresses, instillations).

**P. PLANCHE, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

1, boulevard de la Madeleine — MARSEILLE.

## TERGYL LAMO

**Spécialité dermatologique.**

### 1° POMMADE.

**Composition.** — Sulfo-Ichthyolate Amm., S/Galate de Bismuth, Oxyde de Titane, Onguent de Naphte, Chlor. de Mg., Huile Adrénalinée.

**Indications.** — La plupart des Eczémas, Acnés, Rougeurs des Nouveau-nés, Prurits, etc.

Prix au public : Petit tube : 6 francs.

Tube moyen : 10 francs. — Triple tube : 23 francs.

### 2° POUDRE (C. T. L.).

**Composition.** — Chlor. de Mg., Sulfo-Ichthyolate d'Amm., Extrait mou Hamamélis, Onguent de Naphte, Ceyssatite, Kaolin, Oxyde de Titane, etc.

**Indications.** — Complément de la pommade; mêmes indications thérapeutiques. Parfum léger.

Prix au public : la boîte : 6 francs.

### Laboratoires LAMO

26-28, rue Paul-de-Kock. — PARIS (XIX<sup>e</sup>)

---

## TERKAL MONAL

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Carbonate de gaïacol terpino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

**Dose.** — Quatre à six dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

**Action.** — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

**Indications.** — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Le flacon de 30 dragées : 10 francs.

**Laboratoires MONAL et C<sup>le</sup>**

6, rue Bridaine — PARIS.

# TEROZONE

## Térébenthine thérapeutique.

**Composition.** — Térébenthine riche en ozone.

**Propriétés thérapeutiques.** — Stimulant des fonctions glandulaires, modificateur des muqueuses bronchiques et urinaires, dissolvant des calculs biliaires, générateur d'énergie.

**Formes.** — Trois formes.

### TEROZONE T pour usage interne.

**Indications.** — 1° Affections respiratoires chroniques quelles qu'elles soient.

2° Diathèse arthritique dans toutes ses manifestations.

3° Affections génito-urinaires.

4° Aux troubles des glandes endocrines.

**Mode d'emploi.** — Tâter la susceptibilité stomacale de chaque malade en commençant par des petites quantités.

Prendre dans un peu d'eau froide sans sucre, immédiatement avant les deux principaux repas, le premier jour, V gouttes, augmenter d'une goutte par jour et par repas, jusqu'à XXX gouttes, puis redescendre d'une goutte par jour et par repas jusqu'à V gouttes. Se reposer 10 jours, puis recommencer de la même façon, jusqu'à résultat.

### TEROZONE U, pour usage externe.

En frictions, massages, fumigations.

**Indications.** — 1° Toutes les affections pulmonaires, aiguës ou chroniques.

2° Toutes les affections arthritiques.

3° Les périviscérites, les épiploïtes, les congestions utérines, les annexites (méthode de la compresse).

**Mode d'emploi.** — Les *frictions* et *massages* doivent être légers et d'une durée maxima de cinq minutes. Recouvrir ensuite d'une gutta-percha et d'un bandage.

Pour les *fumigations*, 1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante. En cas de cervicite ou de périviscérite, imprégner une compresse et l'appliquer sur la peau.

### TEROZONE G.

1° Usage gynécologique. Usage urologique. — Lavage des plaies.

2° Une cuillerée à soupe pour un litre d'eau tiède à 30°.

Quand la Blennorrhagie est moins intense, faire des instillations à la seringue uréthrale. Commencer à 1 cc. de TEROZONE G pour 9 cc. d'eau bouillante et finir à 2 cc.

Laboratoire Ch. BOUVELOT

Ancien interne des Hôpitaux de Paris,

Docteur en Pharmacie,

Ancien professeur de Chimie

62, rue d'Antibes — CANNES.

## TERPINE GONNON

**Présentation et composition.** — *Elixir* : Terpene dissoute dans l'alcool et sirop de Tolu (1 verre à liqueur = 0 gr. 20 de terpene).

*Pilules* : Terpene, 0 gr. 10 ; Codéine, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

*Pâte* : Terpene, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

*Pastilles* : Terpene 0 gr. 05 et Tolu.

**Propriétés thérapeutiques.** — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

**Posologie.** — *Elixir* : 2 à 4 verres à liqueur par jour.

*Pilules* : 4 à 6 capsules par jour.

*Pâte* : 15 à 20 morceaux par jour.

*Pastilles* : 8 à 10 pastilles par jour.

**Indications.** — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphysème. Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

*Elixir* : 20 fr. ; *Pilules*, 8 fr. ; *Pâte et pastilles*, 4 fr. 50.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

---

## TERPINE GRANULÉE BARON

**Composition.** — Terpene pure et benzoate de soude.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique des voies respiratoires, facilite l'expectoration et tarit les sécrétions bronchiques ; diurétique et antiseptique urinaire.

**Indications.** — Rhinites, Laryngo-Trachéites, bronchites aiguës, subaiguës, chroniques ; Catarrhe bronchitique des emphysémateux ; Bronchorrée ; Dilatation des bronches ; Coqueluche ; Cystites ; Infections urinaires, etc...

**Doses.** — 2 à 4 cuillerées mesures par jour. *Enfants* ; demi-dose.

### Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V°).

## TERPOXYL INTERNE

du Docteur Barinque.

Liquide générateur d'oxygène à l'état naissant  
au-dessus de 35° C.

**Composition.** — Solution alcoolique faible de Terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 0096 pour 100 gr.

**Propriétés.** — Anti-thermique, anti-toxique, tonique et stimulant.

**Indications.** — Toutes dépressions ; choc hémoclasique ou autres ; Pneumonie (régression fébrile en 24 heures). Toutes maladies infectieuses.

**Posologie.** — *Fièvre intense* : XV gouttes toutes les heures dans 1/4 verre d'eau sucrée ; espacer avec la régression fébrile.

**Tonique** : XV gouttes, quatre fois par jour.

Prix du flacon : 12 fr.

## TERPOXYL EXTERNE

du Docteur Barinque.

Cède son oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.  
Cicatrisant rapide. — Atoxique. — Non caustique.

**Composition.** — Solution alcoolique faible de terpènes et sesquiterpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 0192 pour 100 gr.

**Propriétés.** — Désinfectant et désodorisant parfait pour toutes plaies, même cancéreuses, cicatrisant rapide.

**Indications.** — Plaies, Ulcères variqueux, Gerçures des seins, Blennorrhagies, Affections de la peau, de la gorge, Angines, Coryzas, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc...

**Posologie.** — En solution de concentration croissante depuis 1/5 de Terpoxyd externe pour 4/5 d'eau bouillie ou distillée jusqu'à 1/2 ou pur suivant la sensibilité de la muqueuse traitée.

Prix du flacon : 16 fr.

## OVULES au TERPOXYL

du Docteur Barinque.

Antiseptiques - Cicatrisants - Non caustiques.

**Indications.** — Leucorrhée, Métrites, Salpingites, etc.

Prix de la boîte : 16 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI°).

Tél. Danton 49-39.

## TÉTRANITROL ROUSSEL

### Composition.

Comprimés de Tétranitrato d'Erythrol à  
1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

### Indications :

Hypertension : Angine de poitrine,  
asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

### Doses et mode d'emploi :

Laisser fondre les comprimés sur la langue  
(de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

### Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## THALASSOTONINE VADAM

Triade leucocytogène et tonique associée à l'action  
catalytique de l'Eau de Mer vraie.

### Formule :

Eau de mer vraie isotonique .....	5 cc.
Cadodylate de soude.....	5 centigr.
Sulfate de strychnine .....	1 milligr.
Nucléino-phosphoglycérato de soude..	10 centigr.

**Posologie.** — Une injection, indolore, intramusculaire tous les deux jours, ou chaque jour.

**Indications.** — Etats infectieux torpides, déficiences cellulaires, surmenages, neurasthénie, convalescences.

Prix au public : Boîte de 10 ampoules : 25 francs.  
Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des  
Médicaments sous le numéro 82-2.

Echantillon et littérature sur demande :

### Laboratoire J. PLÉ

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).  
J. PLÉ, Docteur en Pharmacie (Univ. de Paris).

## THAOLAXINE

(Laxatif-régime.)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

**Doses et mode d'emploi.** — Paillettes, 1 à 4 cuiller. à café à chaque repas ; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas ; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas ; granulé, 1 à 2 cuiller. à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

**Propriétés thérapeutiques.** — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

**Indications.** — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires DURET et RÉMY**  
et du Docteur Pierre **ROLLAND**  
ASNIÈRES (Seine).

## THEBAIL

(Opium essentiel.)

**Propriétés.** — Le *Thébaïl* (opium essentiel), qui exclut de sa composition les alcaloïdes convulsivants et stupéfiants de l'opium et qui n'en conserve que les alcaloïdes soporifiques et calmants, donne la puissance maxima de l'opium, avec toutes les efficacités pacificatrices que l'on attend de ce précieux agent. Enfin son activité physiologique est rigoureusement dosée *in vivo*.

**Formes thérapeutiques.** — Le *Thébaïl* est présenté sous 2 formes :

1<sup>o</sup> En ampoules isovisqueuses indolores dosant par cc. :

Thébaïl .....	2 cgr.
équivalent à { morphine .....	1 —
{ extrait d'opium .....	5 —

2<sup>o</sup> En suppositoires dosant :

Thébaïl .....	2 cgr.
---------------	--------

**Posologie pour les adultes :**

Ampoules.....	1 à 2 par 24 heures.	Prix : 20 fr.
Suppositoires.....	1 — —	15 fr.

Dépôt : **Laboratoires NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS



## THÉINOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-9.

**Forme.** — Elixir.

**Composition.** — Théine en combinaison salicylique, Salicylate d'Antipyrine.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Euphorique. — *Antidépresseur*. — Analgésique. — Régulateur des fonctions nerveuses. — Tonique circulatoire.

**Indications.** — Migraines. — Névralgies. — Douleurs rhumatoïdes. — Crises gastro-intestinales. — Dysménorrhées.

**Mode d'emploi.** — Deux cuillerées à dessert à une heure d'intervalle l'une de l'autre.  
Le flacon : 14 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## THÉISINE DUBAT

*Granulé de Théobromine et Extrait de maïs.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

**Indications.** — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorenales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

**Doses.** — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

Cuillerée à café =  $\begin{cases} 0 \text{ gr. } 25 \text{ théobromine pure.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ extrait de maïs.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ phosphate de soude.} \end{cases}$

Prix : 14 francs.

Echantillons sur demande

**LABORATOIRE DU D<sup>r</sup> DUBAT**

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

## THEMSALINE

**Composition.** — La Themsaline préparée d'après les travaux du Dr Jentzer, de Genève (Voir *Traitement biologique des infections*, Masson, éditeur), est un mélange fractionné et rectifié d'essences, de résine élémi, de baume du Pérou et de thymol.

**Propriétés.** — Agit comme antiseptique, antitoxique, analgésique, sédatif, leucogène et tonique. Attaque l'infection *étiologiquement* et non symptomatiquement comme tous les narcotiques.

**Indications.** — *Toutes les infections aiguës* : grippe et infections pyogènes, érysipèle, angines, annexites, septicémies, anthrax, phlegmons, péritonites, fistules d'origine infectieuse, plaies infectées. *Contre-indications* : éviter les doses fortes dans la pneumonie, la broncho-pneumonie, les néphrites.

**Mode d'emploi.** — En injections intraveineuses, pratiquées *très lentement* (durée 10 minutes environ), avec une seringue à tuberculine et, de préférence, avec l'aiguille spéciale Jentzer : 6/10 cmc. chez l'adulte et 3/10 cmc chez l'enfant. Une injection par jour, jusqu'à guérison ou apyrexie.

**Laboratoire ZYMA**

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

**Action.** — Diurétique puissant.

**Indications.** — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

**Formes.** — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50.

Prix au public : 12 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé.

**Prop. thé.** — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais est dépourvue des inconvénients de celle-ci ; son activité se manifeste à des doses 5 fois moindres. Elle agit quand la théobromine est inefficace et provoque l'excrétion de l'urée et des chlorures.

**Indications.** — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

**Formes.** — 1° Solution. Dose : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée.

Une cuillerée contient 0,25 cgr. de théobrominate de lithium.

2° Gouttes. — Dose : 1 cuiller-mesure ou LX gouttes, une à quatre fois par jour.

LX gouttes ou une cuiller-mesure contiennent 0,50 gr. de théobrominate de lithium.

3° Comprimés. — Dose : 2 à 8 par jour.

2 comprimés contiennent 0,5 cgr. de théobrominate de lithium.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle sous les nos 1-5 et 1-7.

**Laboratoires DUMESNIL**  
10, rue du Plâtre — PARIS.

---

## THÉOBRYL « ROCHE »

(Théobromine injectable).

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigoureux, Colombiès, Crampon, etc.).

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

### THÉOBRYL « ROCHE » AMPOULES

Chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 3 fois par jour.

### THÉOBRYL « ROCHE » GOUTTES

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

Adultes : dose moyenne utile, X gouttes 4 à 8 fois par jour.

Enfants : III gouttes 2 à 6 fois par jour.

### Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## THÉOCALCIODE

**Composition.** — Association de Théobrominate de Lithium, Salicylate de Chaux, Iode combiné (peptones).

Comprimés contenant :

Théobrominate de Lithium.....	0 gr. 15
Salicylate de Chaux.....	0 gr. 25
Iode combiné.....	0 gr. 002

**Indications.** — Diurétique idéal des néphrites avec rétention sèche et des grands œdèmes cardiaques. Médicament de fond de la Dyspnée cardiaque, de l'Asthme, des Scléroses organiques, de l'Obésité, des Hyperthyroïdiens, des Etats endocriniens complexes.

**Présentation.** — Boîte contenant 40 Comprimés.

**Posologie.** — Six à huit Comprimés par jour comme diurétique. Quatre à six Comprimés par jour, aux repas, dix jours de suite, chaque mois, pour les affections chroniques.

**Laboratoire PERRIER**

17 bis, boulevard Rochechouart — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Trudaine 03-01.

## THÉOSALVOSE

**Composition.** — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

**Propriétés.** — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

**Indications.** — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

**Moded'emploi.** — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

**Formes.** — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Prix : 15 francs et 17 fr. 50.

**Laboratoires André GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

# THÉOVÉRINE LALEUF

(Dragées)

**Composition.** — Chaque dragée contient très exactement :

Théobromine pure .....	0,15
Papavérine chlorhydrate.....	0,01

**Propriétés et Indications thérapeutiques.** — Antispasmodique et hypotenseur remarquable. Grâce à son action vaso-régulatrice et dilatatrice, la THÉOVÉRINE rétablit une circulation normale et évite le retour des crises angineuses.

La THÉOVÉRINE présente une action favorable à l'augmentation de la *Diurèse*.

Spécialement indiquée dans :

Angine de poitrine (traitement préventif).

Artério-sclérose.

Insuffisance aortique.

C'est le médicament par excellence des Cardio-Rénaux.

**Doses et Mode d'emploi.** — De 3 à 6 dragées par jour, suivant les indications du médecin traitant. Maximum : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

# THEOXANTHINE

Association Théobromine crist. pure-Phosphate disodique en comprimés *glutinisés*.

Le complexe Théobromine-Phosphate disodique (THEOXANTHINE) constitue la forme de choix pour l'administration de la Théobromine. Mais cette combinaison assez instable est en partie dissociée par l'acidité du suc gastrique. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons préparé la THEOXANTHINE sous forme de comprimés glutinisés. L'enrobage du gluten se désagrègeant seulement dans le duodénum, libère le principe actif en milieu alcalin où l'association Théobromine-Phosphate disodique est beaucoup plus stable. On obtient ainsi une absorption lente et continue de la Théobromine au cours de la traversée intestinale. Il en résulte une activité sensiblement accrue et une tolérance parfaite.

**Composition :** { Théobromine cristallisée pure..... 0 gr. 25  
Phosphate disodique..... 0 gr. 10  
Excipient Q. S. pour 1 comprimé glutinisé.

**Indications.** — Toutes celles de la Théobromine. Activité plus grande à dose moindre. Tolérance parfaite.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par jour.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires DEGLAUDE**

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>). — Tél. : Littré 31-85.

Belgique :

Agent général : **L. PRUNIERES**  
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

## THERMOCÉDONE

**Analgésique et antithermique.**

**Le Thermocédone**, en gouttes et en suppositoires, constitue un traitement d'attaque et d'entretien de toutes les algies et de toutes les fièvres.

**Le Thermocédone** est plus actif que les cachets d'antipyrine et pyramidon, et sans aucune action néfaste sur le système gastro-intestinal. Il convient aux enfants, aux adultes, aux vieillards et aux estomacs les plus délicats.

### Composition des suppositoires Thermocédone :

Chlohydrate d'amyléine. ....	1 cgr.	
Analgésine ..	75 cgr.	Excipient :
Diméthyl amino antipyrine.....	25 cgr.	Q. S.
Extrait de jusquiame stab.....	2 cgr.	

### Composition des gouttes Thermocédone :

Analgésine ..	6 gr.	Excipient :
Diméthyl amino.....	4 gr.	Q. S.

### Posologie :

Suppositoires : *Adultes* : 1 à 2 par jour.

*Enfants* : à partir de 13 ans ; 1 par jour.

Gouttes : *Enfants* : 10 à 12 par jour et par année d'âge.

*Adultes* : 120 à 240 par jour.

Sur prescription médicale seulement.

Prix au public. Suppositoires : Boîte de 4 : 9 fr. 50. Boîte de 8 : 15 fr. 50

Gouttes : le flacon avec compte-gouttes : 15 fr. 50.

**Laboratoire PERICHON**

11, rue Lepic, 11 — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

**Indications thérapeutiques.** — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

**Thigénol « Roche »** pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

### Toutes les affections gynécologiques :

**Thigénol « Roche »** pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

**Ovules « Roche »** au **Thigénol** à 30 p. 100 (voir page spéciale).

**Tampol « Roche »** pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## THIOCITRAN THEVENOT

Granulé soluble.

Soufre — Magnésium.

**Composition.** — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

**Propriétés.** — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

**Indications.** — Affections du foie et des voies biliaires. Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants*: 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr.: 18 francs.

Laboratoire **THEVENOT** — DIJON.

---



## **THIOLCOL « ROCHE »**

Dérivé du gaïacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 ctgr. de gaïacol cristallisé.

### **Doses et mode d'emploi :**

#### *SIROP « ROCHE » au Thiocol.*

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol « Roche »)

*Adultes* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

*Enfants* : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

#### *CACHETS « ROCHE » de Thiocol.*

(1 cachet = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 6 cachets par jour

#### *COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.*

(1 comprimé = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 6 comprimés par jour.

### **Propriétés thérapeutiques :**

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

### **Indications thérapeutiques :**

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## THIOPHYL

**Indications.** — Traitement interne de la *furonculose* et de *toutes les dermatoses à staphylocoques* : acné, anthrax, orgelets, panaris, abcès de l'aisselle et du sein.

**Posologie.** — 3 à 9 pilules par jour en doses régulières et progressives (voir prospectus.)

**Composition.** — Sulfures complexes, ions calcium et charbon activé.

**Propriétés.** — Disparition rapide de la douleur et généralement régression des phénomènes inflammatoires dès le 3<sup>e</sup> jour.

Le flacon de 100 pilules : 20 francs.

Echantillons gratuits :

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 76-85.

---

## THIORINE

(Voir Sulfo-Thiorine).

## THIOSOTE

**Lambiotte Frères.**

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

**Propriétés thérapeutiques.** — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications.** — Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 4 cuillerées à dessert par jour.

*Enfants* : A partir de 3 ans (4 cuillerées à café par jour), à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

*Nourrissons* : XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS.

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## THIO-TERPINE DALIN

Médication des voies respiratoires.

**Composition.** — Sulfogaiacololate de potasse associé à la terpine avec benzoate de soude et codéine.

### Présentation et doses :

*Cachets* : 2 à 3 cachets par jour (un cachet = 0,20 sulfog. potasse, 0,10 terpine, 0,007 codéine).

*Elixir* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour (une cuillerée = 0,20 sulfog. potasse, 0,10 terpine, 0,007 codéine).

*Granulés* : 2 à 4 cuillerées à café par jour (une cuillerée à café = 0,10 sulfog. potasse, 0,05 terpine).

La forme *Granulée* ne contient pas de codéine.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections des voies respiratoires. Antisepsie broncho-pulmonaire. Tuberculose. Laryngites. Asthme. Coqueluche, etc...

**Laboratoires DALIN**

R. BOITAS et C<sup>ie</sup>

1, rue de la Martinière — LYON.

# THORIX (THORIUM X RHEMDA)

En injection hebdomadaire sous-cutanée ou intramusculaire indolore.

## Ses indications. Sa posologie.

*Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Sciatique, Psoriasis* : 8 à 10 piqûres consécutives à raison d'une par semaine, activité augmentant progressivement de 100 à 300 microgrammes, par 50 microgrammes, ne pas dépasser l'activité 300.

*Leucémie, Lymphadénie, Fibromes, Tumeurs, Néoplasmes* : 5 piqûres consécutives, à raison d'une par semaine. 2 à 400, 1 à 450, 2 à 500 microgrammes.

*Psychoses* : 3 piqûres hebdomadaires : 500, 600, 700 microgrammes. Ampoules préparatoires : 250 microgrammes.

Prix de vente au public :		mercredi	jeudi
25 micros.....		5 »	6 »
50 — .....		10 »	12 »
75 — .....		15 »	18 »
100 — .....		20 »	20 »
150 — .....		22 50	27 »
200 — .....		30 »	36 »
250 — .....		37 50	45 »
300 — .....		45 »	54 »
400 — .....		60 »	72 »
450 — .....		67 50	81 »
500 — .....		75 »	90 »
600 — .....		90 »	108 »
700 — .....		105 »	126 »
1 000 — .....		150 »	180 »

Remise au Corps médical : 30 %.

Les ampoules sont livrées *franco* domicile du client.

Le THORIX se prépare le mardi ; il est donc indispensable de passer les commandes à notre Usine (51, rue d'Alsace, à Courbevoie. Tél. : Wagram 58-89) le lundi au plus tard.

Les ampoules sont livrées le mercredi à Paris, banlieue et départements voisins et le jeudi dans les départements éloignés. Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de Bromure de Radium.

**Laboratoires RHEMDA**

**S. MOGAN, Pharmacien**

17, rue d'Hauteville — PARIS (X<sup>e</sup>).

## THOROXYL

Antiseptique intestinal - antidiarrhéique  
non constipant.

**Pharmacologie.** — A base de terres rares, bactéricide et favorisant l'action des sucs digestifs.

**Indications.** — Tous les états diarrhéiques du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Tous les syndromes infectieux à point de départ intestinal (colibacillurie, etc.).

**Posologie.** — Aucune contre-indication. Aucune toxicité. 6 à 10 comprimés pour l'adulte ; 2 à 6 comprimés pour l'enfant et le nourrisson.

Prix au public : 12 francs.

**Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD**  
Docteur ès sciences.

Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine  
de Paris.

40, rue de Bellechasse — PARIS.

Tél. : Littré 97-95.

---

## THYMO-MENTHOL EUPNIQUE BELHOMME

**Indications.** — Infections du nez, de la gorge, des bronches, des poumons et des organes qui en dépendent. Pré-tuberculose.

Tarit toutes suppurations de l'appareil respiratoire.

**Doses.** — 3 à 4 cuill. à café par 1/2 litre d'eau bouillante en inhalations.

Pour combattre la contagion : 2 cuill. à soupe dans de l'eau portée à l'ébullition dans la chambre.

**Laboratoire BELHOMME**

2, rue Tiron — 13, rue de Rivoli,  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

*Ampoules* : (boîtes de 6) une ampoule de 1 cc. = 1 milligr. de thyroxine.

*Comprimés* (flacons de 30) : un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

*Solution* (flacons de 15 cc.) : 1 cc. = 2 milligr. de thyroxine.

### Indications :

Obésité générale, Myxoédèmes, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

### Modes d'emploi et doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés ou X à XV gouttes par jour et plus.

Voie intramusculaire : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TIODINE COGNET

$C^6S\ N^2H^{13}I$

**Propriétés.** — Réalise l'Association *Iodé-soufre*. Médicament organo-iodique soufré. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications. **L'Antiscléreux.**

**Composition.** — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %) avec la thiosinamine.

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et du soufre, ensemble ou séparément. Toutes scléroses. Hypertension. **Rhumatisme chronique.** Tabès. Scléroses médullaires. Asthme. Emphysème. Syphilis. Obésité, etc.

**Formes et posologie.** — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 2 à 5 par jour. *Enfants* : 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, sous-cutanée ou intraveineuse).

Prix au public : Pilules — Le flacon : 13 fr.

Ampoules — La boîte : 15 fr.

**Laboratoires des Produits COGNET**

Armingeat et C<sup>ie</sup>

43, rue de Saintonge — PARIS (III<sup>e</sup>).

## TOCHLORINE

Para-toluène-sulfo-chloramide sodée.

Action antiseptique durable, par mise en liberté progressive d'hypochlorite de soude (principe de la solution de Dakin).

*Indications :*

**Antisepsie (chirurgie générale et spécialités).**  
**Purification des eaux de boisson.**

*Posologie :*

*Chirurgie générale* : Solution aqueuse à 2 p. 100.

*Urologie* : Solut. de 0,10 à 0,50 p. 100.

*Gynécologie* : Sol. de 0,5 à 2 p. 100.

*Stomatologie* : Solut. à 1 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

21, rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TONAX

**Tonique général (sans strychnine).  
Comprimés dragéifiés, demi-friables.**

### Composition :

Méthylarsinate de soude.....	0 gr. 02
Carbonate de manganèse.....	0 gr. 05
Phosphate de chaux.....	0 gr. 20
Phosphate de magnésie.....	0 gr. 10

**Posologie.** — Pour 1 comprimé.

*Adultes* : 2 à 3 par jour.

*Enfants* : 1/2 à 2 par jour suivant âge.

Le comprimé peut s'avaler, se mastiquer, ou s'écraser en poudre.

**Indications.** — Toutes les fatigues, Convalescences, Asthénies, Dyspepsies nerveuses, Amaigrissement, Pertes d'appétit, Etats pré tuberculeux, Tuberculeux.

Prix : 16 francs.

(2 à 3 semaines de traitement.)

**A. LYONS, Pharmacien**

30, rue Monge — PARIS (V<sup>e</sup>).

## TONICALCINE

**Association Magnésium-Calcium.**

1 gr. (XL gouttes)  $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 25 \text{ CaCl}^2. \\ 0 \text{ gr. } 10 \text{ MgCl}^2. \end{array} \right.$

**Forme.** — Liquide.

**Indications.** — Tonique général, hémostatique, antialbuminurique, régulateur de la sécrétion biliaire, etc...

**Doses.** — 1<sup>o</sup> *Adultes* : a) Comme tonique, régulateur biliaire, etc... 1 cuillerée à café par jour en 1 seule fois, avant le repas de midi.

b) Comme hémostatique : De 1 à 5 cuillerées à café par jour.

2<sup>o</sup> *Enfants* : De X à XX gouttes midi et soir suivant l'âge.

Prix : 15 francs.

**G. MARTINIE, Pharmacien**

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

37, avenue de l'Écho — SAINT-MAUR (Seine).



## TONICARDINE GONNON

### Composition :

	Par granule.
Adonidine .....	0 gr. 002
Convallamarine.....	0 gr. 02
Extrait de Strophantus.....	0 gr. 001
Extrait de Scille.....	0 gr. 004

### Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

### Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

### Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine.

Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

### Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas.

Prix : 18 francs.

---

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## TONIGÈNE

### Composition :

Acide digallique .....	0 gr. 40
Acide phosphorique.....	1 gr. 70
Calcium et manganèse.....	Q. S. pour saturer
Iode .....	0 gr. 25
Sirop d'orange et infusion de noyer .....	Q. S. pour 100 gr.

**Forme.** — Préparation édulcorée, évite le dégoût produit par les liquides trop sirupeux. Excite l'appétit, Ne constipe pas.

**Indications.** — Trouble de croissance, Amaigrissement, Phosphaturie, Asthénie, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Anémie, Convalescence, Grossesse, Suite de couches, Allaitement, etc.

**Doses.** — 1 à 4 ans : 1 cuillerée à café ; 4 à 10 ans : 1 cuillerée à dessert ; au-dessus : 1 cuillerée à potage.

**Mode d'emploi.** — Le TONIGÈNE se prend pur au début des repas de midi et du soir. Il s'administre été, comme hiver, aux enfants et adultes.

**Laboratoires Louis LECOQ**

11, rue Eugène-Flachat — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine .....	1 milligr.
Cacodylate de soude .....	0,05
Glycérophosph. soude (Cod. 1908).	0,20
Eau de mer diluée .....	5 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

**Indications.** — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entériques, Tuberculose.*

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. Chevrematte-90-Paris.

## TONIMALT MONT BLANC

**Composition et caractéristiques.** — Aliment tonique et reconstituant, à la fois complet, léger, fortifiant et de goût agréable. Il renferme : *du malt ou orge germé* produit riche en matières minérales, en substances protéiques ou azotées et en vitamines; *du lait des Alpes de Savoie*, dont la qualité est journellement contrôlée; *du miel et du sucre blanc* substances riches en hydrates de carbone, et enfin *du cacao pur* destiné à l'aromatiser.

**Propriétés et indications.** — Bien digéré, même par les estomacs les plus délicats, il convient à tous les âges et est spécialement recommandé : *aux enfants et aux adolescents*, qui ont besoin d'une alimentation saine et fortifiante; *aux jeunes mères* auxquelles il apporte le supplément de sels minéraux nécessaires à la bonne évolution de la grossesse. Au cours de l'allaitement, il augmente et améliore la sécrétion lactée; *aux sportifs et aux intellectuels* auxquels il permet de fournir un effort prolongé; *aux vieillards* dont les voies digestives doivent être ménagées; *aux malades, convalescents, surmenés, débilités*, chez lesquels il augmente la résistance physique, abrège les convalescences et rétablit les forces.

**Posologie.** — Peut être consommé soit *pur*, soit de préférence *délayé* dans du lait, de l'eau, du thé ou du café, en proportions variables suivant le goût de chacun.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc de 500 grammes net.

**COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT**

RUMILLY (Haute-Savoie).

## TONIQUE GONNON

Aux Phosphoglycérates de soude, chaux et potasse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Assimilation parfaite et certaine du phosphore, stimulant de l'appareil nerveux, il accélère la nutrition de tous les organes.

**Indications.** — Anémie, convalescence, neurasthénie, grossesse, médication infantile par excellence.

**Forme et Posologie :**

*Vin et sirop* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

*Granulé* : 2 à 4 cuill. à café par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Demi-dose pour les enfants.

**Prix :**

*Vin et Sirop* : 12 francs.

*Granulé* : 9 francs.

**Produits GONNON**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## **TONIQUE « ROCHE »**

Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale.

Goût très agréable. Efficacité certaine:

### **Propriétés thérapeutiques :**

Propriétés classiques de ses constituants : Acide phosphorique, Arsyène, Strychnine, Kola, complétées et renforcées par un catalyseur de choix : le Manganèse.

### **Indications :**

Tous surmenages, Asthénies, Neurasthénie, Anémies, Prétuberculose, Convalescences, Adénopathies, etc.

### **Mode d'emploi et doses :**

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

*Enfants* (de 8 à 15 ans) : demi-doses.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

10, rue Crillon — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TONIVEININE

**Médication spécifique des affections veineuses.**

**Composition.** — Association de *Sylibum marianum*, galbules de *Cupressus*, *Echinops viscosus*.

**Avantages.** — Effets stimulants sur les fibres lisses des veines, vaso-constricteurs et hémostatiques. Légère excitation de la sécrétion biliaire. Action générale sur la circulation veineuse.

**Indications.** — Varices, Phlébites, Troubles de la puberté et de la ménopause, Hémorroïdes.

**Posologie.** — XX à XLV gouttes matin et soir; X gouttes dans la grossesse.

Dès que les symptômes pénibles sont amendés, le Docteur prescrira les doses diminuées 20 jours par mois.

**Laboratoires BLANCHOT**

15, avenue du Parc-Montsouris — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
Echantillons et littérature sur demande.

## TONUCLYL

**Elixir toni-reconstituant**

à l'acide nucléinique strychnophospharsiné et à la kola.

**Composition :**

Arrhénal .....	0,01
Acide nucléinique.....	0,05
Phosphate de soude desséché.....	0,05
Gouttes amères de Baumé.....	0,05
Extrait fluide de kola.....	0,25
Alcoolat de Garus. ....	0,50
Elixir au vin de Grenache doré.....	Q. S. pour 15 cc.

**Propriétés.** — Stimulant énergique très apéritif, possédant une saveur des plus agréables.

**Indications.** — Fatigue, Anémie, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Inappétence, Tuberculose, Cachexie, Amaigrissement, Lymphatisme, Scrofule.

**Posologie :**

**Enfants :** 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

**Adolescents :** 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

**Adultes :** 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

**Présentation** soignée en flacon de 250 cc. au prix de 15 francs.

**Préparation** exécutée aux :

**Laboratoires MEUNIER, Pharmacien,**  
Lauréat 1<sup>er</sup> prix de la Faculté de Montpellier  
**MONTMARSAULT (Allier).**

## TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de *granulé* avant chaque repas.

*Injectable* : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours ou tous les deux jours en injection intramusculaire profonde.

**Indications.** — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

*Fortifie sans provoquer d'excitation.*

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

## TORIGYRE LAMO

Spécialité antisiphilitique.

**Sirop.**

Solution de *bi-iodure Hg*, pratiquement non iodurée, tonique et reconstituante par un complexe ; *tanno-phosphato-arséno-magnésien*.

Syphilis et tous états pathologiques évoluant sur terrain *hérédo-spécifique*.

**Doses efficaces par jour :**

*Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café.

*Nourrissons* : 1/3 à 1 cuillerée à café, dans infusion ou lait.

**Dragées.**

Mêmes propriétés que le sirop. 1 dragée = 1 cuillerée à café.

**Doses efficaces par jour :**

*Adultes* : 3 à 12 dragées.

*Enfants* : 1 à 3 dragées (avalier sans croquer avec eau, infusion ou lait).

**Prix au public :**

Sirop : 18 francs. — Dragées : 18 francs.

**Laboratoires LAMO**

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## TORITANE LAMO

Spécialité antisyphilitique.

### 1° SIROP :

**Principe du Sirop de Gibert, Arséniate de Soude et Biphosphate de Calcium ; Excipient agréable, Traitement dissimulé, présenté comme dépuratif polyvalent.**

**Doses efficaces par jour. — Adultes :** 1 à 4 cuillerées à soupe. — **Enfants :** 1 à 3 cuillerées à café. — **Nourrissons :** 1/3 à 1 cuillerée à café (dans une infusion ou du lait).

### 2° DRAGÉES :

Mêmes propriétés que le sirop. — 1 *dragée* = 1 cuillerée à café.

**Doses efficaces par jour. — Adultes :** 3 à 12 dragées — **Enfants :** 1 à 3 dragées (avaler sans croquer avec eau, infusion ou lait).

Prix au public :

Sirop : 18 francs. — Dragées : 18 francs.

**Laboratoires LAMO**

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## TORITANOL LAMO

### 1° SIROP :

Iodures simples, très purs (potassium, sodium, str., Mg.). Goût parfait.

Lymphatisme, Goitre, Sclérose, Mycose, etc.

**Doses efficaces par jour. — Adultes :** 1 à 4 cuillerées à soupe. — **Enfants :** 1 à 3 cuillerées à café. — **Nourrissons :** 1/3 à 1 cuillerée à café (dans infusion ou lait).

### 2° DRAGÉES :

Mêmes propriétés que le sirop. — 1 *dragée* = 1 cuillerée à café.

**Doses efficaces par jour. — Adultes :** 3 à 12 dragées. — **Enfants :** 1 à 3 dragées (avaler sans croquer avec eau ou infusion).

Prix au public :

Sirop : 18 francs. — Dragées : 18 francs.

**Laboratoires LAMO**

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique  
des Reconstituants.

**Forme.** — Elixir.

**Action.** — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

**Indications.** — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie, etc.

**Composition.** — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal).....	0.05
Manganèse (sulfate).....	0.0375
Phosphate de soude.....	0.50
Acide phosphorique officinal....	0.25
Méthylarsinate de soude.....	0.015
Extrait de quinquina.....	0.25
Teinture de noix vomique.....	0.25
Teinture de coca.....	1.25
Extrait fluide de kola.....	0.32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle, complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

*Adolescents* (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

*Enfants* (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuiller à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires B. C. L.**

**M. BERGER**

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III<sup>e</sup>) — et ses succursales.



## TOT'HAMÉLIS

**Chantereau.**

**Composition.** — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

**Indications.** — Stases veineuses, Varices, Hémorroïdes. Etats congestifs, Hypertension.

**Posologie.** — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (Hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

**Laboratoires CHANTEREAU**

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## TOURANYL

**Composition.** — Dionine, Sulfogaïacolate K, Benzoate Na, Extrait Marubbe, Amidopyrine, Grindelia, Aconit.

*Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

12 à 16 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 10 francs (10 à 15 jours de traitement).

**Propriétés.** — Sédatif, Expectorant, Modificateur des sécrétions, Antispasmodique, Asepsie des voies respiratoires.

**Indications.** — Trachéobronchites aiguës, Bronchites chroniques, Toux spasmodiques, Broncho-pneumonie, Emphysème.

**Laboratoire P. BASUYAUX**

94, rue Pasteur

FONTENAY-S.-BOIS (Seine).

---

## TRAPHÉINE

**Indications.** — Puissant tonique : action rapide dans tous les cas de convalescence, anémies, pré-tuberculose, états précancéreux.

**Forme.** — Poudre agréable au goût, à diluer dans un demi-verre d'eau.

**Composition.** — Association synergique : Acide phosphorique-Kola caféinée, en milieu marin total, y compris chlorure de magnésium.

### Posologie :

*Adultes* : Deux fois par jour avant les principaux repas, une cuillerée à soupe dans un demi-verre d'eau ordinaire.

*Enfants* : Deux cuillerées à café de la même façon, suivant avis du médecin.

Aucune contre-indication.

**Laboratoires S. I. C. A.**

**R. MICHY, Pharmacien.**

13, rue Beudant — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Wagram 75-75.

## TRÉPARSOL

Acide formyl-méta-amino-  
para oxyphénylarsinique.

### Indications :

*Syphilis*, à tous les âges (nourrissons, enfants, adultes), et à toutes les périodes de la maladie (Hérédo-Syphilis, Syphilis primaire, secondaire, tertiaire, Para-Syphilis).

*Dysenterie amibienne*. Le Tréparsol est un véritable spécifique de cette affection, qu'il guérit en détruisant les Amibes et les Kystes amibiens.

*Protozooses intestinales, Diarrhée des Tuberculeux, entéro-colites diverses* (d'origine parasitaire ou infectieuse).

*Pian et toutes Spirochétoses* : Angine fusospirillaire de Vincent, etc.

### Présentation :

Tubes de 30 comprimés dosés à 0,25  
(dosage adultes). Prix : 22 fr.

Tubes de 40 comprimés dosés à 0,10  
(dosage enfants). Prix : 13 fr. 20.

Tubes de 60 comprimés dosés à 0,02  
(dosage nourrissons). Prix : 11 fr.

### Posologie :

*Adultes* : 1 à 4 comprimés par jour.

*Enfants* : 0,01 à 0,02 cg. par jour et par kilog.

### Mode d'emploi :

Traitement *discontinu* (3 à 4 jours consécutifs par semaine), et *progressif* (commencer par des doses faibles et augmenter de semaine en semaine).

Dépôt : Pharmacie Générale.

LECOQ et FERRAND.

54, rue de la Chaussée-d'Antin — PARIS.

Laboratoire

L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

## TRÉPHONYL

(L'Hépatothérapie associée à la Sérothérapie et aux Tréphones embryonnaires.)

**Composition.** — Extrait de foie foetal, Suc embryonnaire, Sérum hémopoïétique.

**Mode d'action.** — Par l'extrait hépatique foetal et le sérum hémopoïétique, constitue la médication de choix de toutes les Anémies même les plus graves.

Par les Tréphones du suc embryonnaire, accélère la croissance et assure la régénération des tissus.

**Indications.** — Toutes les Anémies, même les plus graves. Toutes les déficiences organiques : convalescences difficiles ; retards dans le développement ou la croissance chez les enfants.

**Présentation.** — Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. Boîte de 10 flacons-ampoules de 5 cc. Flacon de sirop de 300 gr.

**Posologie.** — 1 à 2 flacons-ampoules par jour par voie buccale ou 1 à 2 cuill. de sirop.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> ROUSSEL**  
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## TRÉPOBIUR

Préparation hydrosoluble associant l'uranium et le bismuth. Action curative comparable à celle des arsénobenzènes. L'uranium, par sa radioactivité spécifique et ses propriétés antitoxiniques, double la puissance tréponémicide du Bismuth et diminue d'autant sa toxicité.

**Indications.** — Toutes les manifestations de la syphilis, particulièrement les accidents évolutifs où, grâce à sa solubilité et à sa rapidité d'élimination, le Trépobiur donne les mêmes résultats que les arsenicaux.

### Posologie :

3 à 6 injections intramusculaires par semaine. Totaliser 12 à 16 injections par série.

*L'injection de Trépobiur est indolore.*

### Présentation et Prix :

La boîte de 6 ampoules de 4 cc..... 18 fr.

— de 12 — — — — — 30 fr.

(Aucune indication révélatrice dans leur présentation.)

**Thérapeutique infantile.** — Ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 01 de bi-métal.

### Prix :

La boîte de 12 ampoules de 1 cc..... 20 fr.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## TRÉPOL

Traitement bismuthique de la syphilis. Médication intramusculaire en ampoules stérilisées (3 cc.). Spirillicide à base de tartrate basique de bismuth renfermant environ 80 p. 100 de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

La boîte de 12 ampoules : 36 fr. ; de 6 : 20 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

**Laboratoires pharmaceutiques**

**L.-G. TORAUDE, O. , O. I. .**

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

## TRÉPOQUINOL

Traitement de la Syphilis par l'Iodo-Bismuthate de Quinine  
en

Suspension Aqueuse

ne possédant pas les inconvénients des suspensions huileuses.

Sans danger de stomatite, sans abcès, sans indurations, sans toxicité.

Préparation adoptée par l'Assistance Publique à PARIS.

Ampoules de 3 cc. dosées à 0,10 par cc.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 21 francs.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 40 francs.

**Laboratoires Pharmaceutiques**

**L.-G. TORAUDE O. , O. I. .**

Docteur en pharmacie de l'Université de Paris.  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine  
Membre de la Société de Pharmacie de Paris.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

## TRIBROMURE GIGON

**Composition.** — Bromure triple de potassium, sodium et ammonium.

**Forme.** — Poudre desséchée par préparation spéciale

**Indications thérapeutiques.** — États nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité, Insomnies, Épilepsie.

**Mode d'emploi et doses.** — Cuillère-mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour. suivant avis du médecin.

Flacons pM., mM., gM.

**Laboratoire des Produits du Dr GIGON**

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

**Indications.** — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

**Doses et mode d'emploi.** — Tricalcine pure.

*Adultes :*

Poudre : 1 cuiller mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers mesure.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cach.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine Irradiée : 1 cachet ou  
1 cuillerée à café de granulés.

Avant  
ou  
pendant  
chacun  
des trois  
repas.

**Tricalcine Opothérapique (1) :** 2 drag. ou 2 cuillers  
à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : poudre, granulés, cachets, chocolat :  
14 fr. ; comprimés : 12 fr. ; Méthylarsinée, adrénalinée, fluorée et opothérapique : 16 fr.

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium,

(Association Parathyroïdes, Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle osseuse.)

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

## **TRIDIGESTINE DALLOZ**

**Composition.** — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

**Forme.** — Granulé.

**Indications.** — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

**Dose.** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Le flacon : 12 fr. 50

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

---



## TRIDYNOL

Médicament composé leucopoiétique puissant. Employé contre les tuberculoses.

**Mode d'action.** — Dans la tuberculose, augmentation des globules blancs et spécialement des lymphocytes.

L'autolysat des globules blancs est bactéricide par ses oxydases et lipases. Dissolution des cires bacillaires par les lipases. Exp. de Fiessinger.

Agglutination des bacilles qui prennent des formes d'involution et de souffrance, puis diminuent de nombre et disparaissent souvent après 6, 8, 10 mois.

Ce traitement est activé et exalté par la Diathermie transpulmonaire qui, employée seule, est inutile. Diathermie transpulmonaire 1 500 à 2 000 milliampères, trois séances par semaine une demi-heure. 20 à 30 séances consécutives.

Parfois momentanément dépression et fatigue vers le dixième ou quinzième jour.

En général, augmentation de la toux et des crachats qui deviennent souvent très abondants, purulents, puis muqueux et enfin disparaissent.

Contre-indication absolue : l'*Albuminurie*.

La Diathermie ne provoque pas d'Hémoptysie (professeur d'Arsonval)

Réaction thermique variable, souvent détervescence après un temps variable.

En dehors de la tuberculose, s'emploie aussi avec succès dans les maladies infectieuses, salpingites, entérites, suppurations, cachexies.

**Résultats.** — Malgré toute la prudence de rigueur en cette matière, on peut dire que les résultats sont très bons au premier et deuxième degré. Variable au troisième degré, tout dépendant de l'état général.

Administration à doses fractionnées pour éviter le choc.

Pilules : 5 par jour en moyenne, 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Cette médication est très efficace à doses réduites chez les enfants, combinée avec les rayons ultraviolets (sans diathermie).

Pour renseignements s'adresser :

**Pharmacie JOURNET**

18-20, rue Vavin — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## TRIGLANDINE

**Composition et forme.** — Dragées, Ampoules de 1 cc. et 3 cc, Thyroïde, Hypophyse, Ovaire (glandes totales desséchées sous vide profond à basse température).

**Propriétés thérapeutiques.** — Entraîne régulièrement le redressement du système endocrinien dans son ensemble, par l'administration des 3 glandes nobles, thyroïde, hypophyse, ovaire. .  
Régulateur du cœur périphérique.

**Indications.** — SYNDROMES ENDOCRINIENS SPECIAUX de la femme : Stérilité, Trouble de l'appareil génital, Hypertension de la Ménopause et des dysendocriniens. ASTHENIES ENDOCRINIENNES FEMININES. Troubles de circulation.

**Posologie.** — 1 à 3 dragées par jour pendant 10 jours environ ; 1 ampoule de 1 ou 3 cc. par jour, suivant le cas.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

---

## TRILUÈS

Le moins toxique des arsenicaux *trivalents* employés en syphilithérapie, présenté en solution toute préparée, injectable par voie intramusculaire et intraveineuse.

**Composition.** — Le TRILUÈS est le diéthylène imino-glucylarsénophényl amine mono-méthylène sulfoxylate de sodium, composé contenant 22,5 p. 100 d'arsenic métallique. (Travaux de M. Auger, professeur de chimie analytique à la Sorbonne.) Son avantage réside dans le fait que sa molécule est asymétrique et se désintègre en deux temps. Cette libération freinée de l'As explique sa

*remarquable tolérance*

en même temps qu'elle permet une imprégnation plus durable de l'organisme après chaque injection. (Travaux du prof<sup>r</sup> Robin, de J. Buttner-Thierry, etc.)

**Présentation.** — Deux formes :

Intraveineux	{	en ampoules de 5 cc.
Intramusculaire		en solution préparée d'avance.

**Indications :**

- 1° *Syphilis* : traitement d'assaut, traitements mixtes, traitement de consolidation et cures abortives.
- 2° Fièvres récurrentes, Paludisme, Pian, Fièvre typhoïde, Spirochètoses, Trypanosomiasés, Kala-azar, Pyorrhée alvéolaire, Angine de Vincent.

**Posologie.** — La molécule de TRILUÈS étant lourde, les doses croissent de 0,22 en 0,22, les ampoules sont délivrées selon les 6 concentrations suivantes :

I	II	III	IV	V	VI
0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32

Correspondant à 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75, 0,90 d'Arséno-benzène.

*Spécifier : endoveineux ou intramusculaire.*

**Traitement d'attaque.** — Commencer par 0,44, puis 0,88 et arriver vite à 1,32. La grande marge de sécurité apportée par le TRILUES permet une thérapeutique particulièrement énergique.

**Traitement d'entretien.** — Suivre la gradation des doses. Totaliser pour une série 0 gr. 15 de TRILUES par kilogramme de poids du malade.

**Prix** (boîte de 1 ampoule) : 4, 6, 8, 10, 12, 14 fr. selon la dose.

**Thérapeutique infantile.** — Ampoules de 0 gr. 01 à 0 gr. 60, uniquement sous forme musculaire.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

# TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées blanches à noyau Mou).

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième ..... II gouttes (3 centigr.).

Caféine ..... 2 centigrammes.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — *Vasodilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate*, ne provoquant aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de l'*Angine de Poitrine*, l'*Asthme Cardiaque*, l'*Œdème Pulmonaire*.

**Mode d'emploi.** — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 15 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV°).

# TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

(Dragées roses à Noyau Mou.)

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... II gouttes (3 centigr.).

Chte Papavérine ..... 5 milligrammes.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Spécialement indiquée dans : *Angine de Poitrine*, *Asthme cardiaque* et *pulmonaire*, *Aortites*, *Artérites*, *Urémie*.

**Mode d'emploi.** — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle) au moment ou en prévision des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV°).

## TRINITRINE ROUSSEL

### Composition :

Comprimés n<sup>os</sup> I, II, III correspondant à I, II ou III gouttes de la solution au 1/100<sup>e</sup>.

### Indications.

**Hypertension** : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

### Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

**Pharmacie ROUSSEL**

10, rue Washington — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## TRIPYORIL

Pâte dentifrice antispirillaire à base de Pentaluès, de Résorcine, de Fluorure de Calcium et d'Hydroxyde de Magnésium.

**Propriétés.** — Action préventive et curative puissante n'exerçant aucun effet secondaire nuisible sur la gencive ou sur la dent.

**Indications.** — Prophylaxie et traitement de la carie, de la pyorrhée et des stomatites.

### Présentation et prix :

Tube de 30 gr. environ : 5 francs.

Littérature et échantillon :

**Laboratoires SFÉAT**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## TRIRADOL

Association d'iode organique, menthol, camphre et éléments radio-actifs.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les tuberculoses à lésions limitées et à évolution lente.

**Contre-indications.** — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : une ampoule de 1 cc. ou 4 à 6 capsules par jour, par série de 30.

*Enfants* : suivant l'âge. — Voir Littérature.

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules : 20 fr. — Flacon de 60 capsules : 20 fr.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

R. C. Seine 143-981.

## TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-magnésie, de goût très agréable.

Admise dans les Hôpitaux. Adoptée par les Ministères de la Marine, et des Colonies après expérimentation.

**Propriétés Thérapeutiques.** — Excellent antiseptique des voies digestives, biliaires et urinaires, cholérétique et cholagogue, absorbant des gaz et des toxines, désensibilisant, diurétique, prévient la formation des calculs biliaires.

**Originalité.** — Emploi du citrate de soude qui fait passer le sulfate de magnésie à l'état de citrate non irritant et qui, se transformant en carbonate dans l'organisme et associé aux benzoates de lithine et de soude, fluidifie la bile et les sécrétions, facilite la solution biliaire du cholestérol et modifie le PH biliaire dans le sens de l'alcalinité, ce qui aide à la stérilisation du milieu.

Produit d'une innocuité parfaite ayant à la fois une action antiseptique, cholérétique, cholagogue, absorbante, désensibilisante et diurétique.

**Indications.** — Auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs conséquences : infections des voies digestives, biliaires et urinaires (insuffisance hépatique, ictère, cholécystite, colibacillose, entérite, colite, appendicite chronique, cystite, furonculose, migraines, prurit, urticaire, manifestations anaphylactiques, etc...), lithiase biliaire ; séquelles fonctionnelles de la cholécystectomie.

**Posologie habituelle :**

*Adultes* : 1 à 4 cuillères à café par jour.

*Enfants* : 1/2 à 2 cuillérées à café par jour, suivant l'âge. Une heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu d'eau aussitôt après ou délayer dans un peu d'eau.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle

des Médicaments sous le N° 699-I.

**Laboratoires G. LAMBERT** ✱, Docteur en Pharmacie

6, rue de Longchamp, 6 — VICHY (Allier)

## TRISODYL ROZET

**Hypotenseur Antiscléreux.**

**Composition** (Dose quotidienne moyenne)

Nitrite de soude chimiq. pur... 0 gr. 20

Silicate de soude chimiq. pur... 2 gr.

Citrate de soude chimiq. pur.... 4 gr.

**Formes Pharmaceutiques et Posologie.**

**Comprimés.** — 6 comprimés par jour dans un peu d'eau.

**Solution.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas.

**Action.** — Provoque une vaso-dilatation périphérique modérée et continue, portant sur les Artéριοles et les Capillaires (Nitrite de soude). Solubilise la chaux, augmente la diurèse, s'oppose aux fermentations (silicate de soude). Ramène à la normale la coagulabilité et la viscosité sanguine (citrate de soude).

**Indications.** — Hypertension artérielle. Artériosclérose. Etats pléthoriques et angiospasmodiques, Angine de poitrine, aortites, etc.

**Prix :** 20 fr. le flacon de solution ou la boîte de Comprimés pour un traitement d'un mois environ.

**Laboratoire de la Sulfoléine Rozet**  
Benderitter et C<sup>ie</sup> — VENDOME (L.-et-Ch.)

## TRYNOL

(Comprimés.)

**Forme pharmaceutique et composition.** — Comprimés à base de silicate de soude, sels sodiques décholestérinisants, Gui, Parenchyme hépatique et thyroïdien.

**Propriétés et avantages.** — Abaissant la tension artérielle, dissolvant la cholestérine et décalcifiant les parois artérielles, il tend à rendre de la souplesse aux artères, en empêchant les formations scléreuses.

**Indications.** — Artériosclérose, Athérome, Vertiges, Troubles circulatoires, etc.

**Mode d'emploi.** — 6 comprimés par jour le matin à jeun ou 3 à midi et 3 le soir, de préférence avec une infusion rafraîchissante.

**Prescription.** — 1 boîte comprimés Trynol.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---



## TUBÉROL

### TUBEROL (pur).

**Forme.** — Liquide.

**Composition.** — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

**Indications.** — Toutes affections des poumons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

**Mode d'emploi.** — En enveloppements thoraciques; avec gaze hydrophile imbibée et en inhalations.

### TUBÉROL (onguent).

**Composition.** — Tubérol + Excipient adhésif.

**Indications.** — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

**Mode d'emploi.** — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

### TUBÉROL (Oléo).

**Forme.** — Solution huileuse.

**Composition.** — Tubérol + Huile stérilisée.

**Indications.** — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

**Mode d'emploi.** — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

### TUBÉROL (injectable).

**Forme.** — Ampoules.

**Composition.** — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

**Indications.** — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

**Mode d'emploi.** — 1 à 6 ampoules par jour suivant gravité.

### TUBÉROL (Sirop).

**Composition.** — Tubérol + véhicule.

**Indications.** — Antiseptique des voies respiratoires. Calme la toux.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 3 à 4 cuillerées à café.

**Laboratoires E. BOUTEILLE**

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Marcadet 04-02.

## **TUBES BLACHE**

Toutes formules en pommades pour  
l'Ophthalmologie.

### **Liste des principales préparations :**

Adréno-éphédrine,  
Aminothionine Westermann,  
Analgo-contractine,  
Analgo-mydriatine,  
Argovyl, Cadmio-zinc, Campho-cuivre,  
Chaulmocuprine, Chlorhydratine,  
Colorants composés, Compositol,  
Contractine, Dioptrol, Ichto-zinc,  
Iodure alcalino-calcique, Kinargol,  
Mydriatine, Organo-bismuth,  
Oxy-arsine Hg, Oxyde Hg,  
Paléocaline,  
Phocéol, Thiosulfol cuprique,  
Thiosulfol hydrargyrique,  
Zircotanyl, etc.

## **TUBES CHAUVIN**

Toutes formules en pommades pour l'Oto-  
Rhinologie et pour la Dermatologie :

Série *Rhino* pour le nez.

Série *Oto* pour les oreilles.

Série *Dermo* pour la peau.

**Établissements Alfred CHAUVIN**

**AUBENAS (Ardèche).**

## **TUBES DU Dr GUIRAUD**

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux  
(Anciennement tubes DAVIEL).

### **POMMADES OPHTALMIQUES**

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'oeil.

### **TOUTES FORMULES**

**Spécialement recommandées :** Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Prix : 9 et 10 francs.

Echantillons sur demande.

### **Laboratoire SPES GUIRAUD**

10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Téléph. : Marcadet 37-98.

---

## TUBES DULCIS

### Pommades ophtalmiques.

<b>Argolène</b> (Sel d'Ag). — Conjonctivites aiguës, à 5 p. 100 et 10 p. 100....	12 fr.
<b>Cadmiol</b> — Conjonctivites chroniques, à 1 p. 100 et 2 p. 100.....	12 fr.
<b>Cuprinol</b> (Sel organique de Cu). — Conjonctivites chroniques, à 1 p. 100, 2 p. 100, 5 p. 100.....	12 fr.
<b>Iodo-Calciqne.</b> — Traitement de la cataracte .....	12 fr.
<b>Ichtyol-zinc.</b> — Blépharites.....	12 fr.
<b>Novoptine.</b> — Ulcères à pneumocoques, à 1 p. 100.....	12 fr.
<b>Oxyde orangé de Hg.</b> — Blépharites, conjonctivites phlycténulaires, à 1 p. 100, 2 p. 100, 3 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100	11 fr.
<b>Ophthalmoforme.</b> — Antipurulent, à 2 p. 100, 3 p. 100.....	12 fr.
<b>Aristol.</b> — Antipurulent, à 2 p. 100.	12 fr.
<b>Iodoforme.</b> — A 1 p. 100, et 2 p. 100 .....	12 fr.
<b>Thiosinamine.</b> — Opacités et synéchies à 1 p. 100.....	12 fr.
<b>Mydriasine.</b> — Mydriatique puissant .....	16 fr.
<b>Alcaloïdes seuls</b> .....	12 fr.
<b>Alcaloïdes associés</b> .....	14 fr.
<b>Myosine forte.</b> — Glaucome.....	16 fr.
<b>Myosine faible</b> .....	14 fr.
<b>Iodo-Rubidium.</b> — Cataracte.....	16 fr.

**Laboratoire de Thérapeutique Oculaire**  
du DOCTEUR FERRY

Place Clichy — MONTE-CARLO.

## **TUBES OPHTALMOLOGIQUES FERLUX**

### **Tubes Ferlux :**

Huile de Chaulmoogra, Chaulmoogra-  
Butelline.

Oxyde de mercure orangé, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100  
— jaune, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100

Iodoforme, Calomel, Précipité blanc, Ethyl-  
hydrocupréine (optochin), Halocalcine  
(I Na + CaCl<sup>2</sup>), Ichtyol-oxyde de zinc,  
Thigénol-oxyde de zinc, etc., etc.

### **Produits Orhino :**

Pour Otorhinolaryngologie.

Prix moyen : 10 francs.

### **Laboratoires RHINOPHTA**

G. Bousquet, Docteur en Pharmacie — ALBI.

---

# TUBES STRANA

**Pommades ophtalmiques**  
en tube breveté.

<b>Argyrol 5 %, 10 % : Conjonctivites aiguës.</b>	11	»
<b>Atropine 0,5 %, 1 % : Mydriatiques.....</b>	9	75
<b>Bleu de méthylène 0,5 %, 1 % : Antisep- tique sédatif.....</b>	11	»
<b>Calomel 5 % : Antiseptique résorbant....</b>	9	75
<b>Dionine 2% : Lymphagogue, analgésique.</b>	12	»
<b>— 5 % : — — —</b>	14	»
<b>Eserine 1 % : Myotique.....</b>	14	»
<b>Ichtyol 5 % : Blépharites.....</b>	9	75
<b>Ichtyol-Zinc : Blépharo-Conjonctivites....</b>	11	»
<b>Iode-Calcium : Cataractes.....</b>	11	»
<b>Mydriatique puissant.....</b>	14	»
<b>Myotique puissant.....</b>	14	»
<b>Noviforme 5 %, 10 % : Antiseptiques.....</b>	12	»
<b>Optochine hydrochl. Zimmer 2 % : In- fections pneumococciques.....</b>	14	»
<b>Oxyde orange 1 %, 2 %, 3 %, 5 %.....</b>	9	75
<b>Oxyde orange 0,2 ; Atropine 0,05.....</b>	12	»
<b>Oxyde de zinc 5 % : Blépharo-Conjoncti- vites.....</b>	9	75
<b>Pilocarpine 2 % : Myotique.....</b>	11	»
<b>Précipité blanc 1 %, 2 %, 5 %.....</b>	9	75
<b>Rouge écarlate 5 % : Cicatrisant.....</b>	11	»
<b>Sulfate de zinc 0,025 ; Larocaine 0,1 : Conjonctivites à faible sécrétion.....</b>	12	»
<b>Targesine 5 % : Infections gonococciques et diplobacillaires.....</b>	12	»
<b>Xéroforme 5 % : Antiseptique puissant...</b>	11	»

**Laboratoires SALANTALE**

**STRASBOURG**

## TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore des plaies

Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail.

**Constitution.** — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques (activation considérable de la cicatrisation).

**Propriétés.** — Evite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

**Le Tulle gras Lumière** permet d'abréger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

**Présentation.** — Le **Tulle gras Lumière** est présenté en carrés de dimensions fixes :

0 <sup>m</sup> 10 × 0 <sup>m</sup> 10.	Boîte de 10 compresses.
0 <sup>m</sup> 10 × 0 <sup>m</sup> 10.	— 20 —
0 <sup>m</sup> 10 × 0 <sup>m</sup> 10.	— 30 —
0 <sup>m</sup> 22 × 0 <sup>m</sup> 22.	— 30 —

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte, métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

**Mode d'emploi.** — Placer un carré de **Tulle gras** sur la plaie, appliquer par-dessus le pansement stérilisé.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

45, rue Villon — LYON.

## TULLE ROSE BESLIER

Pansement gras.

**Constitué** par un carré de 13×13 imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli, Pélagonium.

**Le Tulle Rose Beslier** est un cicatrisant énergique ; il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures, plaies par vésication, ulcères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc.,

**Le Tulle Rose Beslier** est livré en boîtes de 10 carrés de 13×13.

Prix : 7 francs la boîte.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant**

**DIGOIN (S.-et.-L.).**

## UCLARSYL

Dioxydiaminoarsénobenzène - monométhylène - Sulfoxylate de soude (914).

Rigoureusement pur (double contrôle chimique et physiologique). Traitement d'attaque et d'entretien de la syphilis.

**Préparation intraveineuse.** — Poudre très aisément soluble dans l'eau distillée pour injections intraveineuses.

Doses progressives de 0 gr. 15 à 0 gr. 90.

**Usines Chimiques des Laboratoires Français**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 58-43.

---

## ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-sodique-silicatée.

Par leur action sédative sur l'élément nerveux les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses, arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume ; font résorber l'œdème et l'empâtement ; guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

Une boîte pour 4 bains de jambe.

Prix : 6 fr. 75.

**Laboratoire SÉVIGNÉ**

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX<sup>e</sup>)



## ULCÉOPLAQUE - ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

**Cicatrisation** certaine des *Plaies aux jambes*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîte de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim. Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 24 ou 36 francs.

1 Ulcéobande. Prix : 30 francs.

## ULCÉOSINE

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-bicarbonaté, arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indiquée dans l'artério-sclérose, l'hypertension artérielle, les troubles hépatiques, les varices, les congestions variqueuses et phlébitiques, les plaies atones, les ulcères variqueux, le rhumatisme chronique, l'hyperglycémie, le diabète.

1 cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Prix : 10 francs.

---

**Laboratoire SÉVIGNÉ**

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX<sup>e</sup>)

## **ULCÉOSOL-POMMADE**

Oxyde de zinc, Cuivre salicylé, Silicate de magnésie et excipient spécial.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 10 francs.

## **ULCÉOSOL-POUDRE**

Oxyde de zinc bismuthé, Acide salicylique, Silicate de magnésie.

Poudre siccative, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 10 francs.

**Laboratoire SÉVIGNÉ**

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX<sup>e</sup>)

---

## ULCEROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

**Présentation et composition.** — Bande de 0 m. 13 × 10 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

**Action.** — Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

**Indications.** — Toutes les plaies atones des membres inférieurs et particulièrement des Ulcères variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

**Mode d'emploi.** — Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Prix au public : 25 fr. la bande.

**Pharmacie MAYAUD**

6 ter, rue Voltaire

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

## ULMACETYL

### Composition par cachet.

Gentiane.....	0 gr. 20
Ulmair (fleurs).....	0 gr. 10
Sureau (fleurs).....	0 gr. 10
Colchique (semences).....	0 gr. 03
Buchu (feuilles).....	0 gr. 10
Azotate de potasse.....	0 gr. 10
Carbonate de lithine.....	0 gr. 05
Caféine.....	0 gr. 04
Benzoate de soude.....	0 gr. 08
Acide acétylsalicylique.....	0 gr. 20

**Indications.** — Toutes les affections rhumatismales, goutte, sciatique, lumbago, torticolis, névralgies, zona, arthritisme.

### Posologie.

En crise : 2 à 6 et même 10 cachets par 24 heures, de préférence 10 à 15 minutes avant chaque repas. Chaque cachet étant absorbé avec un verre d'eau ou de tisane diurétique.

En période calme, comme traitement curatif ; 1 cachet midi et soir pendant 21 jours.

Prix : 16 fr. la boîte de 20 cachets de 1 gr.

Laboratoires de l'ULMACETYL et du SPICANOL  
54, rue de Sablonville, 1, rue de l'Ouest — NEUILLY-PARIS

G. DURAND, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,  
ex Pharmacien de l'Hôpital Maritime de Berck.

## ULMARÈNE GIGON

**Composition.** — Ethers salicyliques liquides d'odeur faible.

**Indications thérapeutiques.** — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

**Formes.** — 1° Ulmarène flacons de 30, 60, 125 cc. (pM, mM, gM) ; pour la vente ou pour les préparations magistrales (liniment, pommade) :

2° Ulmarol Gigon (liniment) ;

3° Baume du docteur Gigon, en tube.

**Mode d'emploi.** — Onctions suivies d'enveloppements.

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## **ULTRACAO LAURENÇON**

**Suraliment Minéro-Nucléiné.**

Délicieux déjeuner à base de Cacao.

Tonique Reconstituant.

Suralimentation Rationnelle de l'enfant et de l'adulte. (Ne constipe jamais.)

**Forme.** — Poudre soluble.

**Posologie.** — Délayer à froid le contenu de 2 cuillerées à café dans une bonne tasse d'eau ou de lait de préférence. Porter à l'ébullition pendant quelques minutes en remuant jusqu'à complète homogénéité.

**Produits J. LAURENÇON**

Pharmacien. Professeur de chimie et de pharmacologie à Lyon.

**Laboratoire d'Actino-Biologie**

**VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).**

---

## **ULTRAFORMINE**

**B. et S.**

**Urotropine avec association de Benzoate de soude (B) ou de Salicylate de soude (S).**

**Composition.** — Comprimés de 0,50 d'Urotropine et comprimés de 0,50 de Salicylate de soude ou de Benzoate, présentés en deux tubes différents dans la même boîte.

**Propriétés.** — Antiseptique urinaire, biliaire et général. L'association de Benzoate ou de Salicylate augmente fortement les propriétés diurétiques.

**Indications.** — Toutes infections générales, urinaires, Affections hépatiques, Affections rhumatismales (Ultraformine S).

**Dose moyenne.** — 2 ou 3 fois par jour 2 comprimés (un de chaque tube) dans un grand verre d'eau.

**Laboratoire SAUZE**

Rue Nationale, 60 — FIRMINY (Loire).

## ULTRA-LEVURE

Levure ultra-haute (37°) de H. Boulard.

**Composition.** — 120 à 150 millions de globules de levure par ampoule de 3 cc. 5 dans un milieu isotonique où la levure reste vivante pendant plus de 5 ans.

**Propriétés.** — Température d'activité et de reproduction optimum correspondant à la température physiologique de l'intestin. Élimine les ferments pathogènes par concurrence vitale. Passe dans la circulation et se retrouve dans les urines.

Ne produit qu'une acidité insignifiante.

Facilite les phénomènes d'assimilation et de désassimilation — tonique par les diastases et les vitamines produites en grande abondance (principalement vitamine B). Action spéciale sur les dermatoses par la vitamine B.

**Indications.** — *Infections intestinales*, états aigus et chroniques, diarrhées infantiles (se prend dans du lait), diarrhées et dysenteries amibiennes ou bacillaires, entérites, tumeurs et dermatoses : *colibacilloses intestinales et urinaires* (résultats très rapides).

**Modes d'emploi.** — Livrée en boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5. *Dose normale* : 1 ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée ; *dans les cas aigus* : 1 ampoule deux fois par jour ; *dose d'entretien* : 2 ampoules par semaine.

La Boîte de 12 ampoules : 22 fr. 50

**Laboratoire des Ultra-Levures L. G. TORAUDE O. ✱. O. I. U**  
D' en pharmacie de l'Université de Paris, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine. Membre de la Société de Pharmacie de Paris.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

## ULTRA-VIOLETS

1° *Affections de la première et de la seconde enfance, hypotrophies, rachitisme, tétanie, anémies ;*

2° *Tuberculoses dites chirurgicales : ganglionnaire, osseuse et ostéo-articulaire, péritonéales, génitales ;*

3° *Affections cutanées : acné, psoriasis, engelures, lupus, et affections du cuir chevelu : pelade ;*

4° *Etats de surmenage et d'asthénie, convalescences ;*

5° *Infections de l'oreille, tuberculoses oculaires, carie dentaire, pyorrhée, blanchiment des dents.*

Vente et location de tous appareils et accessoires à

**La Verrerie Scientifique**

12, avenue du Maine — PARIS (XV°).

Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

## ULTRAVITAMINE 4

Les Quatre Vitamines A. B. C. D. (cholestérol ergostérinique irradié) associées à des éléments minéraux : Phosphore, Manganèse, Calcium, en combinaison avec des produits opothérapiques : Moelles et Poudre d'Os frais.

**Indications.** — Déminéralisation. Rachitisme. Toutes Carences et Convalescences. Dépression nerveuse. Fatigue musculaire. Allaitement. Pré-tuberculose. Puissant Dynamogène. Recalcifiant intégral.

**Forme.** — Délicieux granulé bicolore.

**Posologie.** — La même pour enfants et adultes : 1 cuillerée à café de granulé sec ou dissous dans un peu d'eau froide, 1/2 heure avant les 2 ou 3 principaux repas.

**Produits J. LAURENÇON**

Pharmacien, Professeur de Chimie  
et de Pharmacologie à Lyon.

**Laboratoire d'Actino-Biologie**  
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

## URALYSOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

**Indications.** — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites, Cystites.

*Deux formes : a. Granulés ; b. Comprimés.*

**Formule.** — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine. Lysidine. anhydro-méthylène-citrate d'hexaméthylènetétramine, Sels de lithine.

**Modes d'emploi :**

A. *Granulés* : Une cuillerée à café, matin et soir dans un verre d'eau.

B. *Comprimés* : 4 comprimés par jour en moyenne une demi-heure avant les repas ou une heure après.

Prix de vente au public : 14 francs.

**Laboratoires LOBICA**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>.)

## URASEPTINE ROGIER

A base de Hexaméthylènetétramine et son citrate, Diéthylènediamine, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de substance active par cuill. à café.

**Dose.** — 3 à 6 cuill. à café par jour.

**Propriétés.** — Antiseptique urinaire et biliaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 12 fr. 50.

**Henry ROGIER**, docteur en pharmacie  
56, boulevard Pereire — PARIS.

---

## URAZINE

Citro-salicylate de pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique. Action analgésique et antiseptique. Innocuité absolue.

*Indications :*

**Goutte, Gravelle, Rhumatisme.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Comprimés à 30 centigr. : trois ou quatre par jour, au moment des repas.

Granulés effervescents : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## UR-CLAR

**Antiseptique urinalre.**

### UR-CLAR BLEU

**Composition.** — Bleu de Méthylène, Citraminoxiphène, Poudre d'hamamélis.

**Propriétés.** — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

**Indications.** — Toutes les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorrhagie.

### UR-CLAR BLANC

**Composition.** — Santalol citraminoxiphène, poudre d'hamamélis.

**Propriétés.** — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

**Indications.** — La blennorrhagie et ses complications.

**Doses.** — 9 à 12 capsules par jour.

**Laboratoire Central Maubeuge,**

**A. ROUX, Pharmacien**

58, rue de Maubeuge — PARIS.

## URIBILINE

**Traitement des infections hépato-rénales.**

**Présentation.** — Granulé.

Aux extraits d'artichauts, de boldo et formine.

Stimulants reconnus de la cellule hépatique et rénale.

Un fait incontesté domine la pathologie infectieuse de ces deux organes: la Colibacilliose.

L'URIBILINE y est employé avec succès, et dans toute infection et tout encombrement des glandes hépatiques et rénales: Congestions, Cirrhoses, Cholémie, Cholécystites, Coliques néphrétiques, Néphrites, Dysurie, Anurie.

Rend les plus grands services dans toutes les affections où il est nécessaire d'assurer l'intégrité des voies entéro-hépato-rénales.

**Formule.** — Formine, 5 gr.; Salicylate de Soude, 5 gr.; Bicarbonate de Soude, 2 gr.; Extrait de Boldo, 1 gr.; Extrait d'Artichaut, 1 gr.; Extrait de Rhamnus, 0 gr. 50; Excipient, Q. S. pour 100 gr. de granulé.

**Posologie.** — 3 ou 4 cuillerées à café par jour, entre les repas dans un liquide chaud.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires REBOUL**

PONT-SAINT-MAXENCE (Oise).

**Au même laboratoire :**

Vitalogène, Sanocure, Cardiobromine, Cholagol, Toni-bronchique, Tanode, Créo-Suppo-Camphre.

## URICLARINE

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

**Propriétés thérapeutiques.** — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phénile et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales.

**Indications.** — Maladies infectieuses des Voies Urinaires, Cystites, Pyélites, Colibacillurie, Blennorragie.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

**Laboratoires BRISSON**

**Dr DEDET et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

## URIFLUINE

Succinate de lithine.

Dissout l'acide urique, augmente la quantité des urines, empêche les coliques néphrétiques. Action anti-rhumatismale dans la Cellulite et le Rhumatisme chronique.

La boîte de comprimés ou pilules : 12 francs  
prix public.

La boîte de 10 ampoules : 13 fr. 50  
prix public.

**Laboratoires STENE**

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>.)

## URISANINE

**Composition.** — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

**Dosage.** — Une cuillerée à café = 0 gr. 75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine + 0 gr. 25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique urinaire et biliaire complet ; balsamique et diurétique ; dissolvant phosphatique, urique et uratique ; éliminant sûr et rapide.

**Indications.** — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

**Mode d'emploi.** — Se prend dilué dans 1/2 verre d'eau naturelle ou gazeuse.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS.

## UROBUCCOL MALMANCHE

**Composition :**

Formine (uroformine, urotropine) ...	25 centigr.
Benzoate de soude .....	20 —
— de lithine .....	10 —
Sirop de buchu .....	2 grammes.
— de maïs.....	2 —
— de térébenthine .....	2 —
par cuillerée à café.	

**Forme.** — Liquide sirupeuse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires, antiseptique général, balsamique et diurétique puissant. Dissolvant phosphatique, urique et uratique.

**Indications.** — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatite, Blennorrhagie, Uricémie, Goutte, Lithiase rénale, Coliques hépatiques.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion.

Prix au public : 12 francs.

**Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien. Docteur ès sciences.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## UROCLASE

**Antiurique vrai**  
**Préventif et curatif. Non toxique.**

**Définition et composition centésimale.** — Bioxyde de Silicium (0,25) à l'état colloïdal, uni par adsorption au Carbonate de K (0,025) et au Chlorure de Na (0,19) dispersés en milieu aqueux par un procédé spécial.

**Mode d'action.** — Corrige progressivement le métabolisme vicié de la cellule vivante, rétablit l'équilibre acido-basique rompu vers l'alcalose, redresse jusqu'à la normale le pH humoral. La précipitation de l'acide urique dans l'organisme devient ainsi impossible. Il est donc aussi bien préventif des accidents à venir que curatif des accidents en cours, et de toxicité rigoureusement nulle.

Agit à la manière d'un ferment, suivant les lois de la physicochimie des colloïdes et, par conséquent, de la matière vivante.

**Indications.** — Tous les états uricémiques dans toutes leurs manifestations.

**Emploi et Doses.** — V à X gouttes le matin à jeun dans un peu d'eau. Cures régulières et successives de 10 jours, séparées par repos de 10 jours.

**Pierre ALEXANDRE, Pharmacien**

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 08-00.

---

## UROFORMINE GOBEY

Comprimés dosés à 0 gr. 50. Comprimés effervescents dosés à 0 gr. 25 (solubilité instantanée).  
Solution injectable en ampoules de 2 et 5 cc., à 0 gr. 25 par cc.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 0 gr. 50 à 2 gr. par jour (intraveineuses seulement).

**Propriétés thérapeutiques.** — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant de l'acide urique.

**Indications.** — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalites, Complications broncho-pulmonaires, etc. Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

**Prix au public :**

La boîte de 50 comprimés à 0,50 : 12 fr. 50.

La boîte de comprimés effervescents : 12 fr. 50.

**Laboratoires du Docteur ROUSSEL**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## UROIODINE

**Composition.** — L'Uroïdine ou Iodoéthylate d'hexaméthylènetétramine est une combinaison organique contenant 42 p. 100 d'iode rigoureusement titré, associée à un sel de lithine.

**Propriétés physiques et chimiques.** — Solution dialysable, se décompose lentement, est diffusée dans tout l'organisme, s'élimine dans l'urine sous forme d'iode alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique. Pas d'accumulation.

**Propriétés physiologiques.** — *Grâce à sa molécule iodée*, l'Uroïdine est un excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense, un fixateur d'oxygène, stimulant les échanges nutritifs de l'organisme, *Grâce à l'heureuse combinaison Iodo-Formine*, l'Uroïdine constitue un agent anti-infectieux particulièrement énergique. Enfin *grâce à l'association Formine-Lithine*, l'Uroïdine est un diurétique très actif et un excellent dissolvant de l'acide urique et des urates.

**Indications.** — Toutes affections glandulaires : adénites, adénopathies, végétations adénoïdes, scrofulides, etc... Maladies de la nutrition : toutes manifestations des diathèses. Urique : goutte, gravelle, calculs, etc. Arthritique : rhumatismes chroniques et déformants. Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires, Tertiarisme, Scléroses, Asthme, Emphysème, etc...

**Formes et Posologie.** — Ampoules de 3 cm. 3/4. Comprimés kératinisés de 0 gr. 50. Chez l'enfant au-dessous de 15 ans, 1/2 à 1 ampoule par jour. Chez l'adulte, 1 à 3 ampoules par jour simultanément et de préférence en injection intraveineuse (bien tolérées sans réaction locale ni choc hémoclasique, résorption parfaite). Comprimés : 1 à 2 comprimés suivant l'âge chez l'enfant ; 6 à 8 comprimés chez l'adulte, comme traitement d'entretien. Contenant 42,5 % d'iode, ces comprimés remplacent avantageusement les iodopeptones qui n'ont que 17 % d'iode et sont mieux tolérés grâce à leur enrobage gluténisé.

**Laboratoire de l'UROIODINE**  
7, rue Jules-César, PARIS (XII°).  
Tél. : Diderot 16-94.

## **UROL**

(Liquide)

**Composition.** — Urotropine, Extraits de stigmate de maïs, de chiendent et d'uva-ursi.

**Indications.** — Toutes affections du foie, du rein et de la vessie. Anti-infectieux de la grippe, des septicémies, etc.

**Mode d'emploi.** — 2 cuillerées à café par jour. Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 d'urotropine.

Le flacon : 12 francs.

Échantillons et littérature :

**Laboratoire NEUVILLE**

239, Faubourg St-Honoré — PARIS.

---

## **UROMETHYL**

**Cachets - Dragées.**

**Association stable :** Urotropine chimiquement pure, Salol, Citrate d'urotropine, Bleu de Méthylène.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antisep-tique interne, particulièrement énergique et anti-infectieux par excellence. Aucune intolérance. Pas de contre-indications.

**Indications.** — Antisepsie générale, Maladies infectieuses, Infections urinaires et biliaires, Diathèse urique, Diathèse arthritique.

**Mode d'emploi :**

*Cachets* : 3 à 6 par jour au début des repas.

*Dragées* : 6 à 9 par jour au début des repas.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires de l'UROMETHYL**

**J. BRESSIER, Docteur en Pharmacie**  
102, rue Vincent — MARSEILLE

## UROMÉTINE LAMBIOTTE FRÈRES

*Hexaméthylènetétramine pure.*

**Formes.** — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

**Indications.** — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

**Mode d'emploi.** — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Littératures et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

---

## UROMIL

**Composition.** — Association d'éther phényl-cinchonique, pipérazine, hexaméthylène tétramine.

**Forme.** — Granulé de goût agréable, effervescent, instantanément soluble dans l'eau.

**Action.** — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Par ses éléments phosphoriques, empêche la formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique.

Par son phosphate disodique, entrave la précipitation de l'acide urique au niveau du rein et de la vessie.

Possède une activité double de celle des pipérazines granulées et est toujours bien toléré.

**Indications.** — Diathèse urique, goutte, rhumatisme chronique, lithiase hépatique et rénale.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

**Laboratoires UROMIL**

L. BELIERES, docteur en pharmacie.

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## UROPHÉNYL

**Composition.** — Acide phénylquinolique carbonique et hexaméthylène tétramine recristallisée.

**Action.** — La puissance de l'acide phénylquinolique carbonique pour l'élimination de l'acide urique, sans ses inconvénients (ictère) par association en heureuse proportion avec l'urotropine recristallisée.

**Indications.** — Goutte et rhumatisme.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cachets par jour avant les repas, dans un grand verre d'eau alcaline.

**Laboratoires CROUY**

**Docteur en Pharmacie.**

**VERNON (Eure).**

---

## UROPHILE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-10.

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Composition.** — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Uricolytique, Diurétique, Régulateur de l'activité hépatique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

**Indications.** — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

L'étui : 14 francs. (En France.)

**Laboratoires A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## UROSALYL

**Association stable de l'Urotropine et du Salol.**

### Composition :

Hexaméthylène tétramine. 0 gr. 40.  
 Salol..... 0 gr. 50.  
 Excipient neutre..... Q. S. pour 1 cachet.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique des infections urinaires, biliaires, intestinales. Il donne d'excellents résultats dans les urétrites, prostatites, cystites purulentes, pyurie ; prophylaxie de la fièvre typhoïde et toutes les maladies infectieuses.

**Présentation.** — En boîtes de 24 et de 60 cachets. (*Sous tubes de verre paraffinés.*)

**Doses.** — 2 à 3 cachets par jour, au début des repas.

Prix de vente : G. M., 20 fr. ; P. M., 8 fr. 50.

## UROSALYL MÉTHYLÉ

(Bande bleue.)

Réservé aux malades qui présentent de l'intolérance vésicale pour l'Urotropine.

**Formule :** Salol, 0 gr. 65 ; Bleu de méthylène chimiquement pur, 0,03 ; Excipient neutre, Q. S. pour 1 cachet.

Même présentation, mêmes indications, mêmes doses et mêmes prix que l'Urosalyl simple.

Enregistré au laboratoire national de contrôle des médicaments sous les nos 300-1 et 300-2.

(Peut être prescrit aux assurés sociaux) '

**Clément GARDIOL**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
 de la Faculté de Montpellier

6, rue Félix-Pyat — MARSEILLE.

Échantillons. — Littérature sur demande.

## UROSAN DUFAYARD

**Forme.** — Comprimé à faire dissoudre.

**Composition.** — Benzo-camphorate d'urotropine et extrait de styles de maïs.

**Indications.** — Antiseptique, urinaire et biliaire. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites, Prostatites, Urétrites, Pyélites, Pyélonéphrites de la Grippe, Fièvre typhoïde, Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Calculs, Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires DUFAYARD**

12, rue des Saints-Pères — PARIS.

---

## UROZEA

**Antiseptique hépato-urinaire.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant dissolvant de l'acide urique.

**Indications.** — Maladies infectieuses, syndrome entéro-rénal, lithiases biliaire et rénale, goutte, rhumatisme chronique.

**Forme.** — Granulé effervescent agréable au goût.

**Formule.** — Hexaméthylène tétramine, benzoate de lithine, salicylate de lithine, carbonate de lithine, citrate hexaméthylène tétramine, théobromine, benzoate soude, scille, pipérazine.  
Ext. de stig. de maïs, ext. uva ursi, ext. chiendent.

**Dose et mode d'emploi.** — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 653-3.

**Laboratoire LOBRY**

6, rue Parrot — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## UVARGOL

**Argent colloïdal activé par la lumière.**

Première utilisation en thérapeutique de l'action des rayons lumineux sur l'argent. (On connaît la sensibilité particulière de l'argent à la lumière : photographie).

Cette action a pour effet :

- 1° D'augmenter très fortement le pouvoir bactéricide de l'argent colloïdal, d'où pour action égale *dose extrêmement réduite*.
- 2° De fournir un produit d'action absolument constante.

**L'Uvargol** se fait sous forme :

- 1° *De Dragées*, pour adultes : 6 à 8 par jour, à prendre avant les repas. Contiennent 1 cgr. de principe actif.
- 2° *De Comprimés*. — *Enfants et nourrissons* : 3 à 5 par jour, à faire dissoudre dans de l'eau ou du lait et à prendre en 2 fois avant chacun des principaux repas, ou avant les tétées. Contiennent 1 cgr. de principe actif.
- 3° — *D'Ovules* contenant 5 cgr. de principe actif. Un tous les jours ou tous les 2 jours.
- 4° — *Pommade* à 5 % pour pansements et onctions.

### Indications :

- 1° *Dragées ou comprimés* : toutes les maladies infectieuses de l'intestin ou des voies urinaires : Entérites, Diarrhées (et particulièrement diarrhées infantiles), fièvre typhoïde, grippe infectieuse, cystite, pyélo-néphrite à colibacilles, syndrome entéro-rénal, etc...
- 2° *Ovules* : Traitement des affections de la femme : Métrites, salpingites, vaginites.
- 3° *Pommade* : Pansement de toutes plaies, Brûlures, Hémorroïdes, Sinusites, etc.

**Laboratoires de l'UVARGOL**

**G. MARTINIE**

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI°).  
37, avenue de l'Echo — SAINT-MAUR (Seine).

R. C. 440.107.

Télé. : Roquette 86-84 ; Gravelle 04-32.

## UVÉ

(Gouttes)

**Composition.** — Solution aqueuse de Phosphate de Chaux, Chlorures de Manganèse, de Magnésie, et de Fer, Acide phosphorique stabilisés.

**Ni Arsenic, ni Strychnine.**

**Mode d'action.** — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

**Indications.** — Toutes les **ANOREXIES** (nourrissons, enfants, adultes) dont elles sont le *véritable spécifique*, Convalescences post-infectieuses, Asthénies, Surmenage, Décalcifications, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : XL à LX gouttes. *Enfants* : XX à XL gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau simple ou de préférence bicarbonatée.

*Nourrissons* : I goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois ; I goutte et demie par mois de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

**Prix** : Le flacon : 9 fr. 80 ; grand modèle : 18 fr.

**Laboratoires UVÉ-CRINEX**

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## UVÉOLINE

Pommade antiseptique aux essences aromatiques, longuement irradiée par les Rayons Ultra-Violets.

**Indications.** — Pyodermites, Plaies atones, Ulcères variqueux, Furonculose.

**Mode d'action.** — Agit par les essences végétales, l'hydroxyde de magnésium, le peroxyde de zinc, le bismuth, le calomel.

**Mode d'emploi.** — En onctions ; en compresses imprégnées ; incorporée à la paraffine dans les brûlures.

**Prix** du tube de 40 gr. : 10 francs.

**Ovules à l'Uvéoline.**

Traitement de toutes les lésions utéro-vaginales.

**Prix** de la boîte de 6 ovules : 15 francs.

**Laboratoire de l'UVÉOLINE**

**Pharmacie AMBARD**

CARCES (Var).

## UVÉPHORINE

Spécifique de toutes les carences de l'organisme.

**Composition.** — Association de l'Ergostérine irradiée ou Vitamine D à la Phytosphosphine (Inosito-hexaphosphate de chaux et de Magnésie).

**Propriétés.** — A pour buts bien définis : La fixation du calcium dans l'organisme, et l'apport de phosphore à un organisme qui s'en trouve insuffisamment pourvu. Possède un grand pouvoir reminéralisateur et reconstituant.

**Indications.** — Rachitisme, Déminéralisation, Faiblesse générale, Anémie, Surmenage, Croissance, Accidents de carie dentaire, Troubles de l'ossification, Grossesse, Allaitement.

**Doses.** — *Adultes* : 2 *cachets* par jour, aux repas ou 2 cuillerées à café de *granulé*.

*Enfants* : 1 à 2 *cachets* par jour ou 1 à 2 cuillerées à café de *granulé*.

**Prix** : Cachets (boîte de 24) : 15 fr. — Granulé : 16 fr. 50.

**Laboratoire E. HAUTDIDIER**

37, rue Galilée — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## UVÉSTÉROL

Vitamine D + Facteur de croissance.

Vitamines de la levure.

### Composition

Emulsion non huileuse contenant par cc. (XXXV gouttes), 0 mgr. 05 de Vitamine D cristallisée (2 000 unités antirachitiques), Cholestérol, 5 mgr. ; Extrait de levure de bière, 1 mgr.

### Mode d'action

Fixe chaux et phosphore, Active la croissance, Antitoxique, bactéricide, hématopoiétique.

### Avantages :

*Remplace intégralement l'huile de foie de morue*, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de la Vitamine D (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique, de la Cholestérine.

Onze gouttes égalent 3 cuillerées à soupe d'huile de foie de morue.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.

*Parfaitement toléré même par les fébricitants.*

### Indications :

Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose.

Rachitisme, tétanie, décalcifications.

Toutes tuberculoses (osseuses, séreuses, ganglionnaires, pulmonaires).

### Conservation :

Garde intacte son activité, même au bout d'un an.

Les flacons portent une *date limite d'utilisation*.

### Posologie :

*Adultes* : XXX à LXXX gouttes. *Enfants* : X à XXX gouttes, soit pures, soit diluées dans une boisson lactée, une eau alcaline, du jus d'orange.

Chez le *nourrisson sain* (action préventive) : V gouttes.

Chez le *nourrisson rachitique* : X à XL gouttes.

Prix : Le flacon : 10 fr. 50 ; grand modèle : 18 fr. 50.

**Laboratoires UVÉ-CRINEX**

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV°).

## VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Catarrhe. Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5<sup>e</sup> et la 6<sup>e</sup> injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs (prix au public).

## VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

« A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification « véritablement impressionnante du tableau classique de la pneumonie. »

**Indications.** — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

**Mode d'emploi.** — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs.

## VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc., congestion grippale.

Enraye immédiatement toutes gripes légères ou graves dans leur évolution et évite ainsi leurs complications.

**Mode d'emploi.** — Voir « Vaccin Anti-Pneumonique ».

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs

Laboratoires " STÉNÉ "

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>.)

## VACCIN DEMONCHY

### anti-gonococcique

Le vaccin Demonchy, grâce à sa richesse en corps microbiens (25 milliards de germes au cc.), donne d'excellents résultats non seulement dans les urétrites aiguës et subaiguës, mais aussi dans les complications de la blennorrhagie.

#### Présentation :

Ampoules de 1 cc.

#### Posologie :

Pratiquer une série de 8 à 10 injections de vaccin à doses progressivement croissantes (1/4 de cc., 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2 cc.) en s'abstenant rigoureusement de tout traitement local.

#### Technique des injections :

Les injections doivent être faites en plein tissu cellulaire sous-cutané, entre la crête iliaque et les dernières côtes.

Les injections se font tous les deux jours.

Pour éviter toute réaction du derme, ne pas utiliser pour l'injection l'aiguille qui a servi à prendre le vaccin dans l'ampoule. Lorsque la vaccination est effectuée en se conformant à cette technique, l'action du vaccin se manifeste par *une rapide amélioration et après la huitième injection, il suffit, pour obtenir la guérison, de quelques lavages.*

Prix de vente au public : 20 francs.

**Société Générale  
d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

R. MOREUX, Pharmacien  
Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).



## VACCIN DE WEILL ET DUFOURT

**Composition.** — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

### Indications :

1<sup>o</sup> *Préventif* : Bronchites profondes ou épidémiques. — Broncho-pneumonies post-opératoires.

2<sup>o</sup> *Curatif* : Broncho-pneumonies de l'enfant et de l'adulte. — Pneumonies.

**Avantages.** — Aucune contre-indication. — Aucune réaction.

### Posologie :

*Nourrissons* : 1/3 de cc. ; puis 1/2 cc. ;  
puis 1 cc. *Adultes* : 1 cc.

· **Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

# VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.  
Médication causale naturelle.

## Innocuité absolue.

Vaccin Ac. Sa (acné).....	Cépède.
Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
Vaccin C. E. (coli-entérococcique).....	Cépède.
Vaccin C. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite).....	Cépède.
Vaccin E. (entérococcie).....	Cépède.
Vaccin E. S. ....	Cépède.
Vaccin E. Sa. ....	Cépède.
Vaccin G. (gonococcie).....	Cépède.
Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. Psd.....	Cépède.
Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë).....	Cépède.
Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca.....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otite).....	Cépède.
Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
Vaccin S (érysipèle).....	Cépède.
Vaccin Sa (furuncles).....	Cépède.
Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite).....	Cépède.
Vaccin S. E. S. (puerperalité).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. (100 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. (400 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. 100.....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande  
de MM. les médecins

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 30 francs au public.

## Institut de Biologie appliquée

57, 59, 60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bargue

PARIS (XV<sup>e</sup>) — Téléph. : Ségur 11-40

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.

Adopté par les Hôpitaux.

## VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire; composition polyvalente.

### Nomenclature et Indications :

*Néo-Dmégon* : Antigonococcique (voir p. 756).

*Néo-Dmesta* : Antistaphylococcique.

*Néo-Dmètys* : Anticoquelucheux (voir p. 756).

*Aplexil* : Préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des Fièvres éruptives.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

### Prophylaxie — Vaccinothérapie.

**VACCIN** : Antityphoïdique.

— Antistaphylococcique.

— Polyvalents.

— Pneumo-streptococcique.

— Anticoquelucheux.

— Antigonococcique.

— Antistreptococcique.

— Anticolibacillaire.

— Antimélitococcique.

Injectables en injections sous-cutanées.

Vaccin-Pansements non injectables.

Pyophylaxines, Hémophylaxines, Entérophyllaxine.

Dépositaires généraux :

**Éts DEFFINS**, 40, faubourg Poissonnière — PARIS.

**LABORATOIRE de BIOLOGIE MÉDICALE**

16, rue Dragon — MARSEILLE.

**HAMELIN**, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

**AVIGNON et HAYAT**, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

Pour littérature et échantillons :

16, rue Dragon — MARSEILLE.

## **VACCINS**

### **(Bruschettini).**

2 vaccins sont préparés selon la méthode très originale et très personnelle du professeur BRUSCHETTINI, de Gênes, par les

**Laboratoires FOURNIER Frères.**

7, rue Biscornet — PARIS.

1° Un vaccin Antipyogène polymicrobien polyvalent s'appliquant à toutes les infections dues aux pyogènes communs. Son absence à peu près totale de réactions, tant générales que locales ou focales, en fait le type de vaccin d'urgence.

2° Un vaccin Antigonococcique avec ses applications spécifiques.

### **Posologie.**

Ces 2 vaccins s'emploient à une dose moyenne d'une ampoule par jour et il est particulièrement recommandé de répéter les injections dans les cas graves. Cette posologie leur est particulière.

Sur demande il est envoyé littératures et échantillons ainsi qu'une trousse de vaccinothérapie d'urgence : trousse métallique contenant seringue, aiguilles et ampoules.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS.

## VACCINS IVAGO de Goldenberg.

(Injectables.)

**Avantages.** — La vaccinothérapie telle que la comprend Goldenberg est basée sur les acquisitions biologiques récentes du rôle de la peau dans la défense de l'organisme tout entier.

Ces vaccins, grâce à leur méthode spéciale de préparation, ne donnent *aucune réaction*. Ils sont injectés par gouttes (I à VI gouttes) *dans la peau*.

**Nomenclature.** — Vaccins « A » (antigrippal), « B » (antipyorrhéique), « D » (antistaphylococcique), « G » (antigonococcique), « M » (gynécologique), « P » (antipyogène), « R » (antiozéneux), « U » (anticolibacillaire).

### VACCINS IVAGO BUVABLES.

**Ivago-Coli.** — Pyélite, Pyélonéphrite, Cystite, Colibacillrose.

**Ivago-Sta.** — Furonculose, Anthrax, Abscess, Sycosis, Acné, etc.

**Ivago-Pyo.** Septicémie et toutes infections causées par les pyogènes communs.

**Présentation.** — En boîtes de 10 ampoules de 2 cc. chacune.

**Posologie.** — 2 ampoules par jour pour les adultes et 1 ampoule par jour en 2 fois pour les enfants. Une 1/2 heure avant le repas du matin (à jeun) et une 1/2 heure avant celui du soir dans un 1/2 verre d'eau pure.

Prix : 25 francs.

### GELÉES-VACCINS IVAGO PAR PANSEMENTS

**Gelée-Vaccin Ivago « B ».** — Infections bucco-dentaires Pyorrhée alvéolaire, abscess, etc...

**Gelée-Vaccin Ivago « D ».** — Infections staphylococciques : Furonculose, Anthrax, Sycosis, Acné, etc..

**Gelée-Vaccin Ivago « P ».** — Infections causées par les pyogènes communs.

**Gelée-Vaccin Ivago « M ».** — Gynécologique : Métrites, Salpingites, Leucorrhées, etc...

**Ovules-Vaccins Ivago.** — Métrites, Salpingites, Leucorrhées, etc...

**Laboratoires IVAÛO**

17, rue de Provence — PARIS (IX<sup>e</sup>). — Tél. : Prov. 76-18.

**L. BELIERES, Docteur en Pharmacie.**

## VACCINS-PANSEMENTS

Agissant par contact. Indolores, Atoxiques, Polyvalents,

- 1° **Anti-Pyogène général.** — Boîtes de 3 et 6 ampoules de 10 cc. (Plaies, Affections cutanées, Brûlures, Eczéma, Furoncles, Impétigo, etc.).
- 2° **Anti-Pyogène chirurgical.** — Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. (Pré- et post-opératoire).
- 3° **Gynécologique.** — Boîtes de 3 et 6 ampoules de 20 cc. (Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc.).
- 4° **Oto-rhino-laryngologique.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 5 cc. (Rhinites, Sinusites, Otites, Mastoïdites et toutes affections des voies respiratoires supérieures).
- 5° **Ophthalmologique.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 12 ampoules de 2 cc. (Conjonctivites, Dacryocystites, Blépharocystite, Ophtalmie purulente du nouveau-né et toutes affections oculaires suppurées).
- 6° **Trachôme.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 12 ampoules de 5 cc.

### Spécial URO-VACCIN

- 1° *Vaccin H.* — Boîtes de 10 ampoules de 5 cc. (Blenorragie, Urétrites aiguës, etc. Toutes affections gonococciques de l'homme.)
- 2° *Vaccin F.* — Boîtes de 10 ampoules de 10 cc. (Blenorragie, Urétrites, Métrites, etc. Toutes affections gonococciques de la femme.)

## VACCINS INJECTABLES

- 1° **Broncho-vaccin.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (Toutes affections des voies respiratoires, sauf tuberculose).
- 2° **Anti-pyogène général.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (Plaies, Affections cutanées, Furunculose, etc.).
- 3° **Anti-pyogène chirurgical.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (Pré- et post-opératoire.)
- 4° **Gynécologique.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc.).
- 5° **Oto-rhino-laryngologique.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (Rhinites, Sinusites, Mastoïdites et toutes affections des voies respiratoires supérieures.)

Dépôt général :

- 6° **Uro-vaccin.** — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (Toutes affections gonococciques).

**M. LESUEUR, Docteur en Pharmacie**

37, rue La Pérouse — PARIS.

Tél. : Passy 60-66.

**Laboratoires « VIRULTRA »**  
LAUNAY-SERQUIGNY (Eure).

Tél. 19 à Serquigny.

## VACCINS POLYVALENTS

du Docteur RENARD

pour le traitement des Infections Oculaires.

**Composition.** — *Vaccin n° 1* : Staphylocoques, Streptocoques, Massues, Entérocoques, Gonocoques, Pneumocoques, Filtrat de B. Pyocyaniques.

*Vaccin n° 2* : Même formule, mais sans Gonocoques.

**Indications.** — *Vaccin n° 1* : Conjonctivites purulentes graves.

*Vaccin n° 2* : Infections post-opératoires ou traumatiques, Infections palpébrales ou orbitaires.

**Mode d'emploi.** — Injections hypodermiques.

**Posologie.** — *Nouveau-né* : 1/4 de cc. le premier jour.

*Adultes* : 1/3 le premier jour.

Les jours suivants, augmenter la dose suivant réaction.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

## VACCINS-RONCHÈSE

### AMPHO-VACCINS

Lysat bactérien, ou filtrat de cultures, et bactéries entières.

**Avantages.** — L'association lysat microbien et microbes entiers détermine *rapidement* la formation d'antitoxines et provoque des phénomènes de défense contre l'infection (agglutination puis neutralisation de l'élément infectant), aboutissant à l'état d'immunité. Par leur double composition, les Ampho-Vaccins constituent un perfectionnement remarquable de la vaccinothérapie.

### AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. : lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Anti-infectieux.** — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales. Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis. Vaccination pré-opératoire.

**Antistaphylococcique.** — *Staphylocoques.*  
Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

**Intestinal.** — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Tous états intestinaux aigus ou chroniques.

**Pulmonaire.** — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer.*

Pneumonie, Broncho-pneumonie, Bronchites, Grippe, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjonctivites.

**Urinaire.** — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.



**Posologie :**

<i>Adultes.</i>	{	1 <sup>re</sup> injection .....	1/4 de cc.
		2 <sup>e</sup> — .....	1/2 cc.
		3 <sup>e</sup> inject. et suiv...	1 cc.
<i>Enfants.</i>	{	1 <sup>re</sup> injection .....	1/8 de cc. (II gttes)
		2 <sup>e</sup> — .....	1/4 de cc.
		3 <sup>e</sup> inject. et suiv...	1/3 ou 1/2 cc. selon l'âge.

Injectons journalières pour les doses d'essai, tous les 2 ou 3 jours pour les suivantes. Injections sous-cutanées ou intramusculaires. L'injection intraveineuse est possible si elle est jugée nécessaire. Délivrés en boîtes de 6 ampoules de 1 cc. 5.

Prix : 25 francs.

**AMPHO-VACCINS A INGÉRER**

Par cc. : lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Anti-infectieux.** — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales, Dermatoses, Vaccination pré- ou post-opératoire.

**Antistaphylococcique.** — *Staphylocoques.*

Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

**Antityphoïdique T. A. B.** — *Bacilles d'Eberth, Bacilles para A et B, Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacilles pyocyaniques.*

**Agent curatif** remarquable des infections typhique et para-typhiques et, grâce à l'association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

**Intestinal.** — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Auto-intoxications d'origine intestinale, Entérites, Appendicites, Cholécystites, Syndrome entéro-rénal, certains Rhumatismes, Insuffisance hépatique, Préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux Accouchements.

**Pulmonaire.** — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer, Bacilles pyocyaniques.*

Grippe, Bronchite, Pneumonie, Broncho-pneumonie, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjunctivites.

**Urinaire.** — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.

## **AMPHO-VACCINS A INGÉRER**

### **Posologie habituelle :**

*Adultes et adolescents :* 2 à 3 ampoules par jour, de préférence loin des repas.

*Enfants :* 1 à 2 ampoules par jour.

La posologie du *Vaccin intestinal* varie selon qu'il s'agit d'un cas aigu ou chronique ; elle est la suivante :

*Cas aigus :* 1 ampoule le matin à jeun, 1 le soir en se couchant, pour les *adultes* ; 1 ampoule par jour en 2 fois, pour les *enfants*.

*Cas chroniques et auto-intoxications :* Pour *adultes et enfants d'âge moyen* : 1 ampoule par jour le matin pendant 8 jours, puis 1 ampoule tous les 3 ou 4 jours.

### **Présentation :**

L'Ampho-Vaccin à ingérer intestinal est délivré en boîtes de 8 ampoules de 5 cent. cubes.

Les autres Ampho-Vaccins à ingérer sont présentés en boîtes de 10 ampoules de 2 cent. cubes.

Prix : 25 francs.

## **AMPHO-VACCINS PANSEMENTS**

Filtrat de culture additionné par cent. cube de un milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Antipyogène.** — *Staphylocoques, Streptocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*  
Furoncles, Anthrax, Abscesses, Dermatoses infectieuses, Interventions abdominales, Curettages, Cancers du col.

**Mode d'emploi.** — Mettre sur la plaie une compresse imbibée de vaccin. Un à deux pansements par jour. *Pour les cavités :* Imbiber une mèche de vaccin-pansement et l'introduire dans la cavité à traiter.

### **Deux présentations :**

Ampoules de 10 cc. Prescrire : Ampho-Vaccin, pansement antipyogène.

Ampoules de 2 cc. Prescrire : Ampho-Vaccin antipyogène pour petits pansements.

**Rhino-pharyngien.** — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Entérocoques, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer, Staphylocoques.*

Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive. Traitement abortif du coryza. Rhino-prophylaxie de la grippe. Présenté en ampoules qui se transforment en appareil d'instillation par l'adjonction d'une tétine livrée avec les ampoules.

**Posologie.** — 3 à 4 instillations par jour, ou encore des pulvérisations dans la journée, et 2 instillations, 1 le matin, 1 le soir.

Délivré en boîtes de 6 ampoules de 2 cent. cubes auto-instillables. Prix : 20 francs.

**Ampho-Tablettes** (Comprimés à base d'amphovaccin rhino-pharyngien). Voir page 46.

**Pyo-Amphogel** (Gelée molle à base d'Amphovaccin pansement antipyogène). Voir page 966.

**Laboratoires des Ampho-Vaccins.**

A.-D. RONCHESE, Docteur en pharmacie,  
6, rue Rothschild — NICE.  
62, rue Charlot — PARIS

---

## VACCINS " STÉNÉ "

**Vaccin antifuronculeux « Sténé ».** — Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques. (En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés.)

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

La boîte de comprimés. Prix public : 12 francs.

**Bouillon-vaccin antifuronculeux « Sténé »,** pour pansements. ☉

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

**Vaccin anti-coryza « Sténé » polyvalent.** — Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Le tube. Prix public : 8 francs.

**Ovules-Vaccin « Sténé ».** — Métrites, Salpingo, ovarites, pertes blanches.

La boîte. Prix public : 18 francs.

**Vaccin « opératoire » Sténé.** — Préventif des complications infectieuses post-opératoires. En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

**Bouillon-Vaccin « opératoire » Sténé.** — Pour pansements.

**Vaccin antipyrogène Sténé.** — Pour le traitement des plaies. Préventif et curatif de l'infection des plaies de toutes natures.

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En Bouillon-Vaccin pour pansements.

**Vaccin Antistaphylococcique « Sténé »**

**Bouillon-Vaccin Antistaphylococcique « Sténé ».**

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En bouillon-vaccin pour pansements.

**Laboratoires « STÉNÉ »**

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

Téléph. : Archives 46-47. Adr. télégr. ; Sténé 21 Paris.

## VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Louis Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un « vaccin vivant ».

Voir : Broncho-Vaclydun ; Coli-Vaclydun ; Entéro-Vaclydun ; Gynéco-Vaclydun ; Gono-Vaclydun ; Pyo-Vaclydun ; Staphylo et Strepto-Vaclydun.

## VACLYDERM

**Composition.** — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

**Indications.** — Réalise une vaccinothérapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furonculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

**Mode d'emploi.** — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

Le tube : 18 francs.

**Laboratoires CORBIERE**

27, rue Desrenaudes — PARIS

Tél. : Carnot 78-11. — Télégr. : Pantuto 74 Paris.

## VAGOSÉDYL

Sédatif du vague.

Dosage.

1 comprimé =	{	Phényléthylmalonylurée .....	}	22 0 gr. 017.
		Extrait de Jusquiame, titré en alcaloïdes.		
		Extrait de Valériane fraîche stabilisée...		
		Oxyde de zinc par voie humide.....		

Équivalence.

3 comprimés (pro die)	{	Pilules de Méglin.....	n° 1
équivalent sensiblement à		Phényléthylmalonylurée..	0 gr. 05

**Posologie.** — Les doses varieront suivant les cas de 2 à 5 comprimés par jour à prendre au début des repas.

**Indications principales.** — Hypervagotonie, Spasmophilie, Algies et Spasmes viscéraux, Entéralgie, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des Ptoses, Malaises en rapport avec la menstruation, la grossesse, la ménopause, Symptômes subjectifs du cœur (Vrais et Faux Cardiaques), Hypertension par artério-spasme et ses conséquences, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques, Asthme infantile, Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Excitation psychique, Tremblements, Prurits, Incontinence d'urine, Troubles du sommeil.

) **Laboratoires du VAGOSÉDYL**

20, rue des Martyrs — PARIS (IX°).

**G. GOUSSINET**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ancien interne des Asiles de la Seine, licencié ès sciences.

## VAGOTONINE

(Hormone du parasymphathique.)

**Composition.** — Hormone pancréatique différente de l'insuline. Essentiellement régulatrice du système organo-végétatif.

**Indications.** — *Hypertension artérielle* : la baisse de tension se manifeste 1/2 heure à 2 heures après l'injection, s'accroît pendant 6 à 12 heures, se prolonge 24 et même 48 heures et n'est jamais suivie d'hypertension réactionnelle. — *Diabète* : la VAGOTONINE permet la diminution des injections d'insuline et l'enrichissement du régime en hydrates de carbone. La VAGOTONINE est indiquée également dans l'hypersymphathicotomie, etc...

**Posologie.** — La VAGOTONINE est vendue en boîtes de 6 ampoules.

**Dose moyenne.** — Une ampoule par jour, en séries de 15 à 20 injections. Boîte de 1 ampoule-test de 0 gr. 02 pour essayer le traitement chez les hypertendus. Tous les hypertendus ne réagissent pas, en effet, à la VAGOTONINE, mais quand ils sont justiciables de son traitement, la baisse de tension se manifeste dès la première injection.

**Les Etablissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

**Perles.** — 3 à 6 par jour avant les repas ; ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

**Propriétés.** — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

**N. B.** — La Valbornine n'est pas un soporifique. Le sommeil n'est régularisé qu'au bout de quelques jours par sédation du système nerveux.

Le flacon : 10 fr.

**Henry ROGIER**

Docteur en pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.

## VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

### Composition :

Extrait alcoolique de valériane <i>stabilisée</i> .....	0 04
Extrait alcoolique de jusquiame.....	0 005
Extrait de datura.....	0 005
Extrait alcoolique de passiflore.....	0 03
K Br .....	0 05
Extrait alcoolique de cratægus .....	0 03
pour une dragée de 0 gr. 16.	

40 dragées par étui — Prix en France : 12 fr.

**Propriétés :** Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jusquiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratægus agit synergiquement.

**Indications.** — Etats nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété. Insomnie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthylisme, affections cardiaques ou vasculaires, digestives, génitales.

**Posologie :** Etats nerveux : 1 à 2 dragées par jour.

Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.

## VALEDYL

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

**Indications.** — Insomnies, vertiges, neurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques, troubles cardiaques.

**Formule.** — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratægus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballote, teinture de jusquiame.

**Forme.** — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur.

**Mode d'emploi.** — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

Téléphone : Diderot 04-71.

## VALENAL NOVALIS

**Composition.** — Valériane extr. 0,045 ; Crataegus extrait, 0,015 ; Saule blanc extr., 0,015 ; Passiflore extrait, 0,016 ; Hamamélis extrait, 0,01 ; Gardénal, 0,005 pour une dragée.

Produit joignant à toute une série d'extraits végétaux l'action antispasmodique et hypotensive du gardénal à petite dose ; ce n'est pas une révolution, mais une association logique bien dosée, active et sans danger.

**Indications.** — Déséquilibre du sympathique, Insomnies, Agitations nerveuses, Etat nerveux de la ménopause, Hypertension (surtout spasmodique), etc..

**Dose.** — De 1 à 4 dragées par jour. Cette dose peut être largement dépassée.

**Les Laboratoires NOVALIS**

OULLINS (Rhône).

---

## VALÉRIANATE GABAIL

**Seule préparation désodorisée.**

**Composition.** — Extrait de Valériane.  
Acide Valérianique.

**Indications.** — Toutes affections nerveuses, Neurasthénie, Insomnies, Epilepsie, Spasmes, tics, etc...

**Doses.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, aux repas.

*Enfants* : 1/2 dose.

Prix : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de  
Contrôle des Médicaments.

**Laboratoires S. GABAIL**

5, rue Lefebvre — PARIS (XV°).



**VALÉRIANATE GRIGNON**

à odeur dissimulée.

**Composition.** — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

**Forme.** — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antinerveux, antispasmodique.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

**Pharmacie GRIGNON**

2, rue Duphot — PARIS.

---

## VALÉRIANATE PIERLOT

Liquide ou en capsules.

### RÊSTE TOUJOURS ET MALGRÉ TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

Neurotrophe, actif, sédatif, inoffensif, il rétablit toujours l'équilibre du système nerveux en supprimant l'excitabilité morbide des neurones.

### Posologie :

1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non, le soir avant de se coucher et le matin à jeun.

---

**H. RIVIER**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.

## VALÉRIANE BYLA

(Sédatif régulateur du système nerveux.

Renferme tout le suc inaltérable de la *plante fraîche et vivante*, stabilisé et concentré. Ne contient ni acide valérianique libre, ni ammoniaque combinée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Stimulant des centres nerveux supérieurs affaiblis, dépresseur de l'excitabilité réflexe exagérée. Anti-épileptique, antispasmodique, analgésique, hypnotique.

**Indications.** — Névroses, hystéries, épilepsie, insomnies nerveuses, névralgies, neurasthénie, troubles de la ménopause, convulsions des enfants, palpitations, tachycardie, etc.

**Mode d'emploi.** — 3 cuillerées à café par jour.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## VALÉRIANE GMET

**Composition.** — Extrait total obtenu exclusivement à l'aide de racines de valériane sans adjonction d'acide valérianique ou d'autres produits de synthèse. Sans alcool.

**Propriétés.** — Puissant toni-sédatif du système nerveux central et périphérique.

Odeur conservée (indice de son activité), mais *goût peu prononcé*. Bien acceptée par les femmes et les enfants.

**Indications.** — Tous les états d'excitation et de dépression nerveuse. Névroses, Insomnie, Épilepsie. Chorée, Nervosisme, Convulsions, Terreurs nocturnes, Cauchemars. Dans la neurasthénie, lui adjoindre le *Composé Gmet*. (Voir page 244).

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

**Indications.** — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

**Posologie.** — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est inodore et d'une saveur agréable.

**Laboratoires PACHAUT**

130, Bd Haussmann — PARIS.

Téléph. : Laborde 16-72

---

## VALÉRIANOSE GIGON

**Composition.** — Extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

**Forme.** — Pilules glutinisées.

**Indications thérapeutiques.** — Sédatif du système nerveux, Antispasmodique, Anti-névralgique.

**Mode d'emploi et doses.** — 4 à 6 pilules par jour. Solubilité dans l'intestin.

## PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

**Laboratoire des Produits du Dr GIGON**

**A. FABRE, pharmacien**

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## VALÉRINODOR MALMANCHE

**Composition.** — Préparation liquide sirupeuse contenant par cuillerée à café : 0 gr. 10 d'extrait sec de Valériane stabilisée, 0 gr. 50 d'extrait fluide de *Passiflora incarnata*, 0 gr. 15 de Véronal sodique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant sédatif du système nerveux central. Tolérance parfaite. Sommeil calme sans nausées au réveil.

**Indications.** — Insomnies, Palpitations, Spasmes musculaires, Excitation psychique, Angoisse, Chorée, Convulsions, Toux nerveuse.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion de tilleul.

Prix au public : 14 francs.

**Laboratoire MALMANCHE**  
Pharmacien, Docteur ès sciences  
101, avenue de Paris  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de *Valérianate de Cérium*, sans odeur, de P. Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

**Indications.** — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

**Posologie.** — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible, 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de Valérium P. Thibault sont dosées à 0,05 de principe actif.

**Laboratoire R. J. SOUDAN**  
Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.  
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).  
Enregistré au Laboratoire n° 128-10.

## VALÉROBROMINE LEGRAND

**Composition.** — Éthers-Sels de l'Acide  $\alpha$  Bromovalérianique



**Avantages.** — La VALÉROBROMINE LEGRAND (*brome organique*) offre, par rapport aux bromures (*brome minéral*), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (*arsenic et phosphore organiques*), par rapport aux arseniates et aux phosphates (*arsenic et phosphore minéraux*). Elle possède, contrairement au valérianate d'ammoniaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valérianates, sans avoir à redouter *quelles* que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

**Indications.** — Toutes les névroses : Épilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc.

**Formes.** — *Liquide* : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. 2 à 6 cuillerées à café par jour. — *Capsules* : 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule enrobée de gluten, *ne se dissolvant que dans l'intestin*. 4 à 12 capsules par jour.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 18 francs.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *suc frais de valériane* combiné à l'éther mentholique de l'acide valérianique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

**Indications thérapeutiques.** — Neurasthénie, Hystérie, Insomnie, toutes affections nerveuses.

**Mode d'emploi.** — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire du VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet — PARIS.

Tél. : Wagram 37-58.

## VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif  
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Véronal sodique très pur..... 0 gr. 15

Extrait physiologique de Valériane fraîche  
par plasmolyse ..... 5 cc.

**Dose sédatif.** — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé  
2 à 3 fois par jour.

**Dose hypnotique.** — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Pas de contre-indication.

Prix : Solution : 16 francs.

Comprimés : 16 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

**Laboratoire BERGER**

14, rue des Pyramides — PARIS.

---

## VAL'OVARINE FARMA

**Déficiences ovariennes, Névroses, Etats spasmodiques, Malaises.**

**Composition.** — Association pluriglandulaire d'*ovaire intégral* et d'une infime proportion de *thyroïdine* avec l'extrait physiologique, déchlorophyllé, dégraissé et concentré de *valériane fraîche stabilisée*.

**Pour un cachet :** Ovarine intégrale ..... 175 milligrammes.  
 Thyroïdine..... 5 —  
 Extrait de valériane fraîche... 150 —

**Avantages.** — **Cachets** roses très petits. — Odeur agréable. — **Conservation garantie par procédé spécial.** — Présentation soignée. — Tolérance parfaite. — Assimilation facile.

Les composants opothérapiques, obtenus d'après une technique tout à fait nouvelle rendent leur efficacité thérapeutique maximum ; l'extrait ovarien contient absolument toutes les hormones. *La rapidité d'extraction de ces produits permet en outre d'affirmer qu'aucune fermentation n'a été possible au cours de leur fabrication. Les ovaires en particulier sont garantis de premier choix et prélevés sur des animaux jeunes.*

L'extrait physiologique de valériane préparé par une méthode brevetée très récente est désormais le médicament valérianique le plus actif

**PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES.** — Insuffisances ovariennes  
 Nervosisme.

Hypotenseur. — Modérateur de l'excitabilité réflexe. — Antispasmodique et sédatif du système nerveux central. — Analgésique. — Hypnotique.

Rendement maximum de l'action névrosthénique de la valériane.

**INDICATIONS.** — Infantilisme génital. — Troubles de la croissance — Menstrues rares, peu abondantes, douloureuses. — Colique utérines. — Troubles de la grossesse, de la sécrétion lactées — Castration ovarienne. — Obésité glandulaire.

*Tous états accompagnés de troubles nerveux.* — Inquiétude de la Puberté. — Troubles divers de la Ménopause. Chorée. — Cauchemars. — Neurasthénie. — Etats hystériques. — Insomnies nerveuses. Epilepsie menstruelle. — Palpitations. — Tachycardie.

**POSOLOGIE.** — Sauf indication spéciale du médecin traitant, la cure moyenne de VAL'OVARINE doit être faite chaque mois à raison d'une boîte de cachets à prendre au cours des dix jours qui précèdent les règles. (Un au milieu de chaque grand repas, soit deux par jour.) Reprendre alors la VAL'OVARINE pendant une nouvelle période de dix jours et ainsi de suite. (*Traitement à suivre également en cas d'obésité.*)

*Pour obtenir un effet certain et durable, on continuera ce traitement pendant 3 à 4 mois consécutifs.*

Les femmes ayant subi l'ablation des ovaires ou qui ont passé l'âge critique choisiront de préférence pour suivre un traitement de dix jours de VAL'OVARINE une période où elles constatent soit du nervosisme, soit de l'insomnie, soit une sensation de pesanteur.

**Laboratoire des Spécialités FARMA**

64, rue d'Orsel — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

O. C. P. — C. N. P. F. et toutes les Pharmacies.



## VALOVOSAN

1 comprimé : 0 gr. 15 d'Isopropyl bromo-acétylurée, 0 r. 04 d'ovaires frais, sous forme de poudre desséchée et 40 unités-souris d'hormone sexuelle féminine.

**Indications.** — Malaises neurasthéniques, Symptômes hystériques, troubles nerveux de la ménopause, Règles douloureuses, etc.

**Forme.** — Comprimés.

**Mode d'emploi.** — 1-2 comprimés 3 fois par jour.

**P. BASUYAUX**, pharmacien  
94, rue Pasteur  
FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine)

## VALTHÈNE

(Gouttes)

Antispasmodique puissant.

**Indications.** — Toux laryngées, coqueluche, asthme, toux rebelles des tuberculeux.

**Composition.** — Alcoolature d'Alum Cepa, Teinture de Drosera, Teinture de Cochenille.

*Ne contient aucun toxique. Goût agréable.*

**Posologie.** — Doses moyennes à prendre dans une petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois par jour.

Enfants au-dessous d'un an...	V à X gouttes.
— de 1 an à 5 ans .....	X à XX —
— au dessus de 5 ans....	XX à XL —
Adultes .....	L à LX —

Flacon de 30 cc. Prix : 11 fr. 50 (exempt d'impôt).

Laboratoire de la VALTHÈNE

A. VALAT

51, rue de Tourtille — PARIS (XX<sup>e</sup>).

# VANADARSINE GUILLAUMIN

## GOUTTES

**Composition.** — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

**Propriétés.** — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

**Indications.** — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

**Mode d'emploi.** — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler: dose moyenne, X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

Prix : 12 francs.

# VANADARSINE GUILLAUMIN

## AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné.)

**Composition.** — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube..

**Propriétés.** — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergétique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

**Indications.** — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

*Enfants* : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. (prix 15 fr.), et de 3 cc. (dose forte) (prix 20 fr.).

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes,  
numérotés de 1 à 5.

**Doses et mode d'emploi.** — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le sixième jour, et continuer la variation.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action laxative toujours identique. — Jamais d'accoutumance ni d'irritation. — Tolérance parfaite. — Innocuité absolue.

Prix : 10 francs la boîte.

**Laboratoire de la VARILAXINE**  
**SURGÈRES (Charente-Inférieure).**

---

## VARISCLÉRINE

(Ampoules)

**préparées selon les indications du**  
**Professeur Sicard**

Injectons sclérosantes intravariqueuses,  
sans accidents, sans insuccès.

**Varisclérine A:** Salicyl de soude.

**Varisclérine B:** Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 30 fr.  
Prix spéciaux au corps médical.

**Laboratoire Angelini**  
61, rue de Seine — PARIS.  
Tél. : Danton 92-73.

## VASCUROL

(Dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

**Composition.** — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

**Indications.** — Hypertension, Presclérose et Artério-sclérose. Troubles de la ménopause. Varices. Hémorroïdes. Obésité.

**Mode d'emploi.** — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

**Laboratoire P. GUÉRIN**

MEULAN (Seine-et-Oise).

---

## VASOLAXINE

Huile de vaseline pure.

**Dose :**

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.

*Enfants* : 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

**Indications :**

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon : 12 francs.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.  
**Forme.** — Gouttes.

### Indications thérapeutiques.

*Troubles circulatoires* : Troubles des règles et Ménopause, Congestions broncho-pulmonaires, Hémoptysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

*Troubles glandulaires* : Congestion thyroïdienne, ovarienne, pancréatique ; Troubles sécrétoires, salivaires et cutanés. Sécrétion lactée.

*Troubles sensitivo-moteurs* : Arythmie, Tachycardie, Névralgisme facial, Névro-dermites.

**Mode d'emploi.** — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau, en commençant par la dose la plus faible.

Après les repas, matin, midi et soir.

**Prix de vente au public** : 16 francs le flacon.

**Laboratoire de Pathologie Générale de Paris**  
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél : Auteuil 35-25.

---

## VASO-RHINOL ADRÉNALINÉ

**Forme.** — Pommade pour enfants et adultes.

**Composition.** — 1<sup>o</sup> Pommade pour enfants : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Pétroléine ;

2<sup>o</sup> Pommade pour adultes : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Novocaïne, Pétroléine.

**Indications.** — Infections du Rhino-Pharynx, Etat catarrhal, Troubles Vaso-Moteurs.

**Doses.** — Gros comme un pois dans chaque narine, deux à trois fois par jour.

**Laboratoires des VASO-RHINOL**

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

## VASO-RHINOL

Simple et mentholé.

**Forme.** — Solution huileuse.

**Composition.** — 1° (V. R. simple) : Oxyde de Terpilène, Résorcine, Camphre, Linalol; Para-amido benzoate d'éthyle, Terpènes purifiés, Huile olive stérilisée.

2° (V. R. Mentholé) : Même formule plus menthol.

**Indications.** — 1° V. R. simple : Infections du Nez, du Pharynx, du Larynx et des Oreilles.

2° V. R. mentholé : Troubles sécrétoires, état congestif du Rhino-Pharynx, des Fosses nasales et du Sinus.

**Doses.** — X gouttes ou plus selon les cas, 2 à 4 fois par jour en position couchée.

**Laboratoire des VASO-RHINOL**

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

---

## V. A. V.

Technique du D<sup>r</sup> Vaudremer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antitoxiques et curatives qui permettent d'éviter parfois les interventions chirurgicales, l'hospitalisation et les immobilisations prolongées.

**Indications thérapeutiques.** — Adénites, Ostéites, Arthrites bacillaires, Péritonites, Bacilloses rénales, Lésions oculaires, Granulomes annulaires, Pityriasis, certains Psoriasis, Lupus, etc., associés ou non aux lésions pulmonaires.

**Forme et mode d'emploi.** — Emulsion forte pour les tuberculoses chirurgicales (injectable).

Emulsion faible pour les tuberculoses chirurgicales et pulmonaires associées (injectable).

Prix au public : 60 francs.

**Laboratoire ELOCINE**

51, rue du Ranelagh — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléph. Auteuil. 84-18.

## VÉGANINE

Le médicament à action renforcée.

**Analgésique — Antipyrétique — Antigrippe.**

Comprimés d'un procédé de fabrication nouveau,  
assurant une désagrégation immédiate.

### Composition :

Phosphate de Codéine ...	0 gr. 01	} par comprimé.
Acide acétylsalicylique .	0 gr. 25	
Phénacétine.....	0 gr. 25	

### Action thérapeutique et indications :

La Véganine, composée d'après la théorie de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés :

Sédatif puissant par la Codéine.

Analgésique par l'acide acétylsalicylique.

Analgésique et antithermique par la Phénacétine.

Elle constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, également utile en neurologie (états anxieux).

Sa double action, synergique d'activité et diminutive de toxicité, permettra d'atteindre le résultat recherché avec des doses faibles et sans phénomène d'intolérance.

### Doses et Mode d'Emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec café ou thé.

#### Deux Modèles

Le tube de 10 comprimés : 6 francs.

Le tube de 20 comprimés : 10 francs.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

**Laboratoires SUBSTANTIA**

**F. Guillemoteau, pharmacien**

13, rue Pagès — SURESNES.

Agence générale pour la Belgique :

**Laboratoires SUBSTANTIA S. A.**

53, rue du Poinçon — BRUXELLES

## VÉGÉPHOS

**Composition.** — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

**Propriétés.** — Recalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

**Formes.** — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Cachets : au public : 11 fr.

Granulé : — : 13 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue de Nonnains-d'Hyères — Paris (IV<sup>e</sup>).

## VÉGÉTOL EXTERNE

Médication micro-balsamique.

Spécifique des infections locales de la peau et des muqueuses.

**Composition.** — Complexe liquide renfermant les constituants de plusieurs essences (thym, aspic, citronnelle, etc.) et les produits de réaction de l'acide picrique sur ces constituants.

**Propriétés.** — Produit non toxique, microbicide, décongestionnant, analgésique et cicatrisant, grâce à l'action de l'acide picrique, des essences et de leurs dérivés.

**Indications.** — Plaies, furoncles, anthrax, panaris. Affections des yeux, du nez, de la gorge, des oreilles. Maladies gynécologiques (en injections). Maladies des voies urinaires en injections et en instillations.

**Suppositoires :** Hémorroïdes, fistules, fissures, prostatites.

**Ovules :** Métrites, vaginites, salpingites, pertes blanches.

**Laboratoire du VEGETOL**

8, rue des Quatre-Fils — PARIS.

Tél. : Archives 65-65.



## VEGUVA

**Composition.** — Aliment hydrocarboné riche en vitamines A, B, C, renferme, à l'état de poudre impalpable, la totalité des substances azotées, des sels minéraux et de la cellulose des épinards, carottes et tomates.

**Forme.** — Poudre.

**Indications.** — *Nourrissons* : anorexie, arrêt de croissance, troubles du développement, troubles nutritifs aigus et chroniques, alimentation de transition pour passer du régime lacté au régime mixte.

*Adultes* : Régime achloruré, alcalose.

**Doses.** — *Nourrissons* (après 5 mois) : une mesure répartie dans les biberons de la journée.

*Adultes* : deux à trois mesures à répéter plusieurs fois dans la journée.

Délayer le Veguva à l'aide d'un liquide bouilli et refroidi (lait, eau, bouillon), puis l'incorporer à l'alimentation déjà prête.

Ne pas faire cuire.

Pour la poudre de légumes frais voir également : CA-ROTTASE.

**Laboratoires WANDER**  
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

## VEINALGOL

Spécifique de la maladie veineuse.  
Régulateur de la circulation sanguine.

**Présentation.** — Comprimés dragéifiés.

### Composition :

Extrait s. d'Hamamélis.....	0,02
Int. de Marron d'Inde.....	0,02
Ext. m. de Viburnum .... .	0,01
— — Seneçon....	0,01
— — Genêt .....	0,005
— — Cupressus .....	0,005
— — Stigmate de maïs .....	0,01
Rhamnus Frangula Pulvérisé.....	0,02
Extrait de Thyroïde.....	0,005
— Hypophyse (lobe post.).....	0,002

**Indications.** — La maladie veineuse dans toutes ses manifestations (dilatations et stases, varices, hémorroïdes, suites de phlébites et douleurs qui les accompagnent).

Troubles de la circulation générale.

Congestions pelviennes et troubles des fonctions génitales de la femme.

**Posologie.** — Deux comprimés matin et soir avant le repas, par période de 10 jours.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires VISCONTI**  
64, boulevard Barbès — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## VEINOGENE

Ovoïdes à base d'extrait de genêt, hydrastis, hamamélis, viburnum, marron d'Inde, iodure, bromure, phényléthylmalonylurée.

Circulation veineuse, Troubles de la puberté et de la ménopause, Etats congestifs, Phlébites, Hémorroïdes, Ulcères.

### Posologie :

2 à 6 ovoïdes par jour avant les repas.

Dépôt général :

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

**Composition.** — Surrénales, Hypophyse, Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratœgus, Cœsculus, Viburnum, Valériane.

**Indications.** — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

**Formes.** — Pilules et gouttes.

### Dose :

*Pilules* : 4 à 6 par jour aux repas.

*Gouttes* : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

Prix : *Pilules et gouttes* : 12 francs.

**Laboratoire Moderne**

**d'Opothérapie et Biologie Médicale**

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

## VÊINOSÉRUM

**Indications.** — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes, et tous états congestifs.

1<sup>o</sup> *Forme gouttes* : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamélis, rhamnées).

Doses : XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 15 fr.

2<sup>o</sup> *Forme liqueur*, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses : 1 cuill. à soupe matin et soir, 15 jours par mois. — 12 fr.

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

3, Place Intérieure Saint-Michel  
TOULOUSE.

---

## VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marron d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

**Indications.** — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

**Doses.** — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## VEINOTROPE

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement des troubles veineux.

**Indications.** — Varices. Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la Ménopause et de la Puberté.

### Composition.

#### A. — *Veinotrope. M.*

(Usage masculin, comprimés roses).

Para-thyroïde.....	1 milligr.
Orchitine.....	35 —
Surrénale.....	5 —
Pancréas.....	10 centigr.
Hypophyse.....	1 milligr.
Noix vomique.....	5 —

Extrait Hamamélis, Marron d'Inde. 15 milligr.

#### B. — *Veinotrope. F.*

(Usage féminin, comprimés violets.)

Para-thyroïde.....	1 milligr.
Ovarine.....	35 —
Surrénale.....	5 —
Pancréas.....	10 centigr.
Hypophyse.....	1 milligr.
Noix vomique.....	5 —

Extrait Hamamélis, Marron d'Inde. 15 milligr.

**Mode d'emploi.** — 2 comprimés 1 heure avant les principaux repas. 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

**Formule F :** interrompre pendant la période menstruelle.

Prix de vente au public : 18 francs.

## VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pan-	
créas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile, q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Prix de vente au public : 22 francs.

**Laboratoires LOBICA**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## BANDE DE CRÊPE VELPEAU

**Bande de tissu élastique sans caoutchouc.**

La meilleure des bandes de crêpe : **Légère, douce, extensible, chaude, lavable.**

Filet bleu à utiliser lorsque la chaleur n'est pas nécessaire.

**Plaies, Varices, Efforts.** Prix marqués 5 cm. : 5 fr. 50 ; 7 cm. : 7 fr. 25 ; 10 cm. : 9 fr. 75.

Filet rouge. — Plus riche en laine. A utiliser lorsque la chaleur est nécessaire **Douleurs, Rhumatismes.**  
5 cm. : 6 fr. 75 ; 7 cm. : 9 fr. ; 10 cm. : 13 fr. ; 15 cm. : 18 fr.

**Ceintures de 20 et 30 cm. (25 et 40 fr.) pour Grossesse et Opérations.**

Bande rose sans filet. Même qualité que la bande filet rouge. Spécialement créée pour l'usage féminin. Prati- quement invisible sous les bas fins.

5 cm. : 7 fr. 10 ; 7 cm. : 9 fr. 50 ; 10 cm. : 13 fr. 60.

Toutes les bandes de crêpe ne sont pas des bandes de crêpe Velpeau.

### PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS

## VÉRALGINE

*Spécifique contre l'élément douleur.*

*Sédatif et analgésique à action ultra-rapide et prolongée.*

Association moléculaire d'analgésiques vrais (Phénétine, Amidopyrine) à action élective sur les centres corticaux de la douleur avec le Soné- ryl dérivé barbiturique, étudié par MM. les Professeurs Carnot et Tiffeneau, agissant sur les pseudo-centres de Sherington. Cette asso- ciation renforce et, selon l'expression de Burgi, potentialise l'action curative de chaque constituant, procurant ainsi une rapidité et une durée d'action remarquables avec des doses très faibles et sans aucune intolérance ni réaction cutanée.

**Indications.** — Tous cas justiciables de la morphine, toutes dou- leurs; Cephalées, Névralgies Coliques néphrétiques ou hépatiques, Goutte, Névrites, Rhumatismes, Zona, Sciatique, Migraines des hypertendus, Dysménorrhées, etc., et en art dentaire : Périostite, Pulpite, Interventions, Extractions, Fraisages, etc...

Les comprimés portent un trait de division permettant de fractionner les doses.

**Posologie.** — Adultes : 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants : 1/4 ou 1/2 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

Comprimés : 8 francs. Cachets : 6 francs.

Laboratoire du **MAINGUY**

**M. BASSIN**, Docteur en pharmacie à **BONDY** (Seine).

*Échantillons sur demande.*

## VÉRIANE BURIAT

**Composition.** — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 d'amide barbiturique diéthyle et 1 gramme de Valériane fraîche et INODORE.

**Indications.** — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

### Posologie :

**Adultes.** — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café, espacées dans les 24 heures. Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 3 heures avant le moment du sommeil dans une infusion ou eau sucrée.

**Enfants.** — XXV gouttes par 24 heures et par année d'âge, soit espacées, soit avant le moment du sommeil suivant les cas.

Prix : 14 francs.

**Laboratoire BURIAT**

25, rue Copernic — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## VERMIFUGE CORNET

**Composition.** — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (semen-contra, mousse de corse, fougère mâle, etc.) de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

**Forme.** — Liquide, de conservation indéfinie.

**Indications thérapeutiques.** — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales).

### Doses et mode d'emploi :

Jusqu'à 1 an .....	1/2 cuillère à café.
De 1 à 8 ans.....	1 — —
De 8 à 15 ans.....	2 — —
Adultes .....	1 à soupe.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

**Laboratoires SERRE**

7, place Pey-Berland — BORDEAUX.

## VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contrà d'Alep de chœnopodium anthelmenthicum et de pyrethrum anthemis, présentée sous forme de sirop aromatisé à la vanille.

Agréablement accepté par enfants et adultes.

Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Chaque cuillerée à café renferme 42 mgr. 5 de semen-contrà, 50 mgr. de pyrethrum anthemis et 2 mgr. 5 d'essence de chœnopodium.

### Posologie :

*Enfants de 1 à 5 ans* : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

*Enfants de 5 à 10 ans* : Une cuillerée à dessert.

*Adultes* : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë, doubler les doses.

Prix : 8 francs.

**M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie.**

Cinq-Cantons — BAYONNE.

## VERNIS A LA DIACHUSINE

### Arsénicale.

Traitement externe des Néoplasmes, Cancroïdes, Cancer épithélial de la face.

Le Vernis à la Diachusine arsénicale s'adresse aux cancroïdes en général, surtout aux petits cancroïdes de la face.

**Mode d'emploi.** — On commence à déterger l'ulcération cancroïdale de ses croûtes à l'aide de compresses humides, puis on pratique l'assèchement exact à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Cela fait, à l'aide d'un pinceau, on recouvre de vernis à la Diachusine arsénicale la surface ulcérée, de façon qu'il dépasse et recouvre largement ses bords ordinairement épaissis. Il n'y a plus rien à faire alors, qu'attendre que la croûte formée se détache spontanément, ce qui arrive généralement du quinzième au vingtième jour. Une palpation minutieuse permet alors de s'assurer qu'il ne reste aucune induration suspecte, auquel cas on devrait recourir à une nouvelle application de vernis.

Prix : 15 francs le flacon.

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## VERONIDIA

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de *Passiflora incarnata* dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations, Phobies. Insomnies. Névrose d'angoisse (mal de mer, bourdonnements).

**Dose.** — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

**Prix de vente au public :** 18 fr. (solution). Le tube de comprimés : 14 fr. 50.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

*R. MOREUX, Pharmacien*

Ancien interne des hôpitaux

98, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

---



## VERRULYSE

**Composition.** — A base de glycérophosphates (phosphate vital) de chaux, fer, manganèse, magnésie, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

**Formes.** — Poudre légèrement comprimée en petits cachets.

Boîte de 60 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.

Demi-boîte de 30 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de moins de 8 ans.

**Dose et mode d'emploi.** — *Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.* — 1 cachet par jour pendant 60 jours, au début d'un repas (toujours le même de préférence).

*Pour les enfants de moins de 8 ans.* — 1 cachet tous les deux jours (30 cachets en 60 jours) ou mieux : 1/2 cachet par jour délayé dans une cuillerée de potage ou tout autre aliment, pendant 60 jours.

### Propriétés :

**1° Effet local.** — La 2<sup>e</sup> ou la 3<sup>e</sup> semaine, les verrues prennent une teinte rosée au pourtour ou deviennent le siège d'une légère démangeaison. Elles s'éliminent ou se résorbent dans le mois qui suit le traitement. Dans le cas contraire, reprendre celui-ci à dose double.

**2° Effet général.** — Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants de l'entrain, de l'appétit, du teint, des fonctions intestinales.

**Indications.** — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.).

Exerce une action favorable contre d'autres productions épidermiques, pour lesquelles une expérimentation plus étendue est en cours.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 6 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

**Formule Jacquemaire n° 60.** — Cette formule, peu différente de celle de la Verrulyse, a l'avantage de pouvoir être prescrite comme une formule magistrale. Elle ne porte sur la boîte aucune indication et garde ainsi le secret du diagnostic.

M. MIGUET, docteur en pharmacie.

Établissements JACQUEMAIRE  
VILLEFRANCHE (Rhône).

## VERTICURINE

**Composition.** — Silicate de soude, chimiquement pur.

**Action.** — Hypotensive-antiathéromateuse déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

**Indications.** — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux, Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque. Pré-sclérose, Vertiges, Ménopause.

**Formes et doses.** — 1<sup>re</sup> *Liquide*: chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose: 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas, 2<sup>de</sup> *Comprimés*: chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose: 2 comprimés à chacun des principaux repas.

*Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.*

Verticurine, liquide: le flacon, 18 francs.

Verticurine, comprimés: le flacon, 14 francs.

**Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

47. rue Féray — CORBEIL (S.-et-O.)

---

## VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

**Au Cantharidate de Soude.**

Le **Vésicatoire Rose Beslier** à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

**Indications.** — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonie, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc.

**Présentation.** — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10×10.

Chaque carré, mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant  
DIGOIN.**

## VICHY-PURGATIF

Association de l'Eau alcaline naturelle de Vichy avec les Sulfates de Soude et de Magnésie (75 gr. par 1/2 litre).

Recommandé dans tous les états inflammatoires de l'intestin, dans l'obésité, les maladies du foie, de l'estomac, le manque d'appétit.

*Dose purgative* : prendre le 1/3, la moitié, les 3/4 ou même la bouteille entière, suivant l'âge ou la constitution de la personne.

*Dose laxative* : Un verre à bordeaux ou un demi-verre le matin à jeun.

**Administration :**

7, rue Galvani — PARIS.

**Exploitation :**

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY.

---

## VIN DE BAUDON

Antimoni-phosphaté.

**Composition.** — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

**Avantages.** — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

**Indications thérapeutiques.** — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

**Posologie.** — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Prix : 18 francs

**Laboratoire VAUDIN et GUILLAUMIN.**

Docteurs en Pharmacie, 12, rue Charles-V — PARIS.

## VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif.

Malaga vieux. Quinquina. Cacao.

### Indications :

Faiblesse générale, Anémie,  
Surmenage, États consomptifs, Diabète,  
Convalescence des maladies aiguës,  
Anémie palustre, etc.

### Dose :

Un verre à madère aux deux principaux  
repas.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## VIN DE CARNÉOSE

Vin supertonique.

**Composition.** — Quina-cola-coca, lacto-phosphate, condurango, plasma musculaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Super-toni-nutritif rapide et sûr. Ne fatigue pas l'estomac.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 verre à madère 3 fois par jour avant les repas.

*Enfants* : demi-dose.

Prix :

Le litre : 24 francs.

Le demi-litre : 15 francs.

**USINES ET LABORATOIRES  
DU BLOSSET  
MOULINS-SUR-YÈVRE (Cher).**

**VIN DE CHASSAING**

**à la pepsine et à la diastase.**

S'emploie dans toutes les affections stomacales provenant d'une insuffisance de digestion, à la dose d'un ou deux verres à liqueur immédiatement après le repas.

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

1, Quai Aulagnier

ASNIÈRES (Seine)

---

## VIN DE VIAL ET SIROP DU VIN DE VIAL

**Composition analogue.** — Lacto-phosphate de Chaux, Ecorce de Quinquina, Substances extractives de la Viande.

**Propriétés thérapeutiques.** — A base de substances indispensables à la formation et à la nutrition du plasma, de la fibre musculaire, de la cellule nerveuse et du système osseux. Ces produits peuvent être considérés comme le type complet de la médication fortifiante et tonique. Sous leur influence, on constate une forte amélioration de l'appétit, une augmentation du poids, la coloration du visage réapparaît. Le malade, d'abord défaillant, ressent vite un « mieux » sensible.

Cliniquement, ces signes sont confirmés par une augmentation du nombre des globules rouges, une hyper-tonicité du système nerveux, une fixation intense de la chaux, ainsi qu'une notable amélioration du métabolisme basal.

**Avantages.** — Le *Vin de VIAL* peut être administré à tous les individus (à l'exception des albuminuriques, maladies de peau et contre-indications de l'emploi de l'alcool). De goût particulièrement agréable, il est accepté par les malades les plus délicats et les plus difficiles. Le sirop est particulièrement réservé aux enfants et aux malades qui ne peuvent utiliser un produit alcoolique.

**Indications.** — *Chez l'enfant*, le sirop du Vin de VIAL est tout spécialement indiqué pendant la période de croissance. Il apporte à l'organisme les éléments toniques et les minéraux nécessaires. Chez les lymphatiques, il aide puissamment à la défense de l'organisme.

Chez les petits rachitiques, il favorise la fixation de la chaux et la formation du squelette.

*Chez les jeunes gens*, le Vin de VIAL est d'un grand secours dans les anémies, il améliore le terrain et défend les pré-tuberculeux.

*Chez les vieillards*, il lutte avantageusement contre la dépression et la dé-phosphatisation.

*Chez les femmes enceintes et les nourrices*, il facilite les apports nécessaires à la formation du squelette foetal et à la lactation.

*Chez les convalescents* (de maladies infectieuses, ou interventions chirurgicales), chez les amaigris, les épuisés, et en général dans tous les états de misère physiologique, il contribue à rétablir l'équilibre des forces et assure un retour rapide à la normale.

**Mode d'emploi.** — *Sauf avis contraire du médecin*, 1 verre à liqueur avant chaque repas pour adultes, et 1 cuillerée à bouche pour enfants. — Pur ou dilué dans un peu d'eau.

**Laboratoires H. VIAL, Pharmacien**

36, Place Bellecour — LYON.

## VIN GIRARD

### Iodo-tannique phosphaté.

**Nature.** — Le VIN GIRARD est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage. Un verre à madère de VIN GIRARD contient :

Iode.....	0 gr. 075
Tannin .....	0 gr. 50
Lactophosphate de chaux ....	0 gr. 75

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; 1/2 dose pour enfant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique, reconstituant, augmente la phagocytose.

**Indications.** — Adénopathies, Lymphatisme, Scrofulé, Tuberculose apyrétique, toutes convalescences, en particulier infectieuses et grippales.

**Laboratoire A. GIRARD**

48, rue d'Alésia, — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

Enregistré au Laboratoire National n° 405-2.

## VIN « LUX GAILLAC » MOUSSEUX

(Cuvées réservées, méthode champenoise)

Irradié par les rayons Ultra-Violets.

Procédés des docteurs Loubat, Durand, Muller, Popovitch.

### **Tonique — Stimulant.**

S'emploie dans tous les états de fatigue cérébrale et physique, les anémies, le diabète, etc... Il convient tout spécialement aux convalescents d'affections chirurgicales ou médicales. Il stimule toutes les fonctions de défense organique. Il est indiqué dans le mal de mer et les vomissements.

Vente exclusive par caisse de 12 bout. à 180 francs la caisse doux, demi-sec, brut.

**Établissements du Docteur DURAND**  
6, avenue Foch — GAILLAC (Tarn).

---

## VIN RAIMOA TONIC

**Composition.** — Champagne. Chlorure de magnésium, 0,80 par bouteille. Stimulants digestifs aromatiques divers.

**Indications.** — Mal de mer. Vomissements même dénommés incoercibles. Atonie générale, notamment d'origine digestive. Surmenage physique ou intellectuel. Cancer.

### **Mode d'emploi :**

*Enfants :* De 2 cuillerées à café à 2 verres à madère en 24 heures.

*Adultes :* Comme stimulant, 2 flûtes en 24 heures ; comme excitant, jusqu'à une demi-bouteille par 24 heures.

**Laboratoire des Produits Raimoa**

**COLLIGNON-SAVERS**

264, boulevard Voltaire — PARIS.

Téléph. : Diderot 54-96.



## **VIOFORME CIBA** **et ovules au Vioforme**

(Iodochloroxyquinoléine.)

Succédané de l'iodoforme, inodore, non irritant : antiseptique et kératoplastique.

**Indications.** — Plaies atones, ulcères variqueux, eczémas, escarres, brûlures.

**Doses.** — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100.

Se formule magistralement, ou :

*Boîte poudreuse : 12 francs.*

**Ovules au Vioforme.** — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

*La boîte de 6 : 13 francs.*

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**  
109-113, Boulevard de la part-Dieu — LYON

---

## **VIOPHAN**

Acide phénylcinchoninique de synthèse spéciale :  
*fabrication entièrement française.*

**Propriétés.** — 1° *Non toxique* : Le chien supporte plus de 2 gr. par kilo de poids ; à l'autopsie, foie et reins magnifiques, ne présentant pas de signes de dégénérescence, ni d'inflammation.

2° Mobilisateur et éliminateur spécifique de l'acide urique et des insolubles après modification interne profonde empêchant l'irritation des muqueuses de l'appareil urinaire et permettant une *miction indolore*.

3° Antithermique, Antinévralgique, Antiphlogistique, Anticholestérinhémique.

**Indications.** — Goutte aiguë et chronique, Sciatique, Rhumatisme articulaire aigu et chronique. Névralgies rebelles, Lumbagos, Artériosclérose, Arthritisme.

**Posologie.** — 2 à 12 comprimés ou cachets par 24 heures, au repas. Boissons abondantes. Cure intermittente.

**Présentation** : 20 cachets ou comprimés 0 gr. 40.

**Prix** : 15 fr.

**Laboratoire du Viophan**  
81 et 83, rue de Lille. — ROUBAIX.

## VIOSTEN

**Composition.** — Vitamines (ergostérol et lipoides irradiés), Phosphatides (glycérophosphate de choline), Ether benzylocinnamique.

**Comprimés. — Granulé. — Injections de 1 cc.**

**Indications.** — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme.

Chez les nourrissons et les déficients digestifs employer la **Zymatine irradiée** (Zymatine + Nucléinate de Ca + Ergostérol irradié).

**Doses.** — *Enfants* : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1 comprimé par jour, pendant les repas. 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour.

De 3 à 12 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 12 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

*Adultes* : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Prix : Comprimés, 15 fr. — Ampoules, 20 fr. — Granulé, 15 fr.

**LABORATOIRES LESCENE**

PARIS, 58, rue de Vouillé. — **LIVAROT** (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

## VIOXYL MOUNEYRAT

**Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.**

**Indications.** — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

**Formes.** — Elixir et Granulé.

**Posologie.** — *Adultes* : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

## VIRADÈNE

Synergie de glandes génitales, composé phosphorique, phytothérapique, extrait de noix vomique, nucléinate de manganèse, extrait de maté.

**Indications.** — Dépression nerveuse chez l'homme, affaiblissement des facultés, neurasthénie, sinistrose, surmenage, sénilité prématurée, difficultés de l'acte génésique, frigidité, troubles de la puberté, convalescences difficiles, etc...

**Doses.** — 4 dragées par jour en moyenne.

**Laboratoires du FEMINADÈNE**

120, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## VISCO-SÉRUM

Sérum reminéralisateur nerveux sensibilisant, isotonique, isovisqueux.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les états de dépression du système nerveux et de l'appareil cardio-vasculaire.

### Présentation :

Ampoules injectables de 5 cc.

Boîte de 10 ampoules : 18 francs.

Ampoules buvables de 3 cc.

Boîte de 10 ampoules : 18 francs.

**Posologie.** — Une ampoule injectable de 5 cc. tous les 2 jours (deux séries de 10 piqûres).

Une ampoule buvable à chacun des deux principaux repas (séries de 15 jours).

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

R. C. Seine 143-981.

## VISCOVEINE

Gouttes.

XL gouttes =	
Citrate de soude .....	0,10
Extrait stab. de marron d'Inde.....	0,10
— — fluide de gui.. .....	0,02
— — — de monésia ....	0,05
Bourse à Pasteur .....	0,05
Extraits fluides Hamamélis, Viburnum, Cupressus .....	0,10
En solution glycinée.	

**Propriétés.** — Tonique vasculaire et puissant sédatif utérin.

**Indications.** — Tous états variqueux, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Aménorrhée, Dysménorrhée, Métrorragies, Règles douloureuses, Troubles de la Ménopause.

**Mode d'emploi.** — XXX à XL gouttes avant les deux principaux repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire FOSSET**

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).

## VISCUM ZYMA

**Composition.** — Dialysé de baies, feuilles et tiges de Gui blanc, obtenu selon le procédé original du Prof. GOLAZ.

**Propriétés.** — Le *Viscum Zyma* abaisse la pression sanguine, agit comme tonique du cœur et favorise l'élimination des chlorures et de l'urée.

**Indications.** — *Convient dans tous les états morbides associés à l'hypertension : artériosclérose, urémie, albuminurie de la grossesse ; est également indiqué dans certains cas d'épilepsie.*

**Mode d'emploi.** — S'emploie à la dose de XX à XXX gouttes, diluées dans un peu d'eau, avant les repas (2 à 3 fois par jour).

**Laboratoires « ZYMA »**

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## VITACALCINE

### « Moncour »

Complexe opothérapique irradié.

**Composition.** — Vitamines, Lipoides et Cholestérine du foie et de la moelle rouge des os frais, ainsi que les éléments minéraux de ces derniers.

Les mordants physiques (radiations ultra-violettes), endocriniens (parathyroïde et surrénale) et minéraux (nucléinate de manganèse) en assurent la fixation.

**Indications.** — Toutes maladies déminéralisantes et hyposthénisantes telles que : Prébacillose, Bacillose, Cachexie, Rachitisme, Décalcifications dentaires et osseuses, Neurasthénie, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour.

*Enfants* : 1 à 4, suivant l'âge.

Le traitement sera prolongé aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

**Laboratoire « MONCOUR »**

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE (Seine).  
Téléphone : Molitor 08-47.

## VITACRINES

**Associations hormono-vitaminiques.**

Deux formules : Vitacrine M (Masculin) et Vitacrine F (Féminin).

**Composition.** — Hormones génitales principales et accessoires, Lobe antérieur d'Hypophyse, Corps thyroïde, Surrénale, Vitamine E.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant pluri-glandulaire et médication endocrinienne d'appoint.

**Mode de présentation.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications.** — Asthénie, Convalescence, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle. Puberté, Déficiences glandulaires de la ménopause.

**Posologie.** — 4 à 6 comprimés par jour.

Prix : 18 francs.

**Laboratoire DEFFARGE**

Docteur en pharmacie

2, rue Lauzac — BORDEAUX

## VITADONE

Vitamines A et D.

**Composition.** — Association de la *vitamine A* de croissance et anti-infectieuse et de la *Vitamine D* antirachitique, titrées physiologiquement (1 cc. de Vitadone = 1 200 unités Javillier + 2 400 unités D antirachitiques). Solution huileuse. Chocolatés titrés à 1 200 u. J. + 2 000 unités D.

**Propriétés thérapeutiques.** — La Vitadone remplace *intégralement* l'huile de foie de morue dans toutes ses indications. Elle en contient tous les principes actifs, mais *en quantités infiniment plus considérables*.

**Indications.** — La Vitadone est indiquée dans tous les troubles de la croissance, la déminéralisation, les divers troubles de l'ossification, la scrofule, le lymphatisme, les états de maigreur, les pyodermites, la pré tuberculose, etc...

**Posologie.** — En flacons de 24 cc., solution dans l'huile d'olives. — *Nourrissons* : XX gouttes. — *Enfants* : XL gouttes. — *Adolescents et adultes* : LX gouttes par jour, à mélanger à l'alimentation ordinaire, et dans du lait, pour les tout petits. — Chocolatés : 2 à 4 par jour.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## VITAGERMINE

Farine vivante pour enfants, adultes, convalescents et dyspeptiques.

**Propriétés.** — Farine vivante, non dévitaminée par chauffage, faite avec des blés choisis sans adjonction d'aucun médicament, et grâce à un procédé de blutage spécial, seul est utilisé le cœur du blé où sont concentrées toutes les vitamines. La préparation de la VITAGERMINE offre au nourrisson, au convalescent, au dyspeptique, un aliment léger, tonique, reconstituant, de digestion facile et de goût agréable.

**Doses.** — Bouillies pour nourrissons de 6 mois : 1 cuillerée à café de VITAGERMINE pour 125 à 150 gr. de lait et 1 morceau de sucre. Selon l'âge, la bouillie sera faite avec des quantités croissantes de farine et variant de 1 cuillerée à café à 1 cuillerée à soupe 1/2. Cuisson : 15 à 20 minutes à ébullition douce.

**Présentation.** — La VITAGERMINE est mise dans des boîtes en métal sous le vide.

La boîte de 350 grammes : 8 francs.

Société française du LAIT SÈC DRYCO.

5, rue Saint-Roch — PARIS (1<sup>er</sup>). Central 25-29.

## VITAMINOL

**POUDRE (malté). — GRANULÉ (cacaoté).**

**Composition.** — Le VITAMINOL, par ses amines, acides nobles et ses vitamines B, constitue un médicament-aliment dynamogène de saveur agréable, accessible à tous.

**Propriétés thérapeutiques.** — Il apporte à l'organisme des facteurs de croissance et d'équilibre; il complète la ration alimentaire.

**Indications.** — *Vitaminol granulé* : *Adultes* : Tous sous-alimentés, dyspeptiques au régime des pâtes, convalescents, etc..., 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, dans du lait chaud sucré. — *Enfants*, en période de croissance : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour. — *Nourrissons* : 3 cuillerées à café par jour, en 2 ou 3 fois dans la journée. — *Vitaminol poudre* (maltage des bouillies) : une cuillerée à café par bouillie de 100 grammes.

### BISCUITS DE VITAMINOL

Véritable aliment de complément, parfaitement équilibré en matières protéiques végétales, qui les apparentent aux poudres de viande. Ces biscuits sont de saveur très agréable.

**Les Etablissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## VITAMORRHUINE

**Composition.** — Principes actifs de l'huile de foie de morue (vitamines A et D) associés au phosphore et au calcium sous forme de granulés au cacao.

Une cuillerée à café de Vitamorrhaine équivaut à une cuillerée à soupe d'huile de foie de morue type. Préparation vérifiée au point de vue de son activité biologique.

**Indications.** — Rachitisme, Scrofule, Débilité, Lymphatisme, Tuberculose.

**Doses.** — *Enfants* : de 3 mois à 1 an ; 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

**Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## VITAMYL IRRADIÉ

### Solution et Dragées

Contient les quatre Vitamines A. B. C. et D., conservées actives. Elles sont toutes indispensables.

**Indications.** — Rachitismes, Carences, Pré-carences, Troubles de la croissance. Tous les cas de déminéralisation.

**Mode d'emploi.** — Solution de Vitamyl irradié. Elle apporte par cuillerée à café 1 mmgr. 5 d'Ergostérol pur irradié (Vitamine D), en solution huileuse, soit 900 Unités biologiques antirachitiques, associé aux Vitamines A. B. C. du Vitamyl.

**Doses.** — Une à 3 cuillerées à café par jour, mélangé dans un peu d'eau sucrée.

Dragées de Vitamyl irradié. Elles contiennent par dragée 2/3 de milligramme d'Ergostérol Irradié (Vitamine D) pur, en solution huileuse, soit 400 Unités biologiques antirachitiques, associé aux Vitamines A. B. C. du Vitamyl.

**Doses.** — 2 à 6 dragées par jour.

Prix public :

Le flacon de solution G. M. : 18 fr.

Le flacon de solution P. M. : 12 fr.

Le flacon de 40 dragées : 16 fr.

**Laboratoire des Produits AMIDO**

**A. BEAUGONIN, pharmacien**

4, Place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>)

---

## VITARGYL

**Composition et propriétés.** — Protéose argentique dosée à 20 p. 100 d'argent. Très soluble dans l'eau. La solution de Vitargyl est neutre, ne précipite pas par les chlorures en solutions isotoniques, ne coagule pas l'albumine. Possède un pouvoir microbicide énergique.

**Action thérapeutique.** — Sédatif et décongestif externe. Son action non corrosive, parfaitement indolore, ses propriétés excitantes sur les éléments réparateurs des tissus en font l'antiseptique de choix pour toutes les muqueuses.

**Application.** — Traitements abortifs et curatifs de toutes les affections des yeux, du nez, de la gorge et de celles des muqueuses des voies génito-urinaires.

Pour les besoins de l'urologie, gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, est présenté sous forme pure et en préparations (crayons, ovules, suppositoires, ampoules et flacons compte-gouttes).

**Laboratoires POINTET et GIRARD**

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS



## VITASTÉROL

*« Aucune médication à base d'ergostérine irradiée seule ne peut prétendre remplacer l'huile de foie de morue. »*

Lesné, Clément et Simon

(Compte rendu de la Société de biologie, Paris, mars 1928.)

Huile de foie de morue d'activité garantie et constante, dont les éléments actifs (*facteur de croissance, facteur antirachitique et calcofixateur*) ont été éprouvés sur le rat blanc soumis à un régime rachitigène.

**Un gramme de cette huile renferme un minimum de 50 unités antirachitiques** (Méthode de dosage des D<sup>rs</sup> Lesné et Clément).

Chaque flacon porte la date du contrôle biologique effectué.

Présentée en un **flacon de grès**, rigoureusement opaque aux radiations solaires ou autres, susceptibles d'en altérer l'activité, cette huile est de conservation pratiquement indéfinie et **peut être prescrite en été comme en hiver.**

**Indications.** — **Toute déficience en calcium** (Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, Spasmophilie, Rachitisme).

**Troubles de la croissance** (Hypotrophie pondérale et staturale, Insuffisances endocriniennes).

**États de dénutrition. Consolidation des fractures, Convalescences, Allaitement, Avitaminoses.**

**Doses.** — *Nourrissons* : XV à XX gouttes par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

*Adultes* : 1 cuillerée à bouche par jour.

---

**F. GUILBERT, pharmacien**

10, rue du Collège — ARRAS (Pas-de-Calais).

*Dépôt :*

**Office Commercial Pharmaceutique**

71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

# VITÈNE

Médication vitaminée, phosphorée.

**Composition. — Gouttes :**

Phosphatides cérébraux .....	0 gr. 025
Vitamine A .....	200 unités-rats.
— D .....	400 —
Huile d'olive .....	Q. S. par 1 cc.

**Capsules :**

Phosphatides cérébraux .....	0 gr. 025
Vitamine A .....	100 unités-rats
— D .....	100 —
Huile d'olive .....	Q. S.

**Propriétés.** — Le Vitène possède un pouvoir de croissance et anti-anémique remarquable. Agent anti-infectieux et antirachitique puissant, il est aussi fixateur de calcium.

**Indications.** — *Chez l'enfant :* Troubles de croissance, Rachitisme, Anémie. — *Chez l'Adulte :* Convalescence, Surmenage, Lésions bacillaires. — *Chez la femme enceinte :* Pare aux perturbations du métabolisme du calcium. — *A tous les âges :* Agent anti-infectieux.

**Mode d'emploi.** — *Nourrissons :* X gouttes matin et soir. — *Enfants :* XX gouttes matin et soir. — *Adultes :* 2 capsules à midi et le soir au début des repas.

**Laboratoire A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD**

**Docteurs en pharmacie**  
12, rue Charles-V — PARIS

## VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines :

(Vitamines antirachitiques et de croissance.)  
(Contrôle biologique rigoureux).

**Forme.** — Liquide.

### Indications :

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

### Posologie :

*Enfants — Nourrissons :*

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

*Jusqu'à 3 ans :*

1/2 à 1 cuillerée à café.

*Au-dessus de 3 ans :*

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

*Adultes :*

1 cuillerée à soupe par jour.

*(Peut être pris à toute époque de l'année).*

N.-B. — *Le Vivoléol a été la première huile de foie de morue contrôlée biologiquement.*

Prix : 15 francs.

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie.  
Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des  
Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris  
et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## VOCALDOP

Thérapeutique laryngologique.

1° La *poudre Vocaldop* réunit en une seule prescription une *inhalation* et un *gargarisme*.

Une cuillerée à café de *poudre Vocaldop*

H<sup>2</sup>O = Inhalation (respiration nasale).

chaude = Gargarisme (bain buccal).

Inhalation sans alcool. Thèse de Doctorat.

2° Le *cachet Vocaldop* représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la voix parlée et chantée : timbre, puissance, résistance.

### Indications :

Enrouement, Surmenage vocal, Pharyngite, Laryngite.

### Prescriptions :

Deux inhalations par jour, 2 à 3 cachets par jour pendant 15 jours.

### LABORATOIRE LARYNGOLOGIQUE

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## VULCASE

(Comprimés).

Laxatif-cholagogue.

Soufre assimilable. Opothérapie biliaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

**Indications.** — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'Intestin. Dermatoses. Arthritisme.

**Mode d'emploi.** — Prendre de 1 à 4 comprimés par jour, soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

**Laboratoires BRISSON**

**Dr DEDET et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## VULNÉRINE DU D<sup>r</sup> BERGEN

**Principes actifs.** — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Ether éthylpyramido-benzoïque, oxyde de zinc, etc...

**Forme.** — Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 cc.

**Indications.** — Ulcères variqueux, plaies atones, Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Erysipèle, Engélures, Impétigo, Cancers ulcérés inopérables, etc.

Pansement précieux :

La VULNERINE calme, déterge, stérilise, épidermise toutes les plaies sans adhérer, sans macérer, sans intoxiquer. Les brûlures sont calmées instantanément et guérissent sans laisser de cicatrices.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 applications par jour avec le papier à pansement qui accompagne chaque tube de VULNERINE ou avec de la gaze hydrophile purifiée.

Prix du tube : 12 francs.

**Laboratoire DUCOQ**

**LANGAIS (I.-et-L.).**

R. C. Chinon 2059.

---

## WISMUTHANE

**Composition.** — Poudre à base de Carbonate de bismuth chimiquement pur, Carbonate de calcium chimiquement pur, Carbonate de Magnésium chimiquement pur, Codéine phosph. (traces), Kaolin chimiquement pur (préparation spéciale).

**Indications.** — Pansement gastro-intestinal, aérophagie, crises douloureuses de l'estomac, ulcus, sténoses pyloriques, spasmes, colites. Désinfection du tube digestif. Régulateur des selles.

### Posologie :

*Affections de l'estomac* : 1 cuillerée à café aux trois repas.

*Constipation* : 1 à 2 cuillerées à soupe le matin à jeun.

**Laboratoire des Produits Vely**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Passy 87-85.

---

## LA YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

**Composition.** — Ferments bulgares sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

**Formes.** — Dragées et granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

**Posologie.**

**Nourrissons.** — 1 à 2 cuillerées à café par jour. Yaourtine granulée.

**Enfants et Adultes.** — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

**L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

18, place de Laborde — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 18-20

---

## YO-ANDROL

**Tonique général hormono-vitaminique.**

Fixation élective sur les centres génito-spinaux.

### **Composition :**

Vitamine E, Orchilipoïdes, Antéro-Hypophysine, Cortico-Surrénine, etc...

### **Indications :**

Asthénies, Hypotonies, Asthénie génitale masculine, Opothérapie complémentaire chez la femme.

### **Dose :**

9 pilules par jour, augmenter jusqu'à 12 si cela est nécessaire.

### **Contre-indication :**

Adénome de la prostate.

**Note.** — *Nous préparons aussi une forme sans yohimbine. Veuillez, dans ce cas, prescrire : Yo-Androl sans Yohimbine.*

Homologue féminin : **Yo-Gynine.**

### **Laboratoire ISCOVESCO**

107, rue des Dames — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Wagram 07-90.

Adr. tél. : Lipoïdes Paris 54.



## YOHIMBINE VICARIO

**Comprimés de Chlorhydrate d'Yohimbine  
à 5 mmgr.**

L'YOHIMBINE est un tonique du centre médullaire génito-spinal ; il donne les meilleurs résultats dans l'impuissance quelle qu'en soit l'origine (psychique, paralytique, insuffisance de la glande interstitielle du testicule, etc...)

**Dose moyenne.** — 3 comprimés par jour, 1 après chaque repas. Le comprimé s'avale comme une pilule ; une gorgée d'eau est prise ensuite.

**Dose maxima.** — 9 comprimés par jour. Cette dose, qui ne convient qu'à des cas exceptionnellement rebelles, est généralement inutile.

Le tube de 15 comprimés : 4 fr.

La boîte de 60 comprimés : 15 fr.

**Laboratoires VICARIO**

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## ZARYL

(Procédé André Lancien)

*Médication décongestive et antispasmodique*

(Cigarettes aux huiles essentielles sans eucalyptus ni toxiques)

**Composition.** — Essences ou infusions d'ambre, ambrette, myrrhe, styrax, rose, orange douce, catalysées et fixées sur hydra-celluloses provenant du maïs et du palmier nain.

**Présentation et mécanisme thérapeutique.** — La fibre hydra-cellulosique est distribuée en cigarettes qui, allumées, donnent une fumée colloïdale (aérosol thérapeut que).

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif analgésique, procure sommeil calme et réparateur, antispasmodique, décongestif, désodorisant, antiseptique.

**Posologie.** — 4 à 8 cigarettes par jour, et si possible, avaler la fumée.

**Indications.** — Toutes maladies congestives des voies respiratoires, extinction de la voix, enrrouements, laryngites, trachéite, catarrhe, asthme, dyspnée, emphysème, grippe, bronchites, toux coquelucheuse, rhume des foins, coryza, sinusite, ozène, céphalée et névralgies dentaires.

**NOTA.** — Aucune contre-indication : ne donne ni vomissements, ni nausées ; inoffensif pour le rein, le foie, le cœur. Pas d'incompatibilités médicamenteuses.

Laboratoire biologique G. CHAUZEIX

26, Rue Pradier — VILLE-D'AVRAY (Seine-et-Oise).

## ZIMBYL

(Procédé André Lancien)

(Académie des Sciences, PARIS, 1924)

Journées médicales de Bruxelles (médaillon d'or 1926)

*Médication cinnamique hypodermique*

**Composition.** — Solution aqueuse de Cin. éthyl. aminoforme isotonique en ampoules de 3 cc. parfaitement indolore et d'assimilation immédiate. Entièrement dépourvue de toxicité. Ne donne aucun choc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Disparition des sueurs profuses, baisse de la fièvre, augmentation régulière de l'appétit et du poids, augmentation rapide des anticorps et du taux d'hémoglobine. Amélioration de la formule leucocytaire. Désinfection rationnelle générale de l'organisme et en particulier des voies respiratoires et urinaires.

**Posologie.** — Une injection tous les jours pendant dix jours et repos dix jours. Cure deux mois.

**Indications.** — Amaigrissement, asthénie, anémie infectieuse, bronchite chronique, prébacillose, convalescences les plus diverses. Bacillose pure, même avec insuffisance hépatique, complications syphilitiques ou cutanées, de la néphrite ou un état fébrile. Grossesse, Malaria, Rhumatisme bacillaire (associé à BANIKOL). Affections gynécologiques les plus diverses (régressions des lésions inflammatoires, et action favorable sur les congestions, suppurations et ulcérations provoquées par les différents agents pathogènes, avec disparition de la douleur).

**NOTA.** — Aucune contre-indication, ni incompatibilité, ni accoutumance. Pas d'accumulation médicamenteuse. Elimination régulière, aucun accident à redouter. Conserve l'équilibre stomacal, intestinal, cardiaque, renal et hépatique.

Laboratoire Biologique G. CHAUZEIX

26, rue Pradier — VILLE D'AVRAY (Seine-et-Oise.)

## ZOHOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant.

**Indications.** — Anémie, Surmenage, Phosphaturie, Convalescences.

1<sup>re</sup> Forme : En granulés.

**Composition :**

Hypophosphite de chaux.....	0 gr. 06
— fer .....	0 gr. 06
— manganèse....	0 gr. 06

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café à chacun des principaux repas.

2<sup>e</sup> Forme : En ampoules.

**Composition :**

Hypophosphites composés.....	0 gr. 18
Eau physiologique, Q. P.....	2 cc.

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'une ampoule chaque jour en injection sous-cutanée.

Prix de vente au public.

Ampoules : 18 fr. Granulés : 14 fr.

**Laboratoires « LOBICA »**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

# ZOMINE

du professeur CH. RICHET.

Plasma musculaire de bœuf sec et total.

Stimulant de la nutrition en même temps qu'aliment riche en vitamines et facilement assimilable, la Zomine provoque une véritable *régénération musculaire*.

Doses :

1 gramme	(	1/2 cuillerée à café de	2 à 4 ans.
par	1	—	4 à 6 —
année d'âge	1	— 1/2	6 à 8 —
ou	2	cuillerées	8 à 12 —

*Enfants* : La Zomine donne aux enfants *anémiques* ou en *période de croissance* les vitamines et la ration élevée d'*albuminoïdes* dont ils ont besoin. (Voir : *Orthozomine*).

*Adultes* : La Zomine est un *aliment médicament* recommandé dans toutes les *anémies*, *convalescences*, *états de grossesse* et d'*allaitement*.

Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Prétuberculose et Tuberculose* : Dans les premières périodes de la tuberculose, la Zomine provoque une augmentation de poids des malades traités en même temps qu'une amélioration de l'état général.

Dose : 4 à 6 cuillerées à café (ou 2 cuillerées à soupe) par jour.

La Zomine étant très légère, il faut remplir largement les cuillers sans se contenter d'affleurer les bords comme avec un liquide.

La Zomine doit se prendre dans des aliments tièdes ou froids.

Zomine intégrale.	{	Le petit flacon.....	23 fr.
		Le grand flacon.....	45 —
		La boîte de 4 grands flacons...	170 —

*Zomine sucrée* : en paillettes dosées à 50 p. 100 de Zomine intégrale.

Doses : double des doses de Zomine intégrale.

Le flacon : 25 fr. : La boîte de 4 flacons : 95 fr.  
(Voir *Orthozomine*).

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS.

## ZYMATINE LESCÈNE

Poudre sucrée.

**Composition.** — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonate de Mg., Phosphate de Na et de Mg., Bicarbonate de Na., Lactose.

**Propriétés.** — Déconstrictant, Cholagogue alcalin, Maternise le lait de vache, Fluidifie le caséum, le peptonifie. Reminéralise. Empêche les fermentations intestinales.

**Indications.** — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Maladies de la nutrition, Dermatoses, Hépatisme.

*Adultes* : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Ulcères de l'estomac, Affections hépatiques.

**Doses.** — *Enfants* : 2 à 6 mesures par jour dans lait (biberons), eau, bouillies (Éviter température supérieure à 50°). Dans la *constipation*, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après chaque repas, 2 à 3 fois par jour.

**Constipation.** — 2 cuillerées à café 3 ou 4 fois par jour.

Prix au public : 12 francs.

## ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre sucrée.

**Composition.** — Zymatine, Vitamines, Nucléinate de Ca.

**Indications.** — Anémies, Rachitisme, Prétuberculose, Dénutrition, Déminéralisation, Médication hépato-digestive et fortifiante associées.

**Doses :** *Enfants*.

Jusqu'à 6 mois : 1 mesure matin et soir.

— 1 an : — — midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 2 mesures matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger :

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Prix au public : 10 fr. et 18 fr.

**Laboratoires LESCENE**

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados)

Téléph. : Vaugirard 08-19.

## ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

**Forme.** — Poudre.

**Composition.** — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

### Mode d'emploi :

**A. Adultes.** — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café, soit : une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit : une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

**B. Nourrissons.** — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

**Indications.** — Tous états nauséeux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.  
Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 12 fr.

**Laboratoire KERVAN**

81-83, avenue Ledru-Rollin — PARIS (XII<sup>e</sup>).

---



### 3<sup>e</sup> Partie

---

# NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

avec les adresses de leurs  
Fabricants

---

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2<sup>e</sup> partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies,



THE JOURNAL OF THE  
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Vol. 100, Part 1, 1970  
Published by the Royal Anthropological Institute  
21, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1A 2E  
0022-2933/70 \$08.00

## A

- Abactériol**  
**\*Absuric**  
**\*Acatar**  
  
**\*Acécoline-Acecolex**  
  
**\*Acépiline Rambaud**  
**\*Acésine Guillaumin**  
**Acétosulfol Huerre**  
**\*Acétylarsan**  
  
**Acide oléique P. Thi-**  
**bault**  
**Acidural Dupraz**  
**Acimyl Monimart**  
**Acitophosan Merminod**  
**\*Acobella**  
**\*Acodros**  
  
**\*Acoégénol**  
**\*Acolitol**  
  
**Actine**  
  
**Actinophore**  
**\*Actiphos**  
  
**Actipyrine**  
**\*Adénoseptyl**  
**\*Adipolysine**  
  
**Adolan**  
**Adolol**  
**Adolose Legrand**  
**\*Adonal Vicario**  
**Adonidine Clin**  
  
**\*Adoverne Roche**  
**\*Adral**  
  
**Adréna Vincent**  
**Adrénaline Byla**  
**Adrénaline Clin**  
  
**\*Adrénaline Invar**  
**\*Adrénargol**
- 54, bd Jacqmain, Bruxelles.  
 17, r. de Provence, Paris.  
**BEAUXIS-LAGRAVE**, 74, quai  
 Jemmapes, Paris.  
**Labor. L. LEMATTE &**  
**G. BOINOT**, 52, r. La  
 Bruyère, Paris.  
 74, rue Monge, Paris.  
 13, r. Cherche-Midi, Paris (VI<sup>e</sup>).  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
**SPECIA**, 21, rue Jean-Goujon,  
 Paris.  
 48, rue d'Alésia, Paris.  
 (Voir : Oléocidase.)  
 41, r. Etienne-Marcel, Paris.  
 23, r. Grand-Cerf, Meaux.  
 Merminod, 49, r. Paradis, Paris.  
 191, fg St-Antoine, Paris.  
**BOUVELOT**, 62, r. d'An-  
 tibes, Cannes (A.-M.).  
**CHAUVIN**, Aubenas (Ardèche).  
**LANCOSME**, 71, av. Victor-  
 Emmanuel-III, Paris.  
 60, r. Vieux-Pont de Sèvres,  
 Billancourt.  
 84, av. de Saint-Mandé, Paris.  
**PROCHIMAL**, 10, r. de Flo-  
 rence, Paris.  
 9, r. Victor-Letalle Paris.  
 50, rue de Turenne, Paris.  
 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-  
 Moulineaux.  
 45, r. du Marché, Neuilly.  
**Dr LALAURIE**, Cuxac-d'Aude.  
 2, r. des Trois-Frères, Paris.  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 20, r. des Fossés-St-Jacques,  
 Paris.  
 10, r. Crillon Paris.  
**Lab. ROBERT & CARRIÈRE**,  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 14, av. Mac-Mahon, Paris.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,  
 Paris.  
 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.  
 102, r. Vincent, Marseille.

- \*Adrénine Mialhe  
 \*Adrénocalcine  
 \*Adrénoides Béral  
 Adrénol Total (voir  
 Lipoïdes)  
 \*Adrénoléine  
 Adrénophyséine  
 Adrénopituine Byla  
 \*Adrépatine Laleuf  
 \*Adréphédrine Béral  
 Adrialgine  
 Adrianine  
 \*Aérocid  
 \*Aérophagyl  
 \*Aesculase  
 \*Æthone-Falcoz  
 Afatyl  
 \*Agamétol  
 Agar du Dr Gigon  
 \*Agarase  
 Agarham  
 Agaricine Clauss  
 \*Agarol  
 Agaryl Fournier  
 Agesulf  
 Aglo  
 Aglucol  
 \*Agobyl  
 \*Agocholine Zizine  
 \*Agomensine Ciba  
 Agonol Cognet  
 Agoxyl  
 \*Agozymase  
 \*Aigue d'Or  
 Aimaquinase  
 Aimhepar  
 \*Airoglyce  
 Airol Roche  
 Akésol Musi  
 \*Albuol Leisyn  
 \*Albuplast Vigier  
 \*Alcacyl  
 8, r. Favart, Paris.  
 L. ADAM, à Granville (Manche),  
 194, rue de Rivoli, Paris.  
 ISCOVESCO, 107, r. des Dames,  
 Paris.  
 FALVY, 40, r. des Acacias,  
 Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 194, rue de Rivoli, Paris.  
 9, r. de la Perle, Paris.  
 9, r. de la Perle, Paris.  
 MIALHE, 8, rue Favart, Paris.  
 12, bd St-Martin, Paris.  
 MICHELON, 20, bd Hecurte-  
 loup, Tours.  
 9, r. Boissonade, Paris.  
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
 Lab. SALLE, 4, r. Elzévir,  
 Paris.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 RÉAUBOURG, 2, r. Boucicaut,  
 Paris.  
 CATOR, r. Huguerie, Bordeaux.  
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.  
 53, r. du Poinçon, Bruxelles.  
 7, r. Biscornet, Paris.  
 MERMINOD, 49, r. du Paradis,  
 Paris.  
 21, r. Cacheux, Boulogne-sur-  
 Seine.  
 PATRICE, à Vichy.  
 FOUCHERE, Rive-de-Gier  
 (Loire).  
 24-26, r. de Fécamp, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 43, r. de Saintonge, Paris.  
 LETTRY, 69, rue de Sèvres,  
 Paris.  
 71, av. République, Champigny  
 (Seine).  
 53 bis, bd de la Liberté, Lille.  
 Société Régionale de l'Ouest, à  
 Rennes.  
 PETIT, 29, r. Jean-Perréal,  
 Lyon.  
 55, r. Chabrol, Paris.  
 10, r. Crillon, Paris.  
 Sarlat (Dordogne).  
 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.  
 WANDER, 151 bis, rte de Join-  
 ville, Champigny (Seine.)

Alcaderma		47, r. de la Boule-d'Or, Romilly (Aube).
*Alcalinose		27, r. Desrenaudes, Paris.
Alcaloïdes combinés	seuls et	Labor. DULCIS, place Clichy, Monte-Carlo.
*Alcamfétol		Lab. DOR, 17 bis, av. Parmentier, Paris.
Alcasodine		GLORY, 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
Aldhylène		74, r. de Rome, Marseille.
Aldine		37, r. de la Fédération, Paris.
Aldogène Carteret		15, r. d'Argenteuil, Paris.
Aldor		39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
*Alepsal Genévrier		45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
*Alexime		51, r. Gay-Lussac, Paris.
Alfane		GERAUDEL, 3, r. Watteau, Courbevoie.
Algaliment		47, r. Colbert, Tours.
Algalopol		132, rue de Turenne, Paris.
Algane		35, r. de Paris, Clichy.
Algarine Nyrdhal		12, r. de la République, Puteaux.
Algarol		6, r. des Dames, Paris.
*Algatan		3-9, r. des Alouettes, Nanterre (Seine).
Algbiogyl		Lab. Paul Fontanier, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Algilaxine		id.
Algional		id.
*Algocratine Lancosme		71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
Algodigestine		PONCET, à Limoges.
Algolane Poulenc		21, r. Jean-Goujon, Paris.
*Algophagine		UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.
Algoplast		FOURNIER, Dijon.
*Algorol		14, r. Demarquay, Paris.
*Algosédine		DORDIN, 58, Grande Rue Harnes (Pas-de-Calais).
Algostérine		OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
Algovitine		P. FONTANIER, Moulins-s.-Yèvre (Cher).
*Alibourine		Lab. B. E. A., Belfort.
Alimavèna		Bourg-la-Reine (Seine).
Alimentine Mory		OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Aliment Mono		7, r. de Sèze, Paris.
*Aliment Tinardon		17, r. Cadet, Paris.
Allcock's Porous Plaster		5, r. de la Paix, Paris.
*Allergantyl Miluc		37, r. Raspail, Ivry.
*Allisatine Sandoz		20, r. Vernier, Paris.
Allium Coirre		5, bd Montparnasse, Paris.
*Allocaine Lumière		45, r. Villon, Lyon.
*Allochrysine Lumière		id.
*Allonal Roche		10, r. Crillon, Paris.
*Allophaquina		3, r. Watteau, Courbevoie.
*Aloïne Houdé		9, r. Dieu, Paris.



**\*Aloplastine****\*Aloysine Gouzène****\*Alsodine**

Althine

Altsara

**\*Alucol Wander****\*Alunozal****\*Alzine**

Amalariol

Amandol

**\*Amborhinol**

Ambrine

**\*Amibiasine****\*Amidal**

Amidon Planche

**\*Amino-Sel Byla**

Aminoléine

**\*Amiphène**

Amipyrine

Amirargol

Ampélamine

Ampelodine Bernhard

**\*Amphosthène****\*Ampho-Tablettes Ronchèse****\*Amphotonyl****\*Ampho-vaccins de Ronchèse****\*Ampolases-opolases**Ampoules de benzoate  
et bi-iodure Hg. VigierAmpoules bi-iodure  
Hg. Midy**\*Ampoules Boissy**

Ampoules Cantonnet

Ampoules Churchill

Ampoules de Digalène

Ampoules Dubé

Ampoules Egralène

Brisson

Ampoule huile soufrée  
Brisson**\*Ampoules de Pantopon**

« Roche »

Lab. Biologique de l'Île-de-France, 3, r. Laugier, Argenteuil.

139, r. de Paris, Pantin.

Lab. B. C. L., 29, faub. de Bourgogne, Orléans.

3, r. Barbette, Paris.

151, r. St-Maur, Paris.

151 bis, rte de Joinville, Champigny (Seine).

SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.

9, av. Jean-Jaurès, Lyon.

JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.

5, av. des Tilleuls, Paris.

276, r. Lecourbe, Paris.

48, bd La-Tour-Maubourg, Paris

69, r. de Wattignies Paris.

4, pl. des Vosges, Paris.

2, r. Volney, Paris.

26, av. de l'Observatoire, Paris.

72, r. de Bagneux, Montrouge.

CARRON, 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).

113, bd Voltaire, Paris.

AMICROS, 9, bd Edgar-Quinet, Paris.

7, r. de l'Arbre-Sec, Lyon.

11, r. Lafayette, Paris.

132, av. Victor-Hugo, Paris.

6, r. Rothschild, Nice.

LERSAM, 17, r. St-Saëns, Paris

6, r. Rothschild, Nice (A.-M.).

163, r. de Flandre, Paris.

VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

49, r. Hoche, Courbevoie.

BELIERES, 19, r. Drouot, Paris.

12, r. Castiglione, Paris.

HOFFMANN LA ROCHE, & C<sup>ie</sup>

10, r. Crillon, Paris.

MILLOT, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.

157, r. Championnet, Paris.

id.

HOFFMANN LA ROCHE & C<sup>ie</sup>

10, r. Crillon, Paris.

- \*Ampoules névrosthé-  
 niques Dausse 4, r. Aubriot, Paris.  
 Ampoules Optima Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 Ampoules Pinceaux 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 \*Ampoules Reipar DRAPIER, à Lucquy (Ard.).  
 Ampoules Romon 6, r. Bridaine, Paris.  
 Ampoules de Sécacor-  
 nine 10, r. Crillon, Paris.  
 \*Ampoules de Spasmal-  
 gine id.  
 Ampoules de Théobryl id.  
 Ampoules Sulfa Cauterets (Htes-Pyrénées).  
 Ampoules Suracti-  
 vantes Leisyn 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 Ampoules Sigmuth BRISSON, 157, r. Championnet,  
 Paris.  
 Ampoules d'Uriage 15, Champs-Élysées, Paris.  
 Ampoules V.-E. Dou-  
 mer BOMEL à Annonay (Ardèche).  
 \*Amunine BYLA, 26, av. de l'Observatoire,  
 Paris.  
 Amyliodine 163, r. de Flandre, Paris.  
 Amylobromine id.  
 \*Amylodiastase Thépé-  
 nier 12, r. Clapeyron, Paris.  
 \*Anacamphre 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 \*Anacidase MEUNIER, Auxerre (Yonne).  
 \*Anaclasine Ranson 121, av. Gambetta, Paris.  
 Anadiposine FLAHAUT, 74 r. Monge, Paris.  
 \*Analgénine 17, r. Cadet, Paris.  
 Analgine dentaire FANDRE, 4, fg Stanislas,  
 Nancy.  
 Analgol Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude,  
 28, r. Hôpital-Militaire, Lille.  
 \*Anapeptone Vassal Lab. HYGIO-DONTIS, Crois-  
 sy-sur-Seine (S.-et-O.).  
 Anaphylène à Livarot (Calvados) et 58, r. de  
 Vouillé, Paris.  
 \*Anaquintine Lescène DEBRUERES, 66, r. de Paris,  
 Poissy (S.-et-O.).  
 Anasectol Institut Pasteur, 22 rue Dutot,  
 Paris.  
 Anatoxine diphtérique Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix  
 (B.-du-Rh.).  
 \*Anaural BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.  
 \*Anaxeryl 100, bd Sébastopol, Paris.  
 Androbion Netter CORTIAL, 7, r. de l'Armorique,  
 Paris.  
 \*Androcalcion Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
 Androcrinol Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
 Andropolycrinol 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 \*Androstine Ciba 17, bd Haussmann, Paris.  
 Andryl Vicario 26-28, r. St-Claude, Paris.  
 \*Anégrine Rivier. 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 \*Anéo Leisyn

- Anestile Bengué**  
**Aneuvryl**  
**\*Anexol**  
  
**\*Angiolymphé**  
**\*Angiosedine**  
**Angiosthénine**  
**\*Angioxyl**  
**\*Angitan**  
  
**Anhémor**  
  
**\*Aniodol**  
  
**\*Anoïde**  
**Anoxyne**  
  
**\*Anozyl**  
  
**Antacidyl**  
  
**\*Antalgol Dalloz**  
**Antalgyl**  
  
**\*Antasthène**  
**Antasthme Cibrand**  
  
**\*Antélobine Byla**  
**\*Anthema**  
  
**\*Anthracalcine**  
**\*Anthra septol**  
**\*Anthraxone**  
**\*Antialgos Christiaens**  
**\*Antiasthmatique**  
**Anti-asthmatiques du**  
**D<sup>r</sup> Cléry**  
**Antiasthmatique du**  
**D<sup>r</sup> Hallay**  
**\*Antiasthme Bengalais**  
  
**\*Antiasthmine**  
**Anticalculose**  
  
**Antidiabétique Midy**  
**\*Antidiabétique Monavon**  
**Antidiabétique Requis**  
**Antidolor**  
**\*Antidouleur Barbessou**  
**Antiépileptique de**  
**Liège**  
**Antifébra**  
**\*Antifluor**  
**\*Antifuronculeux**
- 47, r. Blanche, Paris.  
 71, r. du Fort, Aubervilliers.  
 DROUET & PLET à Ruell,  
 (Seine-et-Oise).  
 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.  
 BEAU, 36, r. des Archives, Paris.  
 5, av. de Tilleuls, Paris.  
 97, r. de Vaugirard, Paris.  
 VINCENT, 14, av. Mac-Mahon,  
 Paris.  
 LANCOSME, 71, av. Victor-  
 Emmanuel, Paris.  
 3-9, r. des Alouettes, Nanterre  
 (Seine).  
 116, bd Haussmann, Paris.  
 GUERET, 23, r. des Cordeliers,  
 Meung-sur-Loire (Loiret).  
 D. DEROZIER, 24, r. Jardel,  
 Bordeaux.  
 DURET & RÉMY, à Asnières  
 (Seine).  
 13, bd La Chapelle, Paris.  
 MOITY-CHAUZEIX, Neuilly-  
 sur-Seine.  
 54, fg St-Honoré, Paris.  
 199, av. Victor-Hugo, Auber-  
 villiers.  
 26, av. de l'Observatoire, Paris  
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 SAUBA, Montreuil.  
 BAUDE, Saint-Aubert (Nord).  
 23, r. du Caire, Paris.  
 r. du Ch.-de-Mars, à Reims.  
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.)  
 Lab. du D<sup>r</sup> CLÉRY, 53, bd  
 St-Martin, Paris.  
 36, r. Eugène Carrière, Paris.  
 FAGARD, 44, r. d'Aguesseau,  
 Boulogne-sur-Seine.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 HUGON, 208, av. Michel-Bizot,  
 Paris.  
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 171, av. Félix-Faure, Lyon.  
 6, r. de Belleville, Paris.  
 Marmande (Lot-et-Garonne).  
 48, r. Claude-Lorrain, Lille.  
 132, r. de Turenne, Paris.  
 26, r. des Petits-Champs, Paris.  
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).

- Antigastralgique** MIDY & C<sup>ie</sup>, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Winckler** DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune, Paris.
- Antigel** 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
- \*Antigénines** 62, r. Marengo, St-Étienne.
- Antiglaire Forézen** CASTELLANE, Morteau (Doubs).
- Antiglairol** 26, r. des Petits-Champs, Paris.
- \*Antigonol** 42, r. des Martyrs, Paris.
- Antigrippal Demay** MIDY et C<sup>ie</sup>, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- \*Antigrippine Midy** 5, r. de la Paix, Paris.
- Antikamnia** 41, bd Haussmann, Paris.
- Antimucose Marian** SALA VERT, Ste-Foy-la-Grande (Gironde).
- \*Antinéase** COUTURIEUX, 18, av. Hoche, Paris.
- Antipaludique** 45, rue Villon, Lyon.
- Antipaludique Lumière** CAPIN, Roquefort (Landes).
- \*Antiphi** 11, r. du Petit-Parc, St-Maur (Seine).
- \*Antiphlogistine** 126, r. de la Pompe, Paris.
- Antiphlogosine** Union chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.
- Antiphymase Meurice** 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- \*Antiphymique Vadam** 7, av. des Sources, Nice.
- \*Antipiol** 14, r. Gravel, Levallois (Seine).
- Antipsorine** 121, av. de St-Ouen, Paris.
- Antipur** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Antipyrine U. R.** 19, r. Drouot, Paris.
- \*Antirrhoïde Bélières** CHAMBON, pl. Francheville, Périgueux.
- \*Antisciatique** C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).
- Antiseptinol** 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- Antiseptique - Alcalin Gros** 5, av. Victoria, Paris.
- \*Antiurique de Contréxeville** La Biothérapie, 5, r. Paul-Barruel, Paris.
- \*Antivirus** 74, r. de Lourmel, Paris (XV<sup>e</sup>).
- Antixénol** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Antodyne Poulenc** Lab. CARESMEL, 2, q. Paul-Bert, Tours.
- \*Antonol** 10, r. de l'Union, Clichy.
- Anuline** Lab. du D<sup>r</sup> MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- \*Anusol** FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
- \*Anxiol** 74, fg d'Ambrail, Épinal.
- \*Anxiosédine** 157, r. Championnet, Paris.
- Anytal Brisson** AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
- Apaludol** 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
- \*Aphloïne** 48 bis, av. Mozart, Paris.
- \*Aphosal** 8, r. Vivienne, Paris.
- Apioline Chapoteaut**



- Aplaxil**  
**Apocynine du Dr Des-champs**  
**\*Appety!**
- Apyrexine**
- Aprol Vigier**  
**Apsophol**  
**Apyrexine Optima**
- Aquasoluble**  
**\*Aqintol**
- Arachise**
- \*Arapal**
- \*Arcanan**  
**Archésine Trouette-Perret**  
**\*Arcica**  
**\*Ardogène**
- Argent colloïdal élec-trique**  
**Argent colloïdal Nyr-dhal**  
**\*Argion**  
**Argolène**
- \*Argybil**
- \*Argycuprol**  
**\*Arhémapectine Gallior**  
**\*Arhéol Astier**  
**\*Arhine Lambiotte Fr.**
- \*Aristargol**  
**Aristoplast**
- Armosine**
- Aromalt**
- \*Arquéritol**  
**Arrhénal Adrian**  
**Arrhénalotine Bureau**  
**Arrhéniques Clin**  
**Arrhénomartiol Clin**  
**Arrhénio-Splénine**  
**\*Arrhénuclène Bergevin**  
**Arrow-root**
- Arsallyl**
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
**LALEUF**, 20, r. du Laos, Paris.  
 Lab. Biologique de l'Ile-de-France, 3, r. Laugier, Argenteuil.  
 Lab. OPTIMA, 78, Gde-Rue-aux-Bois, Bruxelles.  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 40, r. des Carmes, Orléans.  
 OPTIMA, 78 Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 16, r. Ficatier, Courbevoie.  
 Lab. du Dr MIALHE, 8, r. Favart, Paris.  
 Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.  
 La Biothérapie, 5, r. Paul-Barruel, Paris.  
 CRUET, 13, r. Miollis, Paris.  
 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.  
 84, r. Rochechouart, Paris.  
 9, r. du Temple, Enghien (Seine-et-Oise).  
 MARONNEAU-MOREL, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 12, r. de la République, Puteaux.  
 BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.  
 Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.  
 LANCOSME, 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.  
 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.  
 38, bd Montparnasse, Paris.  
 45, r. du Dr-Blanche, Paris.  
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI<sup>e</sup>).  
 8, r. du Petit-Muse, Paris.  
 VIGIER, 9, r. de la Gare, Levallois (Seine).  
 ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.  
 KARCHER, 139, r. des Pyrénées, Paris.  
 LESURE, 70, r. du Bac, Paris.  
 9, r. de la Perle, Paris.  
 86, bd Port-Royal, Paris.  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 6, r. Mathilde, Courbevoie.  
 à Châteaudun (Eure-et-Loir).  
 BLOCH, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.)  
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.

- Arsaminol Clin  
 Arsébényl Meurico
- \*Arsécrinol  
 Arsenic Organique  
 Glasser
- \*Arséniode  
 Arsenion Couturieux  
 Arsénobenzol Billon  
 Arseno-fer Henry  
 \*Arsénogyl
- \*Arsénomyl
- \*Arsénos-Solvant  
 Arsétonyl
- Arsiodyle
- Arsiquinine Lemaitre  
 \*Arsi-Strychnal Longuet  
 Arsoplasmine  
 \*Arsycodyle Leprince  
 \*Arsylène Roche  
 Arsynal Legrand  
 Arsysérum  
 \*Artérase  
 \*Arterion Vincard
- \*Artéroveinine  
 Arthridoi
- \*Arthrila  
 Arthri-sel  
 Arthritose  
 Arthrolyl  
 \*Artoradine
- \*Arvensyl
- Arzonil  
 \*Ascéine
- \*Asciatine  
 Asclérogénol
- \*Ascoléine Rivier  
 Aseborhal  
 Aseptampoules Du-  
 mesnil  
 Aseptène
- Aseptobiline
- \*Aseptonc
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 Union Chimique Belge, 61, av.  
 Louise, Bruxelles.
- 17, r. Saint-Saens, Paris.  
 COIRRE, 5, bd Montparnasse,  
 Paris.
- BURIAT, 25, r. Copernic, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.
- RAVAUD, 6, pl. de Breteuil,  
 Paris.
- MOUNEYRAT, Villeneuve-la-  
 Garenne.
- 19-21, r. Van-Loo, Paris.  
 CALMEL-DOMERGUE, 20 bis,  
 r. Gravelotte, Toulouse.
- CHASSAIGNE, Ruffec (Cha-  
 rente).
- 12, r. Vavin, Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.
- 52, r. La Bruyère, Paris.  
 62, r. de la Tour, Paris.
- 10, r. Crillon, Paris.
- GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.  
 46, r. de Rome, Marseille.
- GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
- VIGUIER, 14, av. George-  
 Clemenceau, Nice.
- 121, av. St-Ouen, Paris.
- D<sup>r</sup> FRAYSSE, 47, r. de Neuilly,  
 Nanterre.
- LYONS, 30, r. Monge, Paris.  
 22, rue Morère, Paris.
- La Biomarine, à Dieppe (S.-Inf.).
- 11, r. Lafayette, Paris.
- Lab. de Radiumthérapie, 25, r.  
 Vaneau, Paris.
- GERDA, 163, bd Croix-Rousse,  
 Lyon.
- 143, Gde-Rue Guillotière, Lyon.
- CIBA, 109-113, bd de la Part-  
 Dieu, Lyon.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-  
 louse.
- 26, r. St-Claude, Paris.
- 25, r. de Tocqueville, Paris.
- 10, r. du Plâtre, Paris.
- COUDERT, 116, av. Ledru-  
 Rollin, Paris.
- SCHMIDT, 71, r. Ste-Anne.  
 Paris.
- Lab. MOULIN, 50, r. de Répu-  
 blique, Puteaux (Seine).

- \*Aseptopoudre**  
**\*Aseptoradol**  
  
**\*Aseptorhine**  
**\*Aseptovules**  
**Asepturine**  
  
**Asepturol**  
**Asm**  
  
**Aspiphan**  
**Aspirine U. R.**  
**Aspirine Vicario**  
**Asquirol Poulenc**  
**\*Astasol Douetteau**  
**Astéine Biron**  
**Asthmacidine**  
  
**Asthmalène**  
**Asthmapepton**  
**\*Asthmaphédrine**  
  
**Asthmatyl**  
**\*Asthmo-Actine**  
**\*Athsmolysin**  
  
**Asthmor**  
  
**Asthmosine**  
**Astamy.**  
  
**Asthmylose**  
**Atemnol**  
**Atensyl**  
  
**\*Athérolysine**  
**Atihal**  
**Atlasantol**  
  
**Atolysan**  
**\*Atomine**  
**\*Atophan Cruet**  
**\*Atophanyl**  
  
**\*Atoquinol Ciba**  
  
**Atoxyl Poulenc**  
**Atrabiline Gory**  
**\*Atural**  
**\*Audigénine**  
**Auriculine**  
**Aurion Couturieux**  
**Autogénol**  
**Auto Inhalation Legras**  
**Auxergyl**  
**Avanazol Couturieux**
- 46, r. de Rome, Marseille.  
 Etabl. LABORADIUM, 33, r.  
 St-Jacques, Paris.  
 21, r. Feydeau, Paris.  
 46, r. de Rome, Marseille.  
 30, r. St-Jacques, Namur (Bel-  
 gique).  
 86, bd Port-Royal, Paris.  
 THORAL, Le Mont-Dore (P.-  
 de-Dôme).  
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 20, 1g St-Honoré, Paris.  
 10, r. Lafayette, Grenoble.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 3, r. de Vouillé, Paris.  
 14, r de Birague Paris.  
 Lab. OPTIMA, 78, Gde-Rue-  
 aux-Bois, Bruxelles.  
 3, r. du Pont, Epinal.  
 BERTHON à Dornes (Nièvre).  
 HOFSTETTER, 6, r. des  
 Cigognes, Strasbourg.  
 88, av. J.-B.-Clement, Bou-  
 logne-sur-Seine.  
 PHILIPPE, Paimpol (C.-du-N.)  
 ROUSSELET, 9, bd de la Repu-  
 blique, Noisy-le-Sec (Seine).  
 2, r. Lesdiguières, Paris.  
 126, r. de la Pompe, Paris.  
 DORANTOWICZ, 17 bis, av.  
 Parmentier, Paris.  
 Lab. JONIDS, Dijon (Côte-d'Or).  
 5, pl. Miremont, Vienne (Isère).  
 MARONNEAU-MOREL, 156, r.  
 des Fauvelles, Courbevoie.  
 id.  
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.  
 13, r. Miollis, Paris (XV<sup>e</sup>).  
 Lab. CRUET, 13, r. Miollis,  
 Paris (XV<sup>e</sup>).  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 JOOSS, Montreuil (Seine)  
 35, r. de Paris, Clichy.  
 VAILLANT, 19, r. Jacob, Paris.  
 21, r. Feydeau, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.  
 28, r. Monge, Dijon.  
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.

- Avantol**  
**\*Avistyl**  
**\*Azigol**  
**\*Azotyl**  
**\*Azufrol Couturieux**  
**\*Azym**
- GOUIN**, 20, r. des Écoles, Paris.  
 11, r. Lepic, Paris.  
**Thévenot**, 21, r. des Roses, à Dijon.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
**PARET**, 22, r. Guibal, Marseille.

## B

- \*Babeurre Gulgoz**  
**\*Babeurre de Lafaye**  
**Babeurre Lactella**  
**\*Babeurre Nutricia**  
**Babutyrose**  
**Baby-Bala**  
**Baby-Ossine**  
**Bacilacrine**  
**Bacilactine**  
**\*Bacillactine Nutricia**  
**\*Backerine**  
**\*Bacté-Coli-Phage**  
**\*Bacté-Dysentéri-Phage**  
**\*Bacté-Intesti-Phage**  
**\*Bacté-Phages**  
**\*Bacté-Pyo-Phage**  
**Bactériophages Leclerc**  
**\*Bacté Rhino-Phage**  
**\*Bacté-Staphy-Phage**  
**\*Bactioxyme**  
**\*Bains Bagnorradioactif**  
**Bains Brimox**  
**Bains carbogazeux de Royat**  
**\*Bains carbogazeux Wolo**  
**\*Bain Carré**  
**Bain de Royan Varech**  
**\*Bain Salvia**  
**Bains médicamenteux**
- 19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.  
 Ferme de « La Faye », Marlihes (Loire).  
 à Tourcoing.  
 1, bd St-Martin, Paris.  
 59, bd Gambetta, Tourcoing.  
**BRICHARD** et fils, Bar-le-Duc (Meuse).  
**Billy-Montigny** (Pas-de-Calais).  
 50, r. de la République, Putaux.  
 50, r. de la République, Putaux (Seine).  
 142, r. Fransman, Bruxelles.  
 4, pl. des Vosges, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
 10, r. Vignon, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 id.  
 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 55, r. du Centre, Pantin.  
 Lab. **BRIMONT**, Paris.  
 Royat (Puy-de-Dôme).  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
**LANCOSME**, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.  
 Labor. Marin, Pontailiac (Ch.-Inf.).  
 av. Émile Zola, 139, Paris.  
**D<sup>r</sup> FAYES**, 199, r. St-Denis, Paris.

- Bakolyse  
 \*Baldisedan  
 \*Ballotyl  
 \*Balmiga  
 Balnacid  
 Balsamiode  
 \*Balsamol Lescène  
 Balsaniodol  
 Balsapector  
 \*Balsoforme  
 Bandes ulcérophiles  
 Nozan  
 \*Banikol Chauzeix  
 Bardane s'abilisée  
 Dausse  
 Bardanyl  
 Barèges Fagard  
 Barkyl  
 Baromyl  
 \*Basedowine  
 \*Baume Adol  
 Baume Agerca  
 Baume Apard  
 \*Baume Aroma  
 \*Baume Bengué  
 Baume Bernhard  
 \*Baume Dr Baissade  
 Baume Dr Blancard  
 Baume Booglin  
 Baume Dalet  
 Baume Darnoe  
 \*Baume Daynoc  
 \*Baume Delacour  
 Baume de Dentition  
 Baume de la Faculté  
 Baume Dolora  
 \*Baume Duret  
 Baume Fuba  
 Baume du D G gon  
 \*Baume Iki  
 Baume Kamol  
 Baume Lartigol  
 Baume Lorol  
 Baume Marta  
 122, r. Cherche-Midi, Paris.  
 133, r. Lecourbe, Paris.  
 113, bd Voltaire, Paris.  
 127, bd. St-Michel, Paris.  
 49, r. Paradis, Paris.  
 19, c. Morand, Lyon.  
 à Livarot (Calvados) et 58, r.  
 de Vouillé, Paris.  
 10 r. Washington, Paris.  
 15, r. Catulienne, St-Denis  
 (Seine).  
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 6ter, r. Voltaire, La Garenne-  
 Colombes.  
 26, r. Pradier, Ville-d'Avray.  
 (Seine-et-Oise).  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 44, r. d'Aguessau, Boulogne-sur-  
 Seine.  
 30, r. Bobillot, Paris.  
 Sté française d'Extension Bio-  
 Chimique, St-Quentin.  
 GALLIER, 38, bd Montpar-  
 nasse, Paris.  
 L. GIROUD, 78, c. de la Liberté,  
 Lyon.  
 30, r. Bobillot, Paris.  
 27, bd de Courtais, Montluçon  
 (Allier).  
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 16, r. Ballu, Paris.  
 11, r. Lafayette, Paris.  
 Saint-Loup, près Marseille  
 (Bouches-du-Rhône).  
 114, av. Jean-Jaurès, Paris.  
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.  
 24, av. Mathurin Moreau, Paris.  
 HUBERT, Romorantin (L.-et-C.)  
 LEJEUNE, 142, rue de Picpus,  
 Paris.  
 56, bd Péreire, Paris.  
 32, fg Montmartre, Paris.  
 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.  
 50, r. de la République, Pu-  
 teaux.  
 ROUTIER, 20, r. St-Lazare  
 Paris.  
 37, r. des Lois, Toulouse.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 MERCIER, Fécamp (S.-Inf.).  
 6, r. Mathide, Courbevoie.  
 78, fg Saint-Denis, Paris.  
 ZEDAIRE, à Grenoble.  
 BONNAURE, à Alais (Gard).

- \*Baume de la Maternité 7, r. Galvani, Paris.
- Baume Merveilleux RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.
- Baume Oco 87, r. Lafayette, Paris.
- Baume Pélévine 16, r. Barquette, Paris.
- Baume de Port-Royal MOREL, 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
- Baume Py 58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
- Baume des Pyrénées Chalet du Rêve, Bayonne.
- \*Baume Rhodia SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Baume Robemard D<sup>r</sup> PACHEBAT, Bayonne.
- Baume Saihel 70, Grand'Rue, Sèvres.
- Baume Saint-Antoine 38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).
- \*Baume Selenia DAVID & ses fils, 49, r. de Bitche, Courbevoie.
- \*Baume du D<sup>r</sup> Serin de Gaillac Marmande (L.-et-G.).
- \*Baume Suelta 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
- Baume Tanex DEBRUERES, 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
- Baume Tetyl 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
- Baume Victor PELAUD & BAYLE, La Courtine (Creuse).
- \*Baumolacpinine 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- \*Béatol 46, av. des Ternes, Paris.
- \*Beef Lavoix 5, av. Victoria, Paris.
- \*Belhémine Lab. de Sérothérapie, 3, impasse Adam, Boulogne-s.-Seine.
- \*Belladenal Sandoz 20, r. Vernier, Paris.
- Belladone Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- \*Bellafoline Sandoz 20, r. Vernier, Paris.
- \*Bemax 5, r. de la Paix, Paris.
- Bémecé 21, r. Violet, Paris.
- Benedictus (Produits) 74, r. Lamarck, Paris.
- \*Bensamine 74, quai Jemmapes, Paris.
- Benzhermyl 36, q. Fulchiron, Lyon.
- Benzoate de Naphtol FRAUDIN, 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
- \*Benzo-Bismuth Millot 54, r. Bienfaisance, Paris.
- \*Benzobromine HERAULT, 14, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beauvais.
- Benzocalyptol 213, r. St-Honoré, Paris.
- \*Benzocarbène FOUCHERE, Rive-de-Gier (Loire).
- \*Benzoflorine Julien 105, r. de Rennes, Paris.
- \*Benzo - iodhydrine 36, r. de Paris, Colombes (Seine).
- Bruehl
- Benzolactine 38, r. Albouy, Paris.
- Benzo-Lactol 10, r. du Parc-Royal, Paris.
- Benzo phosphine 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Christiaens
- \*Benzoquinol 1, r. Alexandre-III, Dunkerque.
- Benzo-Ringyl 9 r. Boissonade, Paris.

- Benzothymol**  
**Benzyanil**  
**\*Benzylocalcium**  
**\*Benzylol**  
**Berkendyl**  
**Béryline du D<sup>r</sup> Fayès**  
**Bestol du D<sup>r</sup> Lavoué**  
**\*Bétul-Ol Midy**  
**Bexinine Amblard**  
**Bexoforme**  
**Bi-98**  
**Biantero.**  
**Biarsol**  
**\*Biazan**  
**Bibromure de Hg Vi-**  
**cario**  
**\*Bi-Citrol Marinier**  
**Bicollyre**  
**Biere Fanta (nourrices)**  
**\*Biferments lactiques**  
**stables**  
**Bigara**  
**Bigynol**  
**\*Bi-Iodural Novat**  
**Bi-iodure Cros**  
**Bi-iodures Domergue**  
**Bi-iodure Midy**  
**Bi-iodure Souffron**  
**\*Bikréol**  
**Bilentéric**  
**Bilexabol**  
**\*Biléyl Fournier**  
**\*Biliase Raby**  
**\*Biliboldo**  
**\*Bilifluine**  
**\*Biliogastrine Chevillon**  
**Bilio Bouty**  
**Biliose Vichy**  
**Bilirhéine**  
**\*Bilivaccin**  
**Billeros**  
**Billirgyl**  
**Bilolive**  
**Biminéral Reynaud**  
**Binol Roger**  
**\*Binoxol**  
**50, r. de la République, Pu-**  
**teaux.**  
**37, r. de Bourgogne, Paris.**  
**Lab. DOR, 17 bis, av. Parmen-**  
**tier, Paris.**  
**37, r. Galilée, Paris.**  
**61, av. Louise, Bruxelles.**  
**199, r. St-Denis, Paris.**  
**Rennes (Ille-et-Vilaine).**  
**4, r. du Colonel-Moll, Paris**  
**6, r. Balainvilliers, Clermont-Fd.**  
**13, r. Beudant, Paris.**  
**MARONNEAU-MOREL, 156, r.**  
**des Fauvelles, Courbevoie.**  
**Lab. chimie physiologique, 37, r.**  
**Tivoli, Bordeaux.**  
**Lab. ORRILLARD, 245, r. de**  
**Vaugirard, Paris.**  
**1, pl. Lucien-Herr, Paris.**  
**17, bd Haussmann, Paris.**  
**52, r. de Flandre, Paris.**  
**276, r. Lecourbe, Paris.**  
**77, rte d'Orléans, Montrouge.**  
**98, r. J.-Maillotte, La Made-**  
**leine (Nord).**  
**Lab. SEVIGNE, 76, r. des**  
**Rondeaux, Paris.**  
**54, r. de Paris, Charenton.**  
**BOMEL, à Annonay (Ardèche).**  
**12, r. de Nice, Paris.**  
**20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.**  
**4, r. du Colonel-Moll, Paris.**  
**98, r. de Sèvres, Paris.**  
**85, av. de Neuilly, Neuilly-s/s.**  
**112, r. de Gerland, Lyon.**  
**156, r. des Fauvelles, Courbevoie.**  
**7, r. Biscornet, Paris.**  
**à Asnières (Seine).**  
**Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix**  
**(B.-du-R.).**  
**Lab. STENE, 2, pl. des Vosges,**  
**Paris.**  
**CHEVILLON, 99, r. de Paris,**  
**Massy (S.-et-O.).**  
**3, r. Dunkerque, Paris.**  
**PATRICE à Vichy.**  
**41, r. Etienne-Marcel, Paris.**  
**La Biothérapie, 5, r. Paul-**  
**Barruel, Paris.**  
**33, r. Rennequin, Paris.**  
**30, r. Miromesnil, Paris.**  
**GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.**  
**DURAND, à Aigues-Mortes.**  
**177, bd St-Germain, Paris.**  
**145, bd Haussmann, Paris.**

- Biocalcino**  
**\*Biocalcose**  
**Biocalmine**  
**Biocéane**  
**\*Biocholine**  
**Biocrine**  
**Bioderma**  
**Biodermyl Monal**  
**\*Biodynamine**  
**Bi-iodure de mercure indolore Midy**  
**Bioforcil**  
**\*Bioentérase**  
**Biogastrine**  
**\*Biogénol Demasles**  
**Biogésine Rochard**  
**\*Biolactyl Fournier**  
**\*Biolax**  
**Biomagnésium**  
**\*Biomucine**  
**\*Bionéol**  
**Bionergyl**  
**Bionine**  
**Bionucléine**  
**\*Biophorine Girard**  
**Biophosphine**  
**\*Biophylactine M.-G.**  
**Biophytol**  
**Bioplasmyl**  
**Bioplastina Serono**  
**Biopulmol**  
**Biorénine**  
**Bio-Sel**  
**Biosérine**  
**\*Biosine le Perdriel**  
**Biotose Ciba**  
**\*Biotrignon**  
**Biovigorine**  
**Bioxyl**  
**Biozol**  
**Biquinyl Meurice**  
**Bircol Mauchant**  
**Bi-Ricin**  
**Bi-Roche**  
**\*Bisalycilate**
- AUGIER, 2-4, r. des Lombards, Paris.**  
**LEMATTE & BOINOT, 52, r. Labruyère, Paris.**  
**DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.**  
**OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.**  
**ROBERT et CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.**  
**122, fg St-Honoré, Paris.**  
**Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).**  
**6, r. Bridaine, Paris.**  
**17, r. Cadet, Paris.**  
**4, r. du Colonel-Moll, Paris.**  
**1, r. des Augustins, Perpignan.**  
**69, r. de Wattignies, Paris.**  
**1, bd Henri-IV, Paris.**  
**à Vienne (Isère).**  
**à Lorient.**  
**7, r. Biscornet, Paris.**  
**ADLER, 36, r. des Français Bourgeois, Paris.**  
**20, fg St-Honoré, Paris.**  
**37, r. de Bourgogne, Paris.**  
**14, r. de Périgueux, Angoulême.**  
**16, r. St-Gilles, Paris.**  
**LECRONIER, Domfront (Orne).**  
**4, imp. de Béarn, Paris.**  
**48, r. d'Alésia, Paris.**  
**DEPOUILLY, Le Creusot.**  
**116, av. Berthelot, Vienne (Isère).**  
**90, av. des Ternes, Paris.**  
**LE DAVAY, 2, r. Notre-Dame, Guingamp (Côtes-du-Nord).**  
**6, r. des Ursulines, Paris.**  
**Lab. Termes, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne).**  
**12, r. Pavée, Paris.**  
**COUENON, Lamalou (Hérault).**  
**63, cours Victor-Hugo, Lyon.**  
**11, r. Milton, Paris.**  
**109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.**  
**8, r. Pierre-Girard, Paris.**  
**4, r. du Médoc, Le Bouscat.**  
**Hussigny (M.-et-M.).**  
**25, r. Drouot, Paris.**  
**Union Chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.**  
**14, r. de Birague, Paris.**  
**72, route de Châtillon, Malakoff.**  
**21, pl. des Vosges, Paris.**  
**Lab. du Gastrocarbone, St-Louis (B.-du-R.).**



- Bisalyl** JONIDS, 9, bd Sévigné, Dijon (Côte-d'Or).
- \*Biscamph** 5, r. Lefebvre, Paris.
- Biscols Fraudin** 4, av. Desfeux, Boul.-sur-Seine.
- Biscopaks Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Biscottes Delft** 45, r. Grange-aux-Belles, Paris.
- Biscottes Grégoire** 24, r. du Bois, Clichy (Seine).
- Biscottes Rabet** 55, ch. d'Antin, Paris.
- Bisermol** VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- \*Bis-Hyd** 45, r. du Marché, Neuilly-Paris.
- \*Bis-ka-ma** DURET et REMY, Asnières (Seine).
- Bismétine Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- \*Bismhydral** LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- Bismint** 2, r. Paradis, Paris.
- Bismupaïne** 194, r. de Rivoli, Paris.
- \*Bismusodine** 60, r. Auguste-Comte, Lyon.
- \*Bismutartrol** RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.
- \*Bismuth (Crème de)** 12, r. de Buci, Paris.
- Bismuth Adler** 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- \*Bismuth Desleaux** 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- Bismuth léger Adrian** 9, r. de la Perle, Paris.
- Bismuth Perroud** 7, r. des Archers, Lyon.
- \*Bismuth Tulasne** 48, bd des Batignolles, Paris.
- Bismuth 25** OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- \*Bismuthion Coutu-** 18, av. Hoche, Paris (XVI<sup>e</sup>).
- rieux**
- \*Bismuthoidol Robin** 13, r. de Poissy, Paris.
- Bismuthyl « Meurice »** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Bisquina** 7, r. Guillaume Budé, Montgeron.
- Bissine** DECAUD, St-Hilaire-des-Loges (Vendée).
- Bissol** 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
- Bistan** DUCATTE, 31, r. Francs-Bourgeois, Paris.
- \*Bivatol** Lab. Chimiothérapie, 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Bivigor** SCOTT, 38, r. du Mont-Thabor, Paris.
- \*Blagny (gouttes, dra-** 21 r. de la République, Forges-
- gées, sirop)** les-Eaux.
- Blastéase** 21, pl. des Vosges, Paris.
- Blécao Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).
- \*Blédine Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).
- \*Blennopiat** GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
- Blennoradine** Radiumthérapie, 25, r. Vaneau, Paris.
- \*Blennaosine** 23, r. du Caire, Paris.
- Blennotoxyl** 172, r. d'Alsia, Paris.

- Bléomaltine**  
**Bleusantal**  
**\*Blocs Vécot**  
**Blokao**  
**Bluetine**  
**Bokanol**  
**Bolcitol**  
**\*Boldine Houdé**  
**Boldo-Basma**  
**Boldo-Biline**  
**\*Boldobyl**  
**Boldo Glucine Chape-**  
**teaut**  
**\*Boldo-Gmet**  
**\*Boldoine Eparvier**  
**\*Boldolactic Lagoutte**  
**Boldolactol**  
**\*Boldorhéine**  
**\*Boldo-Verne**  
**\*Boléase Monal**  
**\*Bolène**  
**Bonbons Lucas (Ver-**  
**mifuges)**  
**Bonbons vermifuges**  
**Royer**  
**\*Boréol**  
**\*Boricine Meissonnier**  
**Bornyval**  
**Boro-borax Vigier**  
**Borocalcyl Thévenot**  
**\*Borosodine Lumière**  
**\*Borestyrol**  
**Berotropine Sevin**  
**Bouchons Radioactifs**  
**Emania**  
**Boues Radioactives**  
**Emana**  
**Boues Radioactives de**  
**Putejan - les - Bains**  
**(Tchécoslovaquie).**  
**Boues radioactives**  
**Rhemda**  
**Bougies Américaines**  
**Bougies Chaumel**  
**Bougies coricides Der-**  
**mopode**  
**Bougies Franklin**  
**AXAREL, 15, r. Catulienne, St-**  
**Denis (Seine).**  
**DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.**  
**3, imp. Adam, Boulogne-Billan-**  
**court.**  
**BLOCH, à Tomblaine (M.-et-M.).**  
**MEILLER, Dumières (Haute-**  
**Loire).**  
**156, r. des Fauvelles, Courbevoie.**  
**18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.**  
**9, r. Dieu, Paris.**  
**9, pl. Félix-Faure, Paris.**  
**DUCLOY et Cie, Arques (P.-de-**  
**Calais).**  
**SAUBA, Montreuil (Seine).**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**27, fg Montmartre, Paris.**  
**26, Grande-Rue St-Clair, Lyon.**  
**229, cours Gambetta, Lyon.**  
**A. SALLES, 11, bd de Stras-**  
**bourg, Paris (X<sup>e</sup>).**  
**D<sup>r</sup> CHAPELLE, 8, r. Vivienne,**  
**Paris.**  
**à Grenoble (Isère).**  
**6, r. Bridaine, Paris.**  
**46, r. Pierre Charron, Paris.**  
**JOUBERT & SIBASSIÉ,**  
**Nantes.**  
**LAUMONNIER, 225, r. St-Mar-**  
**tin, Paris.**  
**21, r. Feydeau, Paris.**  
**LOGEAI, 22 bis, r. de Silly,**  
**Boulogne-sur-Seine.**  
**2, r. des Lions, Paris.**  
**12, bd Bonne-Neuve, Paris.**  
**21, r. des Roses, Dijon.**  
**45, r. Villon, Lyon.**  
**MAYOLY, 1, pl. Victor-Hugo,**  
**Paris.**  
**2 bis, r. Chevallier-de-la-Barre,**  
**St-Quentin.**  
**14, r. de la Pépinière, Paris.**  
**14, r. de la Pépinière, Paris.**  
**45, r. du Marché, Neuilly.**  
**51, r. d'Alsace, Courbevoie.**  
**LOGEAI, 24, r. de Silly,**  
**Boulogne-sur-Seine.**  
**78, fg St-Denis, Paris.**  
**22, r. St-Pierre, Evreux.**  
**100, bd Sébastopol, Paris.**

- Bougies radioactives** 51, r. d'Alsace, Courbevoie.  
**Rhemda** 12, r. de Nice, Paris.  
**Bougies Raynal** 47, bd Victor, Paris (XV<sup>e</sup>).  
**\*Boules Quiès** BONNAURE, à Alès (Gard).  
**Bouragar** CELLIER, 8, r. de Loge, Mont-  
**Bourgène Blanc** pellier.  
**Bouteilles Radioactives** 14, r. de la Pépinière, Paris.  
**Emana**  
**Bovavèna** Bourg-la-Reine (Seine).  
**Bov'Cardiac** FUMOUE, 78, fg St-Denis,  
 Paris.  
**Bov'Bilic** id.  
**Bov'hépatie** id.  
**\*Bradygastrine** DUCLOY et C<sup>ie</sup>, Arques (P.-de  
 Calais).  
**Brévanyl** 15, q. de Bourbon, Paris.  
**Brodynol** FAUCHÈRE, 44 bis, r. du  
 Mouillon, Rive-de-Gier (Loire)  
**\*Bromadyl Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.  
**Bromalbin Adrian** 9, r. de la Perle, Paris.  
**\*Broméine Montagu** 49, bd Port-Royal, Paris.  
**Bromhyl P. Peyre** 42, av. de Breteuil, Paris  
**\*Bromiase Couturieux** 18, av. Hoche, Paris.  
**Bromidia** 5, r. de la Paix, Paris.  
**Bromidine Henry** 39, r. Sclessin, Liège.  
**Bromocarpine Rocher** 32, r. Grenelle, Paris.  
**Bromoderme** 8, av. Walkanaer, Nice.  
**Bromogastrine** 4, imp. de Béarn, Paris.  
**\*Bromogénol Pépin.** à Courbevoie (Seine).  
**\*Bromomaïsine** 48, r. d'Alésia, Paris.  
**\*Bromone Robin** 13, r. de Poissy, Paris.  
**Bromopirine** PATRICE, à Vichy.  
**Bromostrontiurane** MERMINOD, 49, r. du Paradis,  
 Paris.  
**Bromovaleron Henry** 39, r. Sclessin, Liège.  
**\*Bromovose** Lab. MADYL, 14, r. Miho-  
 mesnil, Paris.  
**Bromure de camphre** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**Clin**  
**Bromure d'éthyle** OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
**Bromure Laroze** 2, r. des Lions, Paris.  
**Bromures Pachaut** 130, bd Haussmann, Paris.  
**Bromure de sodium du** 25, bd Beaumarchais, Paris.  
**D<sup>r</sup> Gigon**  
**Bromures Souffron** 98, r. de Sèvres, Paris.  
**Bronchasmine** THORAL, Le Mont-Dore (Puy-  
 de-Dôme).  
**\*Bronchitol** H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
**Bronchitol** 39, r. de Sclessin, Liège (Bel-  
 gique).  
**Broncho-Baume** 34, r. Turgot, Narbonne.  
**\*Bronchodermine** 34, bd de Clichy, Paris.  
**\*Bronchoforme** 20 bis, r. Sergent-Godefroy,  
 Montreuil-sous-Bois.  
**Bronchogénine** 229, c. Gambetta, Lyon.

**Bronchophile**  
**Bronchoplastre**

\***Bronchoseptol**

\***Broncho-Vaclydun**  
**Broncodyl**

\***Broncosol**

\***Broséyl**  
**Brumarsyl**  
**Bruméol Elixir**  
**Brunyl**  
**Bucchu-Basma**  
**Buccochlore**

**Buccolan**

**Buccurol**

\***Bucmine**

**Buctol Paris**

**Buc-Vac**

\***Bulgarine Thépénier**  
**Bulles d'Haley**  
**Bursol**

**Butyral**  
**Bylierine**  
**Byl-Efa**

Lab. **BADEL**, Valence (Drôme).  
**CAVAILLES**, 29. r. Singer,  
Paris.

Lab. **E. LAURIAT**, à la  
Garenne-Colombes (Seine).

27, r. Desrenaudes, Paris.

177, r. St-Maur, Paris.

Lab. **BRÉSIL**, 12, r. St-Gilles,  
Paris.

40, r. des Acacias, Paris.

65, Cours National, Saintes.

65, Cours National, Saintes.

17, r. de Berri, Paris.

9 pl. Félix-Faure, Paris.

**BEAUCHAMP**, 5, c. St-Louis,  
Marseille.

24, r. Jardel, Bordeaux.

83, bd de la Villette, Paris.

**WARIN**, 4, ch. de la Muette,  
Paris.

4, r. Lamotte-Picquet, Paris.

4, ch. de la Muette, Paris.

12, r. Clapeyron, Paris.

60, r. St-Guilhem, Montpellier.

**COUSSINET**, 20, r. des Mar-  
tyrs, Paris.

121, av. de St-Ouen, Paris.

37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).

**LECACHEUX**, 37, bd Beau-  
marchais, Paris.

## C

\***C. 40**

**Cachets Adol**

**Cachets antigrippe**

**Cachets Aspéca**

**Cachets Atlantis**

**Cachets Canol**

\***Cachets du Dr Boveil**

**Cachets C. A. S.**

**Cachets Céli**

**Cachets Charvoz**

**Cachets Cy-troène**

**Cachets Dellé**

**Cachets digestifs Car-  
bowil**

**DROUET et PLET**, 37, r. Mar-  
ly, Rueil (Seine).

**GIROUD**, 78, c. de la Liberté,  
Lyon.

**D<sup>r</sup> FLAMAND**, 6, pl. Clichy,  
Paris.

**P. DORDIN**, Harnes (P.-de-C.).

66, r. Paradis, Marseille.

5, r. des Lyonnais, Paris.

1, r. Lassalle, Lyon.

49, r. de Metz, Nancy.

**LANDES**, à Gramat (Lot).

3, chem. du Vallon, Lyon-  
Caluire (Rhône).

Lab. de l'Adour, 38, r. Soult,  
Tarbes.

**LE NAOUR**, à Quimperlé (Finis-  
tère).

13, r. St-Agricol, Avignon.

- Cachets digestifs du D<sup>r</sup> Bern 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.  
 Cachets digestifs Gydé 4, cours Tolstoi, Lyon.  
 Cachets du D<sup>r</sup> Faivre à Lyon.  
 Cachets Gau 87, r. de la République, St-Mandé (Seine).  
 \* Cachets Kapytan 76, r. de Sèvres, Paris.  
 Cachets Laxa AUGIER, 2, r. des Lombards, Paris.  
 Cachets Merveilleux Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).  
 Cachets opothérapiques Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 \* Cachets Pachaut 130, bd Haussmann, Paris.  
 Cachets parégoriques BERNHARD, 11, r. Lafayette, Paris.  
 Cachets Phebor 64, r. des Tournelles, Paris.  
 Cachets Prodiges 12, r. Grande, Evreux.  
 Cachets Pyrana 26, ch. de la Madeleine, Nantes.  
 Cachets Rava 4, ch. de la Muette, Paris.  
 Cachets Réal 62, r. Petits-Champs, Paris.  
 Cachets réparateurs HÉRIN, 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine.  
 \* Cachets Roche de HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 10, r. Crillon, Paris.  
 Cachets de Roux 56, r. des Minimes, Marseille.  
 \* Cachets Spévin CHAUVIN, 3, r. de Vouillé, Paris (XV<sup>e</sup>).  
 Cachet Urby P. DORDIN, Harnes (P.-de-C.).  
 \* Cachets Van-Sol 18, r. du Maréchal-Foch, Versailles.  
 Cacodylate Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 \* Cacodyle Gonnon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 Cacodyle Mars 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.  
 \* Cacodyline Jammes 86, r. Michel-Ange, Paris.  
 Cacocylo Phosphate à Villefranche (Rhône).  
 vital Jacquematre  
 Cacticardine D<sup>r</sup> Con-raux à Caudebec (Seine-Inférieure).  
 \* Cadior 10, r. Vignon, Paris.  
 Cadmiol zinc Labor. DULCIS, pl. Cllichy, Monte-Carlo.  
 Cæcaline Gagnière à Clermont-Ferrand.  
 Cafacétyl-Codéine BÉGLIN, 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.  
 \* Cafédrine SAUBA, Montreuil (Seine).  
 Caféine Houdé 9, r. Dieu, Paris.  
 Caféine Invar 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.  
 Calcéose Boillot 9, r. St-Paul, Paris.  
 \* Calcibronat Sandoz 20, r. Vernier, Paris.  
 Calciclo 4, imp. de Béarn, Paris.  
 Calcifixine Bureau 86, bd Port-Royal, Paris.  
 Calcigénie 90, bd St-Denis, Courbevoie (Seine).  
 \* Calcigénol PINARD, 90, bd St-Denis, Courbevoie.

- \*Calciline 21, r. Violet, Paris.
- \*Calcional LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
- Calci-Ostéline 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
- Calciphose BERGER, 14, r. des Pyramides, Paris.
- Calcitanol 7, r. des Petits-Carreux, Paris.
- \*Calcisthénine MAIRE, 171, r. de Belleville, Paris.
- Calcitrine DIGNE fils à Fréjus (Var).
- \*Calcium Sandoz 20, r. Vernier, Paris.
- Calco-céril 16, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
- \*Calcolécr Produits SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
- \*Calcomagnésie 47, r. Bokanowski, Asnières.
- Calco magnésol 52, bd Diderot, Paris.
- Calcophore 6, r. Raoul-Berton, Bagnolet.
- Calcothéobromine 49, r. de Paradis, Paris.
- \*Calcozymase 3, r. Fernand-Widal, Paris.
- \*Calmaby 84, r. Rochechouart, Paris.
- \*Calmag. Na. SUBSTANTIA, 13, r. Pagès, Suresnes.
- \*Calmant Meunier r. du Commerce, Montmarault (Allier).
- \*Calmocardine Lagoutte 229, cours Gambetta, Lyon.
- Calmigorge à Thury-Harcourt (Calvados).
- Calmitine BILLEBAUD, Paray-le-Monial (S.-et-L.).
- Calmosuppos BOIVERT, La Mothe-St-Heraye (Deux-Sèvres).
- Calogyre IMBERT, à Toulon (Var).
- Calomel R. B. Lagrave 74, quai de Jemmapes, Paris.
- Calomel Vicarie 17, bd Haussmann, Paris.
- Calox 5, r. de la Paix, Paris.
- Camphemol 1, pl. Morand, Lyon.
- Camphex 59, bd Lefebvre, Paris.
- \*Camphodausse 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- Camphoral Aguettant 36, q. Fulchiron, Lyon.
- Camphoran 59, bd Lefebvre, Paris.
- \*Campho - Spartéine 16, bd Pereire, Paris.
- Dubois
- \*Camphostyl LACROIX, 37, r. Pajol, Paris.
- \*Camphro-SaiylFraissee 8, r. Jasmin, Paris.
- \*Camphydryl Robin 13, r. de Poissy, Paris.
- \*Canol 39, r. de l'Arbalète.
- \*Cantéine Bouteille 23, r. des Moines, Paris.
- Caoglands 10, r. Poncelet, Paris.
- \*Caparlem Lab. Lorrain de Pr. Synthétiques Purs, Etain (Meuse).
- Capillairai ARQUEVAUX, Etampes (S.-et-O.).
- Capsellase 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- Capsol 74, r. Blanche, Paris.
- Capsoléol Lab. ANINAT, à Nîmes (Gard).
- Capsorhinol 17, r. Chomel, Paris.
- Capsovules Diptlos 18, r. Pierre-Curie, Paris.

- \*Capsules Bardet 76, r. de Sèvres, Paris.  
 Capsules Bonnefond 49, bd Port-Royal, Paris.  
 \*Capsules Bruel 36, r. de Paris, Colombes (Seine).  
 Capsules Cédro-Méthyle 55, r. de Chabrol, Paris.  
 Capsules Cognet 43, r. de Saintonge, Paris.  
 \*Capsules Dartois 6, r. Abel, Paris.  
 Capsules de Gonosan 2, r. des Lions, Paris.  
 Capsules d'Euviscol 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-s.-Seine.  
 Capsules Dieu 2, r. Marché des Blancs-Manteaux, Paris.  
 Capsules Enos Lab. BAPAUME, 85, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.  
 \*Capsules et sirop Préga DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.  
 Capsules Goubaux 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.  
 \*Capsules grises Cabanes 17, r. Cadet, Paris.  
 Capsules Gurgol JEHAN & BRERA à Montauban (Lot-et-Garonne).  
 Capsules d'Hojasol 19, r. Ferdin.-Duval, Paris.  
 Capsules d'Ichtyol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 Capsules Franklin 100, bd Sébastopol, Paris.  
 \*Capsules Joret et Homolle 165, r. St-Honoré, Paris.  
 \*Capsules Kuchner HINGLAIS, Épernay (Marne).  
 Capsules de Morrhaine Puy Grenoble (Isère).  
 \*Capsules Noguès 7, rue Galvani, Paris.  
 Capsules Ovigéniques 50, r. de la République, Puteaux.  
 Capsules Pautauberge 10, r. de Constantinople, Paris.  
 Capsules Pneumal 172, r. d'Alésia, Paris.  
 Capsules Raquin 78, fg St-Denis, Paris.  
 Capsules salolées LACROIX, 31, r. Philippe-de-Girard, Paris.  
 Capsules Sérafin 9, r. de la Perle, Paris.  
 Capsules Taetzel 2, r. Lesdiguières, Paris.  
 Capsules Therpinoï 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 Capsules Vigier 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.  
 Carbaïne Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 \*Carbiscalloïdes MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.  
 Carbalga id.  
 \*Carbargyre 7, av. Marceau, Paris.  
 Carbarseno 49, bd Port Royal, Paris.  
 \*Carbatropine id.  
 Carbémétine id.  
 Carbeserine id.  
 Carbocarpine id.  
 \*Carbocitrol 64, bd Barbès, Paris.  
 \*Carbofixine 34, r. Sedaine, Paris.  
 \*Carboiodine 132, r. de Turenne, Paris.  
 \*Carboiodure Fraudin 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.

- \*Carbolactyl
- \*Carbolin
- Carbomagnésol
- Carbométine
- \*Carbomucil
- Carbonal
- \*Carbonate de Bismuth
- Carbonate de Chaux
- Lancosme
- \*Carbonésie
- \*Carbophos
- \*Carbos
- \*Carbosanis
- Carboseptyl
- Carbozon
- \*Cardialgine Dubois
- \*Cardibaine
- Cardiobromine
- Cardiocrino
- Cardiobromine Reboul
- \*Cardion Vincardi
- \*Cardiosthénine
- Cardiostreptine
- Cardiotonic
- Cardiotonine
- Cardiotonino
- \*Cardisédine
- \*Carditone
- Cardyl
- Carminase
- Carnéose Dr Spès
- \*Carnine Lefrancq
- Carnix Robert
- Carnofer
- \*Carottase
- \*Carypaïne
- \*Casaldyl
- Cascara Alexandre
- Casara Eparvier
- Cascara Henry
- \*Cascara Midy
- \*Cascarine Leprince
- 19, r. de Fleurus, Paris.
- MIDY, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Lab. ASCO, 63, r. de Charonne, Paris.
- 229, c. Gambetta, Lyon.
- 41, r. de Rome, Paris.
- 14, r. Cantin, Courbevoie.
- 3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.
- 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- 12, bd St-Martin, Paris.
- NOË, St-Amand-les-Eaux.
- Lab. E. MILLET, Rambouillet (Seine-et-Oise).
- 49, bd Port-Royal, Paris.
- 94, r. Michelet, Alger.
- 33, r. Pelleport, Paris.
- 16, bd Péreire, Paris.
- 6, r. d'Assas, Paris.
- REBOUL, Pont-Saint-Maxence, (Oise)
- Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- Pont-Ste-Maxence (Oise).
- 14, av. Georges-Clemenceau, Nice.
- Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
- 54, fg. St-Honoré, Paris.
- GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- OPTIMA, 78, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- MILAN, 7, r. Bonald, Lyon.
- LOBICA, 46, av. des Ternes, Paris.
- SPECIA, 21, r. J.-Goujon, Paris.
- Produits FAYÈS, 199, r. St-Denis, Paris.
- Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- 78, fg St-Denis, Paris.
- 62, r. Marengo, St-Étienne.
- EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons.
- 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- 41, r. de Rome, Paris.
- 26, Gde rue St-Clair, Lyon.
- HENRY, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
- 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- 62, r. de la Tour, Paris.



- Caseoline Girard  
Cassitol  
\*Catalyl Mg.  
Catalysine du D<sup>r</sup> Vi-  
querat  
Cataplasme et boue ra-  
dioactive de Bistyan  
\*Cataplasme du D<sup>r</sup> Le-  
lièvre  
Cataplasme Electrique  
Morgin  
Cataplasme Optima  
Catarasmine  
  
Catéchiode Martinet  
\*Catéményl  
  
Cathartine  
  
Cathiode Brisson  
Causyth  
  
\*C. B. K.  
Ced roc.  
Cedrel Bel  
Cédro-Metnyle  
  
Cédre bleu  
  
Cedrosan  
\*Cellona  
Cenopansemets  
Cellules Paret  
\*Cellu-Son  
  
Cemag  
Centroserum Grosjean  
Cephmail  
\*Cephœméline  
Cerdesol  
\*Céréales-Bébé  
  
\*Céréales granulées  
  
\*Céréaline Tulivet  
  
Céréalose  
  
\*Cérébrine Fournier  
Cérébrinol  
Cérébrocricol  
  
\*Cérébroil Leisyn  
\*Cérébrolipase  
\*Cérébrosthénine Dalin  
Cérédine Loudenot  
  
48, r. d'Alésia, Paris,  
14, r. de Birague, Paris.  
10, r. de la Mairie, Ivry (Seine).  
THÉVENOT, Dijon.  
  
GENEVRIER, 145, r. du Mar-  
ché, Neuilly.  
12, av. Grande-Armée, Paris,  
(XVII<sup>e</sup>).  
46, r. Dauphine, Paris.  
  
gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
THORAL, Le Mont-Dore (Puy-  
de-Dôme).  
16, r. Petit-Musc, Paris.  
D<sup>r</sup> G. LALAURIE, à Cuxac-  
d'Aude (Aude).  
EON, 3, r. des Rouairies, Dinan  
(C.-du-N.).  
157, r. Championnet, Paris.  
BOISSY, 49, r. Hoche, Cour-  
bevoie (Seine).  
15, r. Catulienne, St-Denis,  
19-21, r. Van-Loe, Paris.  
DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.  
PIALOUX, 55, r. de Chabrol,  
Paris.  
P. HARDY, 42, bd St-Marcel,  
Paris.  
BREANT, 11, r. de Clichy, Paris.  
4, r. d'Illzac Mulhouse.  
La Cellophane, Bezons (S.-et-O.).  
22, r. Guibal, Marseille.  
AUBRY, 54, r. de la Bienfai-  
sance, Paris.  
D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
36, r. de Malte, Paris.  
17, r. de Berri, Paris (VIII<sup>e</sup>).  
49, r. Maleret, Bordeaux.  
18, r. Favart, Paris.  
FAVRICHON, à St-Sympho-  
rien-de-Lay (Loire).  
FAVRICHON, à St-Sympho-  
rien-de-Lay (Loire).  
52, r. de Poissy, St-Germain-en-  
Laye.  
Lab. ASTIER, 45, r. du  
Docteur-Blanche, Paris.  
147, bd Montparnasse, Paris.  
74, quai Jemmapes, Paris.  
Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
Dames, Paris.  
1 bis, r. Molitor, Paris.  
17, r. Soufflot, Paris.  
49, quai St-Vincent, Lyon.  
106, av. du Roule, Neuilly-sur-  
Seine.

- Céréol Gigon**  
**\*Céréossine**  
 Cérévisine  
 Cérinil  
 Cériomine  
 Cersomine  
 Cervol  
 Cetemol  
**\*Cethocal**  
**\*Cétrarose Gigon**  
**\*Charbon Fraudin**  
**\*Charbon Tissot**  
 Chardyl Meurice  
 Chatel-Biasé  
 Chaulmorhuat **Pô-**  
 maret  
**\*Chéloïdine**  
**\*Chenanthol**  
**\*Chéralys comprimés**  
**\*Chloci**  
 Chlomag  
 Chlorakin  
 Chloral anisé Iida  
**\*Chloral bromuré Du-**  
 bois  
 Chloral-Geranie  
 Chloralgot  
**\*Chloralosane**  
**\*Chloramine**  
**\*Chloraseptine**  
**\*Chloréthyle Bengué**  
 Chlorhydropeptine  
**\*Chlorhydrol**  
**\*Chloridia**  
**\*Chlorinol**  
**\*ChlormagnésiumFisch**  
**\*Chlorobacilline**  
**\*Chlorobyl**  
**\*Chloro-Calcion**  
 Chloroforme anesthé-  
 sique  
 Chloroforme amp.  
 Chloroforme Lam -  
 biotte irères  
 Chloroma
- 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 DEHAUSSY, 66, r. Nationale,  
 Lille.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 16, r. Ste-Croix-de-la-Breton-  
 nerie, Paris.  
 id.  
 18, r. Favart, Paris.  
 19, r. de Fleurus, Paris.  
 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 8 bis, r. J.-J.-Rousseau, Fonte-  
 nay-sous-Bois.  
 25, bd Beaumarchais, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 4, av. Desieux, Boulogne-sur-  
 Seine.  
 34, bd de Clichy, Paris.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 MIRATON, Châtel-Guyon.  
 21, r. Marbeuf, Paris.  
 DORANTOWICZ, 17 bis, av.  
 Parmentier, Paris.  
 HINGLAIS, à Epernay.  
 12, r. des Sts-Pères, Paris.  
 L. ADAM, Granville (Manche).  
 71, r. St-Jacques, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 17, r. du Bouloi, Paris.  
 DURIEZ, 20, pl. des Vosges,  
 Paris.  
 GROSJEAN, 36, r. de Malte,  
 Paris.  
 8, r. de la Paroisse, Versailles.  
 KUHLMANN, 145, bd Hauss-  
 mann, Paris.  
 FREYSSINGE, 6, r. Abel,  
 Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 16, r. Ballu, Paris.  
 D<sup>r</sup> COIRRE, 5, bd Montpar-  
 nasse, Paris.  
 FOUCHÉ, 2, bd Pershing, Paris.  
 Produits Dannec'h 64, r. des  
 Tournelles, Paris.  
 40, r. des Acacias, Paris.  
 4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.  
 TULIVET, St-Germain-en-Laye.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 MICHELS, 9, r. Castex, Paris.  
 USINES DU RHONE, 21, r.  
 Jean-Goujon, Paris.  
 OPTIMA, Grande-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.

- \*Chloro-Magnésion  
 Chloro magnésium Henry  
 Chlorostomalise  
 Chlorosulfol Vigier  
 Chloro T. B. X.
- \*Chlorumagène  
 \*Chlorure ammonium  
 Chloruro
- Chlory-choline  
 \*Chocolate Milk C. G.
- \*Cholagol  
 Cholagon  
 \*Cholecystine
- \*Choléne Camus
- \*Choléine lactique  
 Choléitoires Byla  
 \*Choléfluine  
 Cholélyse Carbou  
 Choléoboldine Thévenot  
 \*Choléo-Combretol  
 \*Choléokinase
- \*Choléolactol Daguin  
 \*Choléopeptine  
 \*Cholépan  
 \*Cholergine
- Cholestérioridine  
 Choline Roche  
 Cholotonon  
 Cholotoxine
- \*Chophytol  
 Chromo - Thermo -  
 Therapie  
 \*Chrysemine  
 Chymosine Fisch  
 \*Cibalgine
- Cibrol  
 \*Cicabi  
 Cicatryl  
 Cidrase  
 G<sup>d</sup> Cidre Bol régime
- Cigares Gicquel  
 Cigarettes anti-asthm.
- 52, bd du Temple, Paris.  
 HENRY, 39, r. de Sclessin,  
 Liège (Belgique).  
 BEDEIL, Lavelanet (Ariège.)  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le  
 Havre.  
 42, r. Mont-Cenis, Paris.  
 BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.  
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol,  
 Paris.  
 22, r. Morère, Paris.  
 Sté des Spécialités diététiques et  
 pharmac. (Cow et Gate), 22, r.  
 des Belles-Feuilles, Paris.  
 REBOUL, Pt-Ste-Maxence (Oise)  
 48, bd des Batignolles, Paris.  
 VINCENT, 14, av. Mac-Mahon  
 Paris.  
 DARRASSE, 7 à 13, r. St-Mau-  
 rice, Nanterre (Seine).  
 DARRASSE, 7 à 13, r. St-Mau-  
 rice, Nanterre (Seine).  
 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 LECONTE, 7, r. des Petits-  
 Carreaux, Paris.  
 8, r. Jean-du-Bellay, Paris  
 21, r. des Roses, Dijon.  
 37, r. de la Fédération, Paris.  
 DURET & RÉMY, Asnières  
 (Seine).  
 5, r. des Remises, St-Maur.  
 1, rue Bénard, Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-  
 sur-Seine.  
 52, r. La Bruyère, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 49, r. Paradis, Paris.  
 CHAUMONT-CAZALS, à Vichy  
 (Allier).  
 ROSA, 1 pl. Champerret, Paris.  
 12, av. du Maine, Paris.  
 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
 Lab. CIBA, 109-113. bd de la  
 Part-Dieu, Lyon.  
 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.  
 2, bd Pershing, Paris.  
 21, r. Chaptal, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 M. LANGLOIS, La Cresson-  
 nière, Pont-l'Évêque.  
 Produits DANNÉCH, 64, r. des  
 Tournelles, Paris.  
 ESCOUFLAIRE, Baisieux (N.).

- Cigarettes du D<sup>r</sup> Cléry** 18, r. de Maubeuge, Paris.  
**Cigarettes Espic** 20, r. St-Lazare, Paris.  
**Cigarettes Indiennes** 8, r. Vivienne, Paris.  
**Grimault**  
**Cigarettes Salva** Lab. Central de France, r. de  
 Châteaudun, Rennes.  
**Cigarettes Schulze** 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-  
 s.-Seine.  
**Cigarettes Zani** 52, r. de Poissy, St-Germain-  
 en-Laye. (Voir Poudre).  
**Cimalvol** 3, bd Beaumarchais, Paris.  
**\*Cimarsényl** MEYNARD, 68, av. de Nor-  
 mandie, Colombes.  
**Cimatoxyl** 6, r. du Bois, Nanterre.  
**\*Cimatryl** 4, pl. Royale, Nantes.  
**\*Cinalose** TAVERNIER, 32 r. de l'Ouest,  
 Paris.  
**\*Cineyl** 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).  
**Cinnolipol Chaulmogré** 74, quai de Jemmapes, Paris.  
**Cinnozyl Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**Cinol** Lab. IMMUNOS, av. des  
 Sources, Nice.  
**\*Cipromarol** 12, r. de la République, Puteaux.  
**Circogénol** 2 pl. République, St-Ouen.  
**\*Citralin** 10, imp. Milord, Paris.  
**Citrarose du D<sup>r</sup> Gigon** 25, bd Beaumarchais, Paris.  
**Citrase** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Citraspirine** 22, bd Sébastopol, Paris.  
**\*Citrocarbine** WARIN, 4, ch. de la Muette,  
 Paris.  
**\*Citrofluyl** 4, ch. de la Muette, Paris.  
**\*Citrolargol** LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé,  
 Paris (III<sup>e</sup>).  
**\*Citropaine** 304, r. St-Jacques, Paris.  
**Citropeptol** 80, r. du Rocher, Paris.  
**\*Citrophos** NOË, St-Amand-les-Eaux.  
**Citrosalol** 57 bis, av. Motte-Picquet, Paris.  
**\*Citrosodine** 34, r. Sedaine, Paris.  
**Citro-thymol** 49, r. de Bitché, Courbevoie.  
**Citrovanille** LENOIR, 5, r. Ste-Isaure, Paris.  
**\*Clearol** 194, r. Rivoli, Paris.  
**\*Clisémine Longuet** 34, r. Sedaine, Paris.  
**\*Clonazone Daufresne** 40, r. Thiers, Le Havre.  
**Cloranol** 58, r. Miromesnil, Paris.  
**\*Clupéyl** Pharmacie PANIER, à Malo-  
 les-Bains.  
**\*Coagulène Ciba** 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
**\*Coaltar Le Beuf** 11, r. Milton, Paris.  
**Coca Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.  
**\*Cocaine Midy** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
**Coccidal Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.  
**Codarsyl** DUBOIS, 16 bd Pereire, Paris.  
**\*Codérax** COIRIER, 69, av. du Maine,  
 Paris.  
**\*Codobromyl** SAUBA, Montreuil (Seine).  
**\*Codocol** 20, r. des Martyrs, Paris.  
**\*Codoforme Bottu** 115, r. N.-D.-des Champs. Paris.

- Colargyl  
Colarsé  
\*Colarsénol  
Colchicine  
Colchiflor Vial  
\*Colchi-Sal Midy  
Colhépatyl
- Colisel
- \*Colitique  
\*Coli-Vaclydun  
Collargol  
Colleodin Leo
- Collo-Bacilline  
Collobiases Dausse  
Colloïdes Amicros  
Colloïdes Clin  
\*Colloïdine  
\*Colloïdogénine  
\*Colloïl Leisyn  
\*Collo-iode Dubois  
Colloïxols  
Collophérine Bap:  
Collosol Pépin  
Collothiol  
Colluboriné  
\*Collubleu  
\*Collutoire V.-E. Dou-  
mer  
Collybor
- \*Collyrès Chibret
- Collyrès Stéryl  
Collyre des Alpes Vica-  
rio  
Collyrès stérilisés Clin  
Coloplastre  
Coluval  
Combrétine Boquillon  
\*Combrosmol  
\*Comitioi
- Complexes colloïdaux  
Dr Riquoir  
\*Complexextraits
- \*Composé Gmet  
\*Compressif Beslier
- Comprimés Adolan
- Comprimés Adrian  
\*Comprimés d'Alibour
- 49, r. de Bitché, Courbevoie.  
49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.  
CARLIER, St-Florentin (Yonne)  
HOUDÉ, 9, r. Dieu, Paris.  
8, r. Vivienne, Paris.  
4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
14, bis, r. de la République  
Ermont (S.-et-O.).  
LAROZE, 54, r. de Paris,  
Charenton (Seine).  
41 à 47, r. du Dr-Blanche, Paris.  
27, r. Desrenaudes, Paris.  
18, av. Hoche, Paris.  
11, square Marie-Louise, Bru-  
xelles.  
11, r. Mansart, Paris.  
4, r. Aubriot, Paris.  
9, bd Edgard-Quinet, Paris.  
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
LALEUF, 20, r. de Laos, Paris.  
10, r. de l'Orne, Paris (XV<sup>e</sup>).  
1 bis, r. Molitor, Paris.  
16, bd Péreire, Paris.  
49, r. de Paradis, Paris.  
4, r. de l'Alma, Asnières.  
116, bd Haussmann, Paris.  
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
223, r. St-Martin, Paris.  
11, r. Lepic, Paris.  
BOMEL, Annonay (Ardèche).
- ADLER, 36, r. des Francs-  
Bourgeois, Paris.  
5, r. St-Herem, Clermont-Fer-  
rand.  
94, r. Michelet, Alger.  
17, bd Haussmann, Paris.  
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
29, r. Singer, Paris.  
5, r. de la Paix, Paris.  
12, r. de Nicé, Paris.  
59, r. Boissière, Paris (XVI<sup>e</sup>).  
GRORICHARD, 12, pl. de la  
Révolution, Besançon.  
Etabl. MERMINOD, 49, r. de  
Paradis, Paris.  
HUCKEL, à Héricourt (Haute-  
Saône)  
27, fg Montmartre, Paris.  
COQUELU, Digoin (Saône-et-  
Loire).  
GENÉVRIER, 45, r. du Marché,  
Neuilly.  
9, r. de la Perle, Paris.  
DURET & RÉMY, à Asnières  
(Seine).

Comprimés Alla	LAPEYRE, Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne).
Comprimés Anta	178, r. Montmartre, Paris.
Comprimés Aqua Pura	ROBERT & CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
Comprimés Chéralys	42, r. des Saints-Pères, Paris.
Comprimés de Gibert	19, r. d'Aubagne, Marseille.
* Comprimés Galac	LAMBERT, pl. du Châtelet, Orléans.
Comprimés Garga	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
* Comprimés Guillaumin	13, r. Cherche-Midi, Paris.
Comprimés gynécologiques Merminod	49, r. de Paradis, Paris.
* Comprimés Kléos	2, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loire.
Comprimés Mayor	S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
* Comprimés Levure Mycéta	4, r. Bellart, Paris.
Comprimés Néothorium Millot	54, r. de la Bienfaisance, Paris.
Comprimés Neyret	35, r. de la Bourse, Lyon.
* Comprimés de Panto-laxine du Dr Boveil	1, r. Lassalle, à Lyon.
Comprimés Pausis	JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
Comprimés du Prof. Pénières	COUPAT, Ussel (Corrèze).
Comprimés Roy	81, bd Suchet, Paris.
Comprimés Salvé	Lab. RICHER, 7, av. Marceau, Paris.
* Comprimés de Thiocol Roche	HOFFMANN LA ROCHE, 10, r. Crillon, Paris.
Comprimés Urbé	LAFFARGUE, Barsac (Gironde)
* Comprimés vaginaux Leisyn	1 bis, r. Molitor, Paris.
* Comprimés Vichy-Etat	G. PRUNIER & C <sup>ie</sup> , 4, r. de la Coutellerie, Paris.
Conarsynol	12, pl. Puget, Toulon.
* Condurango Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
Condurango granulé Astier	45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
Conhydrargol	12, pl. Puget, Toulon.
* Conjonctol	Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
Convallamarine	DEGLAUDE, 6, r. d'Assas, Paris.
Copraxe	77, bd de Grenelle, Paris.
* Coprex	39, r. de Clichy, Paris.
Coqluplaste	COQUELU, Digoin (S.-et-L.).
Coqueluchyl	3, r. du Pont, à Epinal.
* Coramine	Lab. CIBA, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
* Coréine	62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
* Corizol	24, pl. des Vosges, Paris.

- Corpogénine**  
**Corps Thyroïde Mon-**  
**cour**  
 \* **Cortiode**  
**Corylase**  
 \* **Coryphédrine**  
  
**Coryza-Ouate**  
**Cosmargyre**  
  
**Crataguiode**  
  
 \* **Cratægine**  
**Cratægol**  
**Cratægus Bocquillon**  
 \* **Cratægus Gmet**  
 \* **Crayons Antifissure**  
**Crayon à la chrysaro-**  
**bine Vigier**  
**Crayons Chaumel**  
**Crayons néothorium**  
**Millot**  
 \* **Créagenol Corbière**  
**Créatine Aubert**  
  
**Créatonine**  
  
 \* **Crédone Dehaussy**  
**Crémasepta**  
 \* **Crème de Bismuth**  
**Quesneville**  
 \* **Crème de Bi-chlor.**  
**magnésienne**  
**Crème de lainine Vi-**  
**gier**  
**Crème de Lygie**  
  
**Crème de Sapolan**  
**Crème Graziana**  
**Crème Probios anti-**  
**pyogène**  
 \* **Crème résolutive du**  
**D<sup>r</sup> Rap**  
**Crémo-plastol Dumos-**  
**nil**  
 \* **Créoformine**  
**Créogarlic**  
**Créoline Pearson**  
  
 \* **Créosal Dubois**  
 \* **Créositoires**  
 \* **Créosoforme Lam-**  
**biotte Frères**  
 \* **Créosote soluble Va-**  
**cheron**  
 \* **Créo-suppo-camphre**
- EBON, Charost (Cher).**  
 49. av. Victor-Hugo, Boulogne-  
 sur-Seine  
 7, r. de l'Armorique, Paris.  
 105, r. de Rennes, Paris.  
**SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,**  
**Paris.**  
 14, av. de Paris, Biarritz.  
**THÉVENOT, 21, r. des Roses,**  
**Dijon.**  
 36, r. des Francs-Bourgeois,  
 Paris.  
 46, r. d la Barrière, Elbeuf.  
 14, r. Eug.-Delacroix, Paris.  
 10, r. du Bac, Paris.  
 27, fg Montmartre, Paris.  
**DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).**  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
  
 78, fg St-Denis, Paris.  
 54, r. de la Bienfaisance, Paris.  
  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
**D<sup>r</sup> AUBERT, 3, pl. Jussieu**  
**Paris (V<sup>e</sup>).**  
**D<sup>r</sup> AUBERT, 3 pl. Jussieu**  
**Paris.**  
 66, r. Nationale, Lille.  
**D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.**  
 12, r. de Buci, Paris.  
 (Voir Bismuth.)  
 12, r. de Buci, Paris.  
 (Voir Bismuth.)  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
  
**FLUOSALYL BEAUCOUR-**  
**DON, 43, av. Kléber, Paris.**  
 29, r. Singer, Paris.  
 15, r. Catulienne, St-Denis.  
 1 av. Pasteur, Paris.  
  
 29, r. Singer. Paris.  
 10, r. du Plâtre. Paris  
  
 18, r. de Jouvence, Dijon.  
 15, av. Parmentier, Ivry.  
**J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,**  
**La Garenne (Seine).**  
 20, r. du Laos, Paris.  
**JOLLY, 1, r. Christine, Paris.**  
 20, r. Dumont-d'Urville, Pa-  
 ris (XVI<sup>e</sup>).  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
  
**REBOUL, Pont-Ste-Maxence**  
**(Oise).**

- \*Crêpe Velpeau**  
 Crescogénol  
 Crescol  
**\*Crésentyl**  
**\*Crésopirine**  
 Crésyl Jeyes  
**\*Crinex**  
 Crinocalcine  
**\*Crinocardine**  
**\*Crinosthényl**  
 Crinothéine  
**\*Crisalbine**  
**\*Cristolax**  
 Croquettes Marida  
**\*Cryogénine Lumière**  
**\*Cryptargol Lumière**  
**\*Crypthermol**  
**\*Crypthiol**  
**\*Crysiodal**  
 Crystol  
 Cupranine Léger  
 Cuprase-Ducatte  
**\*Cupremone**  
 Cupressus Dausse  
 Cuprifer  
 Cuprinol  
 Cuprion Couturieux  
 Cuprocithine  
 Cupro-Salyl  
 Curalgine  
 Curaluès D<sup>r</sup> Lafay  
 Curatyl Laennec  
**\*Curatine Brunet**  
 Curatoxine  
 Curgol Vicario  
**\*Curiode**  
 Curiosan  
 Curocalcine  
**\*Curogène**  
**\*Curoraisin**  
 Curovaccins atoxiques  
 Cépède (Voir Vaccinothérapie)  
**\*Curoxyure**  
**\*Cuscutine Foulon**  
 Custodine  
 6 r. des Nonnains-d'Hyères, Paris. (Voir Velpeau).  
 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.  
 98, r. de Sèvres, Paris.  
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.  
 2, pl. des Vosges, Paris.  
 35, r. de Fr.-Bourgeois, Paris.  
 18, r. St-Amand, Paris.  
 HATIER, à St-Etienne.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 FOURNIER, 7, r. Biscornet, Paris.  
 48, r. de la Procession, Paris.  
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).  
 1, Jardin-Anglais, Le Raincy.  
 45, r. Villon, Lyon.  
 45, r. Villon, Lyon.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 RENARD, 35, rue de Paris, Clichy (Seine).  
 La Biothérapie, 5, r. Paul-Barruel, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 2, bd de Russie, Vichy.  
 191, r. St-Honoré, Paris.  
 GOUIN, 20, r. des Écoles, Paris  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 à La Ferté-Macé (Orne).  
 Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 GREMY, 14, r. Clichy, Paris.  
 12, r. de Buci, Paris.  
 P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).  
 LECOQ & FERRAND, 54, ch. d'Antin, Paris.  
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.  
 23, r. des Ecoiffes, Paris.  
 114, r. du Temple, Paris.  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 17 bis, av. Parmentier, Paris.  
 156, r. Fauvelles, Courbevoie.  
 11, bd de Strasbourg, Paris.  
 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.  
 133, r. Lecourbe, Paris.  
 60, r. Mathurin-Régnier, Paris.  
 Lab. B. E. A., Belfort.  
 20, fg Poissonnière, Paris.  
 19, r. St-Bazile, Marseille.



- Cutiphile  
 Cutiplaste  
 Cyanargyre  
 Cyanauroi du Dr Gigon  
 \*Cyanhermine  
 Cyanhermyl Dalin  
 Cyanure indolore Erce  
 Cynarine Estébe  
 \*Cynhépatil  
 \*Cynurol Rosa  
 Cypridol  
 \*Cyproveinol  
 Cystitol  
 Cystocure  
 Cystopurine  
 \*Cytobiase  
 \*Cyto-choline Corbière  
 Cytomagnésium  
 \*Cyto-Manganol  
 \*Cytopan  
 \*Cytophédrine  
 Cytoplasmine Ducatte  
 Cytopulmase  
 Cytosal  
 \*Cyto-Serum Corbière  
 Cytostrychnine  
 Cytotropines  
 Cytuline Couturieux  
 BRUNEAU, 17, r. de Berri, Paris  
 id.  
 GUILLAUMIN, 13, r. du  
 Cherche-Midi, Paris.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 37, r. de la Fédération, Paris.  
 1, r. de la Martinière, Lyon.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 à Villefranche-du-Lauragais.  
 BENDERITTER, Vendôme  
 (Loir-et-Cher).  
 1, pl. Champerret, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 18, r. de Beaune, Paris.  
 57, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 CALMELS, Hauterive (Haute-  
 Garonne).  
 49, r. Paradis, Paris.  
 24, r. de Charenton, Paris.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 OLIVIERO, 87, r. Denfert-  
 Rochereau, Paris.  
 CORBIÈRE, 27, r. Desrenaudes,  
 Paris.  
 54, r. de Paris, Charenton.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 8, pl. de la Madeleine, Paris.  
 21, Grande-Rue, Monfermeil  
 (S.-et-O.).  
 54, r. St-Blaise, Paris (XX<sup>e</sup>).  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 FOURNIER (Fr.), 7, r. Bis-  
 cornet, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.

## D

- Daturasolène  
 Déclonal  
 \*Decorpa  
 \*Delbiase  
 Delbosel  
 \*Delcaine Roques  
 \*Demalgon  
 Déméteros  
 2 pl. du Théâtre-Français, Paris.  
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 41, r. de Rome Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 36, r. Ste-Croix-de-la-Breton-  
 nerie, Paris.  
 BASUYAUX, 94, r. Pasteur,  
 Fontenay-sous-Bois.  
 163, r. de Flandre, Paris.

- Denisia Brisson**  
 \***Denisoline Brisson**  
**Dentoline**  
**Dentoryl**  
**Dento Stalys**  
**Dentoxyl**  
  
**Dépuratif Berry**  
  
**Dépuratif Dubreuil**  
**Dépuratif Dumesnil**  
**Dépuratif Kromelinck**  
 \***Dépuratif Rob-Lechaux**  
**Dépuratine**  
 \***Dépuriodé**  
  
**Dépurlaxyl**  
**Dermacide Porcher**  
  
**Dermadésine**  
**Dermajic**  
  
**Dermal Haubro**  
  
**Dermaline Corbière**  
**Dermaline Demeule-naere**  
**Dermathorium Rhem-da**  
 \***Dermatyol**  
  
**Derméon**  
  
**Dermoschistol**  
**Dermodiol**  
 \***Dermodulcis**  
 \***Dermofagine**  
  
**Dermogène**  
**Dermolène**  
  
**Dermaline**  
 \***Dermoplastol**  
**Dermopode**  
 \***Dermoradol**  
  
 \***Dermo-rhinistol**  
  
 \***Dermosplénine**  
 \***Dermo-Stalys**  
**Dermosufrol**  
**Dermotyol**  
 \***Désensibilysine**  
**Desitin**  
  
 \***Détensyl**  
 \***Détergine**
- 157, r. Championnet, Paris.  
 id.  
 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
 3, r. Ch.-Gounod, St-Raphaël.  
 64, r. La Boétie, Paris.  
**HAUTDIDIER**, 37, r. Galilée,  
 Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 172, r. Alésia, Paris.  
 10, r. du Plâtre, Paris.  
 19, r. Drouot, Paris.  
 49, r. de Maubeuge, Paris.  
 50, r. de la République, Puteaux.  
**ANGELINI**, 61, r. de Seine,  
 Paris.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 35, r. des Blancs-Manteaux,  
 Paris.  
 41, r. St-Pierre, Caen.  
**R. MONIMART**, 23, r. du  
 Grand-Cerf, Meaux.  
 Lab. Central de France, 1, r. de  
 Châteaudun, Rennes.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
**KERFYSER**, r. Alexandre III,  
 Dunkerque.  
 17, r. Hauteville, Paris.  
  
**L. GODART**, Andenne (Bel-  
 gique).  
 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-  
 du-N.).  
**LECRONIER**, Domfront (Orne).  
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,  
 Boulogne-sur-Mer.  
 10, r. de l'Union, Clichy.  
 158, Promenade de Corniche,  
 Marseille.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 10, r. du Plâtre, Paris.  
 Evreux (Eure).  
 Établ. **LABORADIUM**, 33, r.  
 St-Jacques, Paris.  
 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-  
 Moulineaux, Paris.  
 14, r. des Minimes, Paris.  
 64, r. La Boétie, Paris.,  
 6, r. Chanoinessé, Paris.  
 Le Naour, Quimperlé (Finistère).  
**BÉLIERES**, 19, r. Drouot, Paris.  
 Établ. **MERMINOD**, 49, r. de  
 Paradis, Paris.  
 8, av. Walkanaer, Nice.  
**D<sup>r</sup> BOURDEAU**, à Parthenay.

- Diabésia**  
**\*Diabétalim**  
**\*Diabétifuge**  
**Diabétosan**  
**Diabétuline**  
  
**Diachusine**  
  
**\*Diadermine**  
**\*Diagnothorine**  
  
**\*Dial Ciba**  
**\*Dialacétine Ciba**  
  
**\*Dialine**  
**\*Dialyl Brunot**  
**Dialyses Golaz**  
**Diardyscol**  
**\*Diasclérol**  
**\*Diasés**  
**\*Diasténine Gremy**  
**\*Diastogène**  
  
**\*Diasto-Pepsine Richepin**  
**\*Diathermie**  
  
**\*Dicaliode**  
**\*Didial Ciba**  
  
**\*Diéménal**  
**\*DiénoI**  
**\*Digalène Roche**  
**\*Digastrine**  
**Digeryl**  
**Digestif Capmartin**  
  
**Digestif Dal**  
**\*Digestif Harvey**  
**Digestif Henry**  
**Digestif Maulin**  
**Digestif Pinel**  
**\*Digestonic**  
  
**\*Digibaïne Deglaude**  
**Digicardine**  
  
**\*Digifoline Ciba**  
  
**\*Digimialbaïne**  
**\*Digistabiline**  
  
**Digitale Dausse**
- 50, r. de la République, Puteaux.  
 61, r. Vandamme, Paris.  
 21, r. Chaptal, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 V. CHARRET-TOMASI, St-Just-sur-Loire (Loire).  
 142, r. de Picpus, Paris.  
 (Voir Vernis à la Diachusine.)  
 12, r. Vavin, Paris.  
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
 C. I. P., 128, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 16, r. Boulainvilliers, Paris.  
 4, r. Bellart, Paris.  
 86, bd Port-Royal, Paris.  
 26, r. de Norvins, Paris.  
 77, r. Miromesnil, Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.  
 Lab. Dr TISSOT, 34, bd de Clichy, Paris.  
 La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris.  
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
 18, r. de Beaune, Paris.  
 18, r. de Beaune, Paris.  
 10, r. Crillon, Paris.  
 11, r. St-Agricol, Avignon.  
 137, av. Parmentier, Paris.  
 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.  
 36, r. de Verdi, Nice.  
 101, av. de Paris, Rueil (S.-et-O.).  
 39, r. Sclessin, Liège.  
 50, r. de la République, Puteaux.  
 à Bonnelles (Seine-et-Oise).  
 Produits Scientia, 21, r. Chaptal, Paris.  
 6, r. d'Assas, Paris.  
 Lab. IMMUNOS, av. des Sources, Nice.  
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
 8, r. Favart, Paris.  
 P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.  
 4, r. Aubriot, Paris.

- Digitale Ecalfe 98, r. de Sèvres, Paris.
- Digitaline Homolle & Quévenne 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Digitale Labelonye 21, r. Chaptal, Paris.
- \*Digitaline cristallisée du Dr Mialhe 8, r. Favart, Paris.
- \*Digitaline de Nativelle 27, r. de la Procession, Paris.
- \*Digitaline Invar 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
- Digitalis Purpurea OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- Dimétol Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- Dimol Bois-Colombes (Seine).
- Diocel 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse
- Diiodoforme Taine 5, r. de la Perle, Paris.
- \*Dilodotyrosine 10, r. Grillon, Paris.
- \*Dinitra Dyn 5, r. Claude-Decaen, Paris.
- Dionol FLEURY, Arcachon (Gironde).
- \*Dioradin 37, r. de la Fédération, Paris.
- \*Dioséine Prunier 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Dippol 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
- Dismenine Henry 39, r. Sclessin, Liège.
- Disménol SAUTER, Bellegarde (Ain).
- \*Dismine Favrot Lab.H. FERRÉ, 6, r. Dombasle, Paris.
- \*Disolurane Vély 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- \*Disonyl ROUSSEL, 97, r. Vaugirard, Paris.
- Disurol 42, r. des Martyrs, Paris.
- Disuryl 23, r. des Moines, Paris.
- Ditagel 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- Dithioléine 157, r. Championnet, Paris.
- Diumnal TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Diurédausse 4 r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- \*Diuregan 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- Diurégine CHARRET-TOMASI, St-Just-sur-Loire (Loire).
- \*Diurène 15, r. d'Argenteuil, Paris.
- Diuréal COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- \*Diuréphédrine THORAL, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
- Diurésinol 1, r. des Augustins, Perpignan.
- Diurétique Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
- \*Diurétique Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
- Dyuril 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
- \*Diurobromine 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- \*Diurocalcine Gros 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- \*Diurocardine 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- \*Diurocystine 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- Di-Uroïdine 45, bd Lafayette, Calais.
- Diuretonine JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.

- Dmégon (Néo)** SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- \*Dmelcos** id.
- Dmesta (Néo)** id.
- Dmetys (Néo)** id.
- \*Dohyfral** 7, r. de l'Armorique, Paris.
- \*Doloma** 29, pl. Bossuet, Dijon.
- \*Dolophos** COLMANT, à Caudry (Nord).
- Dolosol** FOIRET, à Montargis (Loiret).
- \*Dolysine Rochereau** Salbris (L.-et-Ch.).
- Donagol** THOMAS, à Péronne (Somme).
- \*Do-Sa-No-Sal** 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
- Dosarter** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Dosotol** 54, r. de Paris, Charenton.
- \*Dosurine (Trousses)** 16, r. Charlemagne, Paris.
- Doxa** JARMON, r. pl. de la Gare, Tunis.
- Dozéol Deglaude** 6, r. d'Assas, Paris.
- \*Dragécalcion** DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
- Dragées Adrian** 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
- Dragées anticatar-** 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes.
- rhales**
- \*Dragées Bengué** 16, r. Ballu, Paris.
- \*Dragées Blagny** Pamela, Forges-les-Eaux.
- Dragées Bondonneau** 49, r. de Bitche, Courbevoie.
- Dragées Calm** 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine (Nord).
- Dragées Carbonel** 15, r. d'Argenteuil, Paris.
- Dragées de fer Cognet** 43, r. de Saintonge, Paris.
- Dragées de fer Rabuteau** OOMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- Dragées Demazières** 131, r. de Vaugirard, Paris.
- Dragées de Royat** 26, av. de Royat, Chamalières (P.-de-Dôme).
- Dragées Dubourg** 43, r. de Saintonge, Paris.
- Dragées Efigé** 40, av. Secrétan, Paris.
- Dragées Elkin** DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune, Paris.
- \*Dragées ferro-ergotées** MANNET, Loudun (Vienne).
- Dragées Fernel** 76, bd Haussmann, Paris.
- \*Dragées Gelineau** MOUSNIER, 9, bd Carnot, Bourg-la-Reine.
- Dragées Gesta** 43, av. la République, Paris.
- Dragées Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- Dragées Grimaud** La Courtine (Creuse).
- \*Dragées Hecquet** 49, bd Port-Royal, Paris.
- Dragées hépatiques** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Dragées d'iodurine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Dragées Japat** 252, fg St-Martin, Paris.
- Dragées de lactate de fer Gélis et Conté.**
- Dragées de Mastho-**
- phile Annic**
- \*Dragées Lumeval** à Montbron (Charente).
- 52, bd du Temple, Paris.

- Dragées menthol-bo-  
 rax, cocaïne  
 \*Dragées Névrosthé-  
 niques « Yse »  
 Dragées Northon  
 Dragées Nyrdhal  
 Dragées Pautauberge  
 Dragées de Prasion  
 Dragées Phlébos  
 Dragées pulmonaires  
 Giry  
 Dragées St-André -  
 Mayniel  
 Dragées Séranti  
 Dragées Somedo  
 Dragées Tasch  
 \*Dragées Tonicardia-  
 ques Le Brun  
 Dragées Vityl  
 Drainobil  
 Drainochol  
 Drosédéine  
 Droserine Merminod  
 \*Dryco (Lait sec)  
 Dulcilax  
 Duodénase  
 Dusart sirup, solution  
 Dynabiose  
 Dynamocalcine  
 Dynamoferol  
 Dynergyl Féminy  
 Dynos  
 Dyspepsia  
 \*Dyspeptine Hepp  
 Dyspeptol  
 \*Dysthène  
 Dysurol  
 Dyoril  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 65, r. Louis-Blanc, Paris.  
 CACHAT, Evian-les-Bains  
 (Haute-Savoie).  
 12, r. de la République, Pu-  
 teaux.  
 10, r. de Constantinople, Paris.  
 14, r. Eug.-Delacroix, Paris.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 49, r. de Metz, Nancy.  
 85, r. Turbigo, Paris.  
 7 à 13, r. St-Maurice, Nanterre  
 (Seine).  
 à Meudon (Seine-et-Oise).  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
 155, bd Magenta, Paris.  
 62, r. Marengo, Saint-Etienne.  
 68, r. Doudeauville, Paris.  
 6, r. de Belleville, Paris.  
 49, r. de Paradis, Paris.  
 5, r. St-Roch, Paris.  
 Lab. TINARD, 134, bd Péreire,  
 Paris (XVII<sup>e</sup>).  
 12, r. de Nice, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 6, r. d'Alsace, Grenoble.  
 CHAVIALLE, Sèvres (S.-et-O.).  
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol,  
 Paris.  
 COUDERT, 116, av. Ledru-  
 Rollin, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon  
 (Boulogne-sur-Mer).  
 Le Chesnay (Seine-et-Oise).  
 PATRICE, Vichy.  
 47, r. Bokanowski, Asnières.  
 37, r. de Bourgogne.  
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,  
 Boulogne-sur-Mer.

## E

- Eatan**  
**Eaux de Châtel-Guyon**  
**Eau de Lorraine**  
  
**Eau d'Enghien**  
**Eau Sova**  
**Ebanyl**  
**Ectobiase Bonnay**  
  
**\*Eczéda**  
  
**Eczémacure**  
**Eczém Efa**  
**\*Eczosec**  
  
**\*Edistol**  
**Edo-vaccins**  
  
**\*Edricamphre**  
**Edulcora.**  
**Egralene**  
  
**Eitreb-embrocation**  
  
**\*Ektogan**  
**\*Elastoplate**  
**\*Elatine Bouin**  
  
**\*Elbon Ciba**  
  
**Electrargol Clin**  
**Electrauroil Clin**  
**Electrocuprol**  
**Electro Hg**  
**Electromanganol**  
**Electromartiol**  
**Electropalladiol**  
**Electro-platinol**  
**Electro-Rhodiol**  
**Electrosélénium**  
**\*Eledon**  
**Eleodermine**  
**\*Elgine Julien**
- 34, r. Vignon, Paris.  
 6, sq. de l'Opéra, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 10, r. Caumartin, Paris.  
 3, r. Volney, Paris.  
 59, r. Nollet, Paris.  
 112, Grande-Rue, Nogent-sur-  
 Marne (Seine).  
 35, r. des Blancs-Manteaux,  
 Paris.  
 121, av. St-Ouen, Paris.  
 Lab. EFA, Carentan (Manche).  
 35, r. des Blancs-Manteaux,  
 Paris.  
 40, r. des Carmes, Orléans.  
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon  
 Paris.  
 40, r. des Acacias, Paris.  
 PATRICE, à Vichy.  
 P. BRISSON & C<sup>ie</sup>, 157, r.  
 Championnet, Paris.  
 OPTIMA, Grande-Rue au Bois.  
 Bruxelles.  
 12, r. Lamartine, Paris.  
 4, r. d'Ilizack, Mulhouse.  
 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-  
 sur-Seine.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 6, av. Portalis, Paris.  
 38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).  
 105, r. de Rennes, Paris.

- \*Elixir Bonjean** FAURE & DUSSUEL, Aix-les-Bains.  
97, av. Ledru-Rollin, Paris.
- Elixir Bryol** 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- Elixir de Catéchiodé** 5, av. des Tilleuls, Paris.
- Elixir de Pepto-Car-dine**
- Elixir Déret** COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.  
8, r. Vivienne, Paris.
- Elixir digestif de pep-sine Grimault** 16, r. Rocroy, Paris.
- Elixir Duchamp** 20, pl. des Vosges, Paris.
- \*Elixir Ducro** 8, r. Favart, Paris.
- \*Elixir du D<sup>r</sup> Mialhe** 12, r. de Nice, Paris.
- Elixir Duret** 52, r. de Rome, Marseille.
- \*Elixir Dussaud** VAUDIN & GUILLAUMIN,  
12, r. Charles-V, Paris.
- \*Elixir eupeptique Tisy** St-Raphaël (Var).
- Elixir eupnéique Mar-tin Mazade** 37, av. Marceau, Paris.
- Elixir de fer Kœnig** MANNET, Loudun (Vienne).
- \*Elixir ferro ergoté** 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
- Elixir Fleig** 5, r. Lefebvre, Paris.
- \*Elixir Gabail** D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
- Elixir Gelm** à Turkeim (Haut-Mhin).
- Elixir Glassér** 13, r. de Minimes, Paris.
- Elixir Glover** 6, r. de Paris, Joinville-le-Pont.
- \*Elixir Godfrin** 49, r. Maubeuge, Paris.
- \*Elixir Grez** 77, bd de Grenelle, Paris.
- Elixir Hela** 39, r. Sclessin, Liège.
- Elixir hépatique Henry** 9, r. Dieu, Paris.
- Elixir Houde** DUTEIL, 90, av. de St-Ouen,  
Paris.
- \*Elixir Hymel** 116, bd Haussmann, Paris.
- \*Elixir iodépuratif Pé-pin** Loudun (Vienne).
- Elixir Mannet à l'Io-dure de Potassium** Loudun (Vienne).
- Elixir Mannet à l'Io-dure de Sodium** Loudun (Vienne).
- Elixir Mannet au Salol** 41, bd Haussmann, Paris.
- Elixir Mariani** MOURE, 18, r. Favart, Paris.
- Elixir Morlas** M. AUBANEL, Pointe-Rouge,  
Marseille.
- Elixir Percy** 8, r. Vivienne, Paris.
- Elixir polybromuré Baudry** 5, r. de la Feuillade, Paris.
- Elixir polybromuré Yvon**
- \*Elixir Spark** 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- \*Elixir Spes** 10, imp. Milord, Paris.
- Elixir supertonique Stel-la** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Elixir du D<sup>r</sup> Thermes** Produits Dannec'h, 64, r. des Tournelles, Paris.
- \*Elixir thiogalacolé Ar-quevaux** Etampes (Seine-et-Oise).



- Elixir tribromuré Mannet** Loudun (Vienne).  
**Elixir vermifuge All- vers** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).  
**Elixir vermifuge Chiarini** Aix-en-Provence.  
**Elixir Virenque** 131, r. Vaugirard, Paris.  
**Elixir de Virgine Nyr-dhal** 12, r. de la République, Puteaux.  
**Elixir Vital Quentin** MOUSNIER, à Sceaux.  
**\*Elkin Dragées et Granulés** DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune.  
**\*Elzévir Dentition** H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
**Emapirine Toraude** 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
**Embrocation Richer** 45, fg Saint-Denis, Paris.  
**Embrocation Roche** 5, r. de la Paix, Paris.  
**Embrocation Salas** 132, r. de Turenne, Paris.  
**Embrocation Siamoise** M. MARTIN, Cloyes (E.-et-L.).  
**Embryonine du D<sup>r</sup> Barré** HAMEL, 10, pl. Thiers, Le Mans.  
**Emencyl** 163, r. St-Denis, Paris.  
**\*Emerson's Bromo-Seltzer** 62, av. Champs-Élysées, Paris.  
**Emétinol Viel** 7, r. St-Yves, Rennes.  
**\*Emgé Lumière** 45, r. Villon, Lyon.  
**\*Emplâtres R. Cavaillès** 29, r. Singer, Paris.  
**Emplâtre Duret** 61, r. de Vaugirard, Paris.  
**Emulsion Bonnefond** MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.  
**Emulsion Marchais** 11, pl. Castellane, Marseille.  
**Encytol** 23, r. de Douai, Lille.  
**Endocalcase** 74, r. des Jacobins, Amiens.  
**Endocrisines Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.  
**\*Endodermol** 42, av. de Draveil, Vigneux-sur-Seine (S.-et-O.).  
**\*Endopancrine** 48, r. de la Procession, Paris.  
**Endoxène** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Endoxidine** HUGUES, 105, bd Malesherbès, Paris.  
**Energétènes végétaux** 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
**Byla**  
**Energetyl** 137, av. Parmentier, Paris.  
**\*Energine Iodée de Berck** 21, r. St-Leu, Amiens.  
**\*Energine Phosphorée de Berck** 21, r. St-Leu, Amiens.  
**Energinoze D<sup>r</sup> Fraysse** 47, r. de Neuilly, Nanterre.  
**Enésol Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**Engelural** 22, r. de Vienne, Paris.  
**\*Eniode Lefebvre** 2, r. Duphot, Paris.  
**Ennego** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Eno's Fruit Salt** 4<sup>ter</sup>, r. Barbès, Courbevoie.  
**Entalva** LUMIERE, 45, r. Villon, Lyon.  
**Entelactol** 24, bd Sébastopol, Paris.  
**Enteralthine** 3, r. Barbette, Paris (III<sup>e</sup>).  
**\*Entérargol** 68, Chaussée-d'Antin, Paris.

- Entéricure**
- \*Enteriode
  - Entérisane
  - \*Entéro-Antigènes
  - \*Enterobyl Dehaussy
  - \*Entérocarbène
  - Entérochir
  - \*Entéroflagos
  - \*Entérohépatine
  - \*Entéromucine
  - Enteropraxines Abry
  - Entéroseptyl
  - \*Entérovaccin Lumière
  - \*Entéro-Vaclydun
  - \*Entéroxin Leclerc
  - Entérozinc
- Entérozone**
- Entérozyme**
- \*Enzypan
- Eparseno**
- Ephargol**
- \*Ephédraféine
  - \*Ephédrasmine
  - \*Ephédrine Béral
  - Ephédrine Proba
  - \*Ephedrocamphe
  - \*Ephédroides Béral
  - Ephédrol
  - \*Ephédrolénol
  - \*Ephédromel
  - \*Ephéiodine Béral
  - \*Ephédro-rhinol
  - \*Ephétropine Béral
  - \*Epholéine
  - \*Epicral
- Epidermine**
- Epidosine Grémy**
- Epinesthol**
- Epoqualine François**
- \*Eranol
  - Eranyl
  - Erbamil
  - \*Ercerhinol
  - \*Ergorone
- Ergot de seigle Dausse**
- Ergotine Bonjean**
- \*Ergotine Lamante
- BRISSON, 157, r. Championnet, Paris.**
- 39, r. de Clichy, Paris.
- 112, r. de Gerlaud, Lyon.
- 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris
- 66, r. Nationale, Lille.
- 229, cours Gambetta, Lyon.
- LECLERC, 10, r. Vignon, Paris.
- 7, av. des Sources, Nice.
- 77, bd de Grenelle, Paris.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- 78, bd Beaumarchais, Paris.
- 45, r. Villon, Lyon.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 10, r. Vignon, Paris.
- JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
- 56, bd Pereire, Paris.
- 52, r. Labruyère, Paris.
- ALEXANDRE, 41, r. de Rome, Paris.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- GUY SIMON, 44, r. d'Inkermann, Lille.
- 194, r. de Rivoli
- Le Mont-Dore, (Puy de-Dôme.)
- 194, r. de Rivoli, Paris.
- FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
- 16, Henri-Regnault, Courbevoie.
- 194, r. Rivoli.
- 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- 194, de Rivoli.
- id.
- 20 bis r. Gravelotte, Toulouse.
- id.
- 40, r. des Acacias, Paris.
- LAMBERT, 6, r. de Longchamp, Vichy.
- 112, r. de Gerlaud, Lyon.
- 14 r. de Clichy, Paris.
- 33, r. Vaugirard, Paris.
- 16, c. Gambetta, Lyon.
- 45, r. de l'Echiquier, Paris.
- SANSON, Mer (Loir-et-Cher).
- 105, bd Malesherbes, Paris.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 4, r. Aubriot, Paris.
- 99, r. d'Aboukir, Paris.
- M. PARIS, 1, r. Lassalle, Lyon.

- Ergotine Yvon**  
**Ergotinine Tanret**  
**Ergotinine Byla**  
**Erystypticum Roche**  
**\*Erythra Dyn**  
**Erythroluès**  
**Erséol Prunier**  
**\*Esculéol**  
**Eska**  
**Essence Algérienne**  
**Essence Landaise**  
**Essence Japonaise**  
**\*Essoforme**  
**Etain Amicros**  
**Ether amyvalérianique**  
**Ether anesthésique**  
**Ether pour narcose**  
**Ethervalérianique Vial**  
**Ethoforme**  
**\*Ethyl-Pneumine Ler-**  
**sam**  
**Etoléase**  
**Eubiol**  
**Eucalcine**  
**Eucalcium**  
**Eucalinal**  
**Eucalyptéol Anthoine**  
**\*Eucalyptine Lebrun**  
**Euchol**  
**Eudermyl**  
**Eudigérase**  
**Euférine**  
**\*Eufosyl Vély**  
**\*Eugaline**  
**\*Eugastrol**  
**Eugéine Prunier**  
**\*Euglyma**  
**\*Eugynol Grandval**  
**Eukénol Clément**  
**Eukinase Carrion**  
**\*Eumictine Leprince**  
**\*Euonymine P. Thibault**  
**Eupatorine**  
**\*Eupaveryl**  
**Eupectoral**  
**5, r. Lafeuillade, Paris.**  
**10, r. du Commandant-Rivière,**  
**Paris.**  
**26, av. de l'Observatoire, Paris.**  
**10, r. Crillon, Paris.**  
**5, r. Claude-Decaen, Paris.**  
**LECOQ & FERRAND, 14, r.**  
**Gravel, Levallois-Perret.**  
**6, r. de la Tacherie, Paris.**  
**16, r. Henri-Regnault, Cour-**  
**bevoie.**  
**76, r. Orfila, Paris.**  
**pl. de l'Entonnoir, Berck-Plage.**  
**3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.**  
**MAUGER, 79, r. Legendre,**  
**Paris.**  
**SIMON, 44, r. Inkermann, Lille.**  
**9, bd Edgard-Quinet, Paris.**  
**G. BRUEL, 36, r. de Paris,**  
**Colombes (Seine).**  
**SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,**  
**Paris.**  
**OPTIMA, Grande-Rue au Bois,**  
**Bruxelles.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**18, r. de Jouvence, Dijon.**  
**17, r. Saint-Saëns, Paris.**  
**CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).**  
**116, av. Ledru-Rollin, Paris.**  
**20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.**  
**50, bd de Paris, Marseille.**  
**98, r. J.-Maillotte, La Made-**  
**leine.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**155, boul. Magenta, Paris.**  
**Bagnoles-de-l'Orne.**  
**4, imp. de Béarn, Paris.**  
**112, r. de Gerland, Lyon.**  
**20, r. Vieille-du-Temple, Paris.**  
**132, av. Victor-Hugo, Paris.**  
**r. Albert-I<sup>er</sup>, Beaumont-sur-Oise**  
**Lab. BOUTROY, 8, r. de Passy,**  
**Paris.**  
**6, r. de la Tacherie, Paris.**  
**7, r. des Petits-Carreaux, Paris.**  
**12 et 14, r. Féry, Reims.**  
**7, pas. Thionville-Paris.**  
**54, fg St-Honoré, Paris.**  
**62, r. de la Tour, Paris.**  
**48, r. d'Alésia, Paris.**  
**Lab. d'Allopathie générale, Bri-**  
**gnais (Rhône).**  
**PACHAUT, 130, bd Haussmann,**  
**Paris.**  
**ARQUEVAUX, Etampes (S<sup>et</sup>-**  
**Oise).**

- \*Eupeptique Monavon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 \*Euphon 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 Euphonol Aguetant 36, quai Fulchiron, Lyon.  
 Euphorine, D<sup>r</sup> Cha- FAURE et DUSSUEL, à Aix-les-  
 baud Bains.  
 Euphorol Loudenot 106, av. du Roule, Neuilly-  
 sur-Seine.  
 \*Euphoryl 18, av. Daumesnil, Paris.  
 Euphrénine Bastia 1, pl. Carnot, Lyon.  
 \*Euphysol 22 bis, av. de St-Cloud, Ver-  
 sailles.  
 \*Euphytose Lab. MADYL, 14, r. de Miro-  
 mesnil, Paris.  
 Euplasmol VALENTIN, 79, rue de Wazem-  
 mes, Lille.  
 Eupnéol THÉVENOT, 21, r. des Roses,  
 Dijon.  
 \*Eupnine Vernade 7 à 13 r. St-Maurice, Nanterre  
 (Seine).  
 \*Eupnogénol 116, av. Berthelot, Vienne  
 (Isère).  
 \*Eurectol PERROCHON, 57, r. Origet,  
 Tours.  
 Eurexine D<sup>r</sup>-PETIT, 11, r. des Postes,  
 Angoulême.  
 Eurhéine 7, pas. Thionville, Paris.  
 Eurhéose COUDERT, 116, av. Ledru-  
 Rollin, Paris.  
 Euronal 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 Eurythmine Dethan 11, r. Al-de-Neuville, Paris.  
 \*Euskine 45, fg St-Denis, Paris.  
 \*Eusomnine Bélières 19, r. Drouot, Paris.  
 Eutectyl 108, r. du Maréchal-Pétain,  
 Vichy.  
 \*Eutensyl Grémy 14, r. de Clichy, Paris.  
 Eutonon 49, r. Paradis, Paris.  
 Evatmine Carrion 54, fg St-Honoré, Paris.  
 \*Evine 16, r. Barbette, Paris.  
 \*Evobiline LAFFORT, Joué-les-Tours (I.-  
 et-L.).  
 \*Evolaxine Lab. du D<sup>r</sup> LAURENT,  
 GÉRARD, 40, r. de Belle-  
 chasse, Paris.  
 \*Evonyl BONTHOUX, Villefranche-sur-  
 Saône  
 Excytol MARTINET, 16, r. du Petit-  
 Musc, Paris.  
 \*Exhépa 39, r. Fondaudège, Bordeaux.  
 \*Exobol 12, r. du Chemin-Vert, Ville-  
 neuve-la-Garenne (Seine).  
 Exol Cognet 43, r. de Saintonge, Paris.  
 Exolysés Byla 26, av. Observatoire, Paris.  
 \*Exonérol 8, r. de Passy, Paris.  
 Extensoplast VIGIER, 9, r. de la Gare, Le-  
 vallois (Seine).  
 Extrait de céréales 9 et 11, r. de la Perle, Paris.  
 Adrian

- \*Extrait Hamyd  
Extrait Juvinium  
\*Extrait de Malt Français Déjardin  
Extrait de Malt Grütli  
Extrait du D<sup>r</sup> Rap  
Extraits Moncour  
Extraits totaux Choay  
Extrait surrénal Maurice  
Extrait de Yogourth  
Ilgaz
- GMET, 27, fg Montmartre, Paris.  
2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes.  
10, r. Parent-de-Rozan, Paris (XVI<sup>e</sup>) (Voir Malt.)  
139, av. de Verdun, Issy-les-Moulineaux.  
29, r. Singer, Paris.  
49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.  
48, av. Théophile-Gautier, Paris.  
61, av. Louise, Bruxelles.  
13, r. Nouvelle, Charenton.

## F

- \*Facmine Longuet  
\*Fanerval  
\*Fango Fisch et C<sup>ie</sup>  
Fantine Adoue  
\*Fantyl Manseau  
Farine alimentaire  
Suckine  
Farines Benedictus  
Farines de céréales : légumes et fruits  
\*Farine de malt Heudebert  
\*Farines de régime  
Bloch  
Farines Favrichon  
Farine lactée Heudebert  
Farine lactée Larousse  
Farine lactée Nestlé  
Farine lactée diastasée  
Salvy  
\*Farines Maltées Favrichon  
Farines Maltées Jammet  
Farine maltée Vial  
\*Farine Mont-Blanc  
Farré-Cure  
Febrifuge Couturieux  
Fébrifuge
- 34, r. Sedaine, Paris.  
42, r. Mont-Cenis, Paris.  
4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.  
à Pauillac (Gironde).  
à Margaux (Gironde).  
12, av. Steph.-Mallarmé, Paris, et 16, r. Berthelot, Le Havre.  
74, r. Lamareck, Paris.  
BLOCH, Tomblaine, près Nancy (M.-et-M.).  
85, r. de Saint-Germain, Nanterre.  
à Tomblaine, près Nancy.  
à St-Symphorien-de-Lay (Loire).  
85, r. de St-Germain, Nanterre.  
99, Cours Balguerie, Bordeaux.  
6, av. Portalis, Paris.  
4, r. Lambrechts, Courbevoie.  
St-Symphorien-de-Lay (Loire).  
47, r. Miromesnil, Paris.  
8, r. Vivienne, Paris.  
Rumilly (Haute-Savoie).  
29, r. Mogador, Paris.  
18, av. Hoche, Paris.  
MOLIERE, à Constantine.

<b>Fébril</b>	67, r. de Paris, Charenton-le-Pont (Seine).
<b>Fébriline</b>	4, fg Stanislas, Nancy.
<b>*Félamine Sandoz</b>	20, r. Vernier, Paris.
<b>Félargent</b>	21, r. Jean-Goujon, Paris.
<b>Félicol</b>	10, r. Vignon, Paris.
<b>Felsol</b>	pl. Homme-de-Fer, Strasbourg.
<b>*Féminadène</b>	120, r. Lecourbe, Paris.
<b>Feminoglandol</b>	156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
<b>Féminose</b>	7, r. Coq-Héron, Paris.
<b>*Fénuicalcium</b>	191, fg St-Antoine, Paris.
<b>*Fénucine</b>	pl. du Châtelet, Orléans.
<b>*Fenugrène</b>	2, pl. des Vosges, Paris.
<b>Fer Amicros</b>	9, bd Edgar-Quinet, Paris.
<b>Fer-Arsenic</b>	AUCHER, La Ferté-Macé (Orne).
<b>Férarsényl</b>	7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
<b>Fer Bravais</b>	16, r. de Rocroy, Paris.
<b>Fer Girard</b>	8, r. Vivienne, Paris.
<b>Fer Henry</b>	39, r. Sclessin, Liège.
<b>Fer injectable Roussel</b>	MOUSNIER, à Sceaux.
<b>*Fer intraveineux Fraisse</b>	8, r. Jasmin, Paris.
<b>Fériode Byla</b>	26, av. l'Observatoire, Paris.
<b>Fer-ion Couturieux</b>	18, av. Hoche, Paris.
<b>Fer Jaquemaine</b>	à Villefranche (Rhône).
<b>*Fer Larcade</b>	23, r. Beautreillis, Paris.
<b>Fer Leras</b>	8, r. Vivienne, Paris.
<b>Fer Manganèse Amicros</b>	9, bd Edgard-Quinet, Paris.
<b>Ferment pur de raisins</b>	Lab. G. CÉSAR et B. BOSS, 10, r. de la Viotte, Besançon (Doubs).
<b>Fermentérol Milan</b>	15, r. d'Argenteuil, Paris.
<b>Fermentéryl</b>	40, r. des Acacias, Paris.
<b>Ferment Boss</b>	Lab. G. CÉSAR & B. BOSS, Besançon (Doubs).
<b>Ferment immuno-lactique</b>	8, av. des Sources, Nice.
<b>Ferment lactique Van Lier</b>	30, r. St-Jacques, Namur (Belgique).
<b>*Ferment pur de raisin Jacquemin</b>	à Malzéville-Nancy (M.-et-M.).
<b>*Ferment pur de raisin Médicoferment</b>	10, r. de la Viotte, Besançon.
<b>Ferments organiques Zévor</b>	COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
<b>*Fer-Ovarine Vitalis</b>	38, bd de Charonne, Paris.
<b>Feroxal Buisson</b>	98, r. de Sèvres, Paris.
<b>Fer Quévenne</b>	26, r. Petit, St-Denis.
<b>Fer Rabuteau</b>	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
<b>Ferrocaltiose</b>	ROUSSY, Viroflay (S.-et-O.).
<b>Ferrocaltine</b>	GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).
<b>Ferrocaltose</b>	71, r. du Fort, Aubervilliers.
<b>*Ferrocodile et Ferricodile Leprince</b>	62, r. de la Tour, Paris.

- Ferrocol  
Ferroneurol
- Ferropeptone
- Ferrophytine Ciba
- Ferroplasma
- Ferroxyline
- Ferrygène Carrau
- Ferydal
- Fibrinine
- Fibrogénine
- Fidulax Warin
- Figadol Vivien
- Filhosa
- Filtrat Inopseta
- Fixase
- Fixine Grémy
- Fixocalcine
- Fixococcine Corbière
- Fixogène Loudenot
- Flavuroil
- Flévar
- Floravène
- Floréases
- Florhamélis
- Florhépatine
- Florisana
- Fludiose
- Fluène
- Fluenzyl
- Fluérase
- Fluidbos
- Fluidol
- Fluobyl
- Fluocholine
- Fluodyle
- Fluoformol Gonin
- Fluoganèse
- Fluokol
- Fluol
- Fluoram
- Fluoridia
- Fluosalyl
- Flusan
- 132, r. de Turenne, Paris.
- TERMES, à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-G.).
- 17, r. Cadet, Paris.
- 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- VIVIEN, 6, r. Abbeville, Paris.
- 26, Gde-rue St-Clair, Lyon.
- 34, bd de Clichy, Paris.
- ROY, 29, av. Charras, Clermont-Ferrand.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Lab. Hygiodontis, Croissy-sur-Seine (Seine-et-Oise).
- 4, chaussée de la Muette, Paris.
- 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris.
- 133, r. Lecourbe, Paris.
- 60, r. de Prony, Paris.
- PARET, 22, r. Guibal, Marseille.
- 34, r. Sedaine, Paris.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
- STÉNÉ, 2, pl. des Vosges, Paris.
- TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- MORTIER & C<sup>ie</sup>, Bordeaux.
- 20, fg Poissonnière, Paris.
- CAVY à Montluçon (Allier).
- 45, fg St-Denis, Paris.
- 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
- TÉTARD, à Beauvais.
- LANDRIN, 12, r. de la République, Puteaux.
- 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- FOUCHERE, Rive-de-Gier, (Loire).
- 24, c. Lafayette, Lyon.
- 22 bis, r. de Silly, Boulogne-s.-Seine.
- 38, bd Bourdon, Neuilly-Paris.
- 50, r. de Turenne, Paris.
- 10, r. Pierre-Ducreux, Paris.
- 60, r. Saussure, Paris.
- 46, r. de Rome, Marseille.
- LAFFORT, Joué-les-Tours (I. et-L.).
- 43, av. Kléber, Paris.
- 17, r. du Boulol, Paris.
- 50, r. de Lille, Tourcoing.
- BEAUGOURDON, 43, av. Kléber, Paris.
- 132, r. de Turenne, Paris.

- \*Fluveinose Mauchant** 14, r. de Birague, Paris.  
**Fluxhémio** 112, r. de Gerland, Lyon.  
**\*Fluxine (gouttes)** E. BONTHOUX, Villefranche-sur-Saône.  
**Fœnugol** 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.  
**Foie - Endocrisines** 7, r. Biscornet, Paris.  
**Fournier**  
**\*Fokienyl** 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois (Seine).  
**\*Follestrine** GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris.  
**\*Follicormone buccale** HINGLAIS, 30, r. de Miro-mesnil, Paris.  
**\*Folliculine Choay** 48, Av. Théophile-Gautier, Paris.  
**\*Folliculine Crinex** 18, r. St-Amand, Paris.  
**\*Folliculine cristallisée** 89, r. Cherche-Midi, Paris.  
**Roussel**  
**\*Follilobine** FRAYSSE, 47, r. de Neuilly, Nanterre.  
**Folliovarine Laleuf** 20, r. du Laos, Paris.  
**\*Fondants Dausse** 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
**Forcéase** GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.  
**\*Forcival** 6, r. Bridaine, Paris.  
**Fordynol** 13, r. du Général-Foy, St-Etienne.  
**\*Foriod** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
**Formadermine** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
**Formagol Bouty** 3, r. Dunkerque, Paris.  
**Formétine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**Formine Adrian** 9, r. de la Perle, Paris.  
**Formint** MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.  
**Formitrol Wander** 151 bis, r. de Joinville, Champigny.  
**Formobenzyl** DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.  
**\*Formocarbine** TÉTARD, à Beauvais.  
**\*Formocarbos** MILLET, à Rambouillet.  
**Formo-choline** ADLER, 36, r. des Franc-Bourgeois, Paris.  
**\*Formocitrine** 37, av. Jules-Coutant, Ivry-s.-Seine.  
**Formogastrine** 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.  
**Formopectine** 112, r. de Gerland, Lyon.  
**Formo-Vaccins** LUCINIA, 154 bis, r. Breteuil, Marseille.  
**Formule Jacquemaire** Villefranche (Rhône).  
**60**  
**Formyl** 23, r. Valéry-Meunier, Pau.  
**\*Fornose** Lab. CHAVIALLE, 70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).  
**Fortal** Lab. SÉVIGNÉ, 76, r. des Rondeaux, Paris.  
**Fortiane** BONNAFÉ, Milhau (Aveyron).



- \*Fortossan Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- \*Forkol** BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
- \*Fosfomagnyl** 12, r. de Castiglione, Paris.
- \*Fosfoxyl Carron** 69, r. de St-Cloud, Clamart (Seine).
- Fostrychnol Chanté-reau** 8, r. de Constantinople, Paris.
- \*Fosyls Carron** 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
- Fraikola** 4, r. des Carmes, Paris.
- \*Francoplaste Kraus** 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- Frangoléine** à Aigurande (Indre).
- Frangulose Flach** 6, r. de la Cossonnerie, Paris.
- Freinix** 98, r. de Sèvres, Paris.
- Freinolutéine** 2, r. des Deux-Ponts, Paris.
- Frène Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- \*Freinospasmyl Le-prince** 62, r. de la Tour, Paris.
- \*Frenasma** 71, r. St-Blaise, Paris.
- Frialine Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.
- Fructines Vichy** 49, av. Wagram, Paris.
- Frugesolines Vichy** 1 et 3, r. Lafloque, Vichy.
- Fruits de Régime J. MIDY,** 41, r. de Courbevoie.
- Tilloy La Garenne (Seine).**
- Fruxatyl TORAUDE,** 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Fucobiline Prothière** 55, r. Auguste-Comte, Lyon.
- \*Fucoglycine** 11, r. Milton, Paris.
- \*Fucoiodine** 132, r. de Turenne, Paris.
- Fucophosphine COUJET,** à Olonzac (Hérault).
- \*Fucosine Prothière** 55, r. Auguste-Comte, Lyon.
- Fuculose** 223, r. St-Martin, Paris.
- \*Fucus Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- Fumigator Gonin** 60, r. Saussure, Paris.
- Furcol** 47, r. Carnot, Versailles (S.-et-O.).
- \*Furonculase** 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
- Furonculine COUJET,** à Olonzac (Hérault).
- Furol** 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris.
- Furoplast VIGIER,** 9, r. de la Gare, Levallois (Seine).
- Furosyl** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Fusol** 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.



**Gabiol**

**Gadéinol**

**Gadilène Vasseur**

**Gadiodine Labesse**


**Sté française d'Extension Bio-Chimique, St-Quentin.**

6, bd Arago, Paris.

114, r. Faidherbe, Boulogne-s.-Mer.

36, r. des Lices, Angers.

- \*Gaduamine RENARD, 35, r. de Paris, Clichy (Seine).
- \*Gaduase Lab. SERVIER, 25, r. E.-Vignat Orléans.
- Gaduine algovitinée P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Gaïacalcine Latour 17, pl. des Vosges, Paris.
- \*Gaïacamphre PLAGNOL, 18, r. Maréchal-Foch, Versailles.
- Gaïacodil Godard 13, r. Chernovitz, Paris.
- Gaïacolphosphaté 165, r. St-Denis, Courbevoie.
- Pautauberge
- Gaïacomalt U. C. E. P., 5, r. Labreque, Strasbourg.
- Gaïacophosphal Clin 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- Gaïarsénan Ducat 191, r. St-Honoré, Paris.
- Gaïarsol Bouty 3, r. de Dunkerque, Paris.
- \*Galabactéine 154 bis, r. Breteuil, Marseille.
- Galactésia AXAREL, 15, r. Catalienne, St-Denis.
- Galaotina 68, r. Phalsbourg, Le Havre.
- Galactogènes Jolivet 140, fg St-Honoré, Paris.
- \*Galactogil PROGIL, 77, r. Miromesnil, Paris.
- Galactose 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Galazène 15, q. Bourbon, Paris.
- \*Galform 20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI<sup>e</sup>).
- \*Galliodine 71, r. Ste-Anne, Paris.
- \*Gambéol 42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie.
- \*Gamétoxy S. F. E. A. T., 15, r. Catullenne, St-Denis.
- Gamostyl 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- \*Ganderma 42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie.
- Gangliosane 2, allées Spach, Strasbourg.
- \*Gardenal SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- \*Gardéphédrine THORAL, Le Mont-Dore.
- Gargarina Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Garsédol SIMON, 44, r. Inkermann, Lille.
- \*Gastéose 14, r. Demarquay, Paris.
- Gasterinase 77, bd de Grenelle, Paris.
- Gastérine Frémont à Vichy (Allier).
- Gastérol 37, r. Galilée, Paris.
- Gastérophiline AMBLARD, r. Balainvilliers, Clermont-Ferrand.
- \*Gastiase 14, r. Demarquay, Paris.
- \*Gastrépatine Lab. B. C. L., 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- \*Gastrhéma 71, r. Saint-Blaise, Paris (XX<sup>e</sup>).
- Gastrhépase CELLIER, Saint-Uzé (Drôme).

- Gastria**
- \* **Gastricine** du Dr Du-  
hourcau
- Gastrobiase**
- \* **Gastrocalcine**
- \* **Gastrocaol** 
- \* **Gastrocarbone**
- \* **Gastroclean**
- Gastrodium**
- \* **Gastroluès**
- \* **Gastronaldine**
- \* **Gastropansement**
- Gastropeptyl**
- Gastrophiline**
- Gastroplasma**
- Gastrosalvine**
- \* **Gastro-Sodine**
- Gastrosic Léo**
- Gastrotherib**
- \* **Gastrozymase Bouty**
- Gastryl**
- \* **Gatercodéine**
- \* **Gatran**
- \* **Gaurol**
- Gayacolchine**
- Gaze Anadhère**
- Gaze Néolée**
- Gelagar**
- Gelax**
- Gelée antidiarrhéique**  
Lumière
- Gelées Vaccins Gol-  
denberg**
- Gélicrème Dumesnil**
- \* **Gélicurine**
- \* **Gélobarine**
- Géloboldine**
- Gélocalcase**
- Gélocalcine**
- Gelodelbiase**
- MIRATON**, Châtel - Guyon,  
(Puy-de-Dôme.)  
6, r. Louis-Blanc, La Garenne-  
Colombes (Seine).  
2, pl. des Vosges, Paris.  
17, r. Cadet, Paris.
- BENDERITTER**, à Vendôme  
(Loir-et-Cher).  
Saint-Louis (B.-du-Rhône).
- ADLER**, 36, r. des Francs-  
Bourgeois, Paris.  
51, r. de Paris, Pierrefitte (Seine).  
15, r. Catulienne, St-Denis.  
58, r. de Maubeuge, Paris.
- Dr **ZIZINE**, 24-26, r. de Fécamp,  
Paris.  
40, r. des Acacias, Paris.  
53, bd de Verdun, Fontenay-  
sous-Bois.
- MILLET**, à Rambouillet.  
**P. FONTANIER**, Moulins-sur-  
Yèvre (Cher).  
21, r. Violet, Paris.  
11, square Marie-Louise, Bru-  
xelles.
- LA BIOTHÉRAPIE**, 5, r. Paul-  
Barruel, Paris.  
3, r. de Dunkerque, Paris.  
108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
- DOMERGUE**, Agen (L.-et-G.).  
**LECOCQ** et **FERRAND**, 14, r.  
Gravel, Levallois-Perret.  
30, r. Armand-Sylvestre, Cour-  
bevoie.  
40, r. Bienfaisance, Paris.
- CAVAILLES**, 29, r. Singer,  
Paris.  
115, r. N.-D. des Champs, Paris.  
S. G. I. P., 73, r. G<sup>al</sup>-Sarrail,  
Le Havre.  
137, av. Parmentier, Paris.  
45, r. Villon, Lyon.
- IVAGO**, 17, r. de Provence,  
Paris.  
10, r. du Plâtre, Paris.
- AUDIBERT**, Cinq-Cantons, à  
Bayonne.
- SPÉCIA**, 21, r. Jean-Goujon,  
Paris.  
4, imp. de Béarn, Paris.  
8, r. Vivienne, Paris.  
121, av. de St-Ouen, Paris.  
Lab. Pharmacologie Générale,  
8, r. Vivienne, Paris.

- \*Gélogastrine** LICARDY, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine.
- Gélo-Pansement** Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- \*Gélo-Pansements gastro-intestinaux** 8, av. de Grammont, Tours,
- \*Gélor** 63, r. Faisanderie, Paris.
- \*Gélotanin** Lab. CHOAY, 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- Gélotube 29** 49, r. de Bitche, Courbevoie (Seine).
- Gelsémium** Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- \*Génacide** MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
- \*Génatropine** 4, pl. des Vosges, Paris.
- \*Génergosine** Lab. JONIDS, Dijon (Côte-d'Or).
- \*Génésérine** Lab. AMIDO, 4, pl. des Vosges, Paris.
- Genêt Gmet** 27, ig Montmartre, Paris.
- \*Genhyoscyamine** 4, pl. des Vosges, Paris.
- Génocuroï** 10, r. Maubeuge, Paris.
- Génolactine** 3, bd Courcelles, Paris.
- \*Génomorphine** 4, pl. des Vosges, Paris.
- \*Génoscopolamino** 4, pl. des Vosges, Paris.
- \*Genosthéniques** id.
- \*Génostrychnine** id.
- Genovital** 3, r. Dulong, Paris.
- Géo-baryum** 20, cours Morand, Lyon.
- Géodyl** J. ROBERT, 39, r. de Bourgogne, Paris.
- Géraldine** 121, av. de St-Ouen, Paris.
- \*Geranine** 12, av. de la Grande-Armée, Paris.
- Geraseptol** 12, r. Vavin, Paris.
- Gercecure** AMBLARD, r. Balainvilliers, Clermont-Ferrand.
- Gercérine** Eon EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du.-N.).
- Gerdabyl** GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
- Germex 42** 85, r. du Canal, Roanne.
- Germocalcine** 29, r. de Metz, Toulouse.
- Germoclasine** 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
- \*Germose** LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
- Germosine** Lumière 45, r. Villon, Lyon.
- Germyl** 9, r. Petitot, Dijon.
- \*Gernal** 333, r. Vaugirard, Paris.
- Gérol Testart** Chalais (Charente).
- Gesto Serum** Sté d'Elevage et Produits biologiques, St-Philibert (Côte-d'Or).
- Girasiol** Dumesnil 10, r. du Plâtre, Paris.
- Givrinol** 14, r. d'Auge, Caen.
- Gladyl** 66, r. Nationale, Lille.
- \*Glandex phoscalcique** 58, r. de Maubeuge, Paris.

- \*Glandocalcyl  
Glaxo
- \*Glésol  
Globabyl
- Globépal
- \*Globexine  
Globugénol
- Globules Hébert
- \*Globules Fumouze  
Globules Laincar
- Globules Rebeaud
- \*Globules Romon
- Globules Secrétan
- \*Gloma (Malt Wander)
- \*Glottyl
- \*Gloxines  
Glucalcium R. X.
- Glucoflavine
- \*Glucolactol  
Gluconate de calcium  
Sandoz
- \*Gluphosol  
Glutaspirine
- Glutéokina
- Glutinettes d'Aspirine
- Glycalcion
- Glycérine crésotée  
phosphatée Catillon
- Glycéro-bromurine
- \*Glycéro Gloma
- Glycéro-iodurine
- Glycéro-ovarine
- \*Glycérophosphate Dal-  
loz
- Glycérométhylarsénié
- Glycérophosphates de  
chaux granulé Gi-  
rard
- Glycérophosphates ef-  
fervescents
- Glycérophosphates  
Freysing
- Glycérophosphates  
Jacquemaire
- 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
- RISSA, 46, r. Claude-Lorrain,  
Lille.
- 18, av. Hoche, Paris.
- KERFYSER, r. Alexandre-III,  
Dunkerque.
- BOUTY, 3, r. de Dunkerque,  
Paris.
- SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
- Lab. COMTOS, Feschés-le-Cha-  
tel (Doubs).
- à St-Lô (Manche).
- 78, fg St-Denis, Paris.
- LANCOSME, 71, av. Victor-  
Emmanuel-III, Paris.
- 36, r. de Verdi, Nice.
- MONAL & C<sup>ie</sup>, 6, r. Bridaine,  
Paris.
- J. LOGEAIS, 22 bis, r. de Silly,  
Boulogne-sur-Seine.
- 151 bis, rte de Joinville, Cham-  
pigny (Seine).
- 85 bis, r. du Ranelagh, Paris.
- 133, av. de St-Ouen, Paris.
- ROUX, 58, r. de Maubeuge,  
Paris.
- route Nationale, Wattignies  
(Nord).
- BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
- SANDOZ, 20, Vernier, Paris.
- 5, r. Lefebvre, Paris.
- MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
Paris.
- MAZURE, 3, r. de Vouillé, Paris
- 14, r. des Pyramides, Paris.
- 21, r. Feydeau, Paris.
- 3, bd St-Martin, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.
- 151 bis, r. Joinville, Champigny  
(Seine).
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.
- 43, bd de la Chapelle, Paris.
- 6, r. Dombasle, Paris.
- 48, r. d'Alésia, Paris.
- LE PERDRIEL, 11, r. Milton,  
Paris.
- 6, r. Abel, Paris.
- à Villefranche (Rhône).

- \*Glycérophosphate Robin 13, r. de Poissy Paris.  
 Glycère-Thyroidine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 Glycéro-Tribromurine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 Glycogène 8, r. Vivienne, Paris.  
 Glycobyl 4, pl. des Vosges, Paris.  
 \*Glycocarpine DALIN, 49, q. St-Vincent, Lyon.  
 Glycogène Clin 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.  
 Glycojasol 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.  
 \*Glyco-lactimase Couturieux 18, av. Hoche, Paris.  
 \*Glyco. M. 3, av. Lowendal, Paris.  
 Glyco-phénique du D<sup>r</sup> Déclat 6, r. de la Tacherie, Paris.  
 Glycophosphates granulés Astier 45, r. Docteur-Blanche, Paris.  
 \*Glyco-Thymoline 5 bis, r. des Haudriettes, Paris.  
 \*Glyctone phosphatée Charrière ARQUEVAUX, à Etampes (Seine-et-Oise).  
 \*Glykolaine Robin 13, r. de Poissy, Paris.  
 \*Gmet (Extraits) 27, r. Montmartre, Paris.  
 \*Gobérol CHARMAISON, 26, av. de Royat, Clermont-Ferrand.  
 \*Gobillettes Hypnos Chabeuil (Drôme).  
 Golarsyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.  
 \*Gomenol 48, r. des Petites-Ecuries, Paris.  
 Gometer ROBERT et CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 Gometyl id.  
 \*Gonacrine SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 \*Gonagone CARRION, 54, fg St-Honoré-Paris.  
 Gonéine (Capsules) A. GUILLAUMIN, 13, r. Cherche-Midi, Paris.  
 Gonocure SAUBA, Montreuil.  
 \*Gono-Vaclydun 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 Gonurol B 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.  
 Gorgéine FOIRET, à Montargis (Loiret).  
 \*Gosiérine Dalloz 13, bd la Chapelle, Paris.  
 Gossyl 4, imp. de Béarn, Paris.  
 Gossypiol Maurin Lab. de l'HORMOCRINOL, 17, r. de la Glacière, à la Garenne-Colombes (Seine).  
 Goudrinhal 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.  
 Goudroline POINTET et GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
 Goudron Freyssinge 6, r. Abel, Paris.  
 Gouttes amères de Baumé D<sup>r</sup> GIGON, 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 Gouttes antirhumastimales Wagner 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.  
 \*Gouttes Antispasmodiques Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).

- \*Gouttes Arsénosté-  
niques Dausse
- \*Gouttes Blagny  
Gouttescalciques Zanit
- \*Gouttes Daynoc
- Gouttes d'Yzeurol
- Gouttes Efgé
- \*Gouttes Eryl
- Gouttes Esurine
- Gouttes Gydé
- \*Gouttes halogènes du  
D<sup>r</sup> Bern
- \*Gouttes hypotensives  
Fraisie
- Gouttes iodopeptiques  
Narud
- \*Gouttes Leconte
- \*Gouttes livoniennes
- Gouttes Lo-Lo Tsé  
Isberg
- Gouttes du D<sup>r</sup> Ludlam
- \*Gouttes Magalo
- \*Gouttes Malone
- Gouttes Milko
- \*Gouttes Narkay
- \*Gouttes Nican
- \*Gouttes Paidophiles du  
D<sup>r</sup> Guiraud
- Gouttes Pectosérum
- Gouttes Perettes
- \*Gouttes Phosphosté-  
niques Dausse
- \*Gouttes Pilka
- Gouttes Reynaud
- Gouttes Sap
- Gouttes Scandinaves
- Gouttes Schmit anti-  
convulsives
- Gouttes Sclérocourine
- \*Gouttes de Séru
- Gouttes Vigor
- Goyl Meurice
- \*Grains céphalifuges
- \*Grains de Vals
- \*Grains d'Evian
- Grainsgelm
- Grains du D<sup>r</sup> Jehan-  
Meyer
- 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>)
- Pamela, Forges-les-Eaux (S.-I.).  
3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-  
louse.
- LEJEUNE, 142, r. de Picpus,  
Paris.
- 26, av. de Tourville, Paris.
- 40, av. Secrétan, Paris.
- 102, r. Vincent, Marseille.
- D<sup>r</sup> R. PETIT, Angoulême.
- 4, cours Tolstoï, Lyon.
- 3, pl. Intérieure St-Michel,  
Toulouse.
- FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.
- 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
- 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- 15, r. des Immeubles-Industriels,  
Paris.
- F. BOUVIER, 31, bd de la Vil-  
lette, Paris
- 17, r. Cadet, Paris.
- Etabl. GOY, 23, r. Beautreillis,  
Paris.
- VINCENT, à Ancenis (L.-Inf.).
- CLUZEL, 60, c. E.-Zola, Lyon.
- SAUBA, Montreuil (Seine).
- CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.).
- 10, imp. Milord, Paris.
- 3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-  
louse.
- 42, av. de Breteuil, Paris.
- 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>)
- Lab. ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.
- DURAND, Aigues-Mortes  
(Gard).
- 83, r. des Martyrs, Paris.
- D<sup>r</sup> H. PHILIPPE, 14, r. du  
Palais-Grillet, Lyon.
- G. Vilas à Châlons-sur-Marne.
- CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
- 69, r. de Sèvres, Paris.
- 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-  
Moulineaux.
- 7, r. Galvani, Paris.
- PERROCHON, 57, r. Origet,  
Tours.
- D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
- 34, r. St-Martin, Château-du-  
Loir (Sarthe).

- Grains Miraton** 48, r. d'Alésia, Paris.  
**Grains de santé du D<sup>r</sup> Franck** 59, r. Nollet, Paris.  
**Gramalt** CHASSAIGNE, Ruffec (Ch.-I.).  
**\*Granions de Fouard** 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine).  
**\*Granoxyl** 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
**Granulé Bravais** 3, r. Mogador, Paris.  
**Granulé calmafrenkel** LEMATTE, 52, r. La Bruyère, Paris.  
**\*Granulé Caresmel** 2, quai. Paul-Bert, Tours.  
**Granulé du D<sup>r</sup> Mous-saud** H. RIVIER, 26, r. St-Claude, Paris.  
**Granulé Girard** 48, r. d'Alésia, Paris.  
**Granules 3 cachets** D<sup>r</sup> COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.  
**Granules d'Aloïne** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**Granules de Boldine** id.  
**Granules Chanteaud** 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.  
**Granules Chevrier** 21, fg Montmartre, Paris.  
**Granules Colchicine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**Granules Crosnier** 6, r. Chanoinesse, Paris.  
**Granules de Digitaline** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**\*Granule Edges** 59, r. Boissière, Paris.  
**Granulé de Panphosphates** 119 bis, av. Chemin-de-Fer, Rueil (S.-et-O.).  
**\*Granules de Pantofort du D<sup>r</sup> Boveil** 1, r. Lassalle, à Lyon.  
**Granules du D<sup>r</sup> Papillaud** GIGON, 25, bd Beaumarchais, Paris.  
**Granules Homolle & Quévenne** 14, r. des Beaux-Arts, Paris.  
**Granules Houdé** 9, r. Dieu, Paris.  
**Granules Hydrastinine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**Granules Hyosciamine** id.  
**Granules Spartéine** id.  
**Granulé pulmonaire Giry** 49, r. de Metz, Nancy.  
**Granulé dépuratif Künckel** 3, r. Watteau, Courbevoie.  
**Granulé Tinardon** 17, r. Cadet, Paris.  
**\*Granules des Vosges Grassyl** 11, r. Lafayette, Paris.  
**\*Gravidostyl** 98, r. de Sèvres, Paris.  
**Graumanyl Meurice** 97, r. de Vaugirard, Paris.  
**Gravural** 61, av. Louise, Bruxelles.  
**Gripopal** 28, r. de Seine, Paris.  
**Grippol** 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
**Grog antigrip Labo-rome** INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, à Sarrebruck.  
**Guarana Grimault** 4, av. Brazza, Romainville (Seine).  
 8, r. Vivienne, Paris.



- Guérysipèle**  
 71, av. de la République, Cham-  
 pigny (Seine).  
**\*Guéthural**  
 Lab. PEPIN & LEBOUCC,  
 Courbevoie (Seine).  
**\*Gui Byla**  
 26, av. Observatoire, Paris.  
**\*Gui Gmet**  
 27, fg Montmartre, Paris.  
**Gullyl**  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
**\*Guimelinde**  
 Ancenis (Loire-Inf.).  
**\*Guipsine Leprince**  
 62, r. de la Tour, Paris.  
**\*Guitose**  
 4, r. Désirée, Lyon.  
**Gunose**  
 Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
**\*Guttoléol**  
 MAIRE, 171, r. de Belleville,  
 Paris.  
**Gynaicéol**  
 17, r. Cadet, Paris.  
**Gynalthine**  
 3, r. Barbette, Paris (III<sup>e</sup>).  
**Gynaseptone**  
 BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.  
**\*Gyneco-Vaolydun**  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
**Gynéose**  
 14, r. des Pyramides, Paris.  
**\*Gynergène**  
 Etabl. SANDOZ, 20, r. Vernier,  
 Paris.  
**Gynévrine**  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
**\*Gynocalcion**  
 Lab. CORTIAL, 7, r. de l'Armo-  
 rique, Paris.  
**Gynocrinol**  
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
**Gynocure**  
 DEBROCK, 22, r. de Paris,  
 Houilles (S.-et-Oise).  
**Gynohypophysol**  
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
**Gynoluteol**  
 id.  
**Gynocestryl**  
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
**Gynolysats**  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
**\*Gynopausine**  
 42, du Mont-Cenis, Paris.  
**Gynophiline**  
 DOUARD, Uzel (C.-du-N.).  
**Gynophyl Reboul**  
 Pont-Ste-Maxence.  
**Gynopolycrinol**  
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
**Gynoster**  
 133, r. Lecourbe, Paris.

## H

- Hæmaboeol**  
**Halocure**  
**Hamamélidine**  
 BAILLY, 15-17 r. de Rome,  
 Paris.  
 2bis, r. du Chevalier de la Barre,  
 St-Quentin (Aisne).  
 J. LOGEAIS, à Boulogne-sur-  
 Seine.

- \*Hamacitro 47, bd St-Michel, Paris.
- \*Hamaméline Roya 41, r. de Rome, Paris.
- \*Hamaméliode 17, r. Cadet, Paris.
- Hamamélis Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
- \*Hamamélis Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
- \*Hamamélis Grandval 12-14, r. Féry, à Reims.
- Hansénol 116, bd Haussmann, Paris.
- \*Hectargyre Naline à Villeneuve-la-Garenne.
- \*Hectine Naline id.
- Hectiode CANONNE, bd Sébastopol, Paris.
- Hedopeptol 34, r. Montgallet, Paris.
- Helbine 94, r. Michelet, Alger.
- Hélénine du Dr Korab Lab. CHAPES, Chambois (Orne)
- Heliatol (poudre, pom- 4, pl. Royale, Nantes.
- made)
- Hélieurone BYLA, 26, av. de l'Observa-  
toire, Paris.
- Héliosodine 249, r. de Vaugirard, Paris.
- Héliostérine LAROZE, 54, rue de Paris, Cha-  
renton (Seine).
- Heliosthényl LAURIAT, La Garenne-Colom-  
bes (Seine).
- Hélital 15, pl. Nationale, Dieppe.
- Helmazil 7, av. Marceau, Paris.
- Helminthose 132, r. de Turenne, Paris.
- Helminthyl 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- Hémabéol 72, av. Kléber, Paris.
- Hémabione MOURGUES, chemin Neuf,  
Ganges (Hérault).
- \*Hémagène Tailleur SEVENET, 10, r. Le Chapelais,  
Paris.
- \*Hémagénine Giraud pl. de l'Eglise, Argenteuil.
- Hémaldine BILLEBAUD, Paray-le-Monial  
(Saône-et-Loire).
- Hémarsyl du Dr Roux CAILLAU, à Argentat (Corrèze).
- Hématéol 81, r. Le Corrège, Bruxelles.
- \*Hématoéthéroïdine 54, Fg St-Honoré, Paris.
- Hématogénine DEMASLES, Vienne (Isère).
- Hématogénol 37, r. Galilée, Paris.
- \*Hémato-iodine 2, pl. des Vosges, Paris.
- Hématopan 263, r. Lecourbe, Paris.
- Hématoquina Tran- 7, r. Guillaume-Budé, Mont-  
toul geron.
- \*Hémaxol Lab. JONIDS, Dijon.
- \*Hémoantitoxine Sofos 4, r. Désirée, Lyon.
- Hémobiose M. AUBANEL, Pointe-Rouge,  
Marseille.
- \*Hémocalcine FERCOQ, St-Maur (Seine).
- \*Hémocalciopectine BOUDIER, 37, r. de Bour-  
gogne, Paris.
- \*Hémo - Cyté Sérum Labor. CORBIERE, 27, r.  
Corbière Desrenaudes, Paris.
- Hémocléine Lafay 54, ch. d'Antin, Paris.
- \*Hémodrome LANCOSME, 71, av. Victor-  
Emmanuel-III, Paris.

- **Hémoductyl**
- **Hemofer**  
**Hemoferrine**  
**Hémofixine**
- **Hemofluidol**  
**Hémogénase**
- **Hémogénol Dausse**
- **Hémogényl Godart**  
**Hémoglobine Bovel**  
**Hémoglobine Dalloz**
- **Hémoglobine Des-  
chiens**  
**Hémoglobine Star**
- Hémoglobine Van Lier**  
**Hémoglyne Thuau**  
**Hémo-Hépatext**
- **Hemoluol**  
**Hémoneurol Cognet**
- **Hémopaniline**
- **Hémopausine**  
**Hémopectal**
- **Hémo-Phagostyl**
- **Hémophiline Planche**  
**Hémophytol**
- **Hémoplase Lumière**
- **Hémoplasmine**  
**Hémopoïne**  
**Hemoradol**
- **Hémorroïdine**
- **Hémosamine (Utéra-  
mine)**  
**Hémosédine**  
**Hemoserosan**  
**Hémosine**  
**Hémossérum**
- **Hemostatique Goy**
- **Hémostérine irradiée**
- **Hémostra Roche**
- **Hémostyl**
- **Hémotal**  
**Hémotonine**  
**Hémo-Tonikéine**  
**Hémovarine**  
**Hémoveïne**
- LICARDY, 38, boul. Bour-  
don, Paris-Neuilly.**
- LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.**
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.**  
**4, r. Beaurepaire, Paris.**
- Lab. LÉONARDON, Arcachon.**  
**à Courpière (Puy-de-Dôme).**  
**4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).**  
**Andenne (Belgique).**  
**101, av. Mozart, Paris.**  
**13, bd de la Chapelle, Paris.**  
**9, r. Paul-Baudry, Paris (VIII<sup>e</sup>).**
- 2, r. Marché-des-Blancs-Man-  
teaux, Paris.**  
**30, r. St-Jacques, Namur.**  
**22, fg St-Michel, Angers.**
- TAILLANDIER, 107, av. Jean-  
Jaurès, Paris.**  
**6, r. Dombasle, Paris.**  
**43, r. de Saintonge, Paris.**  
**Annonay (Ardèche).**  
**16, r. du Petit-Musc, Paris.**  
**A. FALVY, 40, r. des Aca-  
cias, Paris.**  
**A. PARIS, 4, r. La Motte-  
Picquet, Paris.**  
**2, r. Volney, Paris.**
- BEDEIL, Lavelanet (Ariège).**  
**45, r. Villon, Lyon.**  
**30, r. St-Jacques, Namur.**  
**D<sup>r</sup> SCHOLL, à Gembloux,  
Belgique.**  
**25, r. Vaneau, Paris,**  
**1, r. Alexandre-III, à Dun-  
kerque.**  
**4, r. Bellart, Paris.**
- 19, r. de Fleurus, Paris.**  
**TORAUDE, 22, r. de la Sor-  
bonne, Paris.**  
**89, bd Sébastopol, Paris.**  
**JARMON, 4, pl. de la Gare,  
Tunis.**  
**23, r. Beautreillis, Paris.**  
**366, av. Thiers, Bordeaux.**  
**10, r. Crillon, Paris.**  
**97, r. de Vaugirard, Paris.**  
**UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,  
Paris.**  
**98, r. de Sèvres, Paris.**  
**52, r. La Bruyère, Paris.**  
**ADLER, 36, r. des Francs-  
Bourgeois, Paris.**  
**BRICHARD, à Bar-le-Duc.**

- \***Hémoviris**  
(Cachets élixir)  
**Hémozol**  
**Hémynne**
- \***Hemypnal**
- Henrick's bill**
- Hényl**
- Hépabyl**
- Hepacuroil**  
**Hépagastrol**
- \***Hépanème**
- \***Hépaphos**
- Héparadénine**
- \***Héparbiline**  
**Heparcyl**  
**Héparène**
- \***Héparfer**
- \***Héparmone Byla**  
**Hépascol**
- Hépasodyl**
- \***Hepatergol**
- \***Hépathemo**
- \***Hépatie Efa**
- Hépatine Bouty**  
**Hépatine Gad**
- Hépatismine**
- \***Hépato-Byl**
- Hépatocrinol**
- \***Hépatodiase**
- \***Hépatoformine**
- Hépatogastrine**  
**Hépatogènes Charvoz**
- Hépatolax**
- \***Hépatomanganol**  
**Hepatoseptyl**  
**Hépato-Sérine**
- \***Hépatosodine**
- 1, r. de l'Ouest, Neuilly (Seine).**
- 12, boul. Saint-Martin, Paris.**
- 13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).**
- 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.**
- VERGELOT, 163, r. de Flandre, Paris.**
- 31, av. Foch, La Garenne-Colombes.**
- TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.**
- 10, r. de Maubeuge, Paris.**
- 33, av. de Villiers, Paris.**
- 54 fg St-Honoré, Paris (VIII<sup>e</sup>).**
- 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris (IV<sup>e</sup>).**
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**
- id.**
- 23, r. du Caire, Paris.**
- 30, r. Denis-Papin, Blois.**
- PELLISSIER, 33, av. de Villiers, Paris.**
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.**
- 70, cours Alsace-Lorraine, Bordeaux.**
- 9, r. Laloy, Chaumont.**
- Cousin, r. Albert I<sup>er</sup>, Beaumont-sur-Oise.**
- 9, r. Paul-Baudry, Paris.**
- rue du Château, Carentan (Manche).**
- 3, r. Dunkerque, Paris.**
- OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.**
- 29, r. de Liège, Paris.**
- 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.**
- Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.**
- UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.**
- 26, av. de Royat, Clermont-Ferrand.**
- 4, chaussée de la Muette, Paris.**
- 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.**
- 83, bd de la Villette, Paris.**
- 11, pl. Louis-XII, Blois.**
- 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.**
- 22, r. Guillaume-le-Conquérant, Caen.**
- DURET & RÉMY, Asnières (S.).**

- Hépatotanie**  
 \*Hépatozyl  
 \*Hépatrol  
**Héracléine**  
 \*Héracléol  
 \*Hergénol  
**Hermarsinol**  
**Hermomuthol**  
 \*Hermophényl  
**Hermostyrum**  
**Héroïne Vicario**  
**Hétérolysine**  
**Héxachol**  
 \*Hexafel  
**Hexaformine**  
**Hexalithine**  
**Hexaranol**  
**Hexarubrine**  
 \*Héxorcène  
 \*Hexotal  
**Hippo-Carnis**  
**Hippoplasine du D<sup>r</sup> Gran**  
 \*Hipposarcine Roy  
 \*Hirudinase  
**Histocalcine**  
 \*Histogénol Naline  
**Hojasol**  
 \*Holaseptine  
**Holocalcine**  
 \*Holos Deschiens  
 \*Holovarine  
**Holuryl**  
 \*Hopogan  
**Hordéomaltine**  
**Hordose**  
 \*Hormobiline  
 \*Hormoclène  
 \*Hormocrinol F et M  
**Hormolaxine**  
**Hormolutéine**  
**Hormotone**
- 14, r. de Clichy, Paris.  
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.  
 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
 COUTURIEUX, 18, av. Hoche, Paris.  
 Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
 GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 45, r. Villon, Lyon.  
 WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.  
 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.  
 47, r. Bokanowski, Asnières.  
 123, pl. Beauvoisine, Rouen.  
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence.  
 88, r. Duhesme, Paris.  
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.  
 LE GALLO, à Auray (Morbihan).  
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.  
 18, av. Daumesnil, Paris.  
 83, bd de la Villette, Paris.  
 à Villeneuve-la-Garenne.  
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.  
 5, Grande-Rue, Cannes.  
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon (Boulogne-sur-Mer).  
 9, r. Paul-Baudry, Paris.  
 48, r. de la Procession, Paris.  
 A. FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.  
 12, r. Lamartine, Paris.  
 10, r. Richelieu, Paris.  
 31, r. des Pierres, Bruges (Belgique).  
 17 bis, av. Parmentier, Paris.  
 LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.  
 JAMMES, 17, r. de la Glacière, la Garenne-Colombes.  
 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.  
 DÉGECÉ, 7, rue Princesse, Paris.

- \*Hormovarine Byla  
 Hordénine Lauth  
 Horsine  
 Hova (Tablettes)  
 Huile au Calomel Dumesnil  
 \*Huilaxine  
 Huile Boris  
 \*Huile Crolas  
 \*Huile de foie de morue  
 médicinale suractivée  
 Huile de génévrier Vial  
 \*Huile Gallina  
 Huile grise argentine  
 Huile grise Duret  
 \*Huile grise Ercé  
 Huile grise stérilisée  
 Huile de Hogg  
 \*Huile iodée Finikoff  
 Huile Parlarx  
 Huiles Cholestérinées  
 Dausse  
 \*Humoro Stabiline  
 Hyctal  
 \*Hydralin  
 Hydrargyrettes Hu-  
 bert  
 Hydrargyrion  
 Hydrariode  
 Hydrastine Houdé  
 Hydrastis Dausse  
 \*Hydrastis Gmet  
 Hydrastol  
 Hydrocamphre  
 Hydroclonazone  
 Hydrocotyle  
 Hydrogemmine La-  
 gasse  
 \*Hydrorrhéol  
 Hydroxydase  
 Hygiénane  
 \*Hygiodine  
 \*Hyol  
 \*Hyoscyaminé Houdé  
 \*Hypalène  
 Hypercytol  
 Hypergal Grémy  
 Hypericia  
 Hypericoil
- 26, av. Observatoire, Paris.  
 9, r. du 4-Septembre, Paris.  
 4, r. St-Anastase, Paris.  
 ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.  
 10, r. du Plâtre, Paris.  
 15, r. de Rome, Paris.  
 14, r. de Birague, Paris.  
 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.  
 RHONE POULENC, 21, rue  
 Jean-Goujon, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 4, r. Candolle, Paris.  
 S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne,  
 St-Denis.  
 12, r. de Nice, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-  
 velle, Paris.  
 13, r. Paul-Baudry, Paris.  
 21, r. Chaptal, Paris  
 65, rue Douy-Delcupe, à Mon-  
 treuil (Seine).  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-  
 Moulineaux.  
 DURET & RÉMY, Asnières  
 (Seine).  
 37, r. de la Fédération, Paris.  
 HUBERT, Romorantin (L.-et-  
 Cher).  
 18, av. Hoche, Paris.  
 à La Ferté-Macé (Orne).  
 9, r. Dieu, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris.  
 27, faub. Montmartre, Paris.  
 222, fg St-Martin, Paris.  
 88, r. Duhesme, Paris.  
 Lab. des Antiseptiques Chlorés,  
 40, r. Thiers, Le Havre.  
 21, r. Chaptal, Paris.  
 4, chaussée de la Muette, Paris.  
 CORDIER, 222, fg St-Martin,  
 Paris.  
 10, rue Blanche, Paris.  
 172, rue d'Alésia, Paris.  
 16, r. Petit-Musc, Paris.  
 109, r. de Sèvres, Paris,  
 9, r. Dieu, Paris.  
 15, r. des Champs, Asnières.  
 MATRAY, à Aubière (Puy-  
 de-Dôme).  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 3, r. Rodier, Paris.  
 id.

Hyperityol	3, r. Rodier, Paris.
Hypérol	49, r. Paradis, Paris.
*Hypersan	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Hyperstyl	Etabl. H. O. E., 239, r. Nationale, Villefranche - en - Beaujolais (Rhône).
Hypnase Vergelot	163, r. de Flandre, Paris.
Hypneural Cos	99, r. d'Aboukir, Paris.
Hypnosédine	11, ch. de la Muette, Paris.
Hypnovel Vély	132, av. Victor-Hugo, Paris.
Hypochlorine	l'Antiseptique, 48, r. de Londres, Paris.
Hypochloryl	7 bis, r. de Musset, Paris.
*Hypocholate	2, pl. des Vosges, Paris.
Hypodermozone	56, bd Péreire, Paris.
Hypolyse	24, av. Chatillon, Paris.
*Hypophédrine	18, r. de Beaune, Paris.
Hypophos Hurbourgne	à Montmeyan (Drôme).
Hypophosphites Chur-chill	12, r. Castiglione, Paris.
Hypophosphites Fellows	5, r. de la Paix, Paris.
Hypophydose	D <sup>r</sup> FRAYSSE, 47, r. de Neuilly, Nanterre.
Hypophyse - Endocrines Fournier	7, r. Biscornet, Paris.
Hypophysine	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Hypophysol	107, r. des Dames, Paris.
*Hyposulfène	22, r. de la Sorbonne, Paris.
*Hypotan	LEMATTE & BOINOT, 5, r. La Bruyère, Paris.
Hypotensol	LABESSE, Angers (M.-et-L.).
Hyrganol	SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.



*I. A. M.	D <sup>r</sup> LAVOUÉ, à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Iasthol	Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Ibogaine Nyrdhal	12, r. de la République, Puteaux.
Ichtyol Zinc	Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Idéalax	62, r. Marengo, St-Étienne.
Idéolaxine	OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.

- Iénol**  
**\*Ifranol**  
**\*Iloglandol Roche**  
**Imido Roche**  
**Immuniphages Gremy**  
**\*Immunizols Grémy**  
**Immuno-Antivirus**  
**\*Immunovaccin Anti-**  
**rhumatismal**  
**Immunovaccin bron-**  
**chopulmonaire**  
**\*Indhaméline Lejeune**  
**Indine**  
**Inertyl**  
  
**\*Infangyl Carlier**  
**\*Infra-rouges**  
  
**Infusion orientale R.**  
**B. L.**  
**Inhalateur Hojasol**  
**Inhalateur et inhala-**  
**tions**  
**\*Inhalation-Gargarisme**  
  
**\*Inhalation Lancosme**  
**Inhalation Sargéthyl**  
  
**Inhalatoriol**  
**Inhalène**  
**Inhalex**  
**\*Inhale-Bol**  
  
**\*Inhalol**  
  
**\*Inhalone**  
**\*Inhale-Sel**  
  
**\*Inhaloxyl**  
**Inhalyl**  
**Inhatillol**  
  
**Injection Clin Strychno**  
**Phospharsinée**  
**Injection orientale**  
**Injection sèche Bréra**  
  
**\*Innerclean**  
**Inogyl**  
**\*Inolène (simple, vase-**  
**liné, thymolé).**  
**Inorenol**  
**Inorhinyl**  
**\*Inosepta**  
**Inosphacelol**  
**Inosplénol**
- 37, r. Galilée, Paris.  
 19, r. Jacob, Paris.  
 10, r. Crillon, Paris.  
 id.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 8, av. des Sources, Nice.  
 id.  
 142, r. de Picpus, Paris.  
 DABAT, à Pau (Bas.-Pyr.).  
 CHARVOZ, 3, chem. du Vallon,  
 Lyon-Caluire.  
 St-Florentin (Yonne).  
 La Verrerie Scientifique, 12, av.  
 du Maine, Paris.  
 74, qual Jemmapes, Paris.  
  
 19, r. Ferdinand -Duval, Paris  
 Lab. INHAL, 98, r. J.-Maillotte,  
 La Madeleine-Lille.  
 VOCALDOP, 222, fg St-Martin,  
 Paris.  
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.  
 STOLZ, 56, av. Edouard-Vail-  
 lant, Boulogne-sur-Seine.  
 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.  
 à Berson (Gironde).  
 37, r. Galilée, Paris.  
 P. TAVERNIER, 32, r. de  
 l'Ouest, Paris.  
 62, r. d'Antibes, Cannes (Alpes-  
 Maritimes).  
 CH. DEHAY, à Arras.  
 P. TAVERNIER, 32, r. de  
 l'Ouest, Paris.  
 4, chaus. de la Muette, Paris.  
 137, av. Parmentier, Paris.  
 ADLER, 36, r. des Francs-  
 Bourgeois, Paris.  
 20, r. des Fossés-Saint-Jac-  
 ques, Paris.  
 DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.  
 JEHAN & BRÉRA, Montau-  
 ban (L.-et-G.).  
 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
 60, r. de Prony, Paris.  
 42, r. du Mont-Cenis, Paris.  
  
 60, r. de Prony, Paris.  
 D<sup>r</sup>DEBAT, 60, r. de Prony, Paris.  
 id.  
 id.  
 id.



- \*Inotyl  
 Inoxemol  
 Inoxyl  
 Inoxine  
 \*Institut Pasteur .  
 \*Insulanol  
 \*Insuline (voir \*Endo-pancrine)  
 Insuline A. B.  
 \*Insuline buccale For-net  
 \*Insuliné Byla  
 \*Insuline Léo  
  
 Insuline Rogier  
 Insuloxyl Roussel  
 \*Insulyl  
 Intaline  
  
 Integral Vaccin  
 Intestase  
 Intestinal Merminod  
 \*Intraits Dausse  
 Ioda  
 Iodalbin Adrian  
 Iodalla  
 \*Iodalose Galbrun  
 \*Iodamelis Logeais  
  
 Iodaminase  
 Iodamol  
 Iodargol Viel  
 Iodarsène  
 \*Iodarsenic Guiraud  
 Iodarsine  
 Iodasclérine  
 Iodaselle Delamarre  
 \*Iodaseptine Cortial  
 \*Iodassium  
  
 Iodatoxine Laleuf  
 \*Iodaupébine  
  
 Iode Aucher  
 Iode liquide Lambiotte  
  
 \*Iodéine Montagu  
 Iodel  
  
 \*Iodentérol  
 Iode Oberlin  
 Iodeolaxine  
  
 \*Iode Organique Boissy  
 Iodéol Viel
- D<sup>e</sup> DEBAT, 60, r. de Prony, Paris.  
 id.  
 id.  
 22, av. Opéra, Paris.  
 22, r. Dutot, Paris.  
 97, r. de Vaugirard, Paris.  
  
 1, r. Dajot, Melun.  
 23, r. du Caire, Paris.  
  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 39, r. Fondaudège, Bordeaux,  
 et 11, square Marie-Louise,  
 Bruxelles  
 56, bd. Péreire, Paris.  
 97, r. de Vaugirard, Paris.  
 97, r. de Vaugirard, Paris.  
 THOMAS, Chemillé (Maine-et-Loire).  
 12, r. Paul-Bandry, Paris.  
 69, r. de Wattignies, Paris.  
 49, r. de Paradis, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 63, r. de la Faisanderie, Paris.  
 9, r. de la Perle, Paris.  
 12, r. Vavin, Paris.  
 8, r. du Petit-Musc, Paris.  
 22 bis, r. Silly, Boulogne-sur-Seine.  
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.  
 3, bd Beaumarchais, Paris.  
 7, r. Saint-Yves, Rennes.  
 42, av. de Breteuil, Paris.  
 10, imp. Milord, Paris.  
 304, r. St-Jacques, Paris.  
 SANOVA, 29, r. de Liège, Paris.  
 49, r. Thiers, Boulogne-s-Mer.  
 7, r. de l'Armorique, Paris.  
 4, chaussée de la Muette, Paris.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
 La Ferté-Macé (Orne).  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 49, bd Port-Royal Paris.  
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris (XII<sup>e</sup>).  
 4, r. Candolle, Paris.  
 17, r. Cadet, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 49, r. Hoche, Courbevoie.  
 7, r. Saint-Yves, Rennes.

- Iodeptol** 4, imp. de Béarn, Paris.  
**Iode Rozé** 2, allées de Chelles, Le Raincy.  
**Iodéyl Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.  
**\*Iodex** 46, r. Claude-Lorrain, Lille.  
**\*Iodhéma** 4, r. Candolle, Paris.  
**Iodhyrine du Dr Des-champs** 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.  
**Iodine Médol** J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).  
**\*Iodinjectol Jammes** 86, r. Michel-Ange, Paris.  
**Iodion** 94, r. Michelet, Alger.  
**\*Iodo-Bismuthate de Quinine** FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris;  
**\*Iodo-Bismuth Ercé** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Iodo-calcique** Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte Carlo.  
**\*Iodocalcium** Lab. Biologique de l'Île-de-France, 3, r. Laugier, Argenteuil.  
**Iodocéréal Balloz** 13, bd de la Chapelle, Paris.  
**Iodocol Carrion** 54, fg St-Honoré, Paris.  
**Iodogalle Vial** 4, pl. Croix-Rousse, Lyon.  
**Iodogéline** CROZET, à Cannes (A.-M.).  
**Iodo-Hamamelis Du-coq** Langeais (Indre-et-Loire).  
**Iodo-Juglan** LE GALLO, à Auray (Morbihan).  
**\*Iodogénol Pépin** à Courbevoie (Seine).  
**\*Iodo-Maisine** 48, r. d'Alésia, Paris.  
**\*Iodemétine Hautdidier** 37, r. Galilée, Paris.  
**\*Iodone Robin** 13, r. de Poissy, Paris.  
**\*Iodonésyl** 84, r. St-Lazare, Paris.  
**Iodonine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**Iodonion** 9, r. Victor-Letalle, Paris.  
**Iodonoses Clin** 20, r. d. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**\*Iodonucléol** 14, r. de Birague, Paris.  
**Iodonyl** 10, r. St-Lazare, Paris.  
**Iodoplasme** 85, rue des Morillons, Paris.  
**Iodoplume** PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.  
**Iodo Rubidium** Labor. DULCIS, pl. Ferry, Monte Carlo.  
**Iodo Salva Evesque** 10, r. de Belfort, Rennes.  
**\*Iodosan** DARRASSE, 13, r. Pavée.  
**\*Iodoscelline** 5 r. Lefebvre, Paris.  
**Iodosigol** CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).  
**Iodostarine Roche** 10, r. Crillon, Paris.  
**\*Iodotensyl Dubois** 16, bd Péreire.  
**Iodo-Theïne Henry** 39, r. Sclessin, Liège.  
**\*Iodo-Thyroidine Cati lon** 3, boul. Saint-Martin, Paris.  
**Iodo-Trypsine** 46, av. des Ternes, Paris.  
**Iodoveïne Leduc** JAUME, à Tamaris (Gard).  
**\*Iodo-Vitasine** H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
**Iodoxol** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
**\*Iodural Novat** BOMEL, Annonay (Ardèche).

- \*Iodurase**  
**\*Iodure d'Amidon**  
 Iodures Cros  
 Iodures Domergue  
**\*Iodure de fer**  
 Iodures Foucher  
 Iodures Laroze  
 Iodure Philippe  
**\*Iodures Pachaut**  
 Iodures Souffron  
 Iolase Corbière  
 Ionoides  
**\*Ionyl**  
 Iophénol  
 Iosorbine  
 I. O. Z. X.  
 Ipéca digitale Dausse  
**\*Irénine Gonnon**  
 Irol Churchill  
 Irovarine Tisy  
 Irradiol  
**\*Irrastérine Byla**  
**\*Isacène Roche**  
 Isobromyl  
 Isolual  
**\*Isonal**  
 Isorhinol  
**\*Isotonyl (Poudre de Lausanne)**  
**\*Ispaghul**  
 Ivula Pearson  
**\*Ixium**  
 Ixogyne
- 18, av. Hoche, Paris.  
 LUMIERE, 45, r. Villon, Lyon.  
 12, r. de Nice, Paris.  
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.  
 64, r. de la Rochefoucauld, Paris.  
 49, r. Grégoire-de-Tours, Paris.  
 2, r. des Lions, Paris.  
 14, r. Palais-Grillet, Lyon  
 130, bd Haussmann, Paris.  
 98, r. de Sèvres, Paris.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 13, r. Pavée, Paris.  
 La Biomarine, Dieppe (Seine-Inférieure).  
 P. C. B., 12, r. du Téléphone. Bruxelles.  
 VANDA, 16, r. Ficatier, Courbevoie.  
 155 bis, r. Lafayette, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 12, r. Castiglione, Paris.  
 R. & A. FEIGNOUX, 95, r. de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>).  
 16, r. de Rocroy, Paris.  
 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 10, r. Crillon, Paris.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.  
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.  
 87, r. Lafayette, Paris.  
 TROUETTE-PERRET, 15, r. des Immeubles - Industriels. Paris (XI<sup>e</sup>)  
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).  
 98, r. de Sèvres, Paris.  
 24, r. Paul-Bert. Paris.

## J

- \*Jabosulfène
- Jap
- \*Jécofluy
- \*Jécol
- Jecopeptol
- Jecorine
- Jecorsan Fornet
- Jéjunine
- \*Jemalt Wander
- Jicémine
- Jovine Brisson
- Juglamarine
- Jugland Gmet
- Juglandine Ferrouillat
- \*Juglane
- Juglanrégine
- Juniodyl
- Juraisin Macon
- Jus de raisins Challand
- Jus de raisins Pampryl
- Juvéol
- Juvigor
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- P. HARDY, 42, bd St-Marcel, Paris.
- 3, r. Watteau, Courbevoie.
- 13, r. Beudant, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Inst. de Microbiologie, à Sarrebruck.
- 42, av. de Breteuil, Paris.
- 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- 304, r. Saint-Jacques, Paris.
- 157, r. Championnet, Paris.
- WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.
- 27, faub. Montmartre, Paris.
- 33, r. Daguerre, Paris.
- à Chambéry (Savoie).
- 2, r. des Alpes, à Valence.
- THÉVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.
- Etabl. Œnologiques de Bourgogne, Mâcon (S.-et-Loire).
- Nuits-St-Georges (C.-d'Or).
- 2, villa de la Terrasse, Paris.
- 17, r. Cadet, Paris.
- Nuits-St-Georges (Côte-d'Or).

## K

- Kalastyl
- Kalmine
- \*Kalmigraine
- \*Kalmobrol
- Kalmogastrol
- Kalmopyrine
- Kamara C. 47
- \*Kaopro
- \*Kaolinase
- 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- METADIER, à Tours.
- MEUNIER, r. du Commerce, Montmarault (Allier).
- 60, r. Aug.-Comte, Lyon.
- 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- 49, r. Paradis, Paris.
- 47, qual Jemmapes, Paris.
- 54, r. Paris, Charenton (S.).
- 12, bd Saint-Martin, Paris.

- Kaolin Crookes  
 Kaolin Géo  
 \*Kaviase  
 Kéfir Carrion  
 Kéfir Caucase  
 Kélène  
 Kénapirine Chanteaud  
 \*Kénol  
  
 Képhaline Brunot  
 \*Kérafine  
  
 Keratolyne  
  
 Kératoplastol  
 \*Kerlactine  
 Kerlol Lerck  
 \*Ketophan  
 \*Kidoline  
  
 Kina-Coca-Kola  
  
 Kina Elzevir  
  
 \*Kinéchol  
 \*Kinectine  
  
 Kineurine Moncour  
  
 Kino           pancréatine  
   Henry  
 Kiotéine  
  
 \*Kipsol  
 Kitine  
 \*Kluchoï Remeaud  
  
 Koch-I-Cide  
 \*Kodos  
  
 Kola-fer Trouette  
  
 Kola Gmet  
 \*Kola granulé Astier  
 Kola granulé Roy  
 Kolagum  
 Kolamalt  
  
 Kola Midy  
 \*Kola Monavon  
 Kola  
  
 Kola Pichat  
 Kolarsan  
 Kolarsine Pautauberge  
 Kolatinés
- 2, Fg St-Denis, Paris.  
 20, cours Morand, Lyon.  
 CANAT, 76, av. d'Italie, Paris.  
 54, fg. Saint-Honore, Paris.  
 53, r. de Spa, Bruxelles.  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 54, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
 MILLET & GUILLAUMIN, 8,  
   r. Richer, Paris et 5, r. Am-  
   broise-Thomas.  
 10, pl. Thiers, Le Mans.  
 THERAPLIX, 98, r. de Sèvres,  
   Paris.  
 HYGIO DONTIS, Croissy-sur-  
   Seine (S.-et-O.).  
 L. DORDIN, Harnes (P.-de-C.).  
 1, rue Lassalle Lyon.  
 à Saint-Etienne, 63, pl. St-Roch.  
 6, r. des Cigognes, Strasbourg.  
 GALLIER, 38, bd Montpar-  
   nasse, Paris.  
 GRANVAL, 12-14, r. Fery,  
   Reims.  
 Lab. des Etabl. SALLE, 4, r.  
   Elzévir, Paris.  
 29, r. des Marchands, Avignon.  
 12, r. du Chemin-Vert, Ville-  
   neuve-la-Garenne.  
 49, av. Victor-Hugo, Bou-  
   logne-sur-Seine.  
 HENRY, 39, r. de Sclessin,  
   Liège (Belgique).  
 53, bd de Verdun, Fontenay-  
   sous-Bois.  
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.  
 VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.  
 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-  
   sur-Seine.  
 LEISYN, 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 rte de Moulleau, Arcachon  
   (Gironde).  
 15, r. Immeubles-Industriels,  
   Paris.  
 27, fg. Montmartre, Paris.  
 45, r. du Dr-Blanche, Paris.  
 81, boul. Suchet, Paris.  
 4, r. des Carmes, Paris.  
 U. C. E. P., 5, r. Labroque,  
   Strasbourg.  
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
   Bruxelles.  
 5, c. Charlemagne, Lyon.  
 45, fg St-Denis, Paris.  
 10, r. Constantinople, Paris.  
 12, r. du Helder, Paris.

- Kola Venaize  
 \*Koumyl  
 Kréazone  
 Kréofos Novat  
 Kreptol  
 \*Kydalose  
 \*Kymosine Rogier
- 4, r. des Carmes, Paris.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 TROUETTE, 15, r. des Im-  
 meubles-Industriels, Paris.  
 BOMEL, Annonay (Ardèche).  
 LOUINET, 39, r. de l'Arcade,  
 Paris.  
 DALIN, 49, quai Saint-Vin-  
 cent, Lyon.  
 56, boul. Péreire, Paris.

## L

- \*Lab-Lacto-Ferment  
 Laborol  
 \*Labylox  
 \*Laccodermes Brisson  
 \*Lachésine  
 \*Lacpinine  
 Lacrenile Meurice  
 \*Lac-Ser  
 \*Lactagol  
 \*Lactaris  
 Lactéol Boucard  
 Lactéomaltol  
 Lactermol Vigier  
 \*Lacticholéine Tulivet  
 Lactifère  
 Lactigélose  
 \*Lactimase Couturieux  
 \*Lactobacilline  
 Lactobaotyl  
 \*Lactobyl  
 Lactocalcine  
 \*Lactochol  
 Lactocoaguline Fabre  
 Lacto-Diastal  
 Lacto-ferment  
 Lactofermentine  
 Lactogélose
- MIALHÉ, 8, r. Favart, Paris.  
 CHAUVIN-AUBENAS.  
 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-  
 Bois (Seine).  
 157, r. Championnet, Paris.  
 RENAUD, 2, r. Demours,  
 Paris.  
 FISCH, 4, r. d'Ilzach, Mulhouse.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 49, bd Port-Royal, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 Lab. Central, 129, r. de Turenne,  
 Paris.  
 30, r. Singer, Paris.  
 9, r. Rodier, Paris.  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-  
 Laye.  
 3, r. Capitaine-Scott, Paris.  
 DUCLOY, Arques (P.-de-C.).  
 18, av. Hoche, Paris.  
 13, r. Saint-Maurice, Nanterre  
 (Seine).  
 TORAUDE, 22, r. de la Sor-  
 bonne, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 33, r. de la Haie-Coq, Aubervil-  
 liers.  
 7, av. Marceau, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 THEVENOT, r. des Roses, Dijon.  
 DUCLOY et C<sup>ie</sup>, Arques (P.-de-C.)

**\*Lactolaxine Fydau**  
**Lacto Mannitase**  
**Lacto-Magnésie Vita**  
**Lactomorrhuel**

**Lactophéine**

**Lactophorine**  
**Lactophosphine**  
**Lactoseptyl Legrand**  
**\*Lacto-Sérum Lavril**  
**Lactosérum R. M.**  
**Lactosone**  
**Lactozymase B.**  
**Lactyl Meurice**  
**Lait albumineux Mol-**  
**lard**  
**Lait allégé Dieticus**  
**Lait Berna**  
**Lait de cèdre Sapolan**

**\*Lait de magnésie Phil-**  
**lips**

**Lait de Sapolan**  
**Lait de Soufre Sapolan**

**\*Lait Gallia**  
**Lait Gloria**

**\*Lait Guigoz**  
**Lait Lepelletier**

**\*Lait Mont-Blanc**  
**Lait Ofco**

**\*Laits Dardelet**  
**\*Lait sec C. G.**

**Lait Sec Lo-lo**  
**Lait sec Nutricia**  
**Lait Seklé**

**\*Laminarol**  
**Laminiode**  
**Laminolax**

**\*Lansoyl**  
**\*Lantol Couturieux**  
**Larocaïne**

**\*Larosane Roche**  
**Laryngolan**  
**\*Laurénol**  
**\*Lauriatol**

**Lavement mucobary-**  
**tiné**

**Lax**  
**Laxadonal**

**Laxagarine**

4, r. Lamotte-Picquet, Paris.  
 37, r. de Tivoli, Bordeaux.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
**DELPECH**, 5, r. Danton,  
 Paris.

**CACHAT**, Evian-les-Bains  
 (Hte-Savoie).

9, r. de la Gare, Levallois-Perret.  
 8, r. de la Pompe, Paris.

11 pl. Louis XII, Blois, (L.-et-C.).  
 26, bd des Batignolles, Paris.

146, av. Champs-Élysées, Paris.  
 17, r. Cadet, Paris.

52, r. La Bruyère, Paris.

61, av. Louise, Bruxelles.

25, cours Lafayette, Lyon.

15, quai de Bourbon, Paris.

199 bis, bd St-Germain, Paris.

**CAVAILLÈS**, 29, r. de Singer,  
 Paris.

O. C. P., 108, r. de Picpus.

29, r. Singer, Paris.  
 id.

11, r. de Prony, Paris.

19, bd. Malesherbes, Paris.

19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.

48, r. Ampère, Paris.

Rumilly (Haute-Savoie).

25, av. Michelet, St-Ouen.

**Bonnard** (Yonne).

Sté de Spécial. Diététiques et  
 Pharm. (COW et GATE),  
 22, r. des Belles-Feuilles,  
 Paris.

123, r. de Paris, Saint-Denis.

65, bd Sébastopol, Paris.

51, r. Rennequin, Paris.

132, r. de Turenne, Paris.

29, av. de St-Mandé Paris.

id.  
 5, r. de la Paix, Paris:

18, av. Hoche, Paris.

**HOFFMANN LA ROCHE**,  
 10, r. Crillon, Paris.

id.  
 24, r. Jardel, Bordeaux.

19, r. Drouot, Paris.

31, av. Foch, La Garenne-  
 Colombes (Seine).

145. r. Yves-Le-Goz, Versailles.

19, av. Secrétan, Paris.

**LOUINET**, 39, r. de l'Arcade,  
 Paris.

5, av. des Tilleuls, Paris.

- \*Laxamalt**  
**Laxamer Lefèvre**  
**Laxatif Châtel-Guyon**  
**Gubler**  
**\*Laxatifs Miraton**  
**Laxatine Mory**  
**Laxatone Déjardin**  
**Laxaul**  
**Laxia Dannec'h**  
**Laxinol-Vichy**  
**\*Laxocholéine Tulivet**  
**\*Laxogélose Tulivet**  
**Laxoil**  
**Laxoléine**  
**Laxol Fraudin**  
**Laxo-lin**  
**Laxolip Henry**  
**\*Laxopectine Girard**  
**Laxophore Brachin**  
**Laxor**  
**Lebnot**  
**Lécithine Adrian**  
**Lécithine Clin**  
**\*Lécithine Vacheron**  
**Lécithine Vial**  
**Lécithosine Rovin**  
**Lenicade Brisson**  
**\*Lénicure-Vichy**  
**\*Léniforme**  
**\*Léophani**  
**\*Léotamine**  
**Leptab**  
**Leptandrine Royer**  
**\*Leucagine**  
**Leucaginol**  
**Leucobules Gallier**  
**Leucoril**  
**\*Leucoseptyl**  
**Leucosérum**  
**Levaine**  
**Levulose Rogier**  
**Levurase**  
**\*Levure B. 17**  
**Levure Boss**  
**Levure Coirre**  
**LICARDY, 38, bd Bourdon,**  
**Paris-Neuilly.**  
**52, rue Decamps, Paris.**  
**70, r. Legendre, Paris.**  
**48, r. d'Alésia, Paris.**  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois,**  
**Bruxelles.**  
**10, r. Parent-de-Rosan, Paris.**  
**pl. Guillaume-le-Conquérant, à**  
**Falaise (Calvados).**  
**64, r. des Tournelles, Paris.**  
**PATRICE, à Vichy.**  
**52, r. de Poissy, St-Germain-en-**  
**Laye.**  
**id.**  
**74, r. Monge, Paris.**  
**MILLET, à Rambouillet.**  
**4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.**  
**182, av. de Versailles, Paris.**  
**39, r. Sclessin, Liège.**  
**48, r. d'Alésia, Paris.**  
**à Joinville (Haute-Marne).**  
**Lab. Biologique de l'Île-de-**  
**France, 3, r. Laugier, Argen-**  
**teuil.**  
**23, r. de Douai, Lille.**  
**9, r. de la Perle, Paris.**  
**20, r. des Fossés-Saint-Jac-**  
**ques, Paris.**  
**14, r. Victor-Hugo, Lyon.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**13, r. de Poissy, Paris.**  
**157, r. Championnet, Paris.**  
**24, av. Mathurin-Moreau, Paris.**  
**26, r. Péterelle, Paris.**  
**11, square Marie-Louise, Bru-**  
**xelles.**  
**39, r. Fondaudège, Bordeaux.**  
**10, r. Saint-Lazare, Paris.**  
**223, r. Saint-Martin, Paris.**  
**22, r. de la Sorbonne, Paris.**  
**22, r. de la Sorbonne, Paris.**  
**38, bd Montparnasse, Paris.**  
**18, r. Daguerre, Paris.**  
**121, av. Gambetta, Paris.**  
**66, r. Nationale, Lille.**  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois,**  
**Bruxelles.**  
**56, bd Péreire, Paris.**  
**CHARMAISON, av. de Royat,**  
**Chamalières (P.-de-Dôme).**  
**22, r. de la Sorbonne, Paris.**  
**Lab. G. CESAR & B. BOSS, Be-**  
**sançon (Doubs).**  
**5, bd Montparnasse, Paris.**



- Levure de bière  
 Levure de bière Debouzy  
 Levure Déjardin  
 \*Levure fraîche Myceta  
 \*Levurine extractive Couturieux  
 Levurine brute  
 Levuritin  
 \*Levuromaltine Dejar-  
 din  
 Libérine  
 Licardet Brisson  
 \*Lichénose  
 \*Lientine Grémy  
 Ligatures chirurgi-  
 cales  
 Limital  
 Limmerol  
 \*Limon Churchill  
 \*Limonade Godfrin  
 \*Limonade (Citrose de  
 Vichy)  
 Limonade hypotensive  
 \*Linadéline  
 \*Lin Tarin  
 Liniderme  
 \*Lioncyl  
 Lipasonol  
 \*Lipaurol  
 Lipex  
 \*Lipiodol Lafay  
 Lipobil  
 \*Lipo-Bismuth Ercé  
 \*Lipocérébrine  
 Lipochol Byla  
 Lipocytol Grémy  
 \*Lipodeterpénol Zyma  
 Lipogazes dermatolo-  
 giques  
 Lipoféine  
 Lipogyre Ciba  
 \*Lipoides Iscovesco  
 \*Lipoiiodine Ciba
- ADRIAN, 9, r. de la Perle,  
 Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.  
 4, r. Bellart, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 id.  
 FEIGEL, à Lutterbach  
 (Haut-Rhin).  
 DEJARDIN, 10, r. Parent de-  
 Rozan, Paris.  
 CAPIN, Roquefort (Landes).  
 157, r. Championnet, Paris.  
 DUCLOY et C<sup>ie</sup>, Arques, (P.-de-  
 C.).  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-  
 Bois, Bruxelles.  
 Lab. ROMON, 6, r. Beldane,  
 Paris.  
 12, r. de Strasbourg, Paris.  
 12, r. Castiglione, Paris.  
 5, av. Watteau, Nogent-sur-  
 Marne.  
 7, r. Galvani, Paris.  
 PACHAUT, 130, bd Haussmann  
 Paris.  
 Lab. VARIOT, 151 bis, Grande-  
 Rue, Villemomble.  
 6, r. Dombasle, Paris (XV<sup>e</sup>).  
 24, bd Sébastopol, Paris.  
 6, r. Robert-Estienne, Paris.  
 30, r. N.-Dame-des-Victoires,  
 Paris.  
 LECOQ et FERRAND, 14, r.  
 Gravel, Levallois-Perret.  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
 22, r. du Landy, St-Ouen.  
 29, pl. Wilson, à Denain.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 LEMATTE et BOINOT, 52,  
 r. Labruyère, Paris (IX<sup>e</sup>).  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 4, r. Bellart, Paris.  
 LECOQ & FERRAND, 14,  
 r. Gravel, Levallois.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 id.  
 107, r. des Dames, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon

**Lipol**

Lypolysine Merminod

Lipolysine Martinet

\*Liposeptine

\*Liposplénine du D<sup>r</sup> Groc

Lipothine

Lipo-Vaccins

\*Lipovita

Liqueur de l'Etoile antiasthmatique

Liqueur d'Hermès

Liqueur Laprade

Liqueur Laville

Liqueur peptophosphorique

Liqueur de Pittermont

Liqueur Talobre

Liqueur à la Thyroïdine Bouty

Liqueur végétale Narud

Liq. organiques inject

Liseronine

Listérine

\*Listose Vicario

\*Lita Cortial

Litharsyne Ferré

Lithiné Henry

\*Lithino-formine

Liverine

\*Lobélians

\*Lobéline

\*Lobéline Sandoz

\*Lobuline

Lofodol

\*Logaphos

\*Loraga

Lortocarboll

Lotion végétale Pachau

Luargol

Luatine

Lual

Luarsyl

Luatol

Luchon

Lucinine

\*Lucodal

\*Ludin

Luerol

\*Lugocalcion

Lusitol

\*Lusoforme

route Nationale, Wattignies (Nord).

49, r. de Paradis, Paris.

16, r. du Petit-Musc, Paris

2, pl. des Vosges, Paris.

14, r. des Minimes, Paris.

JOSSE, pl. Wilson, Denain.

32, r. de Vouillé, Paris.

14 r. de Birague, Paris.

MONIN, 49, r. de Maubeuge, Paris.

12, bd Saint-Martin, Paris

49, r. de Maubeuge, Paris.

20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.

ADRIAN, 9, r. de la Perle, Paris.

2, rue de Paris, à Douai.

Saint-Girons (Ariège).

3, rue de Dunkerque, Paris.

38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.

BOUTY, 3, r. Dunkerque, Paris.

19, r. Drouot, Paris.

5, r. de la Paix, Paris.

17 bd Haussmann, Paris.

CORTIAL, 7, r. de l'Armorique, Paris.

19, r. Gregoire-de-Tours, Paris.

39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).

229, cours Gambetta, Lyon.

5, r. de la Paix, Paris.

LALFUR, 20, r du Laos, Paris.

BRUNEAU, 17, r. de Berri, Paris.

20, r. Vernier, Paris.

87, r. de Bourgogne, Paris.

98, r. de Sèvres, Paris.

9, av. Jean-Jaurès, Lyon.

13, rue Pagès, Suresnes.

86, bd Port-Royal, Paris.

130, bd Haussmann, Paris.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

2, av. Parmentier, Paris.

BAILLY, 15, r. de Rome, Paris, id.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

C<sup>ie</sup> Fermière de Luchon (Haute-Garonne).

18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.

2, quai Paul-Bert, Tours.

REY, 12, r. Montmartre, Dijon.

37, r. Pajol, Paris.

NOVALIS, Oullins (Rhône).

7, passage Thionville, Paris.

15, r. d'Argenteuil, Paris.

- Lutéovar**  
**Lux-Gaillac**  
**Lycétol Vicario**  
**Lyciflore**  
  
**Lycobile**  
**Lyméogène**  
**Lymphactol**  
**\*Lynévol**  
**\*Lysacrème L. M. L.**  
**\*Lysarthrol**  
**\*Lysaxins L. M. L.**  
**Lysiode**  
**Lysol**  
**Lysolats**  
**Lysomol**  
  
**Lysurol**
- 14 bis, r. de la République, à  
 Ermont (Seine-et-Oise).  
 av. du Mar.-Foch, Gaillac (Tarn).  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 HOURTOULLE, 11, r. des  
 2-Ponts, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 115, r. St-Honoré, Paris.  
 26, r. Cambon, Paris.  
 4 bis, r. de Lyon, Paris.  
 112, r. des Pyrénées, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 78, bd Beaumarchais, Paris.  
 65, r. Parmentier, Ivry (Seine).  
 65, r. Parmentier, Ivry.  
 HENDRIX, à Anvers (Bel-  
 gique)  
 112, r. de Gerland, Lyon.

## M

- \*Magbromyl**  
**\*Magiodyl**  
**\*Magistère de Bismuth**  
**Magiose**  
**Magnacalcine**  
  
**Magnehyl**  
**Magnécal**  
  
**Magnéclo**  
**\*Magnécythine Dr Tissot**  
**\*Magnéclax**  
  
**Magnésia Régnier**  
  
**Magnésie Bismurée**  
**Magnésie Drouet**  
**Magnésie Durel**  
**Magnésie Carlo Erba**  
**Magnésie Dr Gustin**  
  
**Magnésie Henry**  
**Magnésie hydratée**  
**Magnésie Roy**
- 10, r. de la Mairie, Ivry (Seine)  
 id.  
 2, bd Pershing, Paris.  
 178, r. Montmartre, Paris.  
 SANOVA, 41, r. d'Amsterdam  
 Paris.  
 126, r. de la Pompe, Paris  
 54, r. des Francs-Bourgeois,  
 Paris.  
 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
 34, bd de Clichy, Paris.  
 FAURE et DUSSUEL, Aix-les-  
 Bains.  
 Fontainebleau (Seine-et-Mar-  
 ne).  
 SCOTT, 348, r. St-Honoré, Paris.  
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).  
 7, bd Denain, Paris.  
 105, bd Malesherbes, Paris.  
 BRISSON & C<sup>ie</sup>, 157, r. Cham-  
 pionnet, Paris.  
 5, r. de la Paix, Paris.  
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).  
 81, bd Suchet, Paris.

- Magnésie Storke 71, av. Victor-Emmanuel-III.  
Paris.
- \*Magnésio-Cacodyline JAMMES, 86, r. Michel-Ange,  
Paris.
- Magnésion 27, r. Poids-de-la-Farine, Mar-  
seille.
- Magnésium chloruré 107, av. de la Reine, Boulogne-  
sur-Seine.
- Magnésium Grori- 12, pl. de la Révolution, Besan-  
chard çon.
- \*Magnésium Hardy 42, bd St-Marcel, Paris.  
(Sirop et Tablette-  
Bouillon)
- Magnésol 37, r. Galilée, Paris.
- \*Magnésio-tubes Robi- Moret-sur-Loing (S.-et-M.).  
net
- \*Magnésiovules 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- Magnétol ROUX, 58, r. de Maubeuge,  
Paris.
- Magnétone 10, r. Vignon, Paris.
- Magnidia 17, r. du Midi, Vincennes
- Magnogène 6, r. Bridaine, Paris.
- \*Magol Churchill 12, r. Castiglione, Paris.
- \*Magsalyl Mg 10, r. de la Mairie, Ivry (Seine).
- Maïzena 17, r. du Helder, Paris.
- \*Malarsan P. AUBRY, 54, r. de la Bien-  
faisance, Paris.
- Maltase Fanta Brasserie FANTA, 77, rte d'Or-  
léans, Montrouge (Seine).
- Malt Barley id.
- Malt Ethel Usines ETHEL, Schiltigheim  
(Bas-Rhin).
- \*Maltea Moser 8, ch. de Montbrillant, Lyon.
- \*Malt français Déjardin 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.  
(extrait)
- Maltine Gerbay à Roanne (Loire).
- Malt kneipp Juvisy-sur-Orge (S.-et-O.).
- Maltine-Phénix 14, r. de Birague, Paris.
- Malt Moritz 189, r. de Vaugirard, Paris.
- Maltolax U. C. E. P., 5, rue Labroque,  
Strasbourg.
- Malt-Oléol 20, Fg Poissonnière, Paris.
- \*Maltosan 151 bis, route de Joinville,  
Champigny (Seine).
- \*Malt Pailleté 77, r. de Miromesnil, Paris.
- Malt Régina 10, r. Pajol, Paris.
- Malt Strauss 12, r. Broca, Paris.
- \*Malt Wander 151 bis, route de Joinville,  
à Champigny (Seine).
- Malzémose 18, r. de Ménilmontant, Paris.
- Mamelle Endocrisines 7, r. Biscornet, Paris.  
Fournier
- Mamelline Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Mammol Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
Dames, Paris.
- \*Mancobène 32, r. de l'Ouest, Paris.

- Mandragol**  
**\*Mangaine**  
**Manganéol**  
**\*Manganésia**  
**Manganifer**  
**Mangano-Calciqne**  
**Manganoglobine**  
**\*Mangano Phosphat Julien**  
**Mangaphos**  
**\*Mangarsenic**  
**Manglynoi Ducatte**  
**\*Mangratinas**  
**Mannitine**  
**Marabout**  
**Marcynase**  
**\*Marimino**  
**\*Marinol**  
**Mariode**  
**Marnal**  
**Marron d'Inde Dausse**  
**Marronine Huard**  
**\*Marrubène**  
**\*Marrubiase**  
**\*Marrucol**  
**Marruséra**  
**Marsyle Clin**  
**Marubor**  
**Masbi**  
**Mas de la Vil.**  
**Masglandol**  
**\*Maté Douglas**  
**Matéine Dufert**  
**Matico de Grimault**  
**Maya Bulgare**  
**Médicament de Saint-Boes**  
**\*Medicoferments Boss.**  
**Medocain**  
**Mégathion**  
**Ménacrine**  
**\*Menatol**  
**Ménopausine**  
**\*Menosedine**
- GAILLON, 113, bd Voltaire, Paris.**  
**71, r. Sainte-Anne, Paris.**  
**Usine du Blossét, Moulin-sur-Yèvre (Cher).**  
**Produits Dannec'h, 64, r. des Tournelles, Paris.**  
**VIGIER, 9, r. de la Gare, Levallois (Seine).**  
**à Saint-Amand-Montrond.**  
**Lab. du Gastrocarbone, Saint-Louis (B.-du-Rhône).**  
**105, r. de Rennes, Paris.**  
**4, imp. de Béarn, Paris.**  
**D<sup>r</sup> LAVOUÉ, Rennes (I.-et-V.).**  
**31, r. Francs-Bourgeois, Paris.**  
**163, r. de Flandre, Paris.**  
**62, r. Carnot, Vernon (Eure).**  
**6, r. Trencavel, Béziers.**  
**7, r. Princesse, Paris.**  
**191, Fg St-Antoine, Paris.**  
**à Dieppe (Seine-Inférieure).**  
**BERGER, 14, r. des Pyramides Paris.**  
**10, r. du Quatre-Septembre, Paris.**  
**4, r. Aubriot, Paris.**  
**3, av. Orléans, Paris.**  
**2, pl. des Vosges, Paris.**  
**COMTE, 60, r. St-Guilhem, Montpellier.**  
**COIRIER, 69, av. du Maine, Paris.**  
**133, r. Lecourbe, Paris.**  
**20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.**  
**VALENTIN, 1, r. d'Arras, Béthune.**  
**7, pass. Thionville, Paris.**  
**Arles-sur-Rhône.**  
**156, r. des Fauvelles, Courbevoie.**  
**62, Champs-Élysées, Paris.**  
**163, r. de Flandre, Paris.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**322, r. Saint-Honoré, Paris.**  
**par Orthez (Basses-Pyrénées).**  
**10, r. de la Viotte, Besançon.**  
**71, r. de la Course, Bordeaux.**  
**OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.**  
**18, r. Ferdinand, Flocon, Paris.**  
**BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.**  
**9, pl. de la Paix, Mulhouse.**  
**Demasles, à Vienne (Isère).**

- \*Ménovarine  
Mensorrhine
- \*Mensuosedyl  
Mentholina  
Méral  
Mercuriaux Vigier  
Mercurochrome 220  
Méroléol Salle  
Mésarca Roche
- \*Mésosome  
\*Mésogastrine
- \*Mesothine
- \*Mesothorium Rhemda  
Mésothorium Buisson
- \*Métacuprol
- \*Métaformine  
Métalase  
Métallosal
- Métarsine Jasma
- Métasérum  
Metasulfol Vigier
- \*Méta-Titane  
Métaux colloïdaux
- \*Méta-vaccins  
Métharfer Bouty  
Métharsinate Clin
- Métharsol Bouty
- \*Méthylarsinates Bouty  
Méthylarsinate Vicario  
Méthylarsinate Vigier
- \*Métophan
- \*Métricine
- \*Metritols  
Métrostyptal Grori-  
chard  
Mexyl
- \*Mialbaine
- \*Micelliode  
Micranyl
- \*Microlyse
- \*Mictasol  
Mictasovules
- \*Mictophile
- \*Mictoseptol
- 211, r. de la Convention, Paris.  
EON, 3, r. des Rouairies, Dinan  
(C.-du-N.).  
AUGIER, 2, r. des Lombards,  
Paris.  
GUIGNIER, Bois-Colombes.  
61, av. Louise, Bruxelles.  
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
AMECOUSEMA, 25, r. St-Au-  
gustin, Paris (II<sup>e</sup>).  
4, r. Elzévir, Paris.  
21, pl. des Vosges, Paris.  
17 bis, av. Parmentier, Paris.  
37, av. Jules-Coutan, Ivry-sur-  
Seine.  
RHEMDA, 17, r. d'Hauteville,  
Paris.  
id.  
98, r. de Sèvres, Paris.  
5, r. François-Ponsard, Paris.  
AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.  
252, fg. St-Martin, Paris.  
LÉO, 11, square Marie-Louise,  
Bruxelles.  
JARMON, 4, pl. de la Gare,  
Tunis.  
BOUTY, 3, r. de Dunkerque,  
Paris.  
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
MÉTADIER, à Tours.  
COUTURIEUX, 18, av. Hoche,  
Paris.  
MÉTADIER, à Tours.  
3, r. de Dunkerque, Paris.  
20, r. des Fossés-Saint-Jacques,  
Paris.  
3, r. de Dunkerque, Paris.  
3, r. de Dunkerque, Paris.  
17, bd Haussmann, Paris.  
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
HY, 61, av. de Choisy, Paris.  
LEBRETON, 23, gde Rue As-  
nières.  
127, bd St-Michel, Paris.  
12, pl. de la Révolution, Besan-  
çon.  
6, r. des Dames, Paris.  
8, r. Favart, Paris.  
31, r. des Francs-Bourgeois,  
Paris.  
GREMY, 14, r. Clichy, Paris.  
10, r. Strasbourg, Paris.  
28, r. du Four, Paris.  
id.  
45, fg St-Denis, Paris.  
29, fg de Bourgogne, Orléans.

- \*Miotualine
- Migrainol
- Minéraline du D<sup>r</sup> Baud
- Minéralogène
- \*Minergil
- Minérol
- Minérolaxine
- Mintosal
- \*Miroxyl
- \*Mitigans
- Moka du Travailleur
- Mokavène
- Molavose
- \*Molène
- Mondorasme
- Moranyl
- \*Moréthyl Dausse
- \*Morisland
- Moroïdol
- \*Morrhualène Gautier
- \*Morrhuéline Jungken
- Morrhaine Puy
- Morrhual
- \*Morrhuxine
- \*Morsine
- \*Morubiase Crosnier
- Morubiline
- Moruemalt
- Moruphyle
- \*Moruxase Abadie
- Mothersill's seasick  
remedy
- Mouches Albespeyres
- \*Movebil
- \*Mucicarbos
- \*Mucilaxine
- Mucilose
- \*Mucinum
- Mucobarytine
- \*Mucobismuthine.
- Mucogène Astier
- Mucoléine
- \*Mucosodine
- \*Mucyllium
- CLUZEL, 60, cours E.-Zola,  
Lyon.
- 16, c. Gambetta, Lyon.
- 14, r. de Birague, Paris.
- 4, pl. Croix-Rouge, Lyon.
- 77, r. M. romesnil, Paris.
- 10, r. Richelieu, Paris.
- D<sup>r</sup> LETANNEUR, 87, av. Bor-  
righione, Nice.
- JOUFFRAY, Bourgoin (Isère).
- 32, r. de l'Ouest, Paris.
- 6, r. Robert-Estienne, Paris.
- 36, r. de Verdi, Nice.
- 16, r. de Rocroy, Paris.
- 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- 95, r. de Turenne, Paris.
- SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
Paris.
- 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- CHEVILLON, 99, r. de Paris,  
Massy (S.-et-O.).
- 7, r. Guillaume-Budé, Mont-  
geron.
- 17 bis, avenue Parmentier,  
Paris.
- 105, r. de Normandie, Cour-  
bevoie (Seine).
- à Grenoble.
- 8, r. Vivienne, Paris.
- 163, r. de Flandre, Paris
- 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- 44, r. de Lagny, Montreuil.
- 32, r. Joubert, Paris.
- U. C. E. P., 5, r. Labroque,  
Strasbourg.
- BOST, Villefranche (Rhône).
- 3, pl. Intérieure St-Michel,  
Toulouse.
- 5, r. de Provence, Paris.
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
- 5, pl. Bisson, Lorient.
- Lab. E. MILLET, à Rambouillet  
(S.-et-O.).
- id.
- id.
- CHANTEREAU, 26 bis, r.  
Dombasle, Paris.
- 145, r. Yves le Coz, Versailles.
- id.
- 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
- LANDON, av. Baraduc, Châtel-  
Guyon.
- 37, r. de la Fédération, Paris.
- BERNARD-GARCIN, Saint-Sa-  
turnin les-Avignon (Vaucluse)

- Mugrizol Dumesnil** 10, r. du Plâtre, Paris.  
**Muqueuse Endocrisi-** 7, r. Biscornet, Paris.  
**nes Fournier**  
**\*Muronos du Dr Robert** SILBERT RIPERT, 30, r.  
**Jacques** Benedit, Marseille.  
**Musclanol** 13, r. St-Agricol, Avignon.  
**Musculargyre** FEIGNOUX, 95, r. de Turenne,  
 Paris.  
**Musculogenol** 121, r. Victor-Hugo, Houplines  
 (Nord).  
**\*Musculosine Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
**Mustérole** 5 bis, rue des Haudriettes, Pa-  
 ris.  
**Mutandine** GREMY, 14, r. de Clichy,  
 Paris.  
**\*Muthanol** 55, bd de Strasbourg, Paris.  
**Muthoquinol** 4, impasse de Béarn, Paris.  
**Muxol** Lab. SERVIER, à Orléans.  
**Muxyl** 77, bd de Grenelle, Paris.  
**Mycodermine** 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.  
**Mycolactine** 122, r. du Cherche-Midi, Paris.  
**\*Mycolysine Doyen** 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.  
**Mycidol Badel** à Valence-sur-Rhône.  
**Mydriasine** Labor. DULCIS, pl. Clichy,  
 Monte-Carlo.  
**\*Myoden** E. DAUPEZ, 37, r. des Lois,  
 Toulouse.  
**Myodine Mauchant** 14, r. de Birague, Paris.  
**\*Myoral** 20, r. des Ecoles, Paris.  
**Myo-Serum** 168, bd St-Germain, Paris.  
**Myosine (forte et faible)** Labor. DULCIS, pl. Clichy,  
 Monte Carlo.  
**Myostone Merminod** 49, r. de Paradis, Paris.  
**\*Myothermine** 47, r. Bokanowski, Asnières.  
**\*Myovarsyl** 89, r. Cherche-Midi, Paris.  
**Myrcol** 74, quai Jemmapes, Paris.  
**Myrtanol** 30, r. N.-D.-des-Victoires, Pa-  
 ris.  
**Myrtilline Demasle** à Vienne (Isère).

## N

- Nader** 6, rue de l'Ecole, Versailles  
 (S.-et-O.).  
**Nadolor** 191, fg St-Antoine, Paris.  
**Nadorine** 25, r. Tocqueville, Paris.  
**\*Nafodine Logeais** 22 bis, r. de Silly, Boulogne-  
 sur-Seine.



- Naphthocarbène  
 Narcotile Bengué  
 \*Narcyl  
 Narsenol  
 Nasale Ymera  
 \*Nasargine  
 \*Nasobore  
 Nasocaine  
 \*Nasosulfolarsan  
 \*Natibaine  
 \*Natirose  
 \*Natrosyl  
 Naza-capsules  
 Nazilante  
 \*Nazinette  
 Nazogyne  
 Nazolène  
 Nazophyl Darva  
 \*Néalgyl  
 Nécessaire d'Accouchement  
 Néfitol  
 Neigotan  
 \*Néoarsite  
 \*Néo-Arsycodile  
 Néo-Asclérol  
 \*Néo-Biol  
 Néoby  
 \*Néo-Calculine  
 \*Néocardyl  
 \*Néo-chloral Nau  
 \*Néo-Collargol  
 \*Néo-Dmegon  
 \*Néo-Dmetys  
 Néo-Dispositif Ravaut  
 Néo-Emétinol  
 Néofilhos le Perdril  
 Néo-Galy  
 Néoglobuline  
 Néoiacol  
 Néo-Iodure Ménard  
 Néo-Kola Lumière  
 Néolactine  
 \*Néo-Laxatif Chapotot  
 \*Néol Bottu  
 Néolides H. B.
- FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.  
 47, r. Blanche, Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 28, r. de Seine, Paris.  
 MAIRE, 171, r. de Belleville,  
 Paris.  
 102, r. Vincent, Marseille.  
 Lab. ANINAT, Nîmes (Gard).  
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.),  
 27, r. de la Procession, Paris.  
 27, r. de la Procession, Paris.  
 127, bd St-Michel, Paris.  
 Berger, 29, fg de Bourgogne,  
 Orléans.  
 ANINAT, Nîmes (Gard).  
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.  
 DAUPEZ, 37, r. des Lois,  
 Toulouse.  
 ODILIA, 42, r. du Mont-Cenis,  
 Paris.  
 19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.  
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.  
 LUCINIA, 154 bis, r. de Breteuil,  
 Marseille.  
 24, r. de Montessuy, Paris.  
 48, bd La Tour-Maubourg, Paris,  
 7, r. Galvani, Paris.  
 62, r. de la Tour, Paris.  
 45, r. Caumartin, Paris.  
 4, pl. du Val, à Vanves (Seine).  
 TROUETTE-PERRET, 15, r.  
 des Immeubles-Industriels,  
 Paris.  
 21, r. Violet, Paris.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 21, Gde-Rue Argenteuil (S.-et-O.)  
 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 id.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 2, r. de Rivoli, Paris.  
 11, r. Milton, Paris.  
 MOUNEYRAT, Villeneuve-la-  
 Garenne (Seine).  
 65, r. d'Hauteville, Paris.  
 105, bd Malesherbes, Paris  
 3, r. République, Lyon.  
 45, rue Villon, Lyon.  
 73, av. de Mariville, Le Parc-  
 St-Maur (Seine).  
 56, bd Ornano, Paris.  
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris,  
 id.

- \*Néolyse 55, bd de Strasbourg, Paris.
- Néo-Mésarca Roche 10, r. Crillon, Paris.
- Néo-Mig 229, cours Gambetta, Lyon.
- \*Néo-Neurosine 1, quai Aulagnier, Asnières.
- \*Néo-Pancarpiné 5, r. François-Ponsard, Paris.
- \*Néophagc JAMMES, 86, r. Michel-Ange, Paris.
- Néo-Phanol 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
- Néophos 74, quai Jemmapes, Paris.
- \*Néo-Physiô DROUET & PLET, Rueil-Mal-maison.
- Néo-Pituitairine OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Néoplalysines 49, r. de Paradis, Paris.
- \*Néopulmine 45, fg St-Denis, Paris.
- Néoquinine Falières 20, r Fossés-St-Jacques, Paris.
- Néoral 6, cours Anatole-France, Bordeaux.
- \*Néo-Rhomnol 62, r. de la Tour, Paris.
- \*Néo-Riodine Astier 46, r. Docteur-Blanche, Paris.
- \*Néosaliodc 5, r. Lefebvre, Paris.
- Néosantal Fabris, Chambéry (Savoie).
- Néosédine 112, r. de Gerlaud, Lyon.
- Néo-Serosan TORAUDE, 22, r de la Sorbonne, Paris.
- \*Néo-Séti 157, r. Championnet, Paris.
- \*Néospasmodyl 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- Néo-spermine 172, rue d'Alésia, Paris.
- Néo-Sphérulines (Voir : *Opothérapie Moncour.*)
- Néosuline Fornet 23, r. du Caire, Paris.
- \*Néothorium Millot 54 r. Bienfaisance, Paris.
- Néo-Tréparsenan COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- \*Néo-Trépol 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Néotrope AGUETTANT, 36, quai Fulchiron, Lyon.
- \*Néotrophène Lab. de Chimie appliquée, 31, r. Chemin-de-Fer, Nanterre (S.).
- Néovitalyne 28, r. de l'Hôpital-Militaire, Lille.
- Néphrine Bouty 3, r. de Dunkerque, Paris.
- Néphrine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Néphrocrinol Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- \*Néphryl 6, r. Parrot, Paris.
- \*Neptal SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Neptol (Voir : *Topique Nasal A. B. C*)
- \*Nergine Heudebert 85, r. Saint-Germain, Nanterre.
- \*Nertose 132, r. de Turenne, Paris.
- \*Nervocithine Tissot 34, bd de Clicny, Paris.
- \*Nésal 26, r. Vauquelin, Paris.
- \*Nestogène 6, av. Portalis, Paris.
- \*Nestosyl 72, r. St-Dominique, Paris (VII<sup>e</sup>).
- Neubryne 78, bd Beaumarchais, Paris

- \*Neurène** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- \*Neuréol** LAFARGE, 6, bd Arago, Paris.
- Neurhémol Vinçon** à Auxerre (Yonne).
- Neuricure** 77, bd de Grenelle, Paris.
- \*Neuridor** SAUBA, Montreuil (Seine).
- \*Neurinase** 45, r. du Marche, Neuilly (Seine).
- \*Neurobore** 23, r. des Moines, Paris.
- \*Neurocalcium** Lab. Biol. de l'Île de France, 3, r. Laugier, Argenteuil.
- Neurodonal Koenig** THOMAS, Chemillé (M.-et-L.),
- Neurodose** 47, r. de Neuilly, Nanterre.
- \*Neuroflorine** 44, r. de Lagny, Montreuil.
- Neurogalacol Dethan** 11, r. A.-de-Neuville, Paris.
- Neurogénol** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Neuroiodure Dethan** 11, r. A.-de-Neuville, Paris.
- Neurolipase** 132, r. de Turenne, Paris.
- Neuro-Pax** Cte de GRAUWE, 16, r. de Rocroy, Paris.
- \*Neuroplasma** 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
- Neuroplasmine** id.
- Neuropol** FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.
- Neurosérine** JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
- \*Neurosine Prunier** 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Neurosmon** 49, r. Paradis, Paris.
- Neurosomnyl** 229, cours Gambetta, Lyon.
- Neurosthéma** CELLIER, Saint-Uzé (Drôme).
- Neurosthyl** 4, r., Lamotte-Picquet, Paris.
- Neurotanic** GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- Neurotonine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \*Neurotrol Abadie** 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
- Neurotrope** MÉROBIAN, 37, r. Pajol, Paris.
- Neurotrophène (ampoules)** 9, r. de Boissonnade, Paris.
- \*Neurotrophol Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- \*Neurovarol Douetteau** 20, fg. Saint-Honoré, Paris.
- Neurovoïne** GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- Neuséda** 30, r. Monge, Paris.
- \*Neutralcaol** BENDERITTER, Vendôme (L.-et-Ch.).
- Neutralisine Bureau** 86, bd Port-Royal, Paris.
- Neutralol** 13-15, r. de la Sablière, Bécon-les-Bruyères.
- Neutrobyl** Dr AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.
- Neutrol** AMICI, Saint-Sylvestre, Nice.
- Neutrose Vichy** 49, av. de Wagram, Paris.
- Neuvaritol** 132, av. Victor-Hugo, Paris.

- **Névoral**
- Névralgésine
- Névralgine Montsarrat
- **Névralgol Brossard**
- Névraltène Rogier
- Nevraltine
- Névrasite
- Nevrithone
- Névropathyl Leisyn
- **Nevrosan**
- Nevroserum
- Névrosol
- **Névrosthénine Freys-  
singé**
- Nickobalt
- **Nigérine Vincent**
- Nigroformine
- **Nisaméline**
- **Nitium Buisson**
- **Nitroyl Leisyn**
- Noctifen Léo
- **NoctisédyI**
- **Nopirine Vicario**
- **Normacol**
- **Normalarine**
- **Normatensol**
- Nortal Clin
- Nosodol
- Nosol Aguettant
- **Novacétine Prunier**
- Novaline de Montfleury
- Novanol
- **Novargyre Guillaumin**
- Novarine Vicario
- **Novarsénobenzol Billon**
- Novarsénobenzol Cor-  
bière
- Novarsénobenzol Ercé
- Novarthritol
- **Novatropine**
- Novaiodal
- **Noviode**
- Novismuth
- R. FEIGNOUX, Lab. RAFFEY,  
95, r. de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>).  
DÉBORDES, à Moulins (Allier).  
à Revel (Hte-Garonne).  
1, r. Cordouans, La Rochelle.  
56, bd Pèreire, Paris.  
COUDERT, 116, av. Ledru-Rol-  
lin, Paris.  
11, r. Joseph-Bara, Paris.  
GERDA, 163, bd de la Croix-  
Rousse, Lyon.  
1 bis, r. Molitor, Paris.  
P. C. B., 12, r. du Téléphone,  
Bruxelles.  
4, fg Stanislas, Nancy.  
12, r. des Apennins, Paris.  
6, r. Abel, Paris.  
12, r. Paul-Baudry, Paris.  
14, av. Mac-Mahon, Paris.  
51, r. de Paris, Pierrefitte.  
TROUETTE, 15, r. Immeubles-  
Industriels, Paris.  
98, r. de Sèvres, Paris.  
1 bis, r. Molitor, Paris.  
11, square Marie-Louise, Bru-  
xelles.  
AUGIER, 2-4, r. des Lombards,  
Paris.  
17, bd Haussmann, Paris.  
41, r. de Rome, Paris.  
18, r. de Beaune, Paris.  
87, r. Lafayette, Paris.  
20, r. des Fossés-Saint-Jacques,  
Paris.  
57, r. Edgard-Quinet, Nantes.  
36, q. Fulchiron, Lyon.  
1, q. Aulagnier, Asnières (Seine).  
6, r. d'Alsace, Grenoble.  
J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,  
La Garenne (Seine).  
13, r. Cherche-Midi, Paris.  
17, bd Haussmann, Paris.  
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon  
Paris.  
27, r. Desrenaudes, Paris.  
37, r. de Bourgogne, Paris.  
DARBANS, St-Chinian, Hérault.  
94, r. Pasteur, Fontenay-sous-  
Bois.  
45, fg St-Denis, Paris.  
Lab. SALVOXYL, 237, r. La-  
fayette, Paris (X<sup>e</sup>).  
30, r. des Francs-Bourgeois,  
Paris.

- \*Novo-Brol  
 \*Novo-Lactol  
 \*Novolug  
 Novoptine  
 Novoseptine  
 Novoxol  
 Nox  
 Nuclabia  
 Nuclarène Cognet  
 Nucléarrhol Gabriel  
 \*Nucléarsitol Robin  
 \*Nucléasine  
 \*Nucléatol Robin  
 Nuclécithine  
 \*Nucléigène  
 Nucléocalcose  
 \*Nucléocardyl  
 Nucléo-fenugrene  
 Nucléo-fer Girard  
 Nucléol Haubro  
 \*Nucléophorène  
 \*Nuclergol  
 Nuclhémose  
 Nuclocithol  
 Nuclogénol  
 \*Nujol  
 Nurécase  
 Nurserine  
 Nutréine  
 Nutréol  
 Nutritine Déjardin  
 \*Nutro  
 Nutrobiase  
 Nutromalt  
 Nuxyl  
 Nyctal  
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s-  
 Seine.  
 Et. DAGUIN, St-Maur (Seine).  
 NOVALIS, Oullins (Rhône.)  
 Labor. DULCIS, pl. Clichy,  
 Monte-Carlo.  
 57 bis, av. La Motte-Picquet,  
 Paris (XV<sup>e</sup>).  
 18, r. Daguerre, Paris. (C  
 UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,  
 Paris.  
 Lab. chimie physiologique, 37,  
 r. Tivoli, Bordeaux.  
 43, r. de Saintonge, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).  
 13, r. de Poissy, Paris.  
 163, r. de Flandre, Paris.  
 13, r. de Poissy, Paris.  
 Collonges-Saint-Just-sur-Loire  
 (Loire).  
 Lab. CHEVILLON, 99, r. de  
 Paris, Massy (Seine-et-Oise).  
 67, r. de Paris, Charenton-le-  
 Pont (Seine).  
 2, r. Lauzac, Bordeaux.  
 FURNON, Ste-Sigolène (Hte-  
 Loire).  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 Lab. Central de France, 1, r. de  
 Chateaudun, Rennes.  
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.  
 14, r. Demarquay, Paris.  
 RÉMY & LECOQ, 6, pl. Cli-  
 chy, Paris.  
 28, av. Grammont, Tours.  
 30, r. St-Jacques, Namur (Bel-  
 gique).  
 98, r. de Sèvres, Paris.  
 GRANDVAL, à Reims.  
 6, c. Joseph-Thierry, Marseille.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 61, r. de Seine, Paris.  
 109, bd Haussmann, Paris  
 1, bd St-Martin, Paris.  
 10, r. Cimarosa, Paris (XVI<sup>e</sup>).  
 151 bis, route de Joinville,  
 Champigny (Seine).  
 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.  
 DURET & RÉMY, Asnières,

- Occi-Gourme**  
**Océanine**  
**\*Ocréine Grémy**  
**Odarsol**
- Oderma**  
**Odynal Chevalier**  
**Enase Couturieux**  
**\*Enophos**  
**Oenoquinol**  
**\*Oéréliode**
- \*Estrobroï Roche**  
**Oio-Thyroïdine**
- \*Olbia**
- \*Olcalan**  
**Olcanfral**  
**Oléobiline**  
**Oléo-Bi-Roche**  
**Oléo-Calcium**
- \*Oléocidase**  
**Oléodermine Vincent**  
**Oléodine**  
**\*Oléoformine «Corbière»**  
**Oléogazeur**  
**Oléo-Iode Dubois**  
**Oléojasol**  
**Oléol**  
**Oléolaxine**  
**\*Oléo-Mel**  
**Oléomucilaxine**
- Oléo-Psyllium**
- Oléo-Sérums**  
**\*Oléovules**
- Oléthyle Benzyle**  
**Oliolase Corbière**  
**\*Ohricyl Hardy**  
**\*Olisol**
- 4, av. de Brazza, Romainville.  
 52, r. La Bruyère, Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fos-  
 sés-Saint-Jacques, Paris.  
 Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.),  
 à Varennes-sur-Allier.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 29, pl. Bossuet, Dijon.  
 12-14, r. Fery, Reims.  
 BOUVOT, Auvers-sur-Oise (S.-  
 et-Oise).  
 10, r. Crillon, Paris.  
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 MOUNEYRAT, Villeneuve-la-  
 Garenne (Seine).  
 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.  
 M. MARTIN, Cloyes (E.-et-L.).  
 2, r. Maréchal-Pétain, Nice.  
 10, rue Crillon, Paris.  
 MAURES, à Port-de-Penne  
 (Lot-et-Garonne).  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 14, av. Mac-Mahon, Paris.  
 Pont-à-Celles (Belgique).  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 122, fg. St-Martin, Paris.  
 16, bd. Pereire, Paris.  
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.  
 BRUN, Demi-Lune, Lyon (Rh.).  
 5, av. des Tilleuls, Paris.  
 DELFOUR, Pouillon (Landes).  
 MILLET à Rambouillet (Seine-  
 et-Oise).  
 b. ADLER, 36, r. des Francs  
 Bourgeois, Paris.  
 Route de Cimiez, Nice.  
 SFEAT, 15, r. Catulienne, St-  
 Denis.  
 122, fg. S-Honoré, Paris.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 42, bd. St-Marcel, Paris.  
 SAUBA, Montreuil (Seine).-

- \*Olivéol Etiévant  
Ombiplaste
- \*Onction Angelini
- \*Onction Leisyn  
Ondanol
- \*Onguent Fréval  
Onguent Ilon  
Onguent Ivula
- Onguent Pyorrhépha-  
gine
- Onguent Salas
- Ophorine
- \*Ophtalmine Leprince  
Ophtalmo-vaccin Sa-  
lantale
- \*Opobyl
- \*Opocalcium
- \*Opocalcium Irrad é
- Opochlorine
- \*Opochol
- Opocobalt
- \*Opocrinases
- \*Opodermyl
- \*Opoferrine vitaminée
- Opogénines
- Opoglandéol Fray
- \*Opolases (voir \*Am-  
polases)
- Opolaxyl Corbière
- \*Oponuclyl irradié  
Trouette-Perret
- Opopédol
- Opopeptol
- \*Opophos
- Opophytol
- Oporadol
- Oposérum
- Opositoires opothéra-  
piques Pellissier
- \*Oposynergines
- \*Opothérapie Bouty
- \*Opothérapie Byla
- \*Opothérapie Carrion
- Opothérapie Chaix
- Opothérapie Chevreton
- \*Opothérapie Choay
- \*Opothérapie du D<sup>r</sup>  
Frayse
- Opothérapie Fortin
- \*Opothérapie Fournier
- Opothérapie Fumouze
- BRUN, Demi-Lune, Lyon.  
37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.  
61, r. de Seine, Paris.  
1 bis, rue Molitor, Paris.  
SAUBA, Montreuil  
84, r. Rochechouart, Paris.  
31, r. Illzach, Mulhouse.  
J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,  
La Garenne (Seine).  
Croissy-sur-Seine.  
132, r. de Turenne, Paris.  
OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.  
62, r. de la Tour, Paris.  
42, Grandes Arcades, Stras-  
bourg.  
BAILLY, 15-17, r. de Rome,  
Paris.  
121, av. Gambetta, Paris.  
121, av. Gambetta, Paris.  
132, r. Turenne, Paris.  
TÉTARD, Beauvais (Oise).  
83, bd de la Villette, Paris  
132, r. de Turenne, Paris.  
BENSIMON, 36, r. des Martyrs,  
Paris.  
121, av. Gambetta, Paris.  
40, r. Bellechasse, Paris.  
DURAND, Aigues-Mortes.  
163, r. de Flandre, Paris.  
27, r. Desrenaudes, Paris.  
15, r. des Immeubles-Indus-  
triels, Paris.  
ISCOVESCO, 107, r. des Dames,  
Paris.  
105, bd Malesherbes, Paris.  
19, r. de Fleurus, Paris.  
D<sup>r</sup> TESTART, Chalais (Char<sup>t</sup>)  
25, r. Vaneau, Paris (VII<sup>e</sup>).  
D<sup>r</sup> TESTART, Chalais (Cha-  
rente).  
33, av. de Villiers, Paris  
132, r. de Turenne, Paris.  
3, r. de Dunkerque, Paris.  
26, av. de l'Observatoire, Paris.  
54, fg Saint-Honoré, Paris.  
10, r. de l'Orne, Paris.  
52, r. La Bruyère, Paris.  
48, Av. Théoph.-Gautier, Paris.  
47, r. de Neuilly, Nanterre  
(Seine).  
35, r. Clerc, Paris.  
7, r. Biscornet, Paris.  
78, fg. Saint-Denis, Paris

- Opothérapie Henning** 49, r. de Paradis, Paris.  
**Opothérapie "Le Pecq"** 11, r. Beautreillis, Paris.  
**\*Opothérapie Moncour** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.  
**Opothérapie Richard** 79, av. d'Orléans, Paris.  
**Opothérapie Richter** 49, r. Paradis, Paris.  
**Opothérapie U. T. A.** P. THIVISSEN, 13, r. Sainte-Véronique, Liège.  
**Opothérapiques Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.  
**\*Opothérapiques Pélissier** 33, av. de Villiers, Paris.  
**Opotonine \*** 20, r. des Martyrs, Paris  
**\*Opo-vacuoline** 39, r. de la Gare, Bondy.  
**Opo-veinine** 10, r. Maubeuge, Paris.  
**\*Opozones Lumière** 45, r. Villon, Lyon.  
**Opsine Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.  
**Opsolysine** 7 à 13, r. Saint-Maurice, Nanterre (Seine).  
**\*Opsomyl A et B.** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**\*Optalidon Sandoz** 20, r. Vernier, Paris.  
**\*Optiplaste** 4, r. d'Ilzack, Mulhouse.  
**\*Optraex** 16-22, r. des Orteaux, Paris.  
**Opunsine** 94, r. Michelet, Alger.  
**\*Orargol** Lab. AMICROS, 8, av. Rachel, Paris.  
**Orarigène** 35, av. Alsace-Lorraine, Grenoble.  
**Orcéol** 17, r. Mont-Désert, Nancy.  
**\*Orchidine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**Orchitine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.  
**Orchitine Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.  
**\*Orex « S »** 18, r. St-Amand, Paris.  
**\*Organicalicion** 81, r. de Lille, Roubaix.  
**Organocalcine** 121, av. de St-Ouen, Paris.  
**Orge germé Fanta** 77, rte d'Orléans, Montrouge.  
**Orianol** GÉNTON, à Petit-Quévilly (S.-Inférieure).  
**Oriphol** 8, r. Richer, Paris.  
**\*Ormatol** E. ROBINEAU, 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine).  
**Orpranor** LOUVEL, Elbeuf (S.-I.).  
**Orthobiline** 37, r. Galilée, Paris.  
**\*Ortho-Gastrine** LEBLOND, 51, r. Gay-Lussac, Paris.  
**\*Orthogénol** Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.  
**\*Orthozomine** LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.  
**Osmoléine** 26, r. des Moines, Paris.  
**\*Osmo-Vaccins P. L.** Lab. BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.  
**Ossical** ROBERT et CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Osteline** Lab. Rissa, 46, r. Claude-Lorrain, Lille.



- \* **Ostéoglandulol**
- Ostéo-hépatine**
- Ostéopectine**
- Ostomalt**
- Ostréine Buisson**
- \* **Otalgolex**
- Oto-Antiscclérol**
- Oto-Draineur**
- Otolan**
- Oto-vaccin Salantale**
- Otoléine**
- \* **Ouabaine Arnaud**
- Ouabaine Deglaude**
- \* **Ouataplasme Langlebert**
- Ouate Rhinol**
- \* **Ovaire Fournier**
- Ovaïrine**
- Ovaridine Meurice**
- Ovarids**
- Ovarigène Disdier**
- Ovarine Dubois**
- Ovarine Henning**
- Ovarine Meurice**
- \* **Ovarine Optima**
- \* **Ovarine Tisy**
- Varose**
- \* **Ovaro-Thyroïdine**
- Ovex Léo**
- Ovigénine Bouty**
- Ovo-biol**
- Ovo-Cao**
- Ovo-lécithine Billon**
- Ovomaltine**
- Ovothyrol**
- Ovrine**
- Ovules à l'Inolène**
- Ovules Amicros**
- \* **Ovules Chaumel**
- Ovules Derma**
- Ovules Evine**
- Ovules au gonagone**
- Ovules Gynol**
- Ovules Halogènes du Dr Bern**
- Ovules Halleana**
- \* **Ovules intima**
- 14, r. des Pyramides, Paris.
- 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- DRAPIER, Lucquy (Ardennes).
- 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
- 98, r. de Sèvres, Paris.
- 21, r. Feydeau, Paris.
- 6 pl. Cambronne, Paris.
- 5, r. Emmanuel-Liais, Cherbourg.
- 24, r. Jardel, Bordeaux.
- 42, Gdes Arcades, Strasbourg.
- 72, r. de Bagneux, Montrouge.
- 27, r. de la Procession, Paris.
- 6, r. d'Assas, Paris.
- SABATIER, 10, r. Pierre-Ducieux, Paris.
- DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
- 7, r. Biscornet, Paris.
- 62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 4, imp. de Béarn, Paris.
- av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
- 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
- 49, r. de Paradis, Paris.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- 95, r. de Turenne, Paris.
- 58, r. St-Placide, Paris.
- OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- 3, r. de Dunkerque, Paris.
- 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- 2, r. de Compiègne, Paris.
- SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- 88, cours de Vincennes, Paris.
- 42, r. Mont-Cenis, Paris.
- 9, bd Edgar-Quinet, Paris.
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
- ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
- 16, r. Barbette, Paris.
- 54, fg. St-Honoré, Paris.
- Chaussée d'Ixelles, Bruxelles.
- 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
- ), imp. de Béarn, Paris.
- 229, cours Gambetta, Lyon.

- Ovules avula Pearson** J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).  
**Ovules Magida** 56, r. des Dames, Paris.  
**\*Ovules Néothorium** MILLOT, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.  
**\*Ovule au nestosyl** 72, r. St-Dominique, Paris.  
**Ovules Patrat** 61, r. de Seine, Paris.  
**\*Ovules Rhemda** 17, r. d'Hauteville, Paris.  
**\*Ovules Roche** 10, r. Crillon, Paris.  
**\*Ovules au Terpoxyl** 1, r. Christine, Paris.  
**Ovules Uxora** DHAUSSY, à Mennevret (Aisne)  
**Ovules-Vaccins Salantale** 42, r. des Grandes-Arcades, Strasbourg.  
**Ovules-Vaccins Goldenberg** IVAGO, 17, r. de Provence, Paris.  
**Ovules Vézès** 52, bd du Temple, Paris.  
**Ovunéol Bottu** 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.  
**Oxhydrate de Bi** DESMARS, 89, av. Wagram, Paris.  
**Oxitane** CASENEUVE, Saint-Cyprien (Dordogne).  
**Oxnol** 45, fg Saint-Denis, Paris.  
**Oxycyanure d'hydrargyre** GUILLAUMIN, 168, bd Saint-Germain, Paris.  
**Oxy-Dents C. R. S.** 264, bd Voltaire, Paris.  
**Oxyde orangé de Hg ophtalmoforme** Lab. DULCIS, pl. Clichy, Montecarlo.  
**\*Oxydothyridine Paris** 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.  
**\*Oxydovarine Paris** id.  
**Oxydrol** POINTET et GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
**Oxygénase** D<sup>r</sup> CHAPPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.  
**Oxygénés du D<sup>r</sup> Prim** 27, r. Fourcroy, Paris.  
**Oxygène bore « Obs »** Neuilly-sur-Saône (Rhône).  
**\*Oxy-Injecteur du D<sup>r</sup> Fialip** 23, av. de la Motte-Picquet, Paris.  
**\*Oxyléine** 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).  
**Oxylisine** LAMBERT, 6, r. de Longchamp, Vichy.  
**\*Oxymenthol Perraudin** 21, r. Chaptal, Paris.  
**\*Oxymuth Saça** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
**Oxynargyl** BESNARD, 56, r. des Dames, Paris.  
**\*Oxyol Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.  
**Oxyquinothéine** S. A. L. P., 91, r. Marietton, Lyon.  
**Oxytane** CASENEUVE, St-Cyprien (Dordogne).  
**Oxythymol** GLORY, 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.  
**Oxy-Thymoline** GODFRIN, à Nancy.  
**Oxytoires Sorin** TROMBETTA, à Blain (L.-Inf.).  
**\*Ozobiase** 37, r. de Marly, à Rueil-Malmaison.  
**Ozodor** Lab. SERVIER, Orléans (Loiret)  
**Ozol** à Avignon.

Ozonair  
\*Ozothine

2 r. de Vienne, Paris.  
23, r. Sébastien-Mercier, Paris.

## P

- Pacyl  
Paderyl
- Pain d'amandes au  
gluten frais
- \*Pain essentiel Heude-  
bert
- \*Pain massé Sana
- \*Pains spéciaux Heude-  
bert
- Pains de régime Mil-  
liat
- \*Pain Redeuil
- Pain de santé Martin
- Paloval
- Paludase Corbière
- Paludol
- Pampryl
- Panbiase antiphy -  
mique
- \*Panbiline
- Panbromine
- Pancalbiose
- \*Pancarbo
- Pancréadénine
- \*Pancréanne
- Pancréas-Endocrisi-  
nes Fournier
- \*Pancréastase Defresne
- Pancréatokinase
- \*Pancréatose Idon
- \*Pancrébile
- \*Pancrépatine Laleuf
- Pancrésal
- \*Pancrinol du Dr Debat
- Pandigitale Houdas
- Pandigitale
- 8, r. de Prague, Paris.
- 20, r. des Fossés-St-Jacques,  
Paris.
- 37, r. du Rocher, Paris.
85. r. de Saint-Germain, Nan-  
terre (Seine).
- Gaillac (Tarn).
- 85, r. de Saint-Germain, Nan-  
terre (Seine).
- 319, av. Berthelot, Lyon.
- 7, r. Couche, Paris.
- à Montreuil-Belfroy (Maine-  
et-Loire).
- Pharm. de l'Etoile, Strasbourg.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- PATRICE, à Vichy.
- 2, villa de la Terrasse, Paris.
- BAILLY, 15-17, r. de Rome,  
Paris.
- à Annonay (Ardèche).
- 17, r. Cadet, Paris.
- 1, r. Chancelier, Périgueux.
- P. HARDY, 42, bd St-Marcel,  
Paris.
- OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.
- 10, r. Poncelet Paris (XVII<sup>e</sup>).
- 7, r. Biscornet, Paris.
- 19, r. Jacob, Paris.
- 54, fg St-Honoré, Paris.
- 89, r. St-Georges, Nancy.
- D<sup>r</sup> AUBERT, 3, pl. Jussieu,  
Paris.
- 20, rue du Laos, Paris.
- SCHREIBER, av. du Bois,  
Luxembourg.
- 60, r. de Prony, Paris.
- 26, r. Saint-Claude, Paris.
- OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.

- \*Panfébrine  
Panfortan
- \*Pangaduine
- \*Pangastrol  
17 bis, av. Parmentier, Paris.  
4, ch. de la Muette, Paris.
- \*Pangestyl Narty  
16, r. du Petit Musc, Paris.
- \*Panglandine Coutu-  
rieux  
STOULS, 156, av. Victor-  
Hugo, Paris.
- Pangynol  
134, bd. Péreire, Paris.
- Panhémol  
18, av. Hoche, Paris.
- Panhistol  
20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- \*Panlabyl  
90, av. des Ternes, Paris.
- Panlacto-Midy  
4 bis, r. de Lyon, Paris (XII<sup>e</sup>).
- Panlax Allard  
94, r. Pasteur, Fontenay-sous-  
Bois.
- Panlutéine  
4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Panopepton  
Lab. GMET, 27, fg. Mont-  
martre, Paris (IX<sup>e</sup>).
- Panophytes  
2, rue des 2-Ponts, Paris.
- \*Panostyl  
ROBERTS, 5, r. de la Paix,  
Paris.
- Panphylase  
TROUETTE-PERRET, 15, r.  
des Immeubles-Industriels,  
Paris.
- Panprocol  
57, r. Mathurin-Régnier, Paris.
- Pansement otalgique  
37, r. de Bourgogne, Paris.
- Alsai  
222, r. Duguesclin, Lyon.
- \*Pansolanée  
1, r. Griffon, Lyon.
- Pansomnine  
2, pl. des Vosges, Paris.
- \*Panstomase  
132, av. Victor-Hugo, Paris.
- \*Panthésine  
45, r. du Marché, Neuilly.
- Pantofort du D<sup>r</sup> Boveil  
SANDOZ, 20, r. Vernier, Paris.
- (granules)  
1, r. Lassalle, Lyon.
- Pantolaxine du D<sup>r</sup> Bo-  
veil (cachets)  
id.
- Pantokinon  
94, r. Michelet, Alger.
- \*Pantopon Roche  
10, r. Crillon, Paris.
- Panurol Tissot  
34, bd de Clichy, Paris.
- Panvalérase  
36, av. Niel, Paris.
- Panvalérine Delattre  
10, r. du Bac, Paris.
- \*Panvita  
2, r. Lauzac, Bordeaux.
- \*Panxylon  
E. LOGEAI, 24, r. de Silly,  
Boulogne-sur-Seine.
- Paospholine  
21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
- Papaine Henry  
39, r. de Sclessin, Liège (Bel-  
gique).
- \*Papaine Trouette-Per-  
ret  
15, r. des Immeubles-Industriels,  
Paris.
- \*Papaveryl  
Lab. ORRILLARD, 245, r. de  
Vaugirard, Paris.
- Papavhydrine  
MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
Paris.
- Papier Albespeyres  
78, fg Saint-Denis, Paris.
- Papier du D<sup>r</sup> Balme  
56, bd Péreire, Paris.
- Papier Fayard  
2, av. Mathurin-Moreau, Paris.
- Papier Gicquel  
64 r. des Tournelles, Paris.

- \*Papier iodogène Ey- 189 c. Tolstoi, Lyon-Villeur-  
   monnet banne.  
   Paquets P. C. L. 163, r. de Flandre, Paris.  
   Paquets Védé 2 et 4, pl. Gambetta, Paris.  
   Paracarbochloryl 76, r. Réaumur, Paris.  
 \*Paradol 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).  
   Paradoline 99, r. de Paris, Massy (Seine-et-  
   Oise).  
   Paraffinol LANDON, av. Baraduc, Châtel-  
   Guyon.  
   Paraffinoléol Hamel 17, r. de Berri, Paris.  
   Paraformine 172, r. d'Alésia, Paris.  
   Paragar 107, av. de la Reine, Boulogne-  
   sur-Seine.  
 \*Paragélose 11, r. de Clichy, Paris.  
   Paraghurt Léo 11, square Marie-Louise, Bru-  
   xelles.  
 \*Paralactine Byla 26, av. Observatoire, Paris.  
 \*Paralaxol TULIVET, 52, r. de Poissy à  
   St-Germain-en-Laye.  
   Paralymphine 32, r. de Grenelle, Paris.  
   Paratétanine 17, r. Bourgelat, Lyon.  
 \*Parathyrocalcine Mon- 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-  
   cour sur-Seine.  
   Parathyroïde Endocri- 7, r. Biscornet, Paris.  
   sines Fournier  
 \*Paratone Léo 11, square Marie-Louise, Bru-  
   xelles.  
   Paratoxine Ducatte 31, r. des Francs-Bourgeois,  
   Paris.  
 \*Paratyroné BYLA, 26, av. de l'Observa-  
   toire, Paris.  
   Paremanol BRUNEAU, 17, r. de Berri,  
   Paris.  
   Parkibleu 79, r. de la Roquette, Paris.  
 \*Parlax F. LATOUR, 71, r. Douy-De-  
   coupe, Montreuil-sous-Bois.  
 \*Parolagar 348, r. St-Honoré, Paris.  
 \*Paroxyl THIRIET & C<sup>ie</sup>, 26 et 28, r. des  
   Ponts, Nancy.  
 \*Passicarbone 2, r. Boucicaut, Paris.  
 \*Passiflorine REAUBOURG, 2, r. Boucicaut,  
 \*Passival H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
 \*Pastapalm BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.  
   Pastilles Bala BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).  
   Pastilles Brachat 5, av. Victoria, Paris.  
   Pastilles Contre-ut GIRAUD & JEANDET, 217, r.  
   La Fayette, Paris.  
   Pastilles Fayès 199, r. St-Denis, Paris.  
   Pastilles Helgé D<sup>r</sup> LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.  
   Pastilles Houdé 9, r. Dieu, Paris.  
   Pastilles Irsi 4, ch. de la Muette, Paris.  
   Pastilles Libéria 10, r. Cyrano-de-Bergerac, Paris.  
 \*Pastilles M. B. C. GOY, 23, r. Beautreillis, Paris.  
   Pastilles Méry 16, r. de Rocroy, Paris.  
   Pastilles Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
   Pastilles Miraton 48, r. d'Alésia, Paris.

<b>Pastilles Norvégiennes</b>	36, r. de Verdi, Nice.
<b>Pastilles Palangies</b>	8, r. Vivienne, Paris.
<b>Pastilles Paterson</b>	46, r. de Saintonge, Paris.
<b>Pastilles de Pougues</b>	21, r. Chaptal, Paris.
<b>Pastilles St-Christau</b>	ERGÉLOT, 163, r. de Flandre. Paris.
<b>Pastilles Violettes A.</b>	24, r. de Monttesuy, Paris.
<b>B. C.</b>	
<b>Pastilles Vichy-Etat</b>	24, bd des Capucines, Paris.
<b>Pastils Meran</b>	18, r. de Maubeuge, Paris.
<b>Pâte Aseptor</b>	21, r. Feydeau, Paris.
<b>Pâte Berthé</b>	78, fg Saint-Denis, Paris.
<b>Pâte dentifrice</b>	OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
<b>Pâte dentifrice Philipps</b>	O. C. P., 108, r. de Picpus, Pa- ris.
<b>Pâte Dermos</b>	NEYRET, 35, r. de la Bourse, Lyon.
<b>Pâte Jane</b>	2, r. Marché-des-Blancs-Man- teaux, Paris.
<b>Pâte Magali</b>	43, av. Kléber, Paris.
<b>*Pâte Mireille</b>	Lab. LEGENDRE & C <sup>ie</sup> , sec- tion D. S., Houilles (S.-et-O.).
<b>Pâtes lacto-maltées du</b>	89, r. de Rivoli, Paris.
<b>Dr Jacquet</b>	
<b>Pâte Neyret</b>	35, r. de la Bourse, Lyon.
<b>Pâte pectorale du Dr</b>	66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.)
<b>Williams</b>	
<b>Pâtes Sana</b>	Gaillac (Tarn).
<b>Pâte Silka</b>	26, ch. de la Madeleine, Nantes.
<b>*Pâte Spécia</b>	21, r. Jean-Goujon, Paris.
<b>Pâte de Terpene Quédet</b>	GRIGNON, 2, r. Duphot, Paris.
<b>Pâte thionique Ram- baud</b>	38, r. Gay-Lussac, Paris.
<b>*Patholysine</b>	142, r. de Picpus, Paris.
<b>Pausodyne</b>	98, r. d'Angoulême, Paris.
<b>*Pavérinol</b>	LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.
<b>*Paveron Dausse</b>	4, r. Aubriot, Paris (IV <sup>e</sup> ).
<b>*Paxène</b>	MILLET & GUILLAUMIN, 8, r. Richer, Paris.
<b>Paxol</b>	Lab. ORRILLARD, 245, r. de Vaugirard, Paris.
<b>Pebrômôn Henry</b>	39, r. Sclessin, Liège.
<b>*Pecthionol</b>	Lab. MANSEAU, Margaux (Gi- ronde).
<b>Pectine</b>	17, r. Cadet, Paris.
<b>Pectobiol</b>	21, Gde-Rue, Montfermeil.
<b>*Pectoforme</b>	Lab. GODART, Andenne (Bel- gique).
<b>Pectoral des Dames de France</b>	119, r. de Sèvres, Paris.
<b>Pellicules radifères du</b>	
<b>Dr Vallet</b>	22, r. de la Sorbonne, Paris.
<b>*Pélospanines</b>	FOURNIER Frères, 7, r. Bis- cornet, Paris.
<b>Pelvisédol</b>	Pharmacie C <sup>ie</sup> de France, 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.

- Pentarsyl Lecoq et 14, r. Gravel, Levallois-Perret:  
 Ferrand  
 Penghaivar Vicario 17, bd Haussmann, Paris.  
 \*Pennès (Produits) 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 \*Pentalues 15, r. Catulienne, St-Denis  
 (Seine).  
 \*Peperiodon Henry 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).  
 Pepsenca Roberts 5, r. de la Paix, Paris.  
 Pepsodia 24, r. Paul-Bert, Paris.  
 \*Peptalac Sté des Spécial. diététiques et  
 diurétiques (COW et GATE).  
 22, r. des Belles-Feuilles, Paris,  
 21, r. Chaptal, Paris.  
 \*Peptalmine 13, av. Maréchal-Foch, Dam-  
 marie-les-Lys (S.-et-M.).  
 Peptidol 7, r. des Petits-Carreux, Paris.  
 Peptobrol Kopp 19, r. des Foulons, Strasbourg.  
 Peptocalcine 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.)  
 \*Peptodiase ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.  
 \*Pepto-fer du Dr Jaillet DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.  
 Pepto-ferrine OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 \*Peptogil 77, r. Miromesnil, Paris.  
 \*Peptokola Robin 13, r. de Poissy, Paris.  
 \*Peptonal DURET & REMY, à Asnières  
 (Seine).  
 Peptonate d'Etain 39, r. de Sclessin, Liège (Bel-  
 gique).  
 Henry 13, r. de Poissy, Paris.  
 \*Peptonate de fer Robin 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 Peptone Byla 3, bd Saint-Martin, Paris.  
 Peptone Catillon 8, r. Vivienne, Paris.  
 Peptone Chapoteaut OPTIMA, 78, Gde-rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 Peptone Vassal 28, r. Hôpital-Militaire, Lille.  
 Peptosodine 12, r. Mademoiselle, Paris (XV°).  
 \*Peptosthénine Choay 48, Av. Théophile-Gautier, Paris.  
 Peptovalériane du Dr 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 Gigon  
 Peptozym 90, av. des Ternes, Paris.  
 Peptyl COUDERT, 116, av. Ledru-  
 Rollin, Paris.  
 Peraziodol 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 \*Percaïne-percaïnal CIBA, 113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 \*Percalcine 84, r. Rochechouart, Paris.  
 Péricols Legros 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.  
 \*Péristaltine Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 Perles Jeka 13, r. St-Agricol, Avignon. ✓  
 Perles réductrices PATRICE, à Vichy.  
 \*Perles Taphosote 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.  
 Peroxydines 135, r. de Rome, Paris.  
 \*Persodine Lumière 45, r. Villon, Lyon.  
 Pertussin Salle 4, r. Elzévir, Paris.  
 \*Perubore 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 Perunhyl 80, r. du Rocher, Paris.

- Pérusol**  
**Peruviol**  
**Phagocytine Bureau**  
**Phagolysine**  
**\*Phagostyl**  
**\*Phagostyl Mangané**  
**\*Phaguryl**  
**Phanodorme**  
**Pharmetan**  
**\*Pharyngaseptyl**  
**Pharynxoil**  
**Pharyngoléine**  
**Phelaxine Moulines**  
**\*Phénacodine**  
**Phénalgéine**  
**Phénaseptyl**  
**Phénol Bobœuf**  
**Phiamine Coursaget**  
**Philodermine**  
**\*Philogastrine**  
**Philogyne**  
**Philtroline**  
**\*Phléboguil**  
**Phlébosine M et F.**  
**\*Phlébotonine**  
**Phlyctol**  
**Phora**  
**Phos**  
**Phosarrhène**  
**Phosbiogy**  
**\*Phosbiose**  
**Phoscalgène**  
**\*Phoscamine**  
**Phoscol**  
**Phosféryl Fournier**  
**Phoshémoquinol**  
**Phosiodine**  
**\*Phosma**  
**Phosoda**  
**\*Phosoforme**  
**Phosol Quinet**  
**\*Phosorine**  
**\*Phosote Lambiotte**  
**Phosphalose**  
**\*Phospharsol**  
**Phospharsinol**
- 114, r. du Temple, Paris.  
**REBOUL**, Pont-Ste-Maxence.  
 86, bd Port-Royal, Paris.  
 14, r. Cantin, Courbevoie.  
**A. PARIS**, 4, r. La-Motte-Picquet, Paris.  
**A. PARIS**, 4, r. La Motte-Picquet, Paris.  
**BAILLY**, 15-17, r. de Rome, Paris.  
 r. Saint-Honoré, Paris.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 72, r. de Bagneux, Montrouge.  
 à Villeneuve-la-Guyard (Yonne),  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
 29, r. de Metz, Toulouse.  
 4, pl. Wilson, Limoges.  
 41, r. de Rome, Paris.  
 9, r. Porte-Côté, Blois (L.-et-C.).  
 13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier)  
 34, r. Saint-Lazare, Paris.  
**OPTIMA**, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**MARTINET**, 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
**H. SALLE**, 4, r. Elzévir, Paris  
 54, Fg St-Honoré, Paris.  
**MARTINIE**, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**LANG**, 14, r. de Marignan, Paris.  
 213, r. St-Honore, Paris.  
 112, r. de Gerland, Lyon.  
**P. FONTANIER**, Moulins-sur-Yèvre (Cher).  
 12, r. Pavée, Paris.  
**LESCAROUX**, a. Châteauroux (Indre).  
 14, r. de Birague, Paris.  
**LESCAROUX**, à Châteauroux.  
 7, r. Biscornet, Paris.  
 21, r. des Roses, Dijon.  
**GRAVIER**, 64, r. d'Orsel, Paris.  
 68, Chaussée-d'Antin, Paris.  
**MATRAY**, 4, villa d'Orléans, Neuilly-sur-Seine.  
 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.  
 143, r. du Temple, Paris.  
**VIDAL**, 46, r. de Grenelle, Paris.  
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.  
 62, r. Marengo, St-Étienne.  
 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
**MORAND**, à Auray (Morbihan).



- Phospharsyl colloïdal**  
 du Dr Pinard  
**Phosphate Geffroy** 88, bd Saint-Denis, Courbevoie.  
**\*Phosphates Pinard** DELAMARE & C<sup>ie</sup>, Ro milly  
 sur-Andelle (Eure).  
**\*Phosphate Vital de** 90, bd St-Denis, Courbevoie.  
 Jacquemaire u Villefranche (Rhône).  
**Phosphatine Falières** 6, r. de la Tâcherie, Paris.  
**Phosphatol Vitaminé** 15, r. Catulienne, St-Denis  
 Irradié (Seine).  
**\*Phosphobrom** 22, r. Poncelet, Paris.  
**Phospho-Calcine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
**Phospho calcine ferru-** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
 gineuse Bruxelles.  
**Phosphodéine** 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
**\*Phospho-Fluor-Beynet** 165, r. Saint-Honoré, Paris.  
**\*Phospho-Gaiacol Mary** 32, r. de l'Ouest, Paris.  
 Phosphogénase 37, r. Tivoli, Bordeaux.  
**\*Phosphogène Favri-** à Saint-Symphorien - de - Lay  
 chon (Loire).  
**Phosphoglycérate de** 8, r. Vivienne, Paris.  
 Chaux Chapoteaut  
**Phospho-Iodine** 46, Gde-Rue, Boulogne-s.-Mer.  
**\*Phospholéose Demasles** Vienne (Isère).  
**\*Phosphomagnésium** 22, r. Poncelet, Paris.  
 Phosphonucléose DUPONT, Velines (Dordogne).  
**\*Phosphopinal Juin** 10, impasse Milord, Paris.  
 Phosphorescine Leker 13, r. Marbeuf, Paris.  
 Phospho-Serum 62, r. Dupont-des-Loges, Rennes.  
 Phosphotal Clin 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,  
 Paris.  
**Phospirine** 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).  
**Phostaniol** Lab. COMTOS à Feschés-le-Châ-  
 tel (Doubs).  
**Phostone** BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.  
**\*Phostyl** Lab. PY, 58, bd R.-Wallacé,  
 à Puteaux.  
**\*Phusasmine** E. ROBINEAU, 80, rte des Pe-  
 tits-Ponts, Drancy (Seine).  
**Phydermol** 70, r. Boucicaut, Fontenay-aux-  
 Roses.  
**\*Phylactone Byla** 26, av. Observatoire, Paris.  
**\*Phylla Dyn** 5, r. Claude-Decaen, Paris.  
 Phyllosan 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.  
**\*Phymo-Stéryl Leysin** 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 Physéine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.  
**\*Physioscyamine** 49, r. Maleret, Bordeaux.  
**\*Physiosthénine** LROUET & PLET, 37, r. de  
 Marly, Rueil-Malmaison.  
**\*Physocrisine** 7, r. Biscornet, Paris.  
 Phytalgine P. FONTANIER, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
**Phytergol** 24, r. Paul-Bert, Paris.  
 Phyteta 7, pass. Thionville, Paris.  
**Phytinate de Quinine** 109-113 bd de la Part-Dieu,  
 Ciba Lyon.

- \*Phytine Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- \*Phytogénine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- \*Phytol 3, r. Chané, Paris (XVI<sup>e</sup>).
- \*Phytolécithine 77, r. de Miromesnil, Paris.
- \*Phytomarine 132, r. de Turenne, Paris.
- \*Phytomensyl 59, r. Boissière, Paris.
- \*Phytosplenol PLÉ, 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- Phyto-Tanin D<sup>r</sup> A. Petit, à Angoulême.
- Phytothérapie Coirre 5, bd Montparnasse, Paris
- Picrol 22, r. Maréchal-Foch, Montpel-  
lier.
- Pilka (Gouttes) 4, r. Bellart, Paris.
- Pilules Anhépatiques 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Pilules antidiabétiques 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Midy
- Pilules antinévralgi- MONIN, 49, r. de Maubeuge,  
ques du D<sup>r</sup> Cronier Paris.
- Pilules Bengue 47, r. Blanche, Paris.
- Pilules Blancard 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- Pilules Bosredon GIGON, 25 bd Beaumarchais,  
Paris.
- Pilules bronchotoni- 38 bis, Beaumarchais, Paris
- niques Arco
- Pilules Clauss
- Pilules Clérambourg
- Pilules Culpier
- Pilules Cuticura
- Pilules Doumer
- Pilules Dray
- \*Pilules du D<sup>r</sup> Debouzy
- Pilules du D<sup>r</sup> Mous- LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.  
tier St-Vallier (Drôme).
- \*Pilules du D<sup>r</sup> Séjournet 62, r. de la Tour, Paris.
- Pilules énergétiques 53, bd de Verdun, Fontenay-  
Fradier sous-Bois.
- Pilules Eparvier 26, Grande-Rue, Lyon.
- Pilules Gip 11, r. Joseph-Bara, Paris.
- Pilules Hardy 13, r. Minimes, Le Mans.
- \*Pilules héléniennes 37, r. Pajol, Paris.
- Naud
- Pilules Hémabione Lab. MOURGUES, Chen 12-  
Neuf, Ganges (Hérault).
- Pilules d'Hermal 28, r. Saint-Claude, Paris.
- Pilules Laville 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Pilules Lartigue 78, fg. Saint-Denis, Paris.
- Pilules Lemary 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
- \*Pilules lithuranées du 1, r. Lassale, à Lyon.
- D<sup>r</sup> Boveil
- Pilules de Moussette 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- \*Pilules Myosotis 41, r. de Rome, Paris.
- Pilules Nella 4, r. Jean-Goujon, Paris.
- Pilules Oco 87, r. Lafayette, Paris.
- Pilules oporénales 132, r. de Turenne, Paris.
- Pilules Panma D<sup>r</sup> LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.

- Pilules Philippe** 14, r. Palais-Grillet, Lyon.  
**Pilules Prophylac -** 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.  
**tiques Christiaens**  
**Pilules Purgatives du** 147, faub. Saint-Denis, Paris.  
**D<sup>r</sup> Dehaut**  
**Pilules de Quassine** 6, r. Abel, Paris.  
**Frémint**  
**Pilules Roya** 41, r. de Rome, Paris.  
**Pilules Salvia** 139, av. Émile-Zola, Paris.  
**Pilules stibiées** 2, r. Volney, Paris.  
**\*Pilules V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ard.).  
**Pinofluol** 3, r. de Surène, Paris.  
**Pinolac** ROBERTS, 5, r. de la Paix,  
 Paris.  
**Pinoléum** id.  
**Pipérasol Tissot** 34, bd, de Clichy, Paris.  
**\*Pipérazine Midy** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
**Pipérazine R. B. La-** 74, qual Jemmapes, Paris.  
**grave**  
**Pipettes nasales M. S.** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
**Piscidia Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.  
**Pitol** 2, r. de Paris, Douai.  
**Pituglandol Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.  
**\*Pituilobine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.  
**Pituitairine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
**Pixel Koehly** 117, r. Vieille-du Temple, Paris.  
**Placenta Endocrisines** 7, r. Biscornet, Paris.  
**Fournier**  
**Placentodose** 47, r. de Neuilly, Nanterre.  
**\*Plagéine Soulas** 119, r. de Sèvres, Paris.  
**\*Plasma de Quinton** 54, f. Saint-Honoré, Paris.  
**Plasmargol** HION, Païmpol (C.-du-N.).  
**Plasmocol** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
**Plasmodine Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.  
**Plasone Vauris** 72, av. Kléber, Paris.  
**Plastima** 17, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**Plethorine** 112, r. de Gerland, Lyon.  
**\*Pléxorine Vély** 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
**\*Plombyl** 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).  
**Fluorysse** FABRIS, Chambéry (Savoie).  
**\*Pluribiase** 21, r. Violet, Paris.  
**Pluriglandine M** OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-  
 Bois, Bruxelles.  
**Pluriglandine F** id.  
**\*Plurion Couturier** 18, av. Hoche, Paris.  
**Pneoline** 8, r. Vivienne, Paris.  
**Pneuma Wander** 151 bis, r. de Joinville, Cham-  
 pigny.  
**Pneumobiol** 48, r. de Paris, Vichy.  
**Pneumo-calcine** 46, av. des Ternes, Paris.  
**Pneumocratul** 147, fg Saint-Denis, Paris.  
**\*Pneumogéine Renard** 35, r. de Paris, Clichy.  
**\*Pneumogénol** BURE, 74, fg d'Ambrail, Epinal.  
**\*Pneumo-lipase** YVRARD, 17, r. Soufflot, Paris.  
**\*Pneumostyl Daguin** à Saint-Maur (Seine).  
**Pneumotanic Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.

- Podophylle Coirre**  
**\*Poliol Churchill**  
**Polvista**  
**\*Polybromure Gonnon**  
**\*Polycautére**  
**Polycine**  
**\*Polyferments**  
**Polyformiate Coutu-**  
**rieux**  
**\*Polyiodure Gonnon**  
**\*Polyminéral Fort**  
  
**Polyna**  
**\*Polypeptine**  
**\*Polypeptonal**  
  
**Polyphosphorine Freyssinge**  
**\*Polyvaline D<sup>r</sup> Bayle**  
**Polyveinine**  
**Pommade 731**  
**Pommade adrénostyp-**  
**tique Midy**  
**Pommade à l'Inolène**  
**Pommade Bernhard**  
**\*Pommade Bertol Vichy**  
**Pommade Cuticura**  
**Pommade de l'Esterel**  
**Pommade de Séru**  
**Pommade Eon**  
  
**Pommade épidermo-**  
**gène**  
**Pommade Forgeue**  
**\*Pommade Fornet à l'In-**  
**suline**  
**Pommade Harsen**  
  
**Pommade Heliatol**  
**Pommade Johnson**  
**\*Pommades Kléos**  
  
**Pommade L. 3**  
  
**\*Pommade Lenoir**  
**\*Pommade Logeais**  
**\*Pommade Midy**  
**Pommade Néothorium**  
**Millot**  
**\*Pommade au Nestosyl**  
**\*Pommade Noelline**  
**Pommade Périol**  
**Pommade Phlébos**  
**Pommade Poncet**  
  
**Pommade Quartier**  
**Pommade Radioactive**  
**Raderm**
- 5, bd Montparnasse, Paris.  
 12, r. Castiglione, Paris.  
 6, r. Trencavel, Béziers.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 19, r. Drouot, Paris.  
 113, bd Voltaire, Paris.  
 LALEUF, 20, r. Laos, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 16, r. Henri Regnault, Courbe-  
 voie.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 61, r. de Seine, Paris.  
 DURET et RÉMY, Asnières  
 (Seine).  
 6, r. Abel, Paris.  
 10, r. de l'Orne, Paris,  
 JAUME, Tamaris (Gard).  
 1, r. Delacroix, Chartres.  
 Lab. MIDY, 4, r. du Colonel-  
 Moll, Paris.  
 ODILIA, 42, r. Mont-Cenis, Paris.  
 11, r. Lafayette, Paris.  
 HY, 61, av. de Choisy, Paris.  
 3, av. Lowendal, Paris.  
 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.  
 LETTRY, 69, r. de Sèvres, Paris.  
 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-  
 du-N.).  
 53, bd de Verdun, Fontenay-  
 sous-Bois.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 23, r. du Caire, Paris.  
  
 S. G. I. P., 73, r. Gal Sarrail, Le  
 Havre.  
 4, pl. Royale, Nantes.  
 DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.  
 2, r. des Cordeliers, Mcung-  
 sur-Loire.  
 3, r. Abreuvoir, Boulogne-sur-  
 Seine.  
 142, r. de Picpus, Paris.  
 24, r. Silly, Boulogne-sur-Seine.  
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 54, r. de la Bienfaisance, Paris.  
  
 72, r. Saint-Dominique, Paris.  
 Guingamp (C.-du-N.).  
 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 107, av. de la Reine, Boulogne-  
 s-Seine.  
 34 r. de Paris, Essonnes (S.-et-O.)  
 14, r. de la Pépinière, Paris.

- Pommade Radine**  
**\*Pommade Raiméa**  
**Pommade Rhinol**  
**\*Pommades ophtalmiques Chibrét**  
**Pommades Royer**  
**Pommades Stéryl**  
**Pommade-Vaccin Sallantale**  
**\*Pommade V.-E. Doumer**  
**Poroplaste A. K.**  
**\*Postérisan**  
**\*Post-Hypophyse Choay**  
**\*Potion Adol**  
  
**Potion Boissel**  
**Potion Bonnet**  
**Potion des Cordeliers de Seez**  
**Potion du D<sup>r</sup> Henry**  
  
**Potion Granval**  
**Poudre à l'Inolène**  
**Poudre américaine Leroy**  
**Poudre antiasthmaticque Henry**  
**\*Poudre anti-épileptique Cassarini**  
**Poudre antigastralgique**  
**Poudre Bellada**  
**Poudre Blot Laxative**  
  
**Poudre Cap**  
  
**\*Poudre Chaumel**  
**Poudre Cosy**  
**Poudre Cytisia**  
  
**\*Poudre Danica**  
**Poudre Deol**  
**Poudre dentifrice Charlard**  
**Poudre de Lausanne (Voir : Isotonyl).**  
**Poudre de Sapolan**  
  
**Poudre de viande**  
  
**Poudre du D<sup>r</sup> Cléry**  
**Poudre épidermogène**  
  
**\*Poudre Escouflaire**  
**Poudre Espic**  
**Poudre Evine**
- DUCLOS, Evreux (Eure).**  
 264, bd Voltaire, Paris.  
**DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.**  
**CHIBRET, 5, r. St-Hérem, Clermont-Ferrand.**  
 223, r. Saint-Martin, Paris.  
 94, r. Michelet, Alger.  
 42, r. des Grandes-Arcades, Strasbourg.  
**BOMEL, Annonay (Ardèche).**  
 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.  
 6, r. des Cigognes, Strasbourg.  
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.  
**GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.**  
 4, cours Circé, Bordeaux.  
 17, r. Cadet, Paris.  
 19, av. Secrétan, Paris.  
  
**Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).**  
 12-14, r. Fery, Reims.  
**ODILIA, 42, r. Mont-Cenis, Paris.**  
 12, r. de la République, Puteaux.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
  
**COLUMEAU, 19, r. St-Bazile, Marseille.**  
**BERNHARD, 11, r. Lafayette, Paris.**  
 24, r. Keller, Paris.  
**MONIN, 49, r. de Maubeuge, Paris.**  
 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.  
 78, fg St-Denis, Paris.  
 89, r. St-Georges, Nancy.  
**AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.**  
 50, r. de Turenne, Paris.  
 61, r. de Seine, Paris.  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 87, r. Lafayette, Paris.  
  
**CAVAILLÈS, 29, r. Singer, Paris.**  
 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.  
 18, r. de Maubeuge, Paris.  
 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.  
 à Baisieux (Nord).  
 20, r. Saint-Lazare, Paris.  
 16, r. Barbette, Paris.

Poudre Exhibard	6, r. Dombasle, Paris.
Poudre Fiort	61, r. de Seine, Paris.
Poudre Ferromanganique	8, r. Vivienne, Paris.
Poudre Gast	6, pl. Clichy, Paris.
Poudre Gécé	48, r. de Berri, Paris.
Poudre Génia	136, r. Chemin-Vert, Paris.
Poudre Gilbert Trillon	24, r. Eugène-Pelletan, Vitry-sur-Seine.
Poudre gynol	316, ch. d'Ixelles, à Bruxelles.
Poudre Gynule	CH. DEHAY, à Arras.
Poudre Héliatol	4, pl. Royale, Nantes.
Poudre Helvétia	50, r. de la République, Puteaux.
Poudre Hunier	REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
Poudre Klappa	GIBAN, à Sens (Yonne).
Poudre Lartigue	78, ig Saint-Denis, Paris.
*Poudre laxative de Vichy	1, quai Aulagnier, Asnières.
*Poudre Mass plastique	17, r. Soufflot, Paris.
*Poudre Noelline	GUINGAMP (C.-du-N.).
Poudre Optima	Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Poudre O. R. L.	4, r. d'Illzach, Mulhouse.
*Poudre Paterson	46, r. de Saintonge, Paris.
Poudre Pelevine	16, r. Barbette, Paris.
*Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze	48, r. de la Procession, Paris.
Poudre purgative Künckel	3, r. Watteau, Courbevoie.
Poudre Pylor	20, Gde-Rue, Besançon.
Poudre Remoro	JEHAN & BRÉRA, Montauban (L.-et-G.).
Poudre Rhodys	97, bd St-Germain, Paris.
*Poudre Rocher laxative	19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
Poudre Salva	Lab. Central de France, 1, r. de Châteaudun, Rennes.
Poudre de Sapolan	CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.
*Poudre Satine	7, r. Galvani, Paris.
Poudre de soufre Sapolan	CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.
Poudre Stear	12, r. de Buci, Paris.
*Poudre Stom	HERIN, 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine (Nord).
*Poudre Zani	52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye
Poudre Ziethen	85, r. des Morillons, Paris.
*Pragmoline	SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
Praunase Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
Préaléxol	49, r. de Paradis, Paris.
*Précikase	22, r. de la Sorbonne, Paris.
Précy	96, r. Lafayette, Paris.
Prélase	71, r. Ste-Anne, Paris.
*Prévalidine	4, r. d'Illzach, Mulhouse.
*Prévarsyl	89, r. du Cherche-Midi, Paris.
*Préventyl	74, r. des Jacobins, Amiens.

**\*Prézymase**

Primalgine

**\*Primulyze**

Prises Delqué

**\*Probios****\*Procalcyl**

Procuta Brisson

Produits antidiabétiques Dupont

Produits Benedictus

Produits Billault

Produits Chanteaud

Produits diététiques

Produits Gmet

Produits Gory

Produits de Malt

Produits organiques  
Richard

Produits Orhino

**\*Produits Pennès**(voir : *Pennès*)

Produits de Régime

**\*Prodynase****\*Progaster****\*Progone**

Progyne Thelliez

**\*Prométhine****\*Propeptase**

Prophylax

Prophylaxis

**\*Propidex****\*Propidon****\*Prostaphile Leisyn****\*Prostatols****\*Prosthénase Galbrun****\*Prostigmine**

Protaminol Byla

**\*Protensène**

Protéobiol

Protéol

Prothéine

Prothiol

Protiodé Grémy

**\*Protiodyne**

Protonic

Protolysine

LEBOIME, 3, r. Fernand-Widal,  
Paris.

24, bd Sébastopol, Paris.

23, r. Beateillis, Paris.

46, r. Pierre-Charron, Paris

1, av. Pasteur, Paris.

2, pl. Meissonnier, Lyon.

157, r. Championnet, Paris.

38, r. Rochechouart, Paris

74, r. Lamarck, Paris.

4, pl. de la Sorbonne, Paris.

54, r. Francs-Bourgeois, Paris.

FAVRICHON, à Saint-Sym-  
phorien-de-Lay (Loire)

27, fg. Montmartre, Paris.

51, r. des Mathurins, Paris.

5, r. Labroque, Strasbourg.

79, av. d'Orléans, Paris.

82, r. de la Croix-Verte, Albi,  
BOUTY, 3, r. de Dunkerque.  
Paris.LA NUTRICIA, 142, r. Frans-  
man, Bruxelles.

12, r. Charles-V, Paris.

NOVALIS, Oullins (Rhône).

15, r. Catulienne, St-Denis  
(Seine).

83, r. Maubeuge, Paris.

20, r. des Écoles, Paris.

132, r. de Turenne, Paris.

6, r. des Feuillants, Marseille.

11, r. de la Montagne-Ste-Gene-  
viève, Paris.SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
Paris.SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
Paris.

1 bis, r. Molitor, Paris.

BEAUXIS-LAGRAVE, 74, quai  
Jemmapes, Paris.

8, r. du Petit-Musc, Paris.

HOFFMANN LA ROCHE, 10,  
r. Crillon, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

LEJEUNE, 142, r. de Picpus,  
Paris.

BAILLY, 17, r. de Rome, Paris.

5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.

29, pl. Bossuet, Dijon.

4, r. Childebert, Lyon.

14, r. de Clichy, Paris.

29, pl. Bossuet, Dijon.

88, r. Duhesme, Paris.

7, r. Guillaume-Budé, Mont-  
geron.

- Protyline Roche**  
**\*Proveinase**  
**Provenine**  
**Provitol**  
**Proxytases**  
**\*Proxytol**  
**Prunagar**  
**Pruneline Bost**  
**\*Prunines Sentini**  
**Prurilyse**  
**Pruritol Raimoa**  
**Psinase Grémy**  
**\*Psoréon**  
**Psorialan**  
**Psorimangane**  
**\*Psothanol**  
**Psycho-Neuryl**  
**Psyliolaxine**  
**Puberglandol**  
**Pulcéine**  
**\*Pulmacardia**  
**Pulmicure**  
**Pulmine Byla**  
**Pulmobiasse**  
**Pulmobryne**  
**Pulmobules Hyva**  
**\*Pulmocardine**  
**Pulmocholine**  
**Pulmochrysine**  
**\*Pulmodion**  
**\*Pulmogrog**  
**Pulmogyl**  
**Pulmolaxol**  
**Pulmone**  
**Pulmonine Bouty**  
**Pulmopérol Marol**  
**\*Pulmosérum Bailly**  
**Pulmosirop**  
**Pulmovaccin**  
**\*Pulmoverne**  
**Pulmovitine**  
**Pulmostéryl**  
**Pulmostyl**  
**\*Pulsamone**  
**Pulsophyle**
- 10, r. Crillon, Paris.  
**MIDY Frères**, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 4, cité Magenta, Paris.  
**D<sup>r</sup> DEBAT**, 60, r. de Prony, Paris.  
 97, r. de Vaugirard, Paris.  
 id.  
 71, r. St-Jacques, Paris.  
 à Villefranche (Rhône).  
**DOMERGUE**, Agen (L.-et-G.).  
 51, Grande-Rue, Flers (Orne).  
 264, bd Voltaire, Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 3, r. des Rouairies, Dinan (Côtes-du-Nord).  
 14, r. St-Claude, Paris.  
**MERMINOD**, 49, r. Paradis, Paris.  
 55, bd de Strasbourg, Paris.  
 1, r. F.-Ponsard, Paris.  
**St-Rémy-de-Provence** (B.-du-R.).  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
**LE NAOUR**, Quimperlé (Fin.).  
 14, r. des Pyramides, Paris.  
 Eon, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).  
 26, av. Observatoire, Paris.  
**ADLER**, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
 38, r. N.-Dame de Lorette, Paris.  
 12, r. Grande, Evreux.  
 57, r. Origet, Tours.  
 20, r. d'Avron, Paris.  
**BONNAY**, Nogent-s.-Marne (Seine).  
 10, impasse Milord, Paris.  
**FERCOQ**, St-Maur (Seine).  
 33, r. Lauriston, Paris.  
**GERDA**, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.  
 Lab. **DARDENNES**, Tours.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 46, r. Gandon, Paris.  
 15 et 17, r. de Rome, Paris.  
**MEUNIER**, r. du Commerce, Montmarault (Allier).  
 23, r. des Moines, Paris.  
 13, r. D<sup>r</sup> Mazets, Grenoble.  
**P. FONTANIER**, Moulins-sur-Yèvre (Cher.)  
 à Châteauroux (Indre).  
 Lab. **LESCAROUX**, 3, r. Victor-Hugo, Châteauroux.  
 6, r. Dombasle, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.



- \*Pulvéol**  
**Pulvérisateur E. C. S.**  
**Pulvérisateur Vaast**  
**Pulvi-Lactéol du D<sup>r</sup>**  
 Boucard  
**Pulvinha-Pathuro**  
**\*Pulvita**  
  
**Punch Novela**  
**\*Puragar**  
**Purgalax**  
**\*Purgan Daguin**  
**Purgatif Voux**  
**Purgelettes Roux**  
  
**Purgemint**  
  
**\*Purgos**  
**Purgyl Koehly**  
**\*Pyo-Amphogel**  
  
**Pyodarsénol**  
**\*Pyodermase**  
  
**\*Pyoformine**  
**Pyol Hambro**  
  
**\*Pyo-Vaclydun**  
**Pyramidon U. R.**  
**Pyran**  
**Pyratone**  
**\*Pyrélaïne Collas**  
**\*Pyréthane**  
**Pyréthrine**  
  
**Pyréthrosol**  
**Pyridone D<sup>r</sup> Berlioz**  
**Pyrinol Vichy**  
**\*Pyri-Pyridium**  
  
**Pyrocidine**  
  
**Pyroclase**  
  
**\*Pyroléol Edet**  
**Pyrothéine**  
**\*Pyurol**
- 10, impasse Milord, Paris.  
 10, r. Caumartin, Paris.  
 22, r. de l'Odéon, Paris.  
 30, r. Singer, Paris.  
  
 LE GALLO, à Auray (Morb.).  
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.  
 St-Julien-en-Jarez (Loire).  
 46, r. de Rome, Marseille.  
 24, r. Montessuy, Paris.  
 5, r. Remises, St-Maur (Seine).  
 31, av. Michel-Bizot, Paris.  
 ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.  
 MOULIN, 50, r. de la République, Puteaux.  
 7 bis, r. Galvani, Paris.  
 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 RONCHÈSE, 6, r. Rothschild, Nice.  
 26, r. Pagès, Suresnes.  
 pl. du Marché, La Rochelle (Ch.-Inf.).  
 89, r. du Cher-che-Midi, Paris.  
 Lab. Central de France, 1, r. de Châteaudun, Rennes.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 71, bd Saint-Michel, Paris.  
 15, r. Augustin-Thierry, Paris.  
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.  
 CARTERET, 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 12, r. Pavée, Paris.  
 6, r. d'Alsace, Grenoble.  
 PATRICE, à Vichy.  
 Lab. SERVIER, Orléans (Loiret).  
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.  
 id.  
 3 r. de Paris. Auxerre  
 51, r. Gay-Lussac, Paris.

## Q

- \* **Quassia-Kina Rabot** 49, r. Bitche, à Courbevoie.
- Quassine Frémint** 6, r. Abel, Paris.
- \* **Quassine Houde** 9, r. Dieu, Paris.
- \* **Québralgine** 2, bd Pershing, Paris.
- \* **Quergemol** BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
- Quiétol** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Quiétyl** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- \* **Quina Baron** P. FOURNIE, 3, pl. Miséricorde, Lyon.
- Quinacinas** ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
- Quina-fer Mechling** à Mulhouse.
- Quina Laroche** COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Quinamagnésion** SAUBA, Montreuil, (Seine).
- Quinarsan** 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- \* **Quinarsol Grandval** 12 et 14, r. Féry, Reims.
- \* **Quinby** P. AUBRY, 54, r. Bienfaisance, Paris.
- Quinéase** 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
- \* **Quinéine** 21, r. Chaptal, Paris.
- \* **Quinicardine** 27, r. de la Procession, Paris.
- \* **Quinimuthol Saca** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Quinine Pelletier** VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
- \* **Quininol Phytine Ciba** 109, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Quinio-Goyl Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.
- \* **Quinio-Stovarsol** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Quinismuth** DEMARS, 89, av. Wagram, Paris.
- Quinium Roy** 81, bd Suchet, Paris.
- Quinobromé** Pharmacie centrale de France, 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.
- Quinobromine** TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- \* **Quinoformé Lacroix** 37, r. Pajol, Paris.
- \* **Quinoïdine Duriez** 20, pl. des Vosges, Paris.
- Quinol** G. HENRY, à Vernon (Eure).
- Quinolax** ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
- Quinophage** 12, r. Pavée, Paris.
- Quinopyrol** 172, r. d'Alésia, Paris.
- Quinorhéine Duteil** 90, av. St-Ouen, Paris.
- Quinotane Valgny** 12, r. Charles-V, Paris.

- Quino-Thorium**  
 \* **Quinovarine**  
 \* **Quinquina Gmet**  
**Quinquina granulé As-**  
**tier**  
**Quinquina Granval**  
**Quinquina Watelet**  
 \* **Quinsal**  
 \* **Quinthéryl**  
 \* **Quinuryl**  
**Quiphos Churchill**  
**Le Quotidien (Raisin)**
- 98, r. de Sèvres, Paris.  
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 27, fg Montmartre, Paris.  
 45, r. du Docteur-Blanche,  
 Paris.  
 12-14, r. Féry, Reims.  
 15, av. Montsouris, Paris.  
 34, r. Thiers, Gray.  
 LÉONARDON, Arcachon (Gir.)  
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Pa-  
 ris.  
 12, r. Castiglione, Paris  
 H. Chartier, à Saumur.

## R

- Radiargyl**  
**Radiobaume Adrian**  
**Radiobiogyl**  
**Radiocréméline**  
**Radiodine**  
**Radiofor**  
 \* **Radiogastrol**  
**Radiole**  
**Radiolysine**  
**Radio magnésium**  
**Rhemda**  
 \* **Radiopaque**  
**Radiophorine**  
**Radiosérum Jaboin**  
 \* **Radiotétrane**  
**Radiotonine**  
 \* **Radiotropine**  
**Radiovitine**  
**Radiovules**  
**Radipirine**  
**Radjunal Chevrier**  
**Raiforyl**  
**Raisin Moillard**  
**Raisin quotidien**  
**Rami-gouttes**  
**Rapidoate**
- 17, r. d'Hauteville, Paris.  
 9 et 11, r. de la Perle, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 25, r. Vaneau, Paris.  
 4, r. St-Anastase, Paris.  
 10, r. Maubeuge, Paris.  
 12, r. Pavée, Paris.  
 25, r. Vaneau, Paris.  
 41, r. de Rome, Paris.  
 17, r. d'Hauteville Paris  
 HEUDEBERT, 85, r St-Ger-  
 main, à Nanterre.  
 JOOSS, Montreuil (Seine).  
 24, r. Monttessuy, Paris.  
 40, r. Bellechasse, Paris.  
 4, r. St-Anastase, Paris.  
 Établ. Laboradium, 33, r St-  
 Jacques, Paris.  
 P. FONTANIER, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 17, r. d'Hauteville, Paris.  
 9, r. Victor-Letalle, Paris.  
 21, fg Montmartre, Paris.  
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,  
 Boulogne-sur-Mer.  
 8, r. Lacépède, Le Havre.  
 CHARTIER, Saumur (M.-et-L.)  
 à Levallois-Perret, 44, r. Chaptal.  
 BLOCH à Tomblaine (M.-et-M.).

**Ravix**

Réalgose  
 Réaline  
 \*Réalphène Buisson  
 Réargon  
 \*Reconstituant Mary  
 \*Rectagine  
 Rectaméline (Voir Pom-  
 made Logeais).  
 \*Rectanol  
 \*Rectoline  
 \*Rectopanbiline  
 Rectoplasme  
 \*Rectosol  
 Recto-Vaccin Salan-  
 tale  
 Recytile  
 Réfistine  
 Régulase Efgé  
 \*Regyl  
 Rein- Endocrisines  
 Fournier  
 Remède Boss  
 \*Renaleptine  
 Renalgine  
 Renetol  
 \*Renion Vincardi  
 \*Renocardine  
 Renotanic Grémy  
 \*Renovol  
 Renovules  
 \*Réparateur Thuau  
 \*Résocaïne  
 \*Résyl  
 \*Réthragine  
 Retropituine Carrion  
 Retusol  
 Revitalose  
 Révulsif  
 \*Révulsif Boudin  
 Révulsif liquide SR  
 \*Révulsif Milko  
 \*Révulsif Procipha  
 Révulsior  
 \*Révulsoplasme  
 \*Rbagadine Bracque-  
 mond

CRAISSON, 19, r. J.-J.-Rous-  
 seau, Paris.

4, imp. de Béarn, Paris.

GUILLAUME, Issoudun.

98, r. de Sèvres, Paris.

41, r. de Rome, Paris.

32, r. de l'Ouest, Paris.

22, r. de la Sorbonne, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

M. SOULAS, Surgères (Ch.-I.).

Lab. du D<sup>r</sup> Plantier, à Anno-  
 nay (Ardèche).

MILLET, à Rambouillet.

M. SOULAS, Surgères (Ch.-I.).

42, r. Grandes-Arcades, Stras-  
 bourg.

4, r. d'Illzach, Mulhouse.

20, r. du Conseil, Bruxelles.

40, av. Secrétan, Paris.

8, r. Richer, Paris.

7, r. Biscornet, Paris.

PRAX, à Brest (Finistère).

SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.

LONGUET, 34, r. Sedaine,  
 Paris.

DUVAL, à Falaise.

14, av. Georges-Clemenceau,  
 Nice.

57, r. Origet, Tours.

14, r. de Clichy, Paris.

22, r. de Paris, Houilles.

id.

22, fg. St-Michel, Angers.

BRESSIER, 102, r. Vincent,  
 Marseille.

109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.

22, r. de la Sorbonne, Paris.

54, fg. Saint-Honoré, Paris.

119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil  
 (Seine-et-Oise).

D<sup>r</sup>FRAYSSE, 47, r. de Neuilly,  
 Nanterre.

4, r. d'Illzach, Mulhouse.

9, av. Jean-Jaurès, Joinville-  
 le-Pont (Seine).

4, r. Levert, Paris.

60, cours Emile-Zola, Lyon.

4, r. d'Illzach, Mulhouse.

PAULIN & BARRE, Tours.

4, r. Levert, Paris.

71, av. de Villiers, Paris.

- Rhamnine** Henry  
**\*Rhéantine** Lumière  
**Rhéothymine**  
**\*Rhésal-Vicario**  
**\*Rhinadrargol**  
**\*Rhinadrol**  
**Rhinaldose**  
**Rhinalginol**  
**Rhinaseptogène**  
**\*Rhinaspir**  
**Rhinodol**  
**\*Rhinodrops**  
**\*Rhinofluine**  
**Rhino geraudol**  
**\*Rhinol**  
**Rhino-Lactéol du D<sup>r</sup>**  
**Boucard**  
**Rhinolan**  
**Rhinolin**  
**\*Rhino-Liposeptine**  
**Rhino-Pro**  
**Rhino-Salas**  
**\*Rhino Salva**  
**\*Rhino-Socoll**  
**Rhino Spécifique Favrot**  
**Rhinotherme**  
**Rhino-Vaccin Salan-**  
**tale**  
**\*Rhino-Vaclydun**  
**\*Rhizotanin**  
**\*Rhocya Dyn**  
**\*Rhodarsan**  
**\*Rhodazil**  
**Rhodocaïne Coutu-**  
**rieux**  
**\*Rhoféine**  
**\*Rhomnol Leprince**  
**Rhubarbe comp. de**  
**Baudry**  
**Rhumatoidine**  
**Ricéyl Billault**  
**Ricifruit**  
**Ricigel**  
**Ricilax**  
**Ricinopalmine**  
**Ricinpoudre**  
**Ricomalt**  
**\*Riodine Astier**
- 39, r. de Sclessin, Liège.  
 45, r. Villon, Lyon.  
 7, r. Guillaume-Budé, Mont-  
 geron.  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 56, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).  
 A. FALVY, 40, r. des Acacias,  
 Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.  
 PATRICE, à Vichy.  
 21, r. Feydeau, Paris.  
 50, r. de la République, Pu-  
 teaux.  
 194, r. de Rivoli, Paris.  
 5, r. François-Ponsard, Paris.  
 ADLER, 36, r. des Francs-  
 Bourgeois.  
 80, fg St-Denis, Paris.  
 30, r. Singer, Paris.  
 24, r. Jardel, Bordeaux.  
 82, av. Malakoff, Paris.  
 2, pl. des Vosges, Paris.  
 4, cité Magenta, Paris.  
 132, r. de Turenne, Paris.  
 Lab. Central de France, 10 r.,  
 de Belfort, Rennes.  
 132, r. de Turenne, Paris.  
 6, r. Dombasle, Paris.  
 Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.).  
 42, r. Grandes-Arcades, Stras-  
 bourg.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 56, bd, Ornano, Paris.  
 5, r. Claude-Decaen, Paris.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 id.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 62, r. de la Tour, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le  
 Havre.  
 ROBERTS & C<sup>ie</sup>, 5, r. de la  
 Paix, Paris.  
 60, rte de Châtillon, Paris.  
 5, bd. des Brotteaux, Lyon.  
 15, r. de Naples, Paris.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 45, r. du Docteur-Blanche, Paris.

- Rob Cabanès**  
**Rob Dussang**  
  
**Rob Gory**  
**\*Rob Oberlin**  
**Roléine**  
**\*Romarantyl**  
  
**\*Romarène**  
  
**Romarol**  
**Rongicort**  
**\*Rosayl A et B**  
**Rosanol**  
**\*Rosaseptor**  
**Royérine Dupuy**  
**\*Rozoderme**  
**\*Rubyl**  
  
**\*Rutonal**  
  
**Rylal Noyon**  
**\*Rythmos Leisyn**  
**\*Rythmosystol**
- 17, r. Cadet, Paris.  
 Lab. LESCAROUX, Château-  
 roux.  
 JOOSS, Montreuil (Seine).  
 TINARDON, 17, r. Cadet, Paris.  
 49, r. de Bitché, Courbevoie.  
 15, r. des Immeubles-Indus-  
 triels, Paris.  
 BEAUFOUR, 44, r. de la  
 Manuf. Nationale, Beauvais.  
 81, av. Malakoff, Paris.  
 DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.  
 101, r. de Paris, Rueil (S.-et-O.).  
 L. HINGLAIS, à Epernay.  
 21, r. Feydeau, Paris.  
 223, r. St-Martin, Paris.  
 11, r. des Deux-Ponts, Paris  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon.  
 Paris.  
 SPECIA, 21, r. Jean Goujon,  
 Paris.  
 24, r. Paul-Bert, Paris.  
 1 bis, rue Molitor, Paris.  
 COMTE, 60, r. St-Guilhem,  
 Montpellier.

## S

- Sacérase**  
**\*Saint-Aré**  
  
**\*Salantale**  
  
**Salaseny**  
**Salbiase**  
**Salbine du D<sup>r</sup> Fayès**  
**\*Salénal Ciba**  
  
**\*Salène Ciba**  
**Salicaïne**  
**Salicaire Dausse**  
**Salicaire Henry**  
**Salicairine**  
**Salicéral Clin**  
**Salicol Dusaule**  
**Salcydol**  
**Saliodé**
- 20, r. du Pré-St-Gervais, Paris.  
 Sté des Eaux minérales de  
 Decize (Nièvre).  
 NOTH & ANSELME, 42, Gran-  
 des-Arcades, Strasbourg.  
 132, r. de Turenne, Paris.  
 La Baule-sur-Mer (Loire-Inf.).  
 3, r. du 4-Septembre, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu.  
 Lyon.  
 id.  
 168, b. Saint-Germain, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 39, r. de Sclessin, Liège.  
 3, r. de Sévigné, Paris.  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 6, r. Abel, Paris.  
 69, r. de la Colonie, Paris.  
 GABAIL, 5, r. Lefebvre, Paris.

- \*Salsanos 5, r. de la Paix, Paris.
- \*Salubrine Phénix 14, r. de Birague, Paris.
- Salurol 56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.
- Salvacid MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- Salvanos 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
- Salva-Serum OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \*Salvatyl 42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie.
- \*Salvé 45, fg St-Denis, Paris.
- \*Salvebyl 45, r. du Fg-St-Denis, Paris.
- \*Salvenase Legoux 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).
- Salvocaf Villeneuve-les-Avignon (Gard).
- Salvoxyl 237, r. Lafayette, Paris.
- \*Salychlore 46, r. de Rome, Marseille.
- \*Salyptol Narty 134, bd Péreire, Paris.
- \*Salsysérum 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
- \*Sambul à Evreux (Eure).
- Sanalgine Lab. SANAL, St-Louis (Haut-Rhin).
- Sanalia 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- \*Sanas 72, r. du Commerce, Paris.
- Sanatogène Bauer 49, r. Paradis, Paris.
- \*Sandoptal Sandoz 20, r. Vernier, Paris.
- \*Sanedrine SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- \*Sanex Inhalant BOISSY, 49, r. Hoche, Courbevoie (Seine).
- Sanguifer Bouret 87, r. Lafayette, Paris.
- \*Sanguil 12, r. Saint-Gilles, Paris.
- Sanguine irradiée RIETHE, 40, r. des Abbesses, Paris.
- Sangul Dubat 80, fg. Saint-Denis, Paris.
- Sanka 54, quai de Boulogne, Boulogne-sur-Seine.
- \*Sanluol SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- \*Sanocrysine 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
- Sanocure REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
- \*Sanoformine 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- Sanogène REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
- \*Sanogyl 5, r. Paul-Barruel, Paris.
- Sanomint GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
- \*Sanoquinol CIBA, 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- \*Sanoram 5, r. Paul-Barruel, Paris.
- Sanos G. MIQUEL, 3, av. Lowendal, Paris.
- Santal Bretonneau 6, r. Saint-Claude, Paris.
- Santal Clin 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- \*Santal Midy 8, r. Vivienne, Paris.

*Santal Monal	6, r. Bridaine, Paris.
Santal Oberlin	17, r. Cadet, Paris.
Santal P. Petit	12, bd Saint-Martin, Paris.
Santal Salolé	37, r. Pajol, Paris.
Santal Salolé Cabanès	17, r. Cadet, Paris.
Santalène Daupez	37, r. des Lois, Toulouse.
Santalol Montagu	49, bd Port-Royal, Paris.
Santéine Montagu	49, bd. Port-Royal, Paris.
*Santhéose	4, r. du Roi-de-Sicile, Paris.
Santogénol Caubin	62, r. Erlanger, Paris.
Santomalt	U.C. E.P., 5, r. Labroque, Stras- bourg.
Santurol	21, r. des Roses, Dijon.
Sapobarbe	CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.
Sapocade	id.
Sapocrème	id.
*Sapolan	id.
Sapolysine	18, r. Daguerre, Paris.
Sapopâte	CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.
Sapogynol	36, r. des Martyrs, Paris.
Sarco-sérum	107, r. des Dames, Paris.
Sarcoglobine	DUCLOÏY et Cie, Arques (P.- de-C.).
Sarcolactine	28, bd de la Cluse, Genève.
*Sarcoptol	8, av. Rachel, Paris.
Sargéthyle	56, av. Ed.-Vaillant, Boulogne- Billancourt.
Sarkol	à Dammarie-les-Lys (S.-et-M.).
Satine	11, r. Joseph-Bara, Paris.
Saturalgine	3, bd Beaumarchais, Paris.
Saturol	Laborat. DURET & RÉMY, Asnières
*Saubarsinol	SAUBA, Montreuil (Seine).
Sauge Gmet	27, fg. Montmartre, Paris.
Savon dentifrice Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Savon de Sapolan	CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.
Savon Iodé Oberlin	17, r. Cadet, Paris.
Savons Denisol Brisson	157, r. Championnet, Paris.
Savons ichthyol, sou- fre, etc.	VIGIER, 12, bd Bonne-Nou- velle, Paris.
Savons Michon	49, bd Port-Royal, Paris.
*Savons Mollard	2, r. du Marché-des-Blancs- Manteaux, Paris.
Savon Perusol	114, r. du Temple, Paris.
Scatagar	46, r. de Rome, Marseille.
Scialine	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Sciaticure	121, av. St-Ouen, Paris.
*Scillarène	SANDOZ, 20, r. Vernier, Paris.
*Scillitrine	PERRIER, 17 bis, bd Roche- chouart, Paris.
Scléramine Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IV <sup>e</sup> ).
Sclérobyl	65, av. Victor-Hugo, Paris.



- Sclérolysine**  
**\*Sclérosérol**  
**\*Scléroserum**  
**Scléroveine Hardy**  
**Scorogènes**  
  
**\*Scurocaïne**  
  
**\*Scuroforme**  
**\*Sécacornine Roche**  
**Seccase**  
**\*Sédacrine**  
**\*Sédarsan Optima**  
  
**Sédasia**  
  
**Sédasthmine**  
**Sédatif Py**  
  
**Sédatine Christiaens**  
**Sédaton Leo**  
**\*Sédatoze Gigon**  
**\*Sédatuline**  
**Sedlitz Ch. Chanteaud**  
**Sedobore**  
**\*Sédobrol Roche**  
**Sédocardine**  
  
**Sédoderme**  
**Sédoflorine**  
**\*Sédofolline**  
**Sédoformine**  
**\*Sédogastrine**  
**Sedo-gaz**  
  
**Sédogène Sallé**  
**\*Sédogrippine**  
**\*Sédol Buisson**  
**Sédomens**  
**\*Sédoneurol**  
**Sédopelvien**  
  
**Sédopulmine**  
**\*Sédorhinol**  
  
**\*Sedormid Roche**  
**\*Sédosine**  
**Sédospasmine**  
**\*Sédotensyl**  
**Sédo Viette**  
**\*Seignet' fruits**  
  
**Seklé**  
**Sektal Grémy**  
**\*Selamon**  
**Sels Clarks**
- 31, r. des Francs-Bourgeois Paris  
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse  
 18, av. Daumesnil, Paris.  
 200, r. de Tolbiac, Paris.  
 COMAR, 20, r. des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,  
 Paris.  
 id.  
 10, r. Crillon, Paris.  
 DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.  
 SOULAS, Surgères (Ch.-Inf.).  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 DOUETTEAU, 20, r. Fg-St-  
 Honoré, Paris.  
 3, bd Beaumarchais, Paris.  
 58, bd Richard-Wallace, Pu-  
 teaux.  
 2, r. du Ch.-de-Mars, à Reims.  
 41, sq. Marie-Louise, Bruxelles.  
 25, bd Beaumarchais, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 46, r. de la Barrière, Elbeuf.  
 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.  
 80, r. du Rocher, Paris.  
 10, r. Crillon, Paris.  
 Lab. BARRE, 7, pl. Pérelre,  
 Paris.  
 FERRAND, Clichy (Seine).  
 24, bd Sébastopol.  
 4, r. du Mont-Cenis, Paris.  
 12, r. Pavée, Paris.  
 ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.  
 BOUDIER, 37, r. de Bourgogne,  
 Paris.  
 14, r. des Pyramides, Paris.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 98, r. de Sèvres, Paris.  
 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 196, r. de Paris, Montreuil-sous-  
 Bois.  
 6, r. Robert Estienne, Paris.  
 REGAGNON, 276, r. Lecourbe,  
 Paris.  
 10, r. Crillon, Paris.  
 38, b. Bourdon, Neuilly-s-Seine.  
 DEMASLES, Vienne (Isère).  
 6, r. Robert-Estienne, Paris.  
 163, r. de Flandre, Paris.  
 rte du Mouleau, Arcachon  
 (Gironde).  
 51, r. Rennequin, Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
 10, r. Vignon, Paris.  
 16 bis, r. Vivienne, Paris.

- Sel D.**  
**\*Sel de Hunt**  
**\*Sel d'Ewald**
- \*Sel digestif Bé Me Cé**  
**Sel de fruit Crolas**  
**\*Sélénol Couturieux**  
**\*Sel hépatique U. N.**  
 Arquevaux  
**Sel Impérial Borotar-**  
 trine  
**Sel Jolivet**  
**\*Sels du Jura**  
**\*Sels de lithine effe-**  
 vescents  
**Sel de Salins-Moutiers**  
 Selor  
 Selvan
- Sel Vichy-Etat**  
**Selnos-Vichy**  
**Sels radioactifs Ra-**  
 diana  
**\*Selunic**
- Sel Zem**  
**\*Sénécol**  
**Sénophile**  
**\*Séotral Leisyn**  
**\*Sephydine**  
**\*Septicémine Cortial**  
**Septocarbine**  
**\*Septolan**
- Septometrol**  
**Septylase**
- Séquardine Bouty**  
**\*Sérélbé**  
**Sérénol**  
**\*Serifer Laurençon**  
**Seringue (spéciale pour**  
 insuline)  
**Sérobei**  
**Séro-Citral**  
**Séro-Collosol**  
**Séro-comprimés Mé-**  
 rieux  
**\*Serodausse antitoxi-**  
 senyl  
**Séroferrine**  
**\*Sérogyna**  
**Séroléine**
- \*Seroma Rey**  
**Séroquinol**
- DUPUY, à Montluçon (Allier).**  
 16, r. Boulainvilliers, Paris.  
**BRACQUEMOND, 105, r. de**  
 Normandie, Courbevoie.  
 21, r. Violet, Paris.  
 56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 à Etampes (Seine-et-Oise).  
 22, r. de l'Arcade, Paris.  
 140, fg. Saint-Honoré, Paris.  
 11, av. de l'Opéra, Paris.  
 11, r. Milton, Paris.  
 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
 3, r. de Vouillé, Paris.  
**COUTURIEUX, 18, av. Hoche,**  
 Paris.  
 24, bd des Capucines, Paris.  
**COUBAND, 27, r. Drouot, Paris.**  
 20, pl. de la Nation, Paris.  
**G. MIQUEL, 3, av. Lowendal,**  
 Paris.  
 85, r. Turbigo, Paris.  
 23, r. Beautreillis, Paris.  
 17, r. de Berri, Paris.  
 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 Chabeuil (Drôme).  
 7, r. de l'Armorique, Paris.  
 4, r. Major, Pamiers.  
**LAFFORT, Joué - les - Tours**  
 (Indre-et-Loire).  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
**BRISSON & C<sup>ie</sup>, 157, r. Cham-**  
 pionnet, Paris.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 L. B. L., 18, r. Daguerre, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).  
 149, r. du Palais-Gallien, Bor-

deaux.

LBL, 18 r. Daguerre, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

116, bd Haussmann, Paris.

63, r. Victor-Hugo, Lyon.

4, r. Aubriot, Paris.

52, r. La Bruyère, Paris.

LBL, 18, r. Daguerre, Paris.

C. BARON, aux Sables-d'Olonne

(Vendée).

12, r. Montmartre, Dijon.

Ph<sup>ie</sup> centrale de France, 21, r.

des Nonnains-d'Hyères, Paris.

- Sérosan
- Séro-Sérum Rivier
- Serosine Boullé
- Sérosthényl Bouty
- Serpoline
- \*Sérum antiasthmaticque de Heckel
- Sérum antiphymique Vadam
- Sérum antityphoïdique de Rodet
- Sérum Collyre
- \*Sérum de Jousset
- Sérums de l'Institut Mérieux
- Sérum maternel
- \*Sérum neuropsychique
- \*Sérum Nevrosthénique Fraysse
- Sérum Nevrotone
- Sérum Normet
- Sérum Oliviero
- Sérum polymicrobien
- Sérums Fraisse
- Sérum sthénique
- \*Sérum végétal
- \*Setirtem
- \*S. F. E. O. L.
- S. I. A. V.
- Siccogyne
- Siccol
- Sicopion
- Sidéranyl
- Sidérarsan
- Siforcia
- Sigma-Cones
- Sigma-Sérum
- Sigmoïdine Grémy
- Sigmotal
- Sigol
- \*Silguine
- Silicate de soude Pellissier
- \*Silicyl
- \*Silisode
- TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 26-28, r. St-Claude, Paris.
- 12, av. de la Grande-Armée, Paris.
- 3, r. de Dunkerque, Paris.
- OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- CORBIERE, 27, r. Desre-naudes, Paris.
- (Voir : Antiphymique).
- Lab. AGUETTANT, 36, q. Fulchiron, Lyon.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- BRUNEAU, 17, r. de Berri, Paris.
- 17, r. Bourgelat, Lyon.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- 191, Fg-St-Antoine, Paris.
- 8, r. Jasmin, Paris.
- P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- 10, r. Vignon, Paris.
- 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
- ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- 8, r. Jasmin, Paris.
- OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- D<sup>r</sup> CUGUILLERE, 19, r. des Chalets, à Toulouse.
- 8, r. Passy, Paris.
- 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
- 8, av. des Sources, Nice.
- J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
- 5, r. Robert-Planquette, Paris.
- 31, r. Saint-Georges, Paris.
- 23, r. de Douai, Lille.
- Lab. HALLEANA, 4, imp. de Béarn, Paris.
- 163, r. de Flandre, Paris.
- 17, r. Cadet, Paris.
- 132, r. de Turenne, Paris.
- 14, r. de Clichy, Paris.
- 5, r. de Stockholm, Paris.
- à Saint-Fons (Rhône).
- 2, r. Boucicaut, Paris.
- 33, av. de Villiers, Paris.
- 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
- MICHELA, 9, r. Castex, Paris.

- \*Sinahin**  
**Sinapisme Rigollot**  
**\*Sinaplasme du D<sup>r</sup>**  
 Faure  
**\*Sinaqua Nutricia**  
**Sinaseptic**  
  
**Sinrénaline**  
**\*Sinusyl**  
  
**Sirodion**  
  
**Sirop d'Aconit Ecalte**  
**Sirop Alba**  
**Sirop antiasthmatique**  
 Favrot  
**\*Sirop antiphlogistique**  
 de Briant  
**Sirop d'Aubergier**  
  
**Sirop Avet**  
**Sirop Axaria**  
  
**Sirop Bala**  
**Sirop béchique Maire**  
**Sirop Belca**  
  
**Sirop Berthé**  
**Sirop Blagny**  
**Sirop de Blancard**  
**Sirop Blottière**  
**\*Sirop Brahma**  
  
**Sirop Briant**  
**Sirop Britannia**  
**Sirop de Broméine**  
  
**Sirop bromoformique**  
 Henry  
**Sirop Bronchophilos**  
**Sirop Brumauld**  
**Sirop Buci**  
  
**Sirop Bural**  
**Sirop carbolique du**  
 D<sup>r</sup> Vialle  
**\*Sirop Castanol**  
**Sirop composé aux Hy-**  
 pophosphites Fellows  
**\*Sirop de Créosote Va-**  
 cheron  
**Sirop de Dentition Al-**  
 deni  
**Sirop Delabarre**  
**Sirop de Raifort iodé**  
 de Grimault
- 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 13, r. Pavée, Paris.  
 FAURE & DUSSUEL, à Aix-  
 les-Bains.  
 142, r. Fransmann, Bruxelles.  
 LE MAROIS, 197, av. de Ver-  
 sailles, Paris.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 CHATEAU, 137, av. Parmen-  
 tier, Paris.  
 228, r. de Paris, Montreuil-  
 sous-Bois.  
 98, r. de Sèvres, Paris.  
 61, r. de Seine, Paris.  
 BLOTTIERE, 6, r. Dombasle,  
 Paris.  
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.  
 COMAR, 20, r. des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
 DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.  
 AXAREL, 15, r. Catulienne,  
 St-Denis.  
 BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse)  
 171, r. de Belleville, Paris.  
 THÉVENOT, r. des Roses,  
 Dijon.  
 8, fg Saint-Denis, Paris.  
 PAMÉLA, Forges-les-Eaux.  
 64, r. La Rochefoucauld, Paris  
 6, r. Dombasle, Paris.  
 COULOUX, 116, r. du Pont,  
 Auxerre (Yonne).  
 131, r. Vaugirard, Paris.  
 Labor. BERTHIER, Grenoble.  
 MONTAGU, 49, bd Port-Royal,  
 Paris.  
 39, r. de Sclessin, Liège (Bel-  
 gique).  
 6, r. Berbizy, Dijon.  
 65, cours National, Saintes.  
 COMAR, 20, r. des Fossés  
 Saint-Jacques, Paris.  
 1, rue Rambuteau, Paris.  
 87, r. Lafayette, Paris.  
  
 9, pl. Municipale, Tulle.  
 5, r. de la Paix, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
  
 15, r. Catulienne, St-Denis.  
 (Seine).  
 78, laub. Saint-Denis, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.

- Sirop Derbecq**  
**Sirop de digitale**  
**Sirop Diver**  
**Sirop Dubois au créosal**  
 (Voir : *Créosal*).  
**Sirop du Dr Dubreuil**  
**Sirop Ducode**  
**Sirop de Dusart**  
**Sirop Dr Dusourd**  
**Sirop Escolle**  
 \***Sirop Famel**  
**Sirop ferrug. Laroze**  
**Sirop Flamand**  
**Sirop C. Frany**  
**Sirop Gabi**  
 \***Sirop de Gaiarsol**  
**Sirop Gécé**  
 \***Sirop Gélinau**  
**Sirop Gélvart**  
**Sirop de Gilbert**  
**Sirop Gigon**  
 \***Sirop Girard**  
 \***Sirop de glycérophosphates Vacheron**  
 \***Sirop Gribell**  
**Sirop Grimault**  
**Sirop du Dr Hecquet**  
**Sirop Helgé**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
 Byla  
**Sirop d'Hémoglobine**  
 Grimault  
**Sirop d'Hémoglobine**  
 Henry  
**Sirop d'Hémoglobine**  
 Star  
**Sirops Henry**  
**Sirop Henry Mure**  
**Sirop d'Hypophosph.**  
 de chaux  
**Sirop d'Iodéine**  
**Sirop Iodermol Vigier**  
**Sirop Iodo-noyer**  
 \***Sirop iodotannique**  
 Guillermon  
**Sirop Jackson**  
**Sirop Jane**  
**Sirop Jolivet**
- 12, rue Cadet, Paris.  
 LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.  
 50, r. de la République, Puteaux.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 37, r. Galilée, Paris.  
 P. ROCHE, Aigueperse (P.-de-Dôme).  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 LAMAR, pl. Forbin, Aix. (B.-du-R.).  
 16 à 22, r. des Orteaux, Paris.  
 2, r. des Lions, Paris.  
 6, pl. Clichy, Paris.  
 52, av. de la République, Paris.  
 AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.  
 BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 132, r. de Turenne, Paris.  
 MOUSNIER, 9, bd Carnot, Bourg-la-Reine.  
 24, r. Bagnole, Paris.  
 Maisons-Laffitte (S.-et-O.).  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 19, r. Drouot, Paris (IX<sup>e</sup>).  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 49, bd Port-Royal, Paris.  
 Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
 2 r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
 71, r. Saint-Jacques, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 49, bd Port-Royal, Paris.  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.  
 Gde rue au Bois, Bruxelles  
 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.  
 140, fg Saint-Honoré, Paris.

- Sirop Jovin** 172, r. d'Alésia, Paris.  
**Sirop de Kola Henry** 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).  
**Sirop Koff** BEDEIL, Lavelanet (Ariège).  
**Sirop Kopé** 4, r. Alexandre-III, Dunkerque.  
**Sirop Lagasse** 8, r. Vivienne, Paris.  
**Sirop de Lamouroux** 6, r. Dombasle, Paris.  
**Sirop Lanchat** Lab. COMTOS, à Feschés-le-Châtel (Doubs).  
**Sirop Laurin** 86, bd Port-Royal, Paris.  
**Sirop laxatif Gobey** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
**\*Sirop Lecœur** GAVIN, Vimoutiers (Orne).  
**Sirop Lex** MARTINET, 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
**\*Sirop de Lovel** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
**Sirop Magali** 43, av. Kleber, Paris.  
**Sirop du Dr Manceau** à Château-du-Loir (Sarthe).  
**\*Sirop de la Maternité** 7, r. Galvani, Paris.  
**Sirop Maver** S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.  
**Sirop Mignard** 29, bd Sébastopol, Paris.  
**Sirop de Mimotannin Iodo-phosphaté** 3, r. Bab-Azoun, Alger.  
**\*Sirop minéral sulf. Crosnier** 44, r. de Lagny, Montreuil.  
**\*Sirop Mireille** Lag. LEGENDRE & C<sup>ie</sup>, Section DS. Houilles (S.-et-O.).  
**\*Sirop Morlas** 18, r. Favart, Paris (II<sup>e</sup>).  
**Sirop Mory** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**Sirop Myrianis** AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.  
**Sirop Névra** FAURE, 80 r. du Rocher, Paris.  
**\*Sirop Nogués** 7, r. Galvani, Paris.  
**Sirop Nourry** 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris. (Voir : Vin Nourry).  
**Sirop Patrat** 61, r. de Seine, Paris.  
**Sirop phéniqué Vial** 8, r. Vivienne, Paris.  
**Sirop Polybromuré Laroze** 2, r. des Lions, Paris.  
**Sirop Polyformiaté Pr. Chapelle** 8, r. Vivienne, Paris.  
**Sirop polyiodure Gonnon** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
**\*Sirop Prega** (Voir : Capsules Préga).  
**Sirop Rabuteau** COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.  
**Sirop Rami** r. Chaptal, Levallois-Perret.  
**Sirop Ramos** 7, r. Capeyron, Bordeaux.  
**Sirop Rébellion** 6, r. Pas-de-la-Mule, Paris.  
**\*Sirop du Dr Reinwillier** 64, r. La Rochefoucauld, Paris.  
**Sirop Rhegia** BONNAURE, Aïès (Gard).  
**\*Sirop Roche au thiocol** 10, r. Crillon, Paris.  
**\*Sirop Sentini** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).  
**Sirop de Sirtal** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

- \*Sirop de Teyssedre** 34, fg d'Angoulême, Limoges.  
**Sirop Thomas** 2, r. Volney, Paris.  
**\*Sirop Tinardon** 17, r. Cadet, Paris.  
**Sirop tribromuré Gi-** 25, bd Beaumarchais, Paris.  
**gon**  
**\*Sirop Vacheron au** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
**galacol**  
**Sirop Vauthier Marcq** 98, r. du Chemin-Vert, Paris.  
**Sirop vermifuge Ré-** AXAREL, 15, r. Catulienne,  
**monia** St-Denis.  
**\*Sirop Viano** 15, r. Catulienne, St-Denis  
 (Seine).  
**Sirop Viette** 163, r. de Flandre, Paris.  
**Sirop Zemmette** 85, r. Turbigo, Paris.  
**Sirtal** COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fossés-  
 St-Jacques, Paris.  
**\*Sistex** 18, r. St-Amand, Paris.  
**\*Sistomensine Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
**S. I. V. A.** Labor. des Immuno-Vaccins,  
 av. des Sources, Nice.  
**Sodamyl** LEGRAS, à Avranches (Manche).  
**\*Soderséine** 18, r. de Beaune, Paris.  
**Sodisalyne** PILLET, 5, av. Victoria, Paris.  
**\*Sodogastrol** 229, cours Gambetta, Lyon.  
**\*Sodolactine** Lab. GERDA, 163, bd Croix-  
 Rousse, Lyon.  
**Sodorose** Labor. Hyg. Appliquée, 64, bd  
 Voltaire, Paris.  
**Sodotetrane** 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
**\*Sodothioli** Labor. de Médecine Expé-  
 rimentale, Beauvais.  
**Solargol** 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.  
**\*Sol... i Fraisse** 8, r. Jasmin, Paris.  
**Solicide** 94, r. Michelet, Alger.  
**\*Solmuth** 14, r. Gravel, Levallois (Seine).  
**Solubaine Nativelle** 27, r. de la Procession, Paris.  
**Solucalcine** D<sup>r</sup> COIRRE, 5, bd Montpar-  
 nasse, Paris.  
**\*Solucamphre Dela-** 16, r. Henri-Regnault, Cour-  
**lande** bevoie.  
**Soluprotine Roche** 10, r. Crillon, Paris.  
**Solurase** 71, r. du Fort, Aubervilliers.  
**Solurol** COMAR, 20, r. des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
**Soluté Gaube du Gers** 54, r. de la Bienfaisance, Paris.  
**Soluthanol** 55, bd de Strasbourg, Paris.  
**\*Solution Bardet** 76, r. de Sèvres, Paris.  
**Solution de di-phos-** ARSAC, Montélimar (Drôme).  
**phate de chaux**  
**Solutions Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**Solution Coirre** 5, bd Montparnasse, Paris.  
**Solution Cunaud** pl. du Marché, La Rochelle  
 (Ch.-Inf.).  
**Solution du D<sup>r</sup> Jacobson** CARRION, 54, fg St-Honoré,  
 Paris.  
**Solution Fumouze** 78, fg Saint-Denis, Paris.  
**Solution Henry Mure** à Annonay (Ardèche).

- \*Solution huileuse au 72, r. St-Dominique, Paris.  
     Nestosyl  
     Solution Laroyenne 7, bd Denain, Paris.  
 \*Solution Normet 10, r. Vignon, Paris.  
 \*Solution Pautauberge 10, r. de Constantinople, Paris.  
     Solution salicylate 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).  
     Henry  
     Solution Schoum 84, av. de St-Mandé, Paris.  
     Solution Valens 52, r. Decamps, Paris.  
     Solution V.-E. Doumer BOMEL, Annonay (Ardèche).  
     Solution Watelet BLANCHOT, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris.  
  
     Solvochine 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
     Solvosclérose 83, bd de la Villette, Paris.  
 \*Solvuric 14, r. de Birague, Paris.  
     Somalguine 18, av. Daumesnil, Paris.  
     Somnacétine MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.  
  
 \*Somnicones 194, r. de Rivoli, Paris.  
 \*Somnifène Roche 10, r. Crillon, Paris.  
     Somnitis LYONS, 30, r. Monge, Paris.  
     Somnobrol 50, r. de l'Université, Liège.  
     Somnofan TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
  
     Somnopol 80, r. du Rocher, Paris.  
 \*Somnothyrid Lab. CANTIN, Palaiseau (S.-et-O).  
  
 \*Sonagar MICHELON, 20, bd Heurte-  
     loup, Tours.  
     id.  
 \*Sonamel 2, pl. des Vosges, Paris.  
 \*Sonène SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
     Paris.  
 \*Soneryl 128, r. du Mont-Cenis, Paris.  
  
     Sonomalt POINTET & GIRARD, 30,  
     r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
 \*Soporaiose 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
  
 \*Soporigène Delqué 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
     Sornyal 12, r. Castiglione, Paris.  
     Sorol Churchill SAUTER, à Bellegarde (Ain).  
     Sparablanc 18, r. de Jouvence, Dijon.  
     Sparaplast Fournier 9, r. Dieu, Paris.  
     Spartéine Houdé 20 r. des Fossés-St-Jacques, Paris.  
     Spartoval DUTEIL, 90, av. de St-Ouen,  
     Paris.  
     Spasalgique Alexandre, 41, r. de Rome, Paris.  
  
 \*Spasmacol 18, av. Hoche, Paris.  
     Spasma Couturieux 10, r. Crillon, Paris.  
 \*Spasmalgine Roche Ancenis (Loire inférieure).  
 \*Spasmalone 1, r. Christine, Paris.  
 \*Spasmine Jolly 24, av. de Châtillon, Paris.  
     Spasmolyse 239, cours de l'Yser, Bordeaux.  
 \*Spasmoneural MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
     Paris.  
     Spasmopurine 6, r. d'Assas, Paris.  
  
 \*Spasmosédine 64, bd Barbès, Paris.  
 \*Spasneurol



- Spécific Brachat**  
 Lab. chimico-pharmac., à Livry-Gargan (S.-et-O.).
- \*Spécifique Bejean**  
 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Spécifique Broca**  
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris
- Spécifique Lancelot**  
 100 ter, av. St-Mandé, Paris.
- Spécifique Rousset**  
 9, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
- Spécifique Thorat**  
 Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
- \*Spectrol**  
 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- Sphérulines - Moncour**  
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-s.-Seine.
- (Voir Opothérapie)**
- Spinkterol**  
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- \*Spicanol**  
 1, r. de l'Ouest, Neuilly-s.-Seine.
- Spiralgine**  
 Lab. SERVIER, Orléans
- Spirillan**  
 23, r. de Berne, Paris.
- Spirobismol**  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- \*Spirochtan**  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Spirogyl**  
 La Biothérapie, 5, r. Paul Barruel, Paris.
- Splénarmone**  
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Splénique (Extrait du Dr Bayle)**  
 8 et 10, r. de l'Orne, Paris.
- plénocarvine**  
 88, r. Duhesme, Paris.
- Splénocrinol**  
 Lav. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris
- \*Splénocrisine**  
 7, r. Biscornet, Paris.
- Splénodose**  
 47, r. de Neuilly, Nanterre.
- Spléno-Magnésium**  
 FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.
- \*Splénomanganol**  
 191, Pg St-Antoine, Paris.
- Splenora**  
 LÉONARDON, Arcachon (Gironde).
- Splénose**  
 163, r. de Flandre, Paris.
- Splenotanic**  
 GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- \*Splenyl**  
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- \*Spyrolides**  
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- \*Stal-Kosal**  
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-Seine.
- Stabyne**  
 REBOUL, Pt. Ste-Maxence.
- \*Stalysine**  
 41-47, r. Docteur-Blanche, Paris.
- \*Stanion Couturieux**  
 18, av. Hoche, Paris.
- \*Stanno-Bardane Henry**  
 39, r. Sclessin, Liège.
- Stannolip Henry**  
 39, r. Sclessin, Liège.
- \*Stannoxyyl**  
 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Staphydex**  
 WARIN, 4, chemin de la Muette, Paris.
- \*Staphylagone**  
 CARRION, 54, f; St-Honoré, Paris.
- \*Staphylase du Dr Doyen**  
 LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
- \*Staphylocide Audras**  
 112, r. de Gerland, Lyon.
- \*Staphylo-coccine Fraquet**  
 21, r. Chaptal, Paris.

- Staphyloplast**  
**\*Staphylotanol**  
**\*Staphylo-Vaclydun**  
**\*Staprolysat**  
**Staréol Dupraz**  
**Stasol**  
  
**Stéarol**  
**Sténergine**  
**Sténofier Lumière**  
**Sténol Chanteaud**  
**Stenon du D<sup>r</sup> Gelm**  
**Sténophyl Vigan**  
**\*Sténovarine**  
**\*Stéramine**  
  
**\*Stéridrophil Wuhrlin**  
**Stérilait**  
**Stérinase Vincent**  
**\*Stérobi**  
**Sterocalcium**  
**\*Stérogyl**  
  
**\*Sthénoléine**  
  
**\*Sthenoxal**  
**Stibial**  
**\*Stillargol**  
**Stoch-vaccin Bovy-**  
**Cantonnet**  
**Stomachine**  
  
**Stomacol Boulet**  
**Stomagyl**  
**Stomal**  
  
**Stomarine Billault**  
**\*Stomarol**  
  
**Stomaton**  
**\*Stomaxines**  
**\*Stoméol Vichy**  
**Stommol Leisyn**  
**\*Stomobrol**  
  
**\*Stomophile**  
**\*Stomoxygène**  
  
**\*Stoprel**  
**\*Stovafer**  
**\*Stovaine Billon**  
  
**\*Stovarsol**  
**\*Stovédrine**  
  
**\*Strepto-vaclydun**  
**Strictoforme Dausse**
- FOURNIER, Dijon.**  
 55, bd. de Strasbourg, Paris.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 41, r. Etienne-Macel, Paris.  
**LANCOSME, 71, av. Victor-**  
**Emmanuel-III, Paris.**  
**M, Bonnet Saint-Etienne.**  
 4, pl. des Vosges, Paris.  
 45, r. Vilon, Lyon.  
 54, r. Franco-Bourgeois, Paris.  
**D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude,**  
 103, r. Saint-Lazare, Paris.  
 132, r. de Turenne, Paris.  
**Lab. Antiseptiques Chlorés,**  
 40, r. Thiers, Le Havre  
 à Houdouville (Eure).  
 10, r. Cardinal-Mercier, Paris.  
 14, av. Mac-Mahon, Paris.  
 15, r. Catulienne, St-Denis.  
 132, r. de Turenne, Paris.  
**Lab. Chimiothérapie, 89, r. du**  
**Cherche-Midi, Paris.**  
 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-  
 Moulineaux.  
 47, r. Bokanowski, Asnières.  
 21, Jean-Goujon, Paris.  
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 19, r. Drouot, Paris.  
  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois,**  
**Bruxelles.**  
 14, r. Eugène-Delacroix, Paris.  
 143, c. de la Somme, Bordeaux.  
**Lab. PY, 58, bd R.-Wallace,**  
**à Puteaux (Seine).**  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
**ROLLAND, 31, r. des Francs-**  
**Bourgeois, Paris.**  
 6, r. Robert-Estienne, Paris.  
 id.  
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).  
 1 bis, rue Molitor, Paris.  
 4, av. Brazza, Romainville  
 (Seine).  
 17 bis, av. Parmentier, Paris.  
 2 bis, r. du Chevalier-de-la-Barre,  
 à St-Quentin.  
 47, r. Bokanowski, Asnières.  
 45, fg Saint-Denis, Paris.  
**SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,**  
**Paris.**  
 id.  
**LICARDY, 38, bd Bourdon,**  
**Neuilly-sur-Seine.**  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).

- Strontium Paraf-Javal**  
**Strontiurane**
- Strophantal**  
**\*Strophantine et Strophantus Catillon**  
**\*Strychnal Longuet**  
**\*Strychnarsitol Robin**  
**Strychno Cacodyl**  
**\*Strychnotonine**
- \*Stupho**  
**Succharure Leprince**  
**Succomusculine**  
**Suc-Durham**  
**Suckine**  
**Sucre Diabetalm**  
**\*Sucre Edulcor Ferré**  
**Suc Simon**  
**Sucroquinine**
- Sudyl Roberts**  
**\*Sulfa ampoules**
- Sulfan**  
**Sulfarène**  
**\*Sulfarsenol**  
**Sulfarsinol Lefèvre**  
**\*Sulfarsiode**  
**Sulfate d'Atropine Clin**  
**Sulfate de quinine Léo**
- Sulphydral Ch. Chan-teaud**  
**Sulfinhal**  
**Sulfo-benzol**  
**Sulfo-bore Roy**  
**\*Sulfobyl**  
**\*Sulfocadol**
- \*Sulfocol**  
**\*Sulfocrème Lilless**
- Sulfodelbiase**  
**\*Sulfodermol**  
**\*Sulfoidol Robin**  
**Sulfol Charlard**  
**Sulfoléine Rozet**  
**Sulfo-Mésarca Roche**  
**Sulfo-mel du Dr Fayès**  
**Sulfo-Perless**  
**Sulforéon**
- Sulfo-rhinol Fayès**  
**\*Sulfosine Léo**  
**\*Sulfo-Thiorine**
- 8, r. Vivienne, Paris.**  
**MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.**  
**62, r. Marengo, St-Étienne.**  
**3, bd Saint-Martin, Paris**
- 34, r. Sedaine, Paris.**  
**13, r. de Poissy, Paris.**  
**21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.**  
**94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois.**  
**38, r. Mainguy, Bondy (Seine).**  
**62, r. de la Tour, Paris.**  
**10, r. de l'Orne, Paris.**  
**14, r. de Birague, Paris.**  
**12, av. Stéphane-Mallarmé, Paris**  
**61, r. Vandamme, Paris.**  
**19 r. Grégoire-de-Tours, Paris.**  
**Chalon-sur-Saône.**  
**7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.**  
**5, r. de la Paix, Paris.**  
**Sté PYRNE, Cauterets (Htes-Pyr.).**  
**DALAYEUN, Sannois (S.-et-O.) (Lab. du), à Agen.**  
**19-21, r. Van-Loos, Paris.**  
**52, r. Decamps, Paris.**  
**MURARD, 4, r. Désirée, Lyon.**  
**20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.**  
**11, square Marie-Louise, Bruxelles.**  
**54, r. Francs-Bourgeois, Paris.**
- 98, r. J. Maillotte, La Madeleine.**  
**239, fg Saint-Honoré, Paris.**  
**81, bd Suchet, Paris.**  
**Lafarge, 6, bd Arago, Paris.**  
**16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.**  
**M. Godart, Andenne (Belgique).**  
**FISCH & Co 4, r. d'Alzach, Mulhouse.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.**  
**13, r. de Poissy, Paris.**  
**12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.**  
**à Vendôme (Loir-et-Cher).**  
**10, r. Crillon, Paris.**  
**3, r. du 4-Septembre, Paris.**  
**26, r. Friant, Paris.**  
**3, r. des Rouairies, Dinan (O.-du-N.).**  
**199, r. St-Denis, Paris.**  
**39, r. Fondaudège, Bordeaux.**  
**39, r. Fondaudège, Bordeaux.**

- Sulfostan**  
**Sulfoxal**  
 \*Sulfoxyl  
 Suroxyne  
 Sulfur concentré Dax  
 \*Sulfureux Pouillet  
 Sulfurine du Dr Langlebert  
 \*Sulfurion Couturieux  
 \*Sulfuryl Monal  
 \*Sulf.-Y  
 Sulphaqua Pépin  
 Sulphénine Trouette  
 \*Sulphium  
 Sulsol  
 \*Sunalool  
 Suniforme  
 \*Sunoxol  
 Super-digestif  
 Supernucléine Legrand  
 \*Supparygre du Dr Faucher  
 Supparsol  
 \*Suppocalgos Lagoutte  
 Suppo-Guivrol  
 \*Suppo-Gynals  
 Suppositoires Almine Louveau  
 Suppositoires Anugeol  
 \*Suppositoires au Nestosyl  
 \*Suppositoires Chau-mel  
 Suppositoires Colludrol  
 \*Suppositoires Corbière  
 Suppos. Corbière au 606  
 \*Suppositoires à l'Esculéol  
 Suppositoires Eon  
 \*Suppositoires Gonnon  
 \*Suppositoires Hymel  
 Suppositoires Lama-line  
 \*Suppositoires Logeais  
 \*Suppositoires Midy
- CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.**  
**FANYAU, 48, r. Claude-Lorrain, Lille.**  
**102, r. Vincent, Marseille.**  
**43, r. Laffitte, Paris.**  
**MORELLET à Bagnoles-de-l'Orne.**  
**62, r. du Cardinal-Lemoine.**  
**9, r. de la Perle, Paris.**  
**13, av. Hoche, Paris.**  
**6 r. Bridaine, Paris.**  
**SALAVERT, Ste-Foy-la-Grande (Gironde).**  
**116, bd Haussmann, Paris.**  
**15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.**  
**BRISSON, 157, r. Champlonnet, Paris.**  
**10, r. St-Lazare, Paris.**  
**145, bd Haussmann, Paris.**  
**11, r. de la Station, Asnières.**  
**KUHLMANN, 145, bd Haussmann, Paris.**  
**96, r. Monge, Dijon.**  
**96, r. Monge, Dijon.**  
**34, bd de Clichy, Paris.**  
**37, r. de Bourgogne, Paris.**  
**229, cours Gambetta, Lyon.**  
**Matray, Aubières (Puy-de-D.).**  
**124, r. du Bac, Paris.**  
**78, bd des Batignolles, Paris.**  
**BOEGLIN, 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.**  
**72, r. St-Dominique, Paris.**  
**78, fg Saint-Denis, Paris.**  
**ANDRÉ, r. des Etuves, Montpellier.**  
**27, r. Desrenaudes, Paris id.**  
**16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.**  
**3, r. des Rouairies, Dinan (O.-du-N.).**  
**14, r. Victor-Hugo, Lyon.**  
**LUTEIL, 90, av. de St-Ouen, Paris.**  
**AFFRE, St-Mandé (Seine).**  
**24, r. de Silly, Boulogne-sur-S.**  
**4, r. du Colonel-Moll, Paris.**

- \*Suppositoires Pachaut 130, bd Haussmann, Paris.
- \*Suppositoires Pepet 56, bd. Péreire, Paris.
- \*Suppositoires Pyrax Lab. Chavialle, 70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).
- \*Suppositoires Rocav. 116, bd Haussmann, Paris
- Suppositoires Royer 223, r. Saint-Martin, Paris.
- \*Suppositoires S. F. E. 15, r. Catullienne, St-Denis
- A. T.
- \*Suppotonic Lagoutte 229, cours Gambetta, Lyon.
- Suppo-Vaccin Salan- 42, r. Grandes-Arcades, S ras-
- tales bourg.
- Suprarénidine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Suractivase 122, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Suralimentine Rolland 41, r. d'Amsterdam, Paris
- \*Surbical 42, r. Mont-Cenis, Paris.
- Surlax 24, bd Sébastopol, Paris.
- \*Surparine 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois (Seine).
- \*Surrasthénine BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 7, r Biscornet, Paris.
- Surrénale - Endocri- 14, r. de Clichy, Paris.
- sines Fournier 7, r. Saint-André, Le Mans.
- Surrénaline Bouty 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- Surrénotanin Grémy 4, q. Pasteur, Sète.
- \*Sylcase PERDRIGEON, Vaires (S-et-M).
- Sylvol 26 bis, r. Dombasle, Paris.
- Sylvor 40, r. des Acacias, Paris.
- Sympathol 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- \*Sympatnyl 48, Av Théophile-Gautier, Paris.
- Synase 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- Syncaïne Clin Lab. CRUET, 13, rue Miollis, Paris (XV<sup>e</sup>).
- \*Synchrines Choay 3 à 9, r. de l'Abreuvoir. Bou-
- \*Synergyl Vadam lorne-sur-Seine
- \*Synthaline B BAUDE, St-Aubert (Nord).
- Synthol
- \*Syphonéol

## T

- Tabedo SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Tablettes Boval DEHAY, Arras (P.-de-C.).
- Tablettes Enurésan KUNTZMANN, à Ribeaupville (Haut-Rhin).

- \*Tablettes Hova  
 Tablettes oxymenthol  
 Perraudin  
 \*Tablettes Perroud  
 Tablettes Renard  
 Tablettes de Phos-  
 pharsol  
 Tablettes Stuart  
 Tablettes de thyroïde  
 \*Tablettes Zeva  
 \*Taburol Monal  
 \*Tachygastrine  
 Tachysmuth  
 \*Taenifuge Bardet  
 Taenifuge des Dames  
 de France  
 \*Taenifuge du Dr Du-  
 hourcau  
 \*Taenifuge du Dr Jac-  
 quème  
 Taenifuge Ercé  
 \*Taenifuge Kirn  
 \*Taenifuge Larix  
 Taenifuges Limousin  
 Talcazone  
 \*Tamar Indien Grillon  
 \*Tamarine  
 \*Tampol Roche  
 Tampons Alsai  
 Tampovules Corbière  
 Tanacétyl Clin  
 Tanisol  
 Tannarsol  
 Tanno-Bismuth  
 \*Tanno-Calcine  
 \*Tannurgy  
 Tanode  
 Tanosal  
 \*Tapo  
 Tarbisol  
 Tardospermine  
 Tartrate Borico-potas-  
 sique du Dr Gigon  
 Lab. Zyma, 4, r. Bellart, Paris  
 Lab. SCIENTIA, 21, r. Chap-  
 tal, Paris.  
 3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.  
 GIBAN, à Sens (Yonne).  
 17, r. Rochechouart, Paris.  
 DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.  
 CATILLON, 3, bd Saint-Martin,  
 Paris.  
 60, c. Emile-Zola, Lyon.  
 6, r. Bridaine, Paris.  
 DUCLOY et C<sup>ie</sup>, Arques (Pas-de-  
 Calais)  
 DEMARS, 89, av. Wagram,  
 Paris.  
 76, r. de Sèvres, Paris.  
 119, r. de Sèvres, Paris.  
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-  
 Colombes (Seine).  
 CHIARINI, Aix-en-Provence.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-  
 sur-Seine.  
 25, r. Thiers, Tarbes.  
 10, r. du Bac Paris.  
 Lab. des Antiseptiques chlorés,  
 40, r. Thiers, Le Havre.  
 DARRASSIE, 13, r. Pavée, Paris.  
 4, rte de Médoc, Le Bouscat  
 (Gironde).  
 10, r. Crillon, Paris.  
 1, r. Griffon, Lyon.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 MIGNON, 119, r. de Noisy, Les  
 Lilas.  
 119, r. de Sèvres, Paris.  
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence.  
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-  
 sur-Seine.  
 Dr LETANNEUR, 87, av.  
 Borriglione, Nice.  
 REBOUL, Pont-Sainte-Maxence  
 (Oise).  
 FEIGEL, à Lutterbach (Haut-  
 Rhin).  
 Lab. MADYL, 14, r. Miromesnil,  
 Paris.  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
 Paris.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.

- \*Tartrate Borico-potas-  
sique Pachaut  
Tartro-Bi Roche  
Tartrobol
- \*Taxol  
T. B. X. Métacrysine
- \*Tébéphaguine
- \*Técarine
- \*Tégéol  
Teinture de Cocheux  
Ténébryl
- \*Tensoryl-D  
Teperos  
Tercinol
- \*Tercodal  
Tercolène  
Tercyn Chéron
- \*Térébine  
  
Térébules Gallier
- \*Tergyl Lamo
- \*Terkal Monal  
Ternose Trouette
- \*Térozone
- Terpène iodé
- Terpine Boveil  
Terpine Cailleux  
Terpine du Mezenec  
Terpine Duval
- \*Terpine Gonnon
- \*Terpine granulée Ba-  
ron
- Terpinets  
Terpinol Adrian  
Terpoflor
- \*Terpoxyl  
Terpoxyl ovules
- Tersol
- Teskrine
- Testicule - Endocrisi-  
nes Fournier
- Tétralgine Routhier
- Tetra magnesium
- \*Tetranitrol Roussel
- Tetrasthénol
- Tetrasulfol Vigier
- Testogan
- Thalaphyl
- Thalassan
- 130, bd Haussmann, Paris.
- 10, r. Crillon, Paris.
- 71, r. St-Jacques, Paris.
- 46, av. des Ternes, Paris.
- S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le  
Havre.
- 23, r. du Caire, Paris.
- PECIA, 21, r. Jean-Goujon,  
Paris.
- 11, r. de Clichy, Paris.
- 36, q. Fulchiron, Lyon.
- 22, r. du Landy, St-Ouen.
- 52, bd du Temple, Paris.
- 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- 158, r. Saint-Jacques, Paris.
- 14, r. Demarquay, Paris.
- 14, r. de Birague, Paris.  
à Vincennes.
- PLANCHE, 1, bd de la Made-  
leine, Marseille.
- 38, bd Montparnasse, Paris.
- 26-28, r. Paul-de-Kock, Paris.
- 6, r. Bridaine, Paris.
- 15, r. des Immeubles-Industriels,  
Paris.
- 62, r. d'Antibes, (Cannes).
- FROSSARD, 86, r. de Varenne,  
Paris.
- 9, pl. des Terreaux, Lyon.
- Parmain (S.-et-O.).
- CELLIER, Roanne (Loire).
- 82, r. Marengo, St-Étienne
- 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- 74, r. Monge, Paris
- 8, r. Vivienne, Paris.
- 9, r. de la Perle, Paris.
- 26, r. Petrelle, Paris.
- JOLLY, 1, r. Christine, Paris.  
id.
- 32, r. Carnot, Beaune (Côte-d'Or).
- 89, Grande-Rue, Sens (Yonne).
- 7, r. Biscornet, Paris
- à Vierzon.
- GENÉVRIER, 45, r. du Marché,  
Neuilly.
- 10, r. Washington, Paris.
- 19-21, r. Van-Loo, Paris.
- 12, bd Bonne-Bouvelle, Paris.
- MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
Paris.
- BOUTTET, à Rufec (Charente-  
Inférieure).
- 49, r. Paradis, Paris.

- \*Thalassotonine Vadam 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- \*Thaolaxine DURET & REMY, à Asnières.
- Thapsia Le Perdriel 11, r. Milton, Paris.
- \*Thébaïl 7, r. Galvani, Paris.
- Thé de l'Emyrne 151, r. St-Maur, Paris.
- Thé Evine 16, r. Barbette, Paris.
- \*Théinol Bailly 15 et 17, r. de Rome, Paris.
- \*Théisine Dubat 80, fg Saint-Denis, Paris.
- Thelygan MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- \*Thernsaline Zyma 4, r. Bellart, Paris.
- Théobromine Guillaumin 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Théobromine Houdé 9, r. Dieu, Paris.
- \*Théobromine Invar 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
- Théobromine Rousseau à Ermont (Seine-et-Oise).
- Théobromine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- \*Théobromose 10, r. du Plâtre, Paris.
- \*Théobryl Roche 10, r. Crillon, Paris.
- \*Théocalcicole 17 bis, bd Rochechouart, Paris.
- Théosalvine 13, r. Cherche-Midi, Paris.
- \*Théosalvose 13, r. Cherche-Midi, Paris.
- Théovadil 85, r. des Morillons, Paris (XV<sup>e</sup>).
- \*Théoverine Laleuf 20, r. du Laos, Paris.
- \*Théoxanthine 6, r. d'Assas, Paris.
- Thermo-bloc GAUDICHARD, à Châtellerault (Vienne).
- \*Thermocédone 11, r. Lepic, Paris.
- Thermoplaste COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
- Thermo-Vicardine ACHARD, 15, r. du Commerce, Riom (P.-d.-D.).
- Thé Suédois HERIN, 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine (Nord).
- Thiesdyne BESNARD, 56, r. des Dames, Paris.
- \*Thigénol Roche 10, r. Crillon, Paris.
- \*Thiocitran THEVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.
- \*Thiocol Roche 10, r. Crillon, Paris.
- Thiokéine 4, imp. de Béarn, Paris.
- Thionhydrol Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- \*Thiophyl 12, bd St-Martin, Paris.
- \*Thiorine 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
- Thiosinamine Cognet 43, r. de Saintonge, Paris.
- \*Thiosote-Lambiotte 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
- Thiosyl M. BERGER, à Orléans.
- \*Thio-terpine Dalin BOITAS & C<sup>ie</sup>, 1 r. de la Martinière, Lyon.
- \*Thorix 17, r. d'Hauteville, Paris.
- \*Thoroxyl 40, r. de Bellechasse, Paris.
- \*Thymo-Mentol Eupnique 13, r. de Rivoli, Paris.
- Thymus -Endocrisines Fournier 7, r. Biscornet, Paris.
- Thymine 11, ch. de la Muette, Paris.
- Thymol doré 10, impasse Milord, Paris.



- Thymoléine**  
**Thymusine** Byla  
**Thyratoxine** Byla  
**Thyrénine** Grémy  
**Thyrocréine** Grémy  
**\*Thyrodose**  
**Thyroïde - Endocrisi-**  
**nes** Fournier  
**Thyroïde** Leo  
  
**Thyroïdine** Bouty  
**Thyroïdine** Byla  
**Thyroïdine** Couturieux  
**Thyroïdine** Flourens  
**Thyroïdine** Gory  
  
**Thyroïdine** Henning  
  
**Thyroïdine** Meurice  
**Thyrol** A.  
**Thyroxine** Henning  
  
**\*Thyroxine** Roche  
**Tinctiode**  
  
**\*Tiodine** Cognet  
**Tisane** Cisbey  
**Tisanes** Dausse  
**Tisane** dépurative de  
Cavaillès  
**Tissus** Le Perdriel  
**\*Tochlorine**  
  
**Togal**  
**Tonal**  
**Tonapérine**  
  
**\*Tonax**  
**Toni** bronchique  
  
**\*Tonicalcine**  
  
**\*Tonicardine** Gonnon  
**Tonicardine**  
  
**Toniformiase**  
**\*Tonigene**  
  
**Tonigénine**  
**\*Tonikéine** Chevretin  
**Tonikéal**  
  
**Tonilécithine** Rogier  
**\*Tonimalt**  
**Toni-Pectoral**  
  
**Toniphlébine** Hardy
- ABOU**, 26, r. Temple, Paris.  
26, av. de l'Observatoire, Paris.  
id.  
14, r. de Clichy, Paris.  
id.  
47, r. de Neuilly, Nanterre.  
7, r. Biscornet, Paris.  
  
11, square Marie-Louise, Bru-  
xelles.  
3, r. de Dunkerque, Paris  
26, av. Observatoire, Paris.  
18, av. Hoche, Paris.  
62, r. N.-Dame, Bordeaux.  
**JOOSS**, 7 bis, r. Général-Galliéni,  
Montreuil (Seine).  
**MERMINOD**, 49, r. de Paradis,  
Paris.  
61, av. Louise, Bruxelles.  
107, r. des Dames, Paris.  
**MERMINOD**, 49, r. de Paradis,  
Paris.  
10, r. Crillon, Paris.  
**ROBERT** et **CARRIERE**, 37,  
r. de Bourgogne, Paris.  
43, r. de Saintonge, Paris.  
12, bd St-Martin, Paris.  
4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
29, r. Singer, Paris.  
  
11, r. Milton, Paris.  
**SPECIA**, 21, r. Jean-Goujon,  
Paris.  
22, r. Godot-de-Mauroi, Paris.  
61, r. de Seine, Paris.  
**COLMEAU**, 19, r. St-Bazile,  
Marseille.  
**LYONS**, 30, r. Monze, Paris.  
**REBOUL**, Pont-Sainte-Maxence  
(Oise).  
**MARTINIE**, 62, av. Philippe-  
Auguste, Paris.  
14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
**OPTIMA**, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.  
34, r. Montgallet, Paris.  
**LECOQ**, 11, r. Eugène-Flachat,  
Paris.  
Labor, à Montrevel (Ain).  
52, r. Labruyère, Paris (IX<sup>e</sup>).  
**ADLER**, 36, r. des Francs-  
Bourgeois, Paris.  
56, bd Péreire, Paris.  
Rumilly, (Haute-Savoie).  
**ADRIAN**, 9, r. de la Perle,  
Paris.  
200, r. de Tolbiac, Paris.

Toniphos Baron	Les Sables-d'Olonne.
Toniphosphine	56, r. des Dames, Paris.
*Tonique Gonnon	14, r. Victor-Hugo, Lyon.
Tonique Koenig	37, av. Marceau, Paris.
*Tonique Roche	10, r. Crillon, Paris.
Tonique Zéva	60, cours Emile-Zola, Lyon.
Toni sérum Freyssinge	6, r. Abel, Paris.
*Toniveinine	BLANCHOT, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris.
*Tonuclyl	MEUNIER, r. du Commerce, Montmarault (Allier).
*Tonudol	LICARDY, 38, bd Bourdon, Paris-Neuilly.
Tonyol "F"	VARGAS, 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris.
Tophol	3, r. Condillac, Grenoble.
Topique Bertrand	à Oullins (Rhône).
Topiques Chaumel	78, fg Saint-Denis, Paris.
Topique Nasal A. B. C.	Lab. TIFFENEAU, 24, r. Monttessuy, Paris
Topique pyorrhépha-gine	Croissy-sur-Seine.
Topique Sabatier	13, r. de Longchamp, Paris.
Topique stomacal Dausse	4, r. Aubriot, Paris (1V <sup>e</sup> ).
*Torigyre Lamo	26-28, r. Paul de Kock, Paris.
*Toritane Lamo	id.
*Toritanol Lamo	id.
Totalcalin	S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
Totaliode	58, r. de Maubeuge, Paris.
*Total-Tonic	29, fg Bourgogne, Orléans.
Total magnésien	24, bd Sébastopol, Paris.
*Tot'Hameis	CHANTEREAU, 26 bis, r. Dombasle, Paris.
*Touranyl	94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois (Seine).
Toussyl Py	58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
Trachovaccin Salantale	42, Gdes Arcades, Strasbourg.
Traitement Vernet	9, r. Laloy, Chaumont.
Transputmine	4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.
Tranquital	6, r. Bridaine, Paris.
*Traphéine	13, r. Beudant, Paris.
Traumatol	{ 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
Traumatoplaste	
»Tréparsénans	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Tréparsol	LECOQ & FERRAND, 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
*Tréphonyl	97, r. de Vaugirard, Paris.
*Trépopiur	S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne, St-Denis.
Trépocidine	OPTIMA. 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
*Trépol	22, r. de la Sorbonne, Paris.
*Trépoquinol	id.

- Tréposan**  
**Trépositoires**  
**Triase**  
 \***Tribromure Gigon**  
 \***Tricalcine**  
 \***Tridigestine Dalloz**  
 \***Tridynol**  
  
**Triféryl**  
**Trifloral Francois**  
**Triganol Vigier**  
 \***Triglandine Bouty**  
**Triglandol Bouty**  
**Tri-Iodo-Ercé**  
**Trijumine Pelletier**  
**Trilactine**  
 \***Triluès**  
  
**Trilysine**  
 \***Trinitrine Caféinée Du-bois**  
 \***Trinitrine-Papavérine Laleuf**  
 \***Trinitrine Roussel**  
**Trinitrine Vicario**  
 \***Tripyoril**  
  
 \***Triradol**  
 \***Triseptine**  
  
 \***Trisodyl Rozet**  
**Tristyl Noyon**  
**Tritonine**  
**Triurase**  
**Trixyl Fraudin**  
**Tri-Zymol**  
  
**Trousses Dosurine**  
**Tryclene**  
 \***Trynol**  
  
**Tryparsamide**  
  
**Trypsogen**  
**Tséamine**  
  
**Tuberculine C. L.**  
**Tubercuséine Leisyn**  
 \***Tubérol**  
 \***Tubes Blache**  
**Tubes Bromure Pa-chaut**  
**Tubes Chauvin**  
 \***Tubes Dulcis**  
  
 \***Tubes Ferlux**  
 \***Tubes du Dr Guiraud**
- 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.**  
 id.  
 4, pl. des Vosges, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 21, r. Chaptal, Paris.  
 13, bd la Chapelle, Paris.  
**JOURNET, 18-20, r. Vavin, Paris.**  
 37, r. Galilée, Paris.  
**TACLET, Arras (P.-de-C.).**  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 id.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 48, r. Jacob, Paris.  
 14, r. de Birague, Paris.  
**S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne, St-Denis.**  
 49, r. Paradis, Paris.  
**LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.**  
 id.  
 10, r. Washington, Paris.  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 15, r. Catulienne, St-Denis, (Seine).  
 55, bd Strasbourg, Paris.  
**LAMBERT, 6, r. de Longchamp, Vichy.**  
**BENDERITTER, à Vendôme.**  
 24, r. Paul-Bert, Paris.  
 64, r. des Tournelles, Paris.  
 46, r. de Rome, Marseille.  
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
 16, r. Charlemagne, Paris.  
 52, bd du Temple, Paris.  
**FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.**  
**SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.**  
**DÉGECÉ, 7, r. Princesse, Paris.**  
**S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne, St-Denis.**  
 21, r. Jean-Goujon, Paris.  
 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 23, r. des Moines, Paris.  
**CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).**  
 130, bd Haussmann Paris.  
 Aubenas (Ardèche).  
**D<sup>r</sup> FERRY, pl. Clichy, Monte-Carlo.**  
**G. BOUSQUET, à Albi.**  
 10, imp. Milord, Paris.

- Tubes Levasseur**  
**Tubes Lux**  
**Tubes Sais**  
**\*Tubes Strana**  
**\*Tulle gras Lumière**  
**\*Tulle rose Beslier**  
**Tussomalt**  
  
**Tuya Feuillé**  
  
**Tymocalcine**  
**Tympano**
- 23, r. de la Monnaie, Paris.  
 35, r. de l'Abattoir, Bruxelles.  
 Oullins (Rhône).  
**SALANTALE**, Strasbourg.  
 45, r. Villon, Lyon.  
**COQUELU**, Digoïn (S.-et-L.).  
 U. C. E. P., 5, r. Labroque,  
 Strasbourg.  
**D<sup>r</sup> BIDOT**, 4, r. du Cirque,  
 Paris.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie,  
**CHAUVIER**, 66, r. Falguière.  
 Paris.

## U

- \*Uclarsyl**  
**Udanka**  
**\*Ulcéobalnéine**  
**\*Ulcéobande**  
**\*Ulcéoplaque**  
**\*Ulcéosine**  
**\*Ulcéosol**  
**Ulcérine Berger**  
  
**\*Ulcérophile Nosan**  
  
**\*Ulmacétyl**  
**Uimaire Gmet**  
**Ulmarene Gigon**  
**\*Ultracao Laurençon**  
  
**\*Ultra formine**  
**\*Ultra-Levure**  
**Ultrargen Leclerc**  
**Ultrasténil**  
  
**\*Ultra-Violets**  
  
**\*Ultravitamine 4**  
  
**Ultravitine**  
  
**Uracétose**  
**\*Uralysol**  
**Uraséol**  
**\*Urassptine Rogier**
- 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
**D<sup>r</sup> LALAURIE**, Cuxac-d'Aude.  
 76, r. des Rondeaux, Paris.  
 id.  
 id.  
 id.  
 id.  
**F. BOUVIER**, 31, bd de la  
 Villette, Paris.  
 6<sup>ter</sup>, r. Voltaire, La Garenne-  
 Colombes (Seine).  
 1, r. de l'Ouest, Neuilly.  
 27, fg Montmartre, Paris.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 16, r. République, Villefranche-  
 s.-Saône.  
**SAUZE**, r. Nationale, Firminy.  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 10, r. Vignon, Paris.  
**P. FONTANIER**, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 La Verrerie Scientifique, 12, av.  
 du Maine, Paris.  
**LAURENÇON**, 16, r. Républi-  
 que à Villefranche-sur-Saône.  
**P. FONTANIER**, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 76, r. des Rondeaux, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 17, r. Cadet.  
 56, bd Péreire, Paris.

- \*Urazine SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- \*Ur-Clar ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- Urdol OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Urénile Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Uréol Ch. Chanteaud 54, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Urgoplast FOURNIER, Dijon.
- \*Uribiline REBOUL, Pont-Sainte-Maxence (Oise).
- Uricase 26, r. de Gagny, Neuilly-sur-Marne.
- Uricémine 29, r. de Liège, Paris.
- Uricine 50, r. République, Puteaux.
- \*Uriclarine 157, r. Championnet, Paris.
- \*Urifluine 2, pl. des Vosges, Paris.
- Uriloxal 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
- Urilysons 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Uri-Magnétol ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- Urisal du Dr Des- 20, r. du Laos, Paris.
- champs
- \*Urisanine LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
- Urixine S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
- Urobényl MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- Urobiose 4, imp. de Béarn, Paris.
- Urobleu 4, imp. de Béarn, Paris.
- \*Urobuccol Malmanche 101, av. de Paris, Rueil (S.-et-O.).
- Urocarbol GENTON, Petit-Quévilly (S.-Inférieure).
- Urocédrol GALLO, à Aurillac.
- \*Uroclase ALEXANDRE, 41, r. de Rome, Paris.
- Uroclean ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Urococcine 20, r. du Laos, Paris.
- Urocuro 10, r. Maubeuge, Paris.
- \*Uroformine Gobey 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Urogène Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
- \*Urofodine 7, r. Jules-César, Paris.
- Urolan 55, bd de Strasbourg, Paris.
- \*Urol Neuville 239, fg St-Honoré, Paris.
- Urolithiase Sté Rég. de l'Ouest, Rennes.
- Urolithol 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
- \*Urométhyl BRESSIER, 102, r. Vincent, Marseille.
- \*Urométine Lambiotte 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
- \*Uromil Dr BELIERES, 19, r. Drouot, Paris.
- \*Urophényl CROUY, 73, d'Albuféra, Vernon (Eure).
- \*Urophile Bailly 15 et 17, r. de Rome, Paris.

- Uropiat**  
**Uroquinase**  
**\*Urosalyl**  
**\*Urosan**  
**Urotisan**  
**\*Urozea**  
**Utéramine Zyma (Voir Hemosamine)**  
**Utérol Leo**  
**\*Uvargol**  
**\*Uvé**  
**\*Uvéoline**  
**Uvéovules**  
**\*Uvéphorine**  
**\*Uvesterol**  
**Uviostérine**
- 119, r. de Sèze, Lyon.  
 DUBOIS, 16, bd Péreire, Paris.  
 GARDIOL, 6, r. Félix-Pyat, Marseille.  
 12, r. des Saints-Pères, Paris.  
 Fabre, 112, r. des Pyrénées, Paris.  
 LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.  
 4, r. Bellart, Paris.  
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.  
 MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.  
 18, r. Saint-Amand, Paris.  
 Pharmacie Ambard, Carcès (Var).  
 AMBARD, Carcès (Var).  
 37, r. Galilée, Paris.  
 18, r. Saint-Amand, Paris.  
 Voir : *Irrastérine*).
- V
- Vabéol**  
**Vacciderm**  
**\*Vaccin anti-asthma-tique du Pr. Minet**  
**Vaccin antigonococcique**  
**\*Vaccin antigrippal du Pr. Minet**  
**\*Vaccin anti-pneumonique du Pr. Minet**  
**Vaccin antituberculeux Bossan**  
**\*Vaccin Demonchy**  
**\*Vaccin de Weill et Dufourt**  
**\*Vaccinothérapie atoxique Cépède**  
**Vaccinovules**  
**Vaccins antipollin**  
**Vaccins Antituberculeux Vaudremer**  
**\*Vaccins atoxiques stabilisés**
- 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.  
 UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.  
 Lab. STÈNE, 2, pl. des Vosges, Paris.  
 OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.  
 2, place des Vosges.  
 2, place des Vosges.  
 Lab. des Indus. Biologiques, 26, r. Royale, Paris.  
 THERAPLIX, 98, r. de Sèvres, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 60, r. Mathurin-Régnier, Paris.  
 23, r. des Moines, Paris.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 146, av. Champs-Élysées, Paris.  
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.

- \*Vaccins Bactériens** Lab. Biochimie Médicale, 16,  
 I. O. D. r. Dragon, Marseille.  
**Vaccins bactériophages** 46, r. de Verneuil, Paris.  
**\*Vaccins Bruschettini** 7, r. Biscornet, Paris.  
**Vaccins Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**\*Vaccins de Ronchèse** 6, r. Rothschild, Nice.  
**Vaccins du Dr Creuzé** 1, r. Bonaparte, Paris.  
**Vaccins Inava** 26, r. Pagès, Suresnes (Seine).  
**Vaccins Irsi** 4 ch. de la Muette, Paris.  
**\*Vaccins Ivago** 17, r. de Provence, Paris.  
**Vaccins Lucinia** (Voir : *Formo-vaccins*).  
**Vaccins microbiens** GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.  
 curatifs  
**\*Vaccins pansements**  
 Antipyogènes  
 Antitrachôme  
 Chirurgical  
 Gynécologiques  
 Oto-rhino-laryngo-  
 logique  
 Ophtalmologique  
 Urogénital  
 } VIRULTRA, à Launay-Ser-  
 quigny (Eure).  
**\*Vaccins Polyvalents** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 Renard  
**\*Vaccins Sténé** 2, pl. des Vosges, Paris.  
**Vacciplast** FOURNIER, Dijon.  
**\*Vacydun Vaclyderm** 27, r. Desrenaudes, Paris.  
**Vacuoline** 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).  
**Vadérol** DURAND, à Joigny (Yonne).  
**\*Vagosédyl** 20, r. des Martyrs, Paris.  
**Vagotonic Fournier** Institut physiologique, Vau-  
 cresson (S.-et-O.).  
**\*Vagotonine** BYLA, 26, av. Observatoire,  
 Paris.  
**\*Valbornine Rogier** 56, bd Péreire, Paris.  
**\*Valbrol** MAYOLY, 1 pl. Victor-Hugo,  
 Paris.  
**\*Valedyl** 191, fg St-Antoine, Paris.  
**\*Valéal** NOVALIS, Oullins (Rh.).  
**Valéral Puy** à Grenoble (Isère)  
**Valéramyl Foulon** 14 bis, r. de la République, à  
 Ermont (Seine-et-Oise).  
**Valergyl Doucet** r. Gambetta, Bolbec.  
**\*Valérianate Gabail** 5, r. Lefebvre, Paris.  
**\*Valérianate Grignon** 2, r. Duphot, Paris.  
**Valérianate Pachaut** 130, b. Haussmann, Paris.  
**\*Valérianate Pierlot** 26, r. Saint-Claude, Paris.  
**\*Valériane Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
**Valériane Dausse** 4, r. Aubriot, Paris.  
**\*Valériane Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.  
**\*Valériane Pachaut** 130, bd Haussmann, Paris.  
**\*Valérianose Gigon** 25, bd Beaumarchais Paris.  
**Valeriflore** 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.  
**\*Valérinodor Malman-  
 che** 101, av. de Paris, Rueil (Seine-  
 et-Oise).  
**\*Valerium Paul Thi-  
 bault** 48, r. d'Alésia, Paris.

*Valérobromine grand	Le- DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
*Valéromenthol	10, r. Poncelet, Paris (XVII <sup>e</sup> ).
*Valéronal	BERGER, 14, r. des Pyramides, Paris.
Valéthryne	39, r. de la Chapelle, Paris.
Valimyl Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Valovarine	64, r. d'Orsel, Paris.
*Valovosan	94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois.
Vals St-Jean	53, bd Haussmann, Paris.
*Valthène	51, r. de Tourtille, Paris.
Valtine	12, r. Tour-des-Dames, Paris.
Valyl Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Vamétol	14, r. de Périgueux, Angoulême.
*Vanadarsine Guillaumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
Vanadine Chevrier	21, fg Montmartre, Paris.
Vaniol	156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Vanotonyl	BREANT, 11, r. de Clichy.
Vansol	18, r. Maréchal-Foch, Versailles.
Vanucléol	37, r. Pajol, Paris.
Varicine	12, r. Cadet, Paris.
Varicolyse	DAGRAN, 16, r. Salaire, Tarascon (Bouches-du-Rhône).
Varicure Marck	à Neuilly-sur-Seine.
*Varilaxine	SOULAS, Surgères (Ch.-Inf.).
*Varisclérine	61, r. de Seine, Paris.
Variserum Lebon	à Charost (Cher).
Vasculine	4, imp. de Béarn, Paris.
*Vascurol	GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).
Vasocônes	BRUN, Demi-Lune, Lyon.
Vasoconstrictine	id.
Vasogènes Pearson	48, r. d'Alésia, Paris.
*Vasolaxine	7, r. Biscornet, Paris.
*Vaso-Neurine	Lab. Pathologie Gle de Paris, 5, r. François-Ponsard, Paris.
Vasorhinine	22, r. Gambetta, Cherbourg.
*Vaso-Rhinol	20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
Vasothyol	9, r. Laloy, Chaumont.
*V. A. V.	51, r. du Ranelagh, Paris.
Vaxa du D <sup>r</sup> Boucard	30, r. Singer, Paris.
*Véganine	13, r. Pagès, Suresnes (Seine).
*Végéphos	21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
*Végétol Fournier	8, r. des Quatre-Fils, Paris.
*Véguva Wander	151 bis, r. de Joinville, Champigny.
*Veinalgol	64, bd Barbès, Paris.
Veinargyre	29, r. des Jardiniers, Montreuil (Seine).
Veinhormones Logeais	24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Veinicura	42, bd Péreire, Paris.
Veinofluine	239, fg St-Honoré, Paris.
*Veinogène	14, r. Demarquay, Paris.
Veinoglandol	156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Veinophiline	27, r. Poids-Farine, Marseille.



- \*Veinoposine  
 \*Veinoserum Abadie  
 \*Veinosine  
 \*Veinotrope  
 Veinyl  
 Velledol Adrian  
 \*Velpeau (bande de crêpe)  
 Vénécine  
 \*Véralgine  
 Veramone  
 \*Vériane Buriat  
 Vermicide Grahaut  
 Vermicure Pigeon  
 \*Vermifuge Cornet  
 Vermifuge des Moines  
 Vermifuges Pivot  
 Vermifuge Rabi  
 Vermifuges Sorin  
 \*Vermirene Audibert  
 Vermitox  
 Vermosol  
 \*Vernis à la Diachusine  
 Verocodal Boeglin  
 Vérogénol  
 \*Véronidia Buisson  
 Verruccin Leo  
 Verrucure  
 \*Verrulyse  
 \*Verticurine  
 \*Vésicatoire rose Beslier  
 Vésicatoires d'Albepeyres  
 Vexillan  
 Viburniode  
 Viburnum Gmet  
 Vicellase  
 \*Vichy Purgatif  
 Vichy Rapide  
 Vigardyne  
 Vagine  
 Vigogastrine  
 Vigostérol  
 Vigotonal  
 Vilax  
 Vin à l'extrait de foie de morue  
 10, r. Claire-Paulhac, Toulouse.  
 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.  
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 9, r. de la Perle, Paris.  
 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.  
 7, r. des Italiens, Paris.  
 38, r. du Mainguy, Bondy.  
 Cruet, 13, r. Miollis, Paris.  
 25, r. Copernic, Paris.  
 21, r. Ste-Catherine, Villeneuve-sur-Lot.  
 18, r. de Jouvence, Dijon.  
 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.  
 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.  
 PUY, Grenoble (Isère).  
 14, r. Turgot, Limoges.  
 TROMBETTA, Blain (L.-Inf.)  
 Cinq Cantons, Bayonne.  
 BOULLÉ, 12, av. de la Gde-Armée, Paris.  
 46, r. du Bac, Asnières.  
 142, r. de Picpus, Paris.  
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.  
 101, av. Mozart, Paris.  
 98, r. de Sèvres, Paris.  
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.  
 6, r. d'Auteuil, Paris.  
 MIGUET, Villefranche (Rhône).  
 GRIAS, 47, r. Feray, à Corbeil (Seine-et-Oise).  
 COQUELU, Digoin (S.-et-L.)  
 FUMOUE, 78, fg Saint-Denis, Paris.  
 89, av. Wagram, Paris.  
 GIRY, 49, r. de Metz, Nancy.  
 27, fg Montmartre, Paris.  
 71, av. de la République, Champigny (Seine).  
 7 bis, r. Galvani, Paris.  
 22, r. de l'Arcade, Paris.  
 21, r. du Chemin de fer, Sceaux.  
 AMBLARD, Cunlhat (P.-de-D.).  
 222, r. Duguesclin, Lyon.  
 B R I C H A R D, Bar-le-Duc, (Meuse).  
 122, bd Murat, Paris.  
 16, bd Filles-du-Calvaire, Paris (XI<sup>e</sup>).  
 21, Fg Montmartre, Paris.

- Vin d'Anduran**  
**Vin Aroud**  
**Vin Boillaud**  
**Vin Bravais**  
**\*Vin de Baudon**  
**Vin de Beef Lavoisier**  
**\*Vin de Bugeaud**  
**\*Vin de Carnéose**  
**\*Vin de Chassaing**  
**Vin de Coca du Pérou**  
**Vin des Indes**  
**Vin Désyles**  
**Vin diurétique Pyrola**  
**Vin énergétique Fra-**  
**dier**  
**Vin Gallia**  
**\*Vin Girard**  
**Vin de Kola Midy**  
**\*Vin de Lavoix**  
**Vin de Moride**  
**Vin de Séguin**  
**\*Vin de Vial**  
**\*Vin Lux Gaillac mous-**  
**seux**  
**Vin Mariani**  
**Vin Mory**  
**Vin Nourry**  
**Vin Oophorine**  
**\*Vin Raimoa Tonic**  
**Vin St-Raphaël**  
**Vin Surtonique Val**  
**Notre-Dame**  
**Vin Tonic Tiffeneau**  
**Vin Tonique F. K.**  
**Vin Urané Pesqui**  
**Vin Voguet**  
**\*Vioforme Ciba**  
**Vioformol Ciba**  
**Violet Bidot**  
**\*Viophan**  
**\*Viosten**  
**\*Vioxyl Mouneyrat**  
**\*Viradène**  
**Viridol**  
**Viriligen**  
**Virilium**  
**Viscine**  
**Visco-dermine**
- MOUSNIER, à Sceaux.**  
**6, r. Dombasle, Paris.**  
**172, r. d'Alésia, Paris.**  
**3, r. Mogador, Paris.**  
**12, r. Charles-V, Paris.**  
**Usine du Blosset, Moulins-sur-**  
**Yèvre (Cher).**  
**5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.**  
**Usine du Blosset, Moulins-sur-**  
**Yèvre (Cher).**  
**1, quai Aulagnier, Asnières.**  
**21, Fg Montmartre, Paris.**  
**61, r. de Seine, Paris.**  
**Levallois-Perret (Seine).**  
**19, r. des Chalets, Toulouse.**  
**53, bd de Verdun, Fontenay-**  
**sous-Bois.**  
**7, r. des Petits-Carreux, Paris.**  
**48, r. d'Alésia, Paris.**  
**4, r. du Colonel-Moll, Paris.**  
**(Voir : Beef Lavoix).**  
**LANDRIN, 12, r. de la Répu-**  
**blique, Puteaux.**  
**165, r. Saint-Honoré, Paris.**  
**36, pl. Bellecour, Lyon.**  
**6, av. Foch Gaillac (Tarn).**  
**41, bd Haussmann, Paris.**  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois,**  
**Bruxelles.**  
**20, r. des Fossés-Saint-Jacques,**  
**Paris.**  
**Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
**264, bd Voltaire, Paris.**  
**à Valence (Drôme).**  
**Usine du Blosset, Moulins-sur-**  
**Yèvre, (Cher).**  
**24, r. de Montessuy, Paris.**  
**46 av. des Ternes, Paris.**  
**au Bouscat-Bordeaux.**  
**5, r. Eug.-Delacroix, Paris.**  
**109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.**  
**id.**  
**4, r. du Cirque, Paris.**  
**81-83, r. de Lille, Roubaix.**  
**D<sup>r</sup> LESCENE, 58, r. de Vouillé,**  
**Paris et Livarot (Calvados).**  
**Villeneuve-la-Garenne (Seine).**  
**120, r. Lecourbe, Paris.**  
**65, r. Monge, Paris.**  
**DÉGÉCÉ, 7, r. Princesse, Paris.**  
**MERMINOD, 49, r. Paradis,**  
**Paris.**  
**11, r. de Fontainebleau, Kremlin-**  
**Bicêtre.**  
**FOSSET, 21, Gde-Rue, Montfer-**  
**mell (Seine-et-Oise).**

- \*Viscoserum  
Viscosodine
- \*Visco-Veine Fosset
- \*Viscum Zyma  
Visvitis
- \*Vitacalcine Moncour
- \*Vitacrine  
Vitaderme Bergonier
- \*Vitadone
- Vitagéine
- \*Vitagermine  
Vital Extrait
- Vitalogène
- Vitamina
- Vitamine Rogier
- \*Vitaminol
- \*Vitamorrhaine
- \*Vitamyl  
Vitaphorine
- \*Vitargyl
- Vitasol
- \*Vitastérol
- Vitazem
- \*Vitène  
Vitergomine
- Vitosine Décornez
- Vitricine Carves
- Vivassol
- Viviodol
- Vivo-Dynergol
- \*Vivoléol
- \*Vocaldop  
Vogénol
- Voltargol Robin  
Vonol
- Vulcapil Brisson
- \*Vulcase  
Vulco (ouate)
- \*Vulnérine Bergen
- 55, bd Strasbourg, Paris.
- 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- 21, Gde-Rue Montfermeil (S.-et-O.).
- 4, r. Bellart, Paris.
- 7-9, bd Haussmann, Paris.
- 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- 2, r. Lauzac, Bordeaux.
- 122, bd Murat, Paris.
- BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- SÉGUIN 7, r. Ste-Isaure, Paris.
- DRYCO, 5, r. St-Roch, Paris.
- E. BASSOL, à Ste-Alvère (Dordogne).
- REBOUL, Pont-Ste-Maxence, (Oise).
- 8, r. Vivienne, Paris.
- 56, bd Péreire, Paris.
- BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- Usines du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- POINTET & GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- 49, r. d'Angoulême, Cognac (Charente).
- F. GUILBERT, 10, r. du Collège, Arras (P.-de-C.).
- 85, r. Turbigo, Paris.
- 12, r. Charles-V, Paris.
- Pharmacie centrale de Belgique, 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- à Ornans (Doubs).
- à Chambéry (Haute-Savoie).
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
- 11, r. de Marseille, Paris.
- BROTHIER, 163, r. St-Denis, Paris.
- 24, r. de Fécamp, Paris.
- 222, fg St-Martin, Paris.
- 13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
- 13, r. de Poissy, Paris.
- MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- 157, r. Championnet, Paris.
- 157, r. Championnet, Paris.
- OPTIMA, 78, Grande-Rue-aux-Bois, Bruxelles.
- DUÇOQ, Langeais (I.-et-L.).

## W

Wantor

\*Wismuthane Vély

BÉRAUD, 13, pl. de la Nation,  
Paris.  
132, av. Victor-Hugo, Paris.

## X

Xanthocol

Xémaderm

Kylosulfol Vigier

37, r. de Bourgogne, Paris.  
59, r. Châteaudun, Paris.  
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

## Y

\*Yaourtine

\*Yo-Androl

Yocaïne

Yogourth (Extrait de)

Yoghourt Karlos

Yoghourt Lactella

Yoghourt Lagnel

\*Yo-Gynine

Yohourth Carrion

Yohourt Douriez

Yohimalt

Yohimbine Gilbert

\*Yohimbine Vicario

Yprine

Yse

Ystaline

Yzeural

18, pl. Laborde, Paris.

ISCOVESCO, 107, r. des Dames,  
Paris.

12, r. Pavée, Paris.

23-25, r. Singer, Paris.

à Lécuse (Nord).

à Tourcoing.

7, r. de la Pépinière, Paris.

ISCOVESCO, 107, r. des Dames,  
Paris.

54, fg St-Honoré, Paris.

37, r. Voiture, Amiens.

U. C. E. P., 5, r. Labroque,  
Strasbourg

2, r. du Marché-des-Blancs-  
Manteaux, Paris.

17, bd Haussmann, Paris.

4 bis, r. Hébert, Courbevoie  
(Seine).

62, r. Louis-Blanc, Paris.

2, pl. du Th.-Français, Paris.

26, av. Tourville, Paris.

## Z

- \*Zaryl  
     Zébo-Plastol Dumes-  
         nil  
     Zédéno  
 \*Zimbyl  
     Zinc-Sulfarsénol  
     Zingal  
     Zistazine  
 \*Zohol  
 \*Zomine du Pr. Richet  
     Zomol  
     Zomo-maltine  
     Zomo-musculosine  
         Byla  
 \*Zymatine-Lescène  
 \*Zymogastrine Kervan  
     Zymostol
- CHAUZEIX, 26, r. Pradier,  
     Ville-d'Avray (Seine-et-Oise).  
 10, r. du Plâtre, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 CHAUZEIX, 26, r. Pradier.  
     Ville d'Avray (Seine-et-Oise),  
 19-21, r. Van-Loo, Paris.  
 11, ch. de la Muette, Paris.  
 163, r. de Flandre, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 172, r. d'Alésia, Paris.  
 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 à Livarot (Calvados) et 58, r.  
     de Vouillé, Paris.  
 81-83, av. Ledru-Rollin, Paris.  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.

**4<sup>e</sup> Partie**

---

**NOMENCLATURE  
DE  
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES  
CLASSÉES  
PAR LABORATOIRES**

---



- Lab. Félix Abadie**, 25, r. Thiers, Tarbes. — *Tœnifuge Larix*.
- Lab. Abadie Tanzi**, 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. — *Asclérogénol* (cachets), *Baume de la Faculté*, *Cachets digestifs du D<sup>r</sup> Bern*, *Diocol*, *Essence landaise*, *Gouttes calciques Zanit*, *Gouttes halogènes du D<sup>r</sup> Bern*, *Gouttes pectosérum*, *Moruxase*, *Neurotrol*, *Ovules halogènes du D<sup>r</sup> Bern*, *Urolithol granulé*, *Veinosérum*.
- Lab. d'Actino-Biologie**, 16, r. de la République, Villefranche-sur-Saône. — *Serifer Laurençon*, *Ultracao Laurençon*, *Ultravitamine 4*.
- Lab. Adam**, Granville (Manche), *Adrénocalcine*, *Chlocci*.
- Lab. Adler**, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Biolax*, *Bismuth Adler*, *Collybor*, *Cratagnéode*, *Formocholine*, *Gastroclean*, *Hémoclean*, *Hémovarine*, *Inhabillol*, *Iodaubépine*, *Oléopsyllium*, *Pulmobiasé*, *Rhinogéraudol*, *Tonikéol*, *Urocléan*.
- Lab. Adol (M. Giroud)**, 78, cours de la Liberté, Lyon. — *Baume Adol*, *Blennopiat*, *Cachets Adol*, *Potion Adol*.
- Lab. de l'Aigue d'or**, 53 bis, bd de la Liberté, Lille. — *Aigue d'or*.
- Lab. Pierre Alexandre**, 41, rue de Rome, Paris. — *Carbomucil*, *Decorpa*, *Enzypan*, *Hamaméline Roy*, *Normacol*, *Phénol Bobeuf*, *Pilules Myosotis*, *Pilules Roy*, *Radiolysine*, *Réargon*, *Spasmacol*, *Uroclase*.
- Lab. de l'Amibiasine**, 69, r. de Wattignies, Paris. — *Amibiasine*, *Bioentérase*, *Intestase*.
- Lab. Amicros**, 8, av. Rachel, Paris (XVIII<sup>e</sup>). — *Amicrargol*, *Elain Amicros*, *Fer Amicros*, *Orargol*, *Ovules Amicros*, *Sarcoptol*.
- Lab. des Prod. Amido**, 4, pl. des Vosges, Paris (IV<sup>e</sup>). — *Amidal*, *Backerine*, *Génatropine*, *Génésérine*, *Genhyoscyamine*, *Génomorphine*, *Génosthéniques*, *Génoscopolamine*, *Génostyrchnine*, *Vitamyl irradié*.
- Lab. H. Ammann**, 3, impasse Adam, Boulogne-sur-Seine. — *Belhemine*, *Blocs Vécór*.
- Lab. des Ampho-vaccins (Ronchèse)**, 6, rue de Rothschild, Nice et 62, r. Charlot, Paris. — *Ampho-pulvérisateur Ronchèse*, *Ampho-tablettes*, *Ampho-vaccin anti-infectieux*, *Ampho-vaccin anti-staphylococcique*, *Ampho-vaccin antityphoïdique T. A. B.*, *Ampho-vaccin pulmonaire*, *Ampho-vaccin urinaire*, *Ampho-vaccin intestinal*, *Ampho-vaccin pansement antipyogène*, *Ampho-vaccin pansement rhino-pharyngien*, *Pyoamphogel*.
- Lab. Ana**, 18, av. Daumesnil, Paris. — *Euphoryl*, *Euphoryl infantile*, *Hirudinase*, *Sclérosérum*.
- Lab. Angelini**, 61, rue de Seine, Paris. — *Depuriode*, *Lycobyle*, *Nutréol*, *Onction Angelini*, *Ovules Patrat*, *Polypeptine*, *Phostone granulé*, *Poudre Deol*, *Poudre Fiore*, *Sirop Alba*, *Sirop Patrat*, *Tonal*, *Vin des Indes*, *Varisclérine*.
- Lab. de l'Angiolymphé**, 4 bis, rue Hébert, Courbevoie. — *Angiolymphé du D<sup>r</sup> Rous*, *Argycuprol*, *Yprine*.



- Lab. de l'Aniodol**, 3-9, rue des Alouettes, Nanterre. — *Algan*, *Aniodol*.
- Lab. de l'Antifluor**, 26, r. des Petits-Champs, Paris. — *Antifluor*.
- Lab. des Antigénines**, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — *Antigénines*, *Biazan*, *Cresentyll*.
- Lab. de l'Antigonol**, 26, r. des Petits-Champs. — *Antigonol*.
- Lab. de l'Antiphlogistine**, 11, r. du Petit-Parc, St-Maur (Seine). — *Antiphlogistine*.
- Lab. des Antiseptiques chlorés**, 40, rue Thiers, Le Havre. — *Clonazone*, *Hydroclorazone*, *Stéramine*, *Talcazone*.
- Lab. de l'Aphosal**, 48 bis, av. Mozart, Paris. — *Aphosal*.
- Sté d'Application pharmacodynamique**, 5, rue Claude-Deccaen, Paris. — *Dinitra Dyn*, *Erythra Dyn*, *Phylla Dyn*, *Rhocya Dyn*.
- Sté générale d'Applications thérapeutiques « Théraplix »**, 98, rue de Sèvres, Paris. — *Bromure Souffron*, *Crescol Buisson*, *Freinix Buisson*, *Féroxal Buisson*, *Grassyl Buisson*, *Hémotonine Buisson*, *Iodure Souffron*, *Ixiun Buisson*, *Kérafine*, *Mésothorium Buisson*, *Nitium Buisson*, *Nujol*, *Ostreïne Buisson*, *Quinothorium Buisson*, *Réalphène Buisson*, *Sédol*, *Vaccin Démonchy*, *Véronidia Buisson*.
- Lab. L. Arquevaux, Pharmacien**, pl. de la Bastille, Etampes (S.-et-O.). — *Elixir thiogaiacolé Arquevaux*, *Eupectoral*, *Glyctone phosphatée Charrière*, *Sel hépatique U. N. Arquevaux*.
- Lab. Aseptor**, 21, rue Feydeau, Paris (II<sup>e</sup>). — *Aseptorhine*, *Auriculine*, *Boréol*, *Glycalcion*, *Otalgolex*, *Rhinaspir*, *Rosaseptor*.
- Lab. P. Astier**, 41-47, rue du Dr-Blanche, Paris. — *Arhéol*, *Condurango granulé Astier*, *Colitique*, *Glycophosphates granulés Astier*, *Kola Astier*, *Néo Riodyne*, *Quinquina granulé Astier*, *Riodyne*, *Stalysine*.
- Lab. du Dr E. Aubert**, 3, pl. Jussieu, Paris : *Créatine*, *Créatonine*, *Métaformine comprimé*, *Métaformine granulé*, *Neutrobil*, *Pancrébile*.
- Lab. Aubry**, 54, r. de la Bienfaisance, Paris. — *Cellu-Son*, *Malarsan*, *Quinby*.
- Lab. Marcel Audibert**, Cinq-Cantons, Bayonne. — *Gélicurine Audibert*, *Vermirène Audibert*.
- Lab. Andras**, 112, r. de Gerland, Lyon. — *Bilentéric*, *Entérisane*, *Epidermine*, *Endigérase*, *Fluxhemo*, *Formopectine*, *Lysurol*, *Néosedine*, *Phosarrhène*, *Plethosine*, *Staphylocid Andras*.
- Lab. Augier**, 2, rue des Lombards, Paris. — *Biocalcine*, *Gachets Laxa*, *Mensuosédyl*, *Noctisésdyl*.

- Prod. Bactériologiques L. B. L.**, 18, r. Daguerre, Paris (XIV<sup>e</sup>).  
— *Leucoril*, *Nevroxol*, *Sapolysine*, *Serélibé*, *Sérogène*.
- Lab. Bailly et Cie**, 15, rue de Rome, Paris (VIII<sup>e</sup>). — *Anaxeryl*, *Forxol*, *Glucolactol*, *Huilaxine*, *Ménatol*, *Opobyl*, *Pastapalm*, *Phaguryl*, *Pulmosérum*, *Quergémol*, *Theinol*, *Urophile*.
- Lab. du Dr Baissade**, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume du Dr Baissade*.
- Lab. du Baldisedan**, 133, rue Lecourbe, Paris. — *Baldisedan*.
- Lab. Bapaume**, 85, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. — *Bikréol*.
- Lab. Barbessou**, Marmande (L.-et-G.). *Baume du Dr Serin de Gaillac*, *Antidouleur*.
- Lab. Bardet**, 76, rue de Sèvres, Paris. — *Cachets Kapytan*, *Capsules Bardet*, *Solution Bardet*, *Taenifuge Bardet*.
- Lab. du Dr Barey**, 37, av. Jules-Coutant, Ivry-sur-Seine. — *Formocitrine*, *Mesogastrine*.
- Lab. Bassin**, 38, r. de Mainguy, Bondy (Seine). — *Stupho*, *Véralgine*.
- Lab. Basuyaux**, 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois (Seine), *Demalgon*, *Fokienyl*, *Labylax*, *Novatropine*, *Panlabyl*, *Strychnotonine*, *Surparine*, *Touranyl*, *Valovosan*.
- Lab. Baude**, St-Aubert (Nord). — *Antraseptol*, *Syphonéol*.
- Lab. B. C. L.**, 29, fg de Bourgogne, Orléans. — *Alsodine*, *Gastrépatine*, *Noza capsules*, *Mictoseptol*, *Total Tonic*.
- Lab. B. E. A.**, 17, faub. des Ancêtres, Belfort. — *Alibourine*, *Curoxyure*.
- Lab. Beaufour**, 44, r. de la Manufacture-Nationale, Beauvais. — *Romarène*.
- Lab. Beauxis-Lagrange**, 74, quai Jemmapes, Paris. — *Acatar*, *Bensamine*, *Calomel R. B. Lagrange*, *Cérébrinol A et B*, *Cinnolipol chaulmoogré*, *Dragées Vityl*, *Kamara C*, 47. *Infusion orientale RBL*, *Myrcol*, *Néophos*, *Pipérazine RB Lagrange*, *Prostatols*.
- Lab. du Spécifique Bejean**, 12, rue des Hospitalières-St-Gervais, Paris (IV<sup>e</sup>) et 30, r. des Francs-Bourgeois. — *Spécifique Bejean*.
- Lab. Belhomme**, 2, rue Tiron et 13, rue de Rivoli, Paris. — *Thymo menthol eupnique Belhomme*.
- M. Belières**, 19, rue Drouot, Paris. — *Absuric*, *Antirrhoïde*, *Arachise*, *Argion*, *Dépuratif Kromelinch*, *Désensibilysine*, *Eusomnine*, *Laurénol*, *Orthogénol*, *Polycautére*, *Sirop Gribell*, *Uromil*.

- MM. Benderitter et Cie, Vendôme (L.-et-O.).** — *Oynhépatil*, *Gastrocaol*, *Neutralcaol*, *Sulfoléine*, *Trisodyl Rozel*.
- Lab. du Dr Bengué, 16, rue Ballu, Paris.** — *Baume Bengué*, *Dragées Bengué*, *Chloréthyle*.
- Lab. Béral, 194, r. de Rivoli, Paris.** — *Adrénoïdes*, *Adréphédrine Béral*, *Clearol*, *Ephédraféine*, *Ephédrine Béral*, *Ephédroides Béral*, *Ephédromel Béral*, *Ephéiodine*, *Ephétropine*. *Rhinodrops*, *Somnicones*.
- Lab. Berger, 14, rue des Pyramides, Paris.** — *Calciphose*, *Glutinettes d'Aspirine*, *Gynéose*, *Mariode*, *Ostéoglandulol*, *Pulmacardia*, *Valéronal*.
- Lab. Bergevin, Châteaudun (E.-et-L.).** — *Arrhénuclène*.
- Lab. Bernard Garcin, St-Saturnin-les-Avignon, Vaucluse.** — *Mucyllium*.
- Lab. G. Bernhard, 11, rue Lafayette, Paris.** — *Ampélidine Bernhard*, *Baume Bernhard*, *Cachets parégoriques Bernhard*, *Granulés des Vosges*, *Poudre antigestralgique Bernhard*, *Pommade Bernhard*.
- Lab. Bertaut-Blancard, 64, r. de la Rochefoucauld, Paris.** — *Kipsol*, *Sirop antiphlogistique de Briant*, *Sirop du Dr Reinwillier au phosphate de chaux gélatineux*, *Iodure de fer inaltérable de Blancard*, *Sirop iodotannique Guillermond*.
- Lab. G. Berthon, Dornes (Nièvre).** — *Asthmo Actine Berthon*.
- Lab. Beytout, 12, bd St-Martin, Paris.** — *Aérophagyl*, *Carbonésie*, *Kaolinase*, *Thiophyl*, *Tisane Cisbey*.
- Lab. de Biochimie médicale (Ch. Desgrez, Dr en pharmacie), 19-21, rue Van-Loo, Paris.** — *Arsénos solvant*. *Ced-Roc*, *Sulfarsénol*, *Tétrasthénol*, *Zinc sulfarsénol*.
- Lab. Biologie appliquée (MM. Carrion et Cie), 54, faub. St-Honoré, Paris.** — *Antasthène*, *Cardiostreptine*, *Evamine Carrion*, *Gonagone*, *Hématoéthylroïdine*, *Hépanème*, *Opothérapie Carrion*, *Ovules au gonagone*, *Pancrétokinase*, *Phlébosine M. et F.*, *Plasma de Quinton*, *Staphylagone*.
- Lab. de Biologie médicale, 7, av. des Sources, Nice.** — *Antipiol*, *Entérofagos*.
- Lab. Biologique de l'Île de France, 3, rue Laugier, Argenteuil (S.-et-O.).** — *Appétyl*, *Aloplastine*, *Iodocalcium*, *Neurocalcium*, *Laxor*.
- Lab. de la Biomarine, Dieppe (S.-Inf.).** — *Arthritose*, *Ionyl*, *Marinol*.
- Lab. du Bionéol, 14, r. Périgueux, Angoulême.** — *Bionéol*, *Vamétol*.
- La Biothérapie, 5, rue Paul-Barruel, Paris.** — *Antivirus*, *Arapal*, *Bili-vaccins*, *Crystodal*, *Sanogyl*, *Spirogyl*.
- Lab. Blanchot, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris.** — *Tontseintine*, *Solution Watdat*.

- Lab. Bloch**, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.). — *Arrow-root, Blokao, Farines de régime, Farines de Céréales, de légumine et de fruits, Rapidoats, Semoules et flocons de céréales, Tapiocas.*
- Lab. Idon Bloch**, 89, r. St-Georges, Nancy. — *Pancréatosa Idon, Poudre Gasy.*
- Lab. Blouin**, 50, r. de Turenne, Paris. — *Adénoseptyl, Fluocholine, Poudre Danica.*
- Lab. Boissy**, 49, rue Hoche, Courbevoie. — *Ampoules Boissy, Causyth (comprimés), Iode organique Boissy, Sanex-Inhalant.*
- Lab. Boize et Alliot**, 9, av. Jean-Jaurès, Lyon. — *Alzine, Atomine, Diurobromine, Diurocarbène, Diurocystine, Logaphos.*
- Lab. Bomel**, Annonay (Ardèche). — *Ampoules V.-E. Doumer, Bi-iodural Novat, Collutoire V.-E. Doumer, Iodural Novat, Kreofos Novat, Pommade V.-E. Doumer, Pilules V.-E. Doumer, Solution V.-E. Doumer.*
- Lab. Bonetti frères**, 12, rue Vavin, Paris. — *Diadermine.*
- Lab. Bordelais**, 49, rue Maleret, Bordeaux. — *Céphœmétique, Physiosciamine.*
- Lab. César et B. Boss**, 10, r. de la Viotte, Besançon. — *Ferment pur de raisin, Médicoferment.*
- Lab. Bottu**, 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris. — *Codoforma Bottu, Gaze néolée, Néalgyl Bottu, Néol, Néolides, Ovunéol Bottu.*
- Lab. Boudin**, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Révuksif Boudin.*
- Lab. Bouillet**, 48, bd des Batignolles, Paris. — *Bismuth Tulasne.*
- Lab. des Boules Quiès**, 47, bd Victor, Paris. — *Boules Quiès.*
- Lab. E. Boulle**, 12, av. de la Grande-Armée, Paris. — *Cataplasme du D<sup>r</sup> Lelièvre, Gérarine, Sérosine Boulle, Vermitox.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Bourdeau**, Parthenay. — *Détergine.*
- Lab. Bousquet et Leroux**, 46, r. de la Barrière, Elbeuf. — *Cratégine, Sédatuline.*
- Lab. Bouteille**, 23, rue des Moines, Paris. — *Gantéine, Disuryl, Neurobore, Tubérol, Vaccinovules.*
- Lab. Boutroy**, 8, rue de Passy, Paris. — *Eugastrol, Exonérol, Setirtem.*
- Lab. Bouty**, 3, rue de Dunkerque, Paris. — *Biliol, Gastrozymase, Globépal, Liqueur Bouty, Liquides organiques injectables, Mélasérum, Métharfer, Métharsol, Méthylarsinates, Néphrine, Opothérapie Bouty, Ovi-génine, Produits Pennès, Sérosthényl, Sirop de Gaïarsol, Surrénaline, Thyroïdine, Triglandine, Triglandol.*
- Lab. Bouvelot**, 62, rue d'Antibes, Cannes. — *Acodros, Inhalol, Tsozons.*

- Lab. Bouvot Auvers-sur-Oise (S.-et-O.). — *Oéréliode*.
- Lab. Boyer, 12, r. Pavée, Paris. — *Phosbiose, Radiogastrol*.
- Lab. Bracquemond et Cie, 105, rue de Normandie, Courbevoie. — *Morrhuetine Juncken, Sel d'Ewald*.
- Lab. Bréant, 11, r. de Clichy, Paris. — *Cedrosan, Chlorure d'ammonium, Lycobile, Osmo-vaccins, Phostone, Vanotonyl*.
- Lab. Ch. Brésil, 12, rue St-Gilles, Paris. — *Broncosol, Sanguil*.
- Lab. J. Bressier, 102, rue Vincent, Marseille. — *Adrénargol, Gouttes Eryl, Nasobore, Résocaïne, Sulfoxyl, Urométhyl*.
- Lab. Pierre Brisson, 157, rue Championnet, Paris. — *Ampoules Egralène, Ampoules huile soufrée, Ampoules Sigmuth, Anytal Brisson, Cathiote Brisson, Denisia, Denisoline, Dithioléine Brisson, Entéricure Brisson, Jovine Brisson, Laccodermes Brisson, Lenicade Brisson, Licardet Brisson, Néo-séti. Procuta Brisson, Savon Denisol Brisson, Vulcase Brisson, Vulcapil Brisson, Uriclarine Brisson, Septylase Brisson, Sulphium Brisson*.
- Lab. Bruel, 36, r. de Paris, Colombes (Seine). — *Capsules Bruel, Benzo-iodhydrine*.
- Lab. Bruneau et Cie, 17, rue de Berri, Paris. — *Brunyl, Cutiphile, Cutiplaste, Lobéline, Parafinoléol, Paremanol. Senophile, Sérum de Jousset*.
- Lab. A. Brunot, 16, rue de Boulainvilliers, Paris. — *Dialyl, Sel de Hunt*.
- Lab. Buriat, 25, rue Copernic, Paris. — *Arséniode Buriat, Vériane*.
- Établ. Byla, 26, av. de l'Observatoire, Paris. — *Amino-sel Amunine, Antélobine, Gui Byla, Hormovarine, Insuline Byla, Héparmone, Irrastérine, Musculosine, Neurotrophol, Opothérapie Byla, Paralactine, Paratyronne, Phylactone, Phytogénine, Pituitobine, Splénarmonne, Splényl, Surrasténine, Vagotonine, Valériane, Vitadone, Vitaminol, Zomo-musculosine*.
- Lab. Caillaud, 37, rue de la Fédération, Paris. — *Aldine, Choléo Combretol, Cyanhérmine, Dioradin, Hydralin, Mucosodine*.
- Lab. Calmel-Domergue, 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse. — *Arsélonyl, Biiodures Domergue, Dermodiol, Ephédro. Rhinol. Eucalcine, Gonurol A. et B., Hexarubrine, Iodures Domergue, Pangynol, Pharyngaseptyl, Vasorhinol simple, Vaso-rhinol mentholé, Vaso-rhinol adrénaliné, Viscosodine*.

- Lab. Camuset**, 18, rue Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal*, *Pyréthane*, *Silicyl*.
- Lab. du Canol**, 39, rue de l'Arbalète, Paris. — *Canol*.
- Lab. Cantin**, Palaiseau (S.-et-O.). — *Gouttes Nican*, *Somnothyrid*.
- M. J. Capin**, Pharmacien, Roquefort (Landes). — *Antiphi*, *Liberine*.
- Lab. Caresmel**, 2, quai Paul-Bert, Tours. — *Antonal*, *Granulé Caresmel*, *Lucodal*.
- Lab. Carlier**, à St-Florentin (Yonne). — *Colarsénol*, *in/angyl Carlier*.
- Lab. Carron**, 69, rue de St-Cloud, Clamart. — *Amiphène*, *Fosfoxyl*, *Fosyls*.
- Lab. Carteret**, 15, rue d'Argenteuil, Paris. — *Bactioxyste*, *Célemol*, *Chrysemine*, *Diurène*, *Euronol*, *Lusoforme*, *Sinahn*.
- Lab. du Castanol**, 9, pl. Municipale, Tulle. — *Sirop Castanol*.
- Lab. Catillon**, 3, boul. St-Martin, Paris (III<sup>e</sup>). — *Glycérine Catillon*, *Iodo-thyroidine Catillon*, *Peptone Catillon*, *Strophantine Catillon*, *Strophantus Catillon*.
- Lab. du D<sup>r</sup> R. Cavaillès**, 29, r. Singer, Paris. — *Broncho-plastre*, *Coloplastre*, *Crème du D<sup>r</sup> Rap*, *Crème de Sapolan*, *Emplâtres Rogé-Cavaillès*, *Extrait du D<sup>r</sup> Rap*, *Gaze Anadhère*, *Lait de Cèdre Sapolan*, *Lait de Sapolan*, *Lait de soufre Sapolan*, *Poudre de Sapolan*, *Sapobarbe*, *Sapocade*, *Sapocrème*, *Sapolan*, *Sapopale*, *Savon de Sapolan*, *Sulfostan*, *Tisane dépurative de Cavaillès*.
- Lab. Central**, 129, rue de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>). — *Laclaris*.
- Lab. Central de France**, 10, rue de Belfort, Rennes. — *Cigarettes Salva*, *Dermal Haubro*, *Iodo Salva Evesque*, *Nucléal Haubro*, *Poudre Salva*, *Pyal Haubro*, *Rhino Salva*.
- Lab. César et Boss**, 10, r. de la Viotte, Besançon (Doubs). — *Ferment pur de raisin*, *Médicoferment*.
- Lab. Cesbron**, 63, rue de la Faisanderie, Paris. — *Gélor*, *Ioda*.
- Lab. du Céthocal**, 8 bis, rue J.-J.-Rousseau, Fontenay-sous-Bois. — *Céthocal*.
- Lab. Chaix**, 8-10, rue de l'Orne, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle*, *Polyvaline du D<sup>r</sup> Bayle*, *Splénique (extrait) du D<sup>r</sup> Bayle*.
- Lab. P. Chambon**, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne). — *Antisciatique P. Chambon*.
- Lab. Chantereau**, 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum*, *Sympathyl*, *Tot'Hamélis*.
- Lab. Chapotot**, 56, boul. Ornano, Paris. — *Néc-laxatif Chapotot*, *Rhizotannin Chapotot*.

- Lab. des Charbons Fraudin**, 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine). — *Benzoate de naphtol Fraudin*, *Biscols*, *Carboiodure Fraudin*, *Charbon Fraudin naphtolé*, *Charbon Fraudin simple*, *Laxol Fraudin*.
- Lab. Charmaison**, 26, av. de Royat, Clermont-Ferrand (P.-de-D.). — *Dragées de Royat*, *Gobérol*, *Hépatofomine*, *Levurase*.
- Lab. Chassaing Le Coq et Cie**, 1, quai Aulagnier, Asnières (Seine). — *Dioséine Prunier*, *Néo-neurosine Prunier*, *Neurosine Prunier*, *Novacétine Prunier*. *Poudre laxative de Vichy*. *Vin de Chassaing*.
- Lab. Pierre Château**, 137, av. Parmentier, Paris. — *Digéryl*, *Energétyl*, *Gélaç*, *Inhalyl*, *Sinuzyl*.
- Lab. Chatelut**, 65, rue Louis-Blanc, Paris. — *Dragées Yse*.
- Pharmacie Chaumel**, 87, rue Lafayette, Paris. — *Isotonyl Bourel* (poudre de Lausanne), *Normatensol*.
- Établ. Alfred Chauvin**, Aubenas (Ardèche). — *Acoégénol*, *Tubes Blache*, *Tubes Chauvin*.
- Lab. L. Chauvin**, 3, r. de Vouillé, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Asthmolène*, *Cachets Spévin*, *Sélor*.
- Lab. biologique Chauzeix**, 26, r. Pradier, Ville-d'Avray. — *Banikol*, *Zaryl*, *Zimbyl*.
- Lab. Chavialle**, 70, Grande-Rue, Sèvres. — *Baume Saihel*, *Dynamocalcine*, *Fornose*, *Suppositoires Pyrax*.
- Lab. Chevillon**, 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.). — *Biliogastrine*, *Morisland*, *Nucleigène*, *Paradol-Paradoline*, *Stoméol Vichy*.
- Lab. Chevreton-Lematte**, 52, r. La Bruyère, Paris. — (Voir Lab. Lematte et Boinot)
- Lab. Chiarini**, Aix-en-Provence (B.-du-R.). — *Elixir vermifuge chiarini*. *Tœnyuge du D<sup>r</sup> Jaquème*,
- M. Chibret**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Ferrand. — *Gollyres Chibret « Optima »*, *Pommades ophtalmiques Chibret « Optima »*.
- Lab. de « Chimie appliquée de Nanterre »**, 31, r. du Chemin-de-Fer, Nanterre. — *Néotrophène*.
- Lab. Choay**, 40, rue Théophile-Gautier, Paris. — *Extraits opothérapiques Choay*, *Extraits injectables*, *Extraits totaux Choay*, *Folliculine Choay*, *Gélotanin Choay*, *Opothérapie Choay*, *Peptosthénine Choay*, *Post-hypophyse Choay*, *Syncrines Choay*.
- Christiaens (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale)**, 2, rue du Champ-de-Mars, Reims. — *Antialgos Christiaens*, *Benzophosphine Christiaens*, *Capsules Goubaux*, *Pilules anhépatiques Christiaens*, *Pilules prophylactiques Christiaens*, *Sédatine Christiaens*.
- Lab. Churchill**, 12, rue de Castiglione, Paris. — *Fosfo-magnyl Ghurchill*, *Limol Ghurchill*, *Magol Ghurchill*, *Potiol Ghurchill*.

- Lab. Giba**, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — Agomensine, Androstine, Ascéine, Atoquinol, Cibalgine, Coagulène, Coramine, Dial, Dialacétine, Didial, Digifoline, Elbon, Ferrophytine, Fortossan, Fortossan irradié, Hémypnal, Lipoiodine, Percainal, Percaine, Péristaltine, Phytine, Quinino phytine Giba. Résyl, Salène-Salenal, Sanoquinol, Sistomensine, Vioforme, Vioformol.
- Lab. du Cimarsényl**, 68, av. de Normandie, Colombes. — *Cymarsényl*.
- Lab. du Gimatryl**, 4, pl. Royale, Nantes. — *Gimatryl*. *Héliatol* (poudre et pommade).
- Etabl. C. I. P.**, 128, r. Vieille-du-Temple, Paris. — *Dialine*.
- Lab. Claeys**, 1, bd St-Martin, Paris. — *Babeurre Nutricia*, *Nutro*.
- Lab. Claverie**, 4, av. Brazza, Romainville. — *Grog antigrip Laborom*, *Oui-Gourme*, *Stomobrol*.
- Lab. du Clupeyl**, 69, av. Faidherbe, Malo-les-Bains. — *Clupeyl*.
- Lab. Cluzel**, 60, cours Emile-Zola, Lyon. — *Gouttes Milko*, *Mictualine*, *Réculsif Milko*, *Tablettes Zéva*, *Tonique Zéva*.
- Lab. des Prod. Cognet** (Armingeat et Cie), 43, rue de Saintonge, Paris (III<sup>e</sup>). — *Agonol Cognet*, *Capsules Cognet*, *Dragées de fer Cognet*, *Dragées Dubourg*, *Hemoneurol Cognet*, *Nuclarène Cognet*, *Tiodine Cognet*, *Thiosinamine Cognet*.
- Lab. A. Coirier**, 69, av. du Maine, Paris. — *Codérax*, *Marrucol*.
- Lab. Colas**, 133, r. Lecourbe, Paris. — *Guroraisin*.
- Sté des Prod. Collas et Boudault**, 15, rue Augustin-Thierry, Paris. — *Pyrélaïne Collas*.
- Lab. Raoul Columbeau**, 19, rue St-Bazile, Marseille. — *Custodine*, *Poudre Cassarini*, *Tonapérine*.
- Lab. des Complextraits Huckel**, Héricourt (Hte-S.). — *Complextraits Condurango*, *Complextraits Convallaria*, *Complextraits Crataegus*, *Complextraits digitale*, *Complextraits G. P. V.*, *Complextraits H. H.*, *Complextraits Kola*, *Complextraits Marron*, *Complextraits Valériane*.
- Lab. Comte**, 60, rue St-Guilhem, Montpellier. — *Bulles d'Haley*, *Marrubiase*, *Rythmosystol*.
- Lab. C. Cons**, rue des Ecoles, Chambéry. — *Juglane*.
- Consortium Scientifique**, 2, pl. Meissonier, Lyon. — *Procalcyl*.
- Lab. du Coprex**, 39, r. de Clichy, Paris. — *Coprex*.
- Lab. Coquelu**, Digoin (S.-et-L.). — *Compressif Beslier*, *Coqluplaste*, *Thermoplaste*, *Tulle rose Beslier*, *Vésicatoire Rose Beslier*.
- Lab. Corbière**, 27, rue Desrenaudes, Paris. — *Alcalinose*, *Broncho-Vacludun*, *Goli-Vacludun*, *Créagénol*, *Cyto-*



*choline, Cyto-manganol, Cytophédrine, Cyto-serum, Cyto-Strychnine, Dermaline, Entéro-vaclydun, Fixococcine, Gono-Vaclydun, Gynéco-vaclydun, Hémocyto-sérum, Iolase, Lacto magnésie Vita, Novarsénobenzol, Oéiformine, Oliolase, Opolaxyl, Paludase, Praunase. Pyo-Vaclydun, Praunase, Rhino-Vaclydun, Sérum anti-asthmatique de Heckel, Staphylo, Strepto-Vaclydun, Suppositoires Corbière, Suppos-Corbière au 606, Vaclydun-Vaclyderm.*

**Lab. Cornaud et Brossard**, 1, rue des Cordouans, La Rochelle. — *Névralgol Brossard.*

**Lab. Cortial**, 7, rue de l'Armorique, Paris. — *Androcalcion, Cortiode, Dohyfral, Gynocalcion, Iodaseptine, Lita, Septicémine.*

**Lab. Cortot**, 36, rue des Archives, Paris. — *Angiosédine.*

**Lab. Coulloux**, 116, rue du Pont, Auxerre. — *Sirop Brahma.*

**Lab. Cousin**, rue Albert I<sup>er</sup>, Beaumont-sur-Oise. — *Eugaline, Hépatergol.*

**Lab. G. Coussinet**, 20, rue des Martyrs, Paris. — *Bursol, Codocol, Opotenine, Vagosedyl.*

**Lab. Couturieux**, 18, av. Hoche, Paris. — *Anti-paludique. — Argolion, Arsenion, Aurion, Avanazol, Azufrol, Bismuthion, Bromiase, Cidrase, Collargol, Cuprion, Cytuline, Diurétique, Fébrifuge, Fer-ion, Glésol, Glycolactimase, Héracléine, Hydrargyrion, Iodurase, Lactimase, Lantol, Levure extractive, Levurine brute, Métaux colloïdaux, Cénase, Panglandine, Plurion, Polyfermiat, Séléniol, Selvan, Spasma, Stanion, Sulfurion, Thyroïdine.*

**Lab. de la Créoformine**, 18, r. de Jouvence, Dijon. — *Créoformine.*

**Lab. Crosnier**, 44, rue de Lagny, Montreuil (Seine). — *Morubiase, Neuroflorine, Sirop Minéral sulfureux.*

**Lab. Crouy**, Vernon (Eure). — *Urophényl.*

**Lab. Cruet**, 13, rue Miollis, Paris. — *Arcanan, Atophan, Atophanyl, Synthaline B.*

**Lab. Cuguilliers**, 19, rue des Chalets, Toulouse. — *Sérum végétal, Vin Pyrola.*

**Lab. de la Curatine Brunet**, 23, rue des Ecoiffes, Paris. — *Curatine Brunet.*

**Lab. du Curogène**, 145, r. Yves-le-Coz, Versailles. — *Curogène, Mucobismuthine.*

**Lab. Daguin**, 7-13, rue Bobillot, St-Maur (Seine). — *Choléolactol, Novo Lactol, Pneumostyl, Purganol.*

- Lab. Dalet**, 24, av. Mathurin-Moreau, Paris. — *Furonculase*, *Baume Dalet*, *Lénicure-Vichy*, *Papier Fayard et Blayn*.
- Lab. Dalin**, 49, quai St-Vincent, Lyon. — *Cérébrosthénine*, *Glycocarpine*, *Kydalose*.
- Lab. Dalin (R. Boitias et Cie)**, 1, r. de la Martinière, Lyon. — *Cyanhermyl*, *Thio-Terpine Dalin*.
- Lab. DaHoz et Cie**, 13, boul. de la Chapelle, Paris. — *Antalgol*, *Glycérophosphate*, *Gosiérine*, *Hémoglobine*, *Tridigestine*.
- Lab. Daniel Brunet**, 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s-Seine. — *Coréine*, *Cholergine*, *Hépato-Byl*, *Neurène*, *Novo-Brol*, *Ostéo-hépatine*, *Ovobiol*, *Ovothyrol*, *Pulvila*, *Stal Kosal*, *Tœnifuge Kirn*, *Tanno-calcine*.
- Lab. Danjou**, 28, rue de l'Hôpital-Militaire, Lille (Nord). — *Anapeptone*, *Peptone Vassal*.
- Prod. Dannec'h (MM. Brun et Martineau)**, 64, rue des Tournelles, Paris. — *Chloridia*, *Cigares Gicquel*, *Elixir du Dr Thermes*, *Laxia Dannec'h*, *Manganésia*, *Papier Gicquel*, *Tritonine*.
- M. J. Dardet**, Bonnard (Yonne). — *Lails Dardet*.
- Établ. Darrasse**, 13, rue Pavée, Paris. — *Iodosan*, *Pepto-fer du Dr Jaillet*, *Tamar Indien Grillon*, *Valérobromine Legrand*.
- Lab. Darrasse**, 7-13, rue St-Maurice, Nanterre. — *Choléine Camus*, *Choléine lactique*, *Dragées Séranti*, *Eupnine Vernade*, *Lactobaciline*, *Opsolysine*.
- Lab. Daupez**, 37, rue des Lois, Toulouse (Hte-Gar.). — *Baume Fuba*, *Myoden*, *Nasogyne*, *Santaline Daupez*.
- Lab. Dausse**, 4, rue Aubriot, Paris. — *Ampoules neurosthéniques*, *Camphodausse*, *Fondants*, *Gouttes*, *Hémogénol*, *Intraits*, *Moréthyl*, *Paveron*, *Sérodausse*.
- MM. G. David et ses Fils**, 49, r. de Bitche, Courbevoie (Seine). — *Gelotube 29*, *Baume Sélénia Quassia Kina Rabot*.
- Lab. D. C. E. H. Hofstetter**, 6, r. des Cigognes, Strasbourg. — *Asthmolysin*, *Ketophan*, *Postérisan*.
- Lab. du Dr Debat**, 60, rue de Prony, Paris. — *Filtrat Inosepta*, *Hépacrine Inogyl*, *Inorenol*, *Inorhinyl*, *Inosepta*, *Inosepta ophtalmique*, *Inosphacelol*, *Inosplenol*, *Inotyol*, *Inoxemol*, *Inoxyl*, *Pancrinol*, *Provitol*.
- Lab. Dechatre**, 20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois. — *Boroseptine*, *Bronchoforme*, *Granulé Sabel*, *Hormotensyl*, *Inhaphone*, *Pastille Sabel à la codéine*, *Plas mastyl*, *Rhinostagone*, *Sédophoryl*.
- Lab. Déchesal**, 39, rue de la Gare, Bondy. — *Aldor formogène*, *Néo-ricin*, *Opo-Vacuoline*, *Rhumatoidine*, *Vacuoline*.
- Lab. Deffarge**, 2, rue Lauzac, Bordeaux. — *Nucléocardyl*, *Panvita*, *Vitacrines*.
- Lab. Defresne**, 19, r. Jacob, Paris. — *Pancréastase Defresne*.

- Lab. Deglaude, 6, rue d'Assas, Paris. — *Cardibaine, Digibaine, Theoxantine, Spasmosédine.*
- Lab. Dehaussy, 66, rue Nationale, Lille. — *Anti-asthmine, Biocalcium, Capsules et sirop Préga, Géréossine, Crédone, Crypthermol, Diastogène, Entérobyl, Formobenzyl, Gladyl, Hermarsinol, Hermomuthol, Koumyl, Leucosérum, Sédoneurol, Sinrénaline.*
- Lab. Dehay, 58, rue St-Géry, Arras. — *Inhalone, Poudre Gynule, Tablettes Boval.*
- Lab. Déjardin, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris. — *Extrait de malt français Déjardin, Laxatone Déjardin, Levure Déjardin, Levuro-Maltine Déjardin, Malt français Déjardin, Mycodermine Déjardin.*
- Lab. Delalande et Cie, 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie. — *Baume Suella, Ephédrocamphe, Esculéol, Neuroplasma Fort, Neuroplasma Massif, Neuroplasmine, Polyminéral, Solucamphe, Sulfocadol, Suppos. à l'esculéol.*
- Lab. du Dr Delalbre, 2, r. Claude Matrat, Issy-les-Moulineaux (Seine). — *Adipolysine, Dermo-rhinistol, Grains Cephalgifuges, Humoro — Stabiline, Sthénoléine.*
- Lab. Delfour, Pouillon (Landes). — *Oléo-mel laxatif.*
- Lab. Deliss, 10, r. de la Mairie, Ivry-sur-Seine. — *Catalyl Mg, Magbromyl, Magiodyl, Magsalyl Mg.*
- Lab. du Delta, 84, rue Rochechouart, Paris. — *Arcica, Calmaby, Onguent Fréval, Percalcine.*
- Lab. Demasles, 5 pl. Miremont, Vienne (Isère). — *Atihal, Biogénol, Hématogénine, Ménosédine, Myrtiline, Phospholéoze, Sédospasmine.*
- Lab. Denis, 85 bis, rue du Ranelagh, Paris. — *Glottyl.*
- Lab. Denisot, 19, rue de Fleurus, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Carbolactyl simple, Carbolactyl bilié, Cervol, Hémosédine, Opophos,*
- Lab. Depruneaux, 18, rue de Beaune, Paris. — *Antigel, Ciproveinol, Diemenal, Dienol, Dragées Elkin, Granules Elkin, Hypophédrine, Normalarine, Soderséine.*
- Lab. de la Dermofagine (L. Sagot), 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — *Dermofagine, Dyspepsia, Dyuril, Holocalcine, Raïforyl.*
- Lab. Dr Derozier, 24, r. Jardel, Bordeaux. — *Anozyl, Buccollan, Laryngolan, Otolan, Rhinolan.*
- Lab. Deschiens, 9, rue Paul-Baudry, Paris. — *Hémoglobine Deschiens, Holos, Hépathémo.*
- Lab. Descoureaux et fils, 52, bd du Temple, Paris. — *Chloro-Magnésion, Dragées Lumeval, Ovules Vézès, Tensoryl D, Tryclène.*
- Lab. du Détensyl, 8, av. Walkanaer, Nice. — *Detensyl.*
- Lab. Diabétalim, 61, r. Vandamme, Paris. — *Diabétalum.*
- Lab. du Diasclérol, 26, r. de Norvins, Paris. — *Diasclérol.*

- Sté de Spéc. Diététiques et Pharmaceutiques** (Cow et Gate),  
22, r. des Belles-Feuilles, Paris. — *Chocolate Milk*  
*C. G.*, *Lait sec G. G.*, *Peptalac*.
- Lab. de la Digastrine**, 11, r. St-Agricol, Avignon. — *Digast-  
trine*.
- Lab. du Dolophos**, 61, rue de St-Quentin, Caudry (Nord). —  
*Dolophos*.
- Lab. Charles Domergue**, Agen (L.-et-Gar.). — *Antiasthma-  
tique D.*, *Antifuronculeux D.*, *Crayons antifissure*  
*Domergue*, *Elixir vermifuge Allvers*, *Gatercodéine*,  
*Naso-Sulfolarsan*, *Prunine Sentini*, *Sirop Sentini*.
- Lab. Dor** (M. Dorantowicz, Pharmacien), 17 bis, av. Par-  
mentier, Paris. — *Alcamfétol*, *Benzylocalcium*.
- Lab. Dorantowicz**, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloï-  
dine*, *Curiodé*, *Hormobiline*, *Mésosome*, *Morrhualène*  
*Gauthier*, *Panfêbrine*, *Stomophile*.
- Lab. L. Dordin**, Harnes (P.-de-C.). — *Algosédine*, *Cachets*  
*Aspica*, *Cachets Urby*, *Kératoplastol*, *Rhinadrargol*.
- Lab. de la Dosurine**, 16, rue Charlemagne, Paris. — *Dosurine*  
(*Trousses*).
- Lab. Douetteau**, 20, r. du Fg St-Honoré, Paris. — *Astasol*,  
*Neurovarol*, *Sédasix*.
- Lab. Drouet et Plet**, 37, rue de Marly, Ruell (S.-et-O.). —  
*Anexol*, *Appareil Laxor*, *Byliréine*, *G. 40 comprimé*,  
*Magnésie hydratée*, *Néo-physio injectable*, *Ozobiase*,  
*Oxyléine*, *Ozobiase opothérapique*, *Phosoforme*, *Phos-  
pirine*, *Physiosthénine*, *Plombyl*, *Quinéase*, *Rosalyl A.*  
*et B.*, *Salysérum*.
- Sté Française du Dryco**, 5, rue St-Roch, Paris. — *Dryco*  
(*lait sec*). *Vitagermine*.
- Lab. du Dr Dubat**, 80, faub. St-Denis, Paris. — *Ouate Rhi-  
nol*, *Pommade Rhinol*, *Seccase*, *Théisine*.
- Lab. des Prod. Dubois**, 16, bd Pereire, Paris. — *Cardial-  
gine*, *Collo-iode*, *Campho-Spartéine*, *Codarsyl*, *Oléo-  
iode*, *Iodotensyl Dubois*, *Uroquinase*.
- Lab. Duc**, 24, av. Mac-Mahon, Paris. — *Bleu Santal*, *Cedrel*  
*Bel Dragécalcon*, *Injection orientale*, *Pommade John-  
son*, *Rongiecourt*, *Sirop Avet*, *Tablette Stuart*, *Hamamélis*  
*Ducoq*.
- Lab. Ducatte**, 31, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Entero-  
antigènes Danysz*, *Paratoxine*, *Sclérollysine*.
- Lab. Ducloy et Cie**, Arques (P.-de-C.). — *Boldo-Biline*,  
*Bradygastrine*, *Lactogelose*, *Lichénose*, *Sarcoglobine*,  
*Tachygastrine*.
- Lab. Ducoq**, Langeais (Indre-et-Loire). — *Iodo-Hamamelis*  
*Ducoq*, *Vulnérine*.
- Lab. Dufayard**, 12, rue des Saints-Pères, Paris. — *Gheralys*,  
*Urosan*.
- Lab. Henri Dufour**, 40, rue des Carmes, Orléans (Loiret). —  
*Apsophol*, *Gadophryl*, *Dymozyl*, *Edistol*.

- Lab. du D<sup>r</sup> E. Duhourcau, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Dragées anticalarrhales du D<sup>r</sup> Duhourcau*, *Gastricine du D<sup>r</sup> E. Duhourcau*, *Tœnifuge français du D<sup>r</sup> E. Duhourcau*.
- Lab. Dulcis, D<sup>r</sup> Ferry, place Clichy, Monte-Carlo. — *Alcaloïdes seuls et combinés*, *Argolène*, *Cadmiol zinc*, *Cuprinol*, *Iodo-calcique*, *Iodo-Rubidium*, *Ichtyol zinc*, *Myosine forte et faible*, *Mydriazine*, *Novoptine oxyde orangé de Hg*, *Ophthalmiforme*. *Tubes Dulcis*.
- Lab. Dumesnil, 10, rue du Plâtre, Paris. — *Aseptampoules Dumesnil*, *Crémo-plastol Dumesnil*, *Dépuralif Dumesnil*, *Dermoplastol Dumesnil*, *Gelicrème Dumesnil*, *Girasiol Dumesnil*, *Huile au calomel Dumesnil*, *Mugrizol Dumesnil*, *Théobromose Dumesnil*, *Zébo-plastol Dumesnil*.
- Lab. Dumesny, 18, rue de Maubeuge, Paris. — *Cigarettes antiasthmiques du D<sup>r</sup> Clery*, *Poudre antiasthmique du D<sup>r</sup> Clery*. *Pastils Meran*.
- Etabl. du D<sup>r</sup> Durand, 6, av. Foch, Gaillac (Tarn). — *Vin Lux Gaillac mousseux*.
- Lab. Duret et Rémy, 13 bis-15, rue des Champs, Asnières. — *Bis-Ka-Ma*, *Choléokinase*, *Comprimés d'Alibour*, *Hépatosodine*, *Nyctal*, *Peptonal*, *Polypeptonal*, *Saturol*, *Thiolaxine*.
- Lab. E. Duriez, 20, pl. des Vosges, Paris. — *Chloral bromuré*, *Elixir Ducro*, *Quinoidine*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Henri-Dussaud, 52, rue de Rome, Marseille. — *Elixir Dussaud*.
- Lab. A. Duteil, 90, av. de St-Ouen, Paris. — *Elixir Hymel*, *Quinorhéine Duteil*, *Spasalgique Duteil*, *Suppositoires Hymel*.
- Sté des Eaux minérales de Decize, 49, bd de Port-Royal, Paris. — (*Source*) *Saint-Aré*.
- Lab. de l'Elocine, 51, r. du Ranelagh, Paris. — V. A. V.
- Lab. de l'Entériode, 39, r. de Clichy, Paris (IX<sup>e</sup>). — *Entériode*.
- Lab. Eon, 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). — *Carnofer*, *Cathartine*, *Derméon*, *Gercerine*, *Mensorrhine Pom-made et suppos.* *Eon*, *Psoréon*, *Pulmicure*, *Sulforeon*.
- Lab. Eparvier, 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon. — *Boldoïne*, *Cascara*, *Ferroxyline*.
- Lab. de l'Ephédrolénol, 24, boul. Jean-Jaurès, Boulogne (Seine). — *Ephédrolénol*, *Ephédrolénol dédoublé*.
- Lab. de l'Eranol, 45, rue de l'Echiquier, Paris. — *Eranol*.

- Lab. Escoufflaire, Baisieux (Nord).** — *Cigarettes anti-asthmiques Escoufflaire n<sup>os</sup> 1 et 2, Poudres anti-asthmiques Escoufflaire n<sup>os</sup> 1 et 2.*
- Lab. général d'Etudes biologiques, 29, pl. Bossuet, Dijon (Côte-d'Or).** — *Doloma, Œnophos, Protidyne.*
- Lab. de l'Euphysol, 22 bis, av. de Saint-Cloud, Versailles.** — *Euphysol (tisane, pastilles).*
- Lab. Evine, 16, r. Barbette, Paris (III<sup>e</sup>).** — *Baume Pélevine, Ovules Evine, Poudre Evine, Poudre Pélevine, Thé Evine.*
- Sté Française d'Extension bio-chimique, 2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, St-Quentin.** — *Boromyl, Gabiol, Halocure, Stomoxigène.*
- c
- Lab. Fabre, 112, r. des Pyrénées, Paris.** — *Lynévol, Uro-tisan.*
- Lab. Fagard, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.** — *Antiasthme Bengalais, Barèges Fagard, Capsules d'Euviscol, Cigarettes Schulzé, Elatine Bouin.*
- Lab. Falcoz et Cie, 9, rue Boissonnade, Paris.** — *Æthone. Neurotrophène.*
- Lab. Falvy, 40, r. des Acacias Paris.** — *Adrénoleine, Anxiol, Broséyl, Chlorinol, Edricamphre, Ephedrine Proba, Epholéine, Hemopectal, Gastropeptyl, Holuryl Rhinadrol, Synase, Trymol.*
- Lab. P. Famel, 20-22, r. des Orteaux, Paris.** — *Optraex, Sirop Famel.*
- Lab. des spécialités Farma, 64, r. d'Orsel, Paris (XVIII<sup>e</sup>).** — *Val'ovarine.*
- Lab. Faure et Dussuel, 15, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.** — *Elixir Bonjean, Euphorine du D<sup>r</sup> Chaboud, Magnelax, Le Sinaplasme,*
- Lab. Favrichon et Vignon, Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).** — *Céréales Bébé Favrichon, Céréales granulées, Farines maltées, Phosphogène Favrichon.*
- Lab. Feignoux, 95, rue de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>).** — *Névoral, Ovarine Tisy.*
- Lab. du Feminadène, 120, rue Lecourbe, Paris.** — *Feminadène, Viradène.*
- Lab. Fercocq, St-Maur (Seine).** — *Pulmogrog, Hémocalcine.*
- Lab. G. Fermé, 55, bd de Strasbourg, Paris.** — *Muthanol, Néolyse, Psathanol, Soluthanol, Staphylotanol, Tri-radol, Urolan, Viscosérum.*
- Ferme de Lafaye, Marlihes (Loire).** — *Babeurre Lafaye.*
- Lab. de la Fer-ovarine Vitalis, 38, bd de Charonne, Paris.** — *Fer-ovarine Vitalis.*

- Lab. du Dr Ferré**, 6, rue Dombasles, Paris. — *Dismine Favrot*, *Hémoluol*, *Lin Tarin*, *Poudre Exibard*, *Pulsamone*, *Sirop Lamoroux*.
- Lab. E. Ferré**, 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris. — *Iodures* *L. Foucher*, *Litharsyne*, *Poudre Rocher laxative*, *Sucre Edulcor*.
- Lab. du Dr Fialip**, 23, av. de la Motte-Picquet, Paris. — *Oxy-injecteur du Dr Fialip*.
- Lab. Fisch et Cie**, 4, rue d'Illzach, Mulhouse (Haut-Rhin). — 104, faub. Poissonnière, Paris. — *Bains carbogazeux Wolo*, *Baumolacpinine*, *Cellona*, *Chlormagnésium*, *Chymosine Fisch*, *Elastoplaste*, *Fango Fisch*, *Fluol*, *Lacpinine*, *Optiplaste Poudre Orl*, *Prévalidine*, *Recylite*, *Réulsif Procipha*, *Solvochine*, *Spirobismol*, *Spirobismo soluble*, *Sulfocrème*, *Tepéros*, *Transpulmine*.
- Lab. Flahaut**, 74, r. Monge, Paris. — *Acépine*, *Anadiposine Laxoil*, *Sulfodermol*, *Terpine granulée Baron*.
- Lab. Fleury-Galvin**, St-Fons, Rhône. — *Carypaïne*.
- Lab. du Fluosalyl (M. Beaugourdon)**, 43, av. Kléber, Paris. — *Crème Lygie*, *Fluol*, *Fluosalyl Beaugourdon*, *Pâte Magail*, *Sirop Magali*.
- Lab. de la Fluxine (M. Bonthoux)**, 42 bis, rue Pasteur, Villefranche (Rhône). — *Evonyl*, *Fluxine (Gouttes)*.
- Lab. du Fokiényl**, 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois. — *Fokiényl*.
- Lab. Paul Fontanier**, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Algbiogyl*, *Algilaxine*, *Algovitine*, *Curalgine*, *Gaduine algovitinée*, *Gastrosalvine*, *Phosbiogyl*, *Phytagline*, *Pulmovitine*, *Radiovitine*, *Ultrasténil*, *Ultravitine*.
- Lab. du Forcival**, 6, r. Bridaine, Paris. — *Forcival*.
- Lab. Fortin**, 109, rue de Sèvres, Paris. — *Hyol*.
- Lab. Fosset**, 21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.). — *Cytopulmase*, *Pectobiol*, *Viscodermine*, *Viscoveine*.
- Lab. Fouard**, 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine). — *Les granions de Fouard*.
- Lab. Fouché**, 2 bd. Pershing Paris. *Chlorhydrol*, *Cicabi*, *Magistère de Bismuth*, *Québralgine*.
- Lab. H. Foucher**, 77, bd de Grenelle, Paris. — *Copraxe Elixir Héla*, *Entérohépatine*, *Gastérinase*, *Muxyl*, *Neuricure*.
- Lab. Fouchère**, Rive-de-Gier (Loire). — *Agobyl*, *Benzo-carbine*, *Biodynol*, *Fluarase*.
- Lab. Fournie**, 3, pl. Miséricorde, Lyon. — *Quina Baron*.
- Lab. A. Fournier et Cie**, 147, bd de Montparnasse, Paris. — *Gérébrine Fournier*.
- Lab. Fournier frères**, 7, rue Biscornet, Paris. — *Bileyl*, *Biolactyl*, *Crinosthényl*, *Opothérapie Fournier*, *Ovaire Fournier*, *Pélospanines*, *Physocrisine*, *Splenocrisine*, *Vaccins*, *Vasolaxine*.

- Lab. M. Fraisse, 8, rue Jasmin, Paris. — *Camphro Salyl Fraisse, Fer intraveineux Fraisse, Gouttes hypotensives Fraisse, Iodo bismuthate de quinine Fraisse, Sérum névros-thénique Fraisse, Sérum hypotensif Fraisse, Sol-Bi Fraisse.*
- Lab. Français de pharmacologie, 42, av. de Dravell, Vigneux-sur-Seine (S.-et-O.). — *Endodermol.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Fraysse, 47, r. de Neuilly, Nanterre. — *Arithridol du D<sup>r</sup> Fraysse, Energinose du D<sup>r</sup> Fraysse, Follilobine. Hypophydose du D<sup>r</sup> Fraysse, Opothérapie du D<sup>r</sup> Fraysse, Revitalose du D<sup>r</sup> Fraysse.*
- Lab. du Frénasma, 71, r. St-Blaise, Paris (XX<sup>e</sup>). — *Frénasma.*
- Lab. Freyssinge, 6, rue Abel, Paris. — *Capsules Dartois, Chloramine, Nevrosthénine, Polyphorine Freyssinge, Quassine Frémint, Salicol Dusaule.*
- Lab. Fumouze et Cie, 78, faub. St-Denis, Paris. — *Capsules Raquin, Carnine Lefranc, Globules Fumouze, Ovules Chaumel, Poudre Chaumel, Suppositoires Chaumel.*
- Lab. Gabail, 5, r. Lefebvre, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Biscamph, Elixir Gabail, Gluphosol, Iodo-scilline, Néosaliodé, Valérianate Gabail.*
- Lab. Galbrun, 8-10, rue du Petit-Musc, Paris. — *Aristargol, Iodalose Galbrun, Prosthénase Galbrun.*
- Lab. R. Gallier, 38, boul. Montparnasse, Paris. — *Arhéma-pectine Gallier, Basedowine, Kidoline.*
- Etabl. Gallina, 4, rue Candolle, Paris. — *Huile Gallina, Iodentérol, Iodhéma.*
- Lab. Clément Gardiol, 6, rue Félix-Pyat, Marseille. — *Uro-salyl.*
- Lab. du Gastrhema, 71, r. St-Blaise, Paris (XX<sup>e</sup>). — *Gastrema.*
- Lab. du Gastrocarbone. Saint-Louis (B.-d.-R.). — *Bisalicylate, Gastrocarbone, Manganoglobine.*
- Lab. J. Gautier, 42, rue Emile-Deschanel, Courbevoie. — *Gambéol, Ganderma, Salvatyl.*
- Lab. Gavin. Vimoutiers. — *Sirop Lecœur.*
- Lab. Genevet, 29, rue des Marchands, Avignon. — *Kinechol.*
- Lab. Génévrier, 45, rue du Marché, Neuilly-sur-Seine. — *Adolan, Atepsal, Bis-Hyd, Boues radioactives de Pistyan-les-Bains (Tchécoslovaquie), Neurinase. Tetra magnésium, Panstomase.*
- Lab. Gerda, 163, boul. Croix-Rousse, Lyon (Rhône). — *Arvensyl, Gerdabyl, Névrithone Daclin, Pulmolaxol, Sodelactine.*



S<sup>e</sup> Ch. Gervais, 11, r. de Prony (XVII<sup>e</sup>). — *Lait Gallia*.

Lab. des Prod. du D<sup>r</sup> Gigon, 25, boul. Beaumarchais, Paris.  
— *Cétrarose, Sédatoze, Tribromure, Ulmarène, Valérianose*.

Lab. Gilbert, 6, rue du Laos, Paris. — *Agaricine Clauss, Artérase, Bilolive, Forcéase, Nazinette, Pilules Clauss*.

Lab. A. Girard, 48, rue d'Alésia, Paris. — *Biophorine, Caséoline, Glycérophosphate de Chaux granulé Girard, Laxo peptine Girard, Nucléofer Girard, Sirop Girard, Vin Girard*.

Lab. Givaudan Lavirotte, 56, chem. de Combe-Blanche, Lyon.  
— *Glyphospher, Hipposarcine Roy, Huile de ricin Crolas, Salurol, Sel de fruit Crolas*.

Lab. des Gloxines, 133, av. de St-Ouen, Paris. — *Gloxines*.

Lab. Gmet, 27, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. — *Boldo Gmet, Coca Gmet, Composé Gmet, Condurango Gmet, Crataegus Gmet, Diurétique Gmet, Dragées Gmet, Extrail Hamyd, Frêne Gmet, Fucus Gmet, Gmet, Gui Gmet, Hamamélis Gmet, Hydrastis Gmet, Jugland Gmet, Kola Gmet, Piscidia Gmet, Quinquina Gmet, Valériane Gmet, Viburnum Gmet, Saugé Gmet, Ulmaire Gmet*.

Lab. Godart, Andenne (Meuse). — *Dermatyol, Hemogenyl, Pectoforme, Sulfocol*.

Lab. P. Godfrin, 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne. — *Limonade Godfrin*.

Lab. du Gomenol, 48, rue des Petites-Ecuries, Paris. — *Gomenol, Gomenoleo et tous produits au Gomenol*.

Prod. Gonnon, 14, rue Victor-Hugo, Lyon. — *Antidiabétique Monavon, Cacodyle Gonnon, Créosote soluble Vacheron, Eueptique Monavon, Irénine Gonnon, Kola Monavon, Lecithine Vacheron, Polybromure Gonnon, Polyiodure Gonnon, Sirop de créosote Vacheron, Sirop de glycérophosphates Vacheron, Sirop de Lovel, Sirop Vacheron au gaiacol, Suppositoires Gonnon, Terpene Gonnon, Tonicardine Gonnon, Tonique Gonnon*.

Lab. Gouin, 20, r. des Écoles, Paris. — *Avantol, Cuprémone, Prométhine*.

Lab. Gouzène, 139, rue de Paris, Pantin. — *Aloysine*.

Lab. Gouzerh, 5, pl. Bisson, Lorient. — *Movébil*.

Établ. Goy, 23, rue de Beautreillis, Paris. — *Gouttes Magalo, Hémostatique Goy, Pastilles M. B. C. Fer Larcade, Primulyse, Sénécol*.

Lab. Grandval, Quirin succ., 12-14, rue Féry, Reims (Marne).  
— *Eugynol Grandval, Hamamélis Grandval, Cenoquinol Grandval, Potion Grandval, Quinquina Grandval, Kina coca kola Grandval, Quinarsol antianémique Grandval, Quinarsol fébrifuge Grandval*.

Lab. Grémy, 14, rue de Clichy, Paris. — *Diasténine, Epidosine Grémy, Eutensyl Grémy, Follestrine, Grémy*.

*Immuniderm Grémy, Immuniperos Grémy, Immuniphages Grémy, Immunizols Grémy, Lientine, Ocréine Grémy, Thyrénine Grémy, Thyrocréine Grémy.*

**Lab. Grias, 47, rue Feray, Corbeil (S.-et-O.).** — *Verticurine.*

**Lab. Grignon, 2, rue Duphot, Paris.** — *Eniode Lefebvre, Valérianate Grignon, Pâte de Terpène Guédel.*

**Lab. Grorichard, 12, pl. de la Révolution, Besançon.** — *Comitiot, Magnésium Grorichard, Mérostyptal Grorichard.*

**Lab. Gros, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.** — *Antisep-tique alcalin Gros, Capsellase, Diurocalcine Gros, Diurocalcine iodurée, Hergénol Sanomint.*

**Lab. André Guerbet et Cie, 22, rue du Landy, St-Ouen (Seine).** — *Lipiodol Lafay, Ténébryl.*

**Lab. Guéret, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret).** — *Anoxyne, Comprimés Kléos, Pommes Kléos.*

**Lab. P. Guérin, 58, rue Basse, Meulan (S.-et-O.).** — *Ferrocalcine, Vascurol.*

**Lab. André Guillaumin, 13, rue du Cherche-Midi, Paris.** — *Acésine, Comprimés Guillaumin, Cyanargyre, Novargyre, Théosalvose, Vanadarsine.*

**Lab. Guillaumin et Gérard, 12, rue Charles V, Paris.** — *Prodynase.*

**Lab. de la Guimelinde, Ancenis (L.-Inf.).** — *Guimelinde.*

**Lab. Paul Hardy, 42, bd St-Marcel, Paris.** — *Biliflux, Borsalyl, Cèdre bleu, Collyre de l'Hôtel Dieu, Sécofluyl, Magnésium Hardy, Neutracid, Oliricin Hardy, Pancarbo, Polypnal, Pulmonaire Bourgogne.*

**Lab. Hautdider, 37, rue Galilée, Paris.** — *Benzylol, Dentoxyl, Gastérol, Hématogénol, Iénol, Inhalax, Iodométine, Magnésol, Orthobiline, Sirop Dubreuil, Triferyl, Uvéphorine.*

**Lab. Henry, 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).** — *Arsenof Henry, Bromovaleron Henry, Bronchitol Henry, Cascara Henry, Chloro-magnésium Henry, Digestif Henry, Disménine Henry, Fer Henry, Kino pancréatine Henry, Laxolys Henry, Lithiné Henry, Iodothéine Henry, Méthyplarsine Henry, Nucleantol Gabriel, Papaine Henry, Pebromon Henry, Peptonate d'étain Henry, Pepidon Henry, Salicaire Henry, Sirop bromoformique Henry, Sirop d'hémoglobine, Sirop de hola composé Henry, Solution salicylate Henry, Sianno bardane Henry, Siannolip Henry.*

- Lab. Hépatie Efa**, rue du Château, Carentan (Manche). — *Byl Efa, Eczem Efa, Hépatie Efa*.
- Lab. Hérault**, 14, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beauvais. — *Benzobromine*.
- Lab. des Prod. français L. Hérin**, 98, rue J.-Maillotte La Madeleine (Nord). — *Bi-ferments lactiques stables. Cachets réparateurs Dragées Calm, Eucalinal Goudrinhal, Poudre « Stom », Sulfinhal, Thé Suédois*.
- Prod. Heudebert**, 85, rue St-Germain, Nanterre. — *Farine de Malt, Nergine, Pain essentiel, Pains spéciaux, Radiopaque*.
- Lab. Hinglais**, Epernay (Marne). — *Gapsules Kuchner, Chénantol*.
- Prod. Hinglais**, 30, rue Miromesnil, Paris. — *Follicormone buccale Hinglais*.
- Lab. Hocquette**, 191, rue du Faubourg-St-Antoine, Paris. — *Acobella, Fenucalcium, Marimine, Sérum neuro-psychique, Splenomanganol, Valédyl*.
- Lab. Hoffmann La Roche et Cie**, 10, rue Crillon, Paris. — *Adoverne, Airolroche, Allonal, Ampoules de Pantopon, Ampoules de Digalène, Ampoules de Sécacornine, Ampoules de Spasmalgine, Ampoules de Théobryl, Arsyène, Cachets Roche thiocol, Choline, Comprimés Roche thiocol, Digalène, Diiodothyrosine Roche, Hémostra, Iodostarine, Iloglandol, Isacène, Larocaïne, Larosan Roche, Estrobrol, Ovules Roche, Pantopon, Prostigmine, Sécacornine, Sédobrol, Sédormid Roche, Sirop Roche, Soluprotine, Somnifène, Spasmalgine, Tampol, Théobryl, Thiogénol, Thiocol, Thyroxine, Tonique Roche*.
- Lab. de l'Hormocrinol**, 17, r. de la Glacière, La Garenne-Colombes (Seine). — *Gossypiol Maurin, Hormocrinol*.
- Lab. Houdé**, 9, rue Dieu, Paris. — *Aloïne, Boldine Houdé, Granules Houdé, Hyoscyamine Houdé, Quassine Houdé*.
- Lab. J. Huerre et Cie**, 9, rue de la Gare, Levallois. — *Albuplast Vigier, Aristoplat, Extensaplast, Furoplast, Lactophorine, Manganifer*.
- Lab. Hy**, 61, av. de Choisy, Paris. — *Métophan, Pommade Bertol Vichy*.
- Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**, 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine). — *Calcomagnésie, Dysthène, Héxafel, Myothermine, Sthénoxal, Stopral*.
- Lab. Hypnos**, Chabeuil (Drôme). — *Gobillettes Hypnos*.

**Lab. des Immunos**, 8, av. des Sources, Nice (A.-M.). — *Cinol*, *Digicardine*, *Ferments immuno lactiques*. *Immuno-vaccin antirhumatismal*, *Immuno-vaccin bronchopulmonaire*, S. I. V. A.

**Institut de Biologie appliquée** (M. C. Cépède), 57-59-60, rue Mathurin-Régnier, Paris (15<sup>e</sup>). — *Vaccinothérapie atoxique Cépède*.

**Institut de Microbiologie**, 23, r. du Caire, Paris. — *Anthraxone Fornet*, *Blennosine Fornet*, *Grippol Fornet*, *Héparcyl*, *Insuline Fornet*, *Néosuline*, *Pommade Fornet*, *Tébéphaguine Fornet*.

**Institut Jacquemin**, Malzeville-Nancy. — *Fermen pur de raisin Jacquemin*.

**Institut Pasteur**, 22, rue Dutot, Paris. — *Serums*, *Vaccins*.

**Lab. de l'Iodarsenic Guiraud**, 10 imp. Milord, Paris. — *Citralin Gouttes païdophiles du D<sup>r</sup> Guiraud*, *Iodarsenic Guiraud*.

**Lab. Iscovesco**, 107, rue des Dames, Paris. — *Adrenol total*, *Afatyl*, *Androcrinol Iscovesco*, *Andropolycrinol*, *Cardiocrinol*, *Cérébrocrinol*, *Gynocrinol*, *Gynohyphophysol*, *Gynolutéol*, *Gynopolycrinol*, *Hépatocrinol*, *Hypophysol*, *Lipoïdes H. I.*, *Mammol*, *Néphrocrinol*, *Opopédol*, *Splenocrinol*, *Sarcosérum*, *Thyrol A.*, *Yo-Androl*, *Yo-Gynine*.

**Lab. Ivago**, 17, r. de Provence, Paris. — *Vaccins intradermiques*, *Vaccins Ivago*, *Gelées vaccins Ivago*.

**Établ. Jacquemaire**, Villefranche (Rhône). — *Blédine*, *Phosphate Vital*, *Verrulyse*.

**Lab. Jammes**, 86, rue Michel-Ange, Paris. — *Cacodyline Jammes*, *Iodinjectol Jammes*, *Magnésio-cacodyline*, *Néophage*.

**Lab. Jauffret**, 4, pl. du Val, Vanves. — *Néobiol*.

**Lab. du Jécol**, 3, rue Watteau, Courbevoic. — *Allophaquina*, *Jécol*.

**Lab. Jicem**, 304, rue Saint-Jacques, Paris. — *Citropaine*, *Iodarsine*, *Jicémine*.

**Lab. Jolly**, 1, rue Christine, Paris. — *Créositoires*, *Spasmine Jolly*, *Terpoxyl*, *Terpoxyl (Ovules)*,

**Lab. Jonids**, 9, boul. Sévigné, Dijon (Côte-d'Or). — *Athérollysine*, *Bisatyl*, *Génergosine*, *Hémaxol*.

- Pharmacie Journet**, 18, r. Vavin, Paris. — *Tridynol*.
- Lab Julien**, 105, rue de Rennes, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Benzoflorine*, *Corylase*. *Elgine Julien*, *Manganophosphat Julien*.
- M. E. Just**, 11, square Marie-Louise, Bruxelles. — *Diuregan Leo*, *Léophani compos. Léo*, *Paratone Léo*.
- Lab. du Kaobrol**, 54, r. de Paris, Charenton. — *Kaobrol*.
- Lab. de la Kaviase**, 76, av. d'Italie, Paris (XIII<sup>e</sup>). — *Kaviase*
- Lab. L. Kerfysen**, 4, rue Alexandre-III, Dunkerque (Nord). — *Benzoquinol*, *Dermaline Demeulenaere*, *Globabyl*, *Hémorroidine (Pommade, Goultes, Suppositoires)*, *Sirop Kopé*.
- Lab. Kervan**, 81-83, av. Ledru-Rollin, Paris. — *Zymogastrique Kervan*.
- Lab. Kraus**, 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris. — *Citrol*, *Francoplaste*, *Ombioplaste*, *Posoplaste Solargol*, *Traumatol*, *Traumatoplaste*.
- Lab. Krieger**, 121, av. de St-Ouen, Paris. — *Antipur*, *Artérioveinine*, *Butyral*, *Eczémacure*, *Gélocalcine*, *Géraldine*, *Organocalcine*, *Sciaticure*.
- Etabl. Kuhlmann**, 145, boul. Haussmann, Paris. — *Binoxol*, *Chloralosane*, *Sunalcol*, *Sunoxol*,
- Laboradium**, 33, rue St-Jacques, Paris. — *Aseptoradol*, *Dermoradol*, *Radiotropine*.
- Lab. Lacombe et Cie**, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. — *Chlorumagène*, *Do-sa-no-sal*, *Fanerval*, *Surbical*.
- Lab. Lacroix**, 37, rue Pajol, Paris. — *Camphostyl*, *Luerol*, *Neurotrope*, *Pilules Hélieniennes Naud*, *Quinoforme*, *Santal salolé*, *Vanucléol*.
- Lab. du Lacto-sérum Lavril**, 26, bd des Batignolles, Paris. — *Lacto-sérum Lavril*.
- Lab. Lafarge**, 6, boul. Arago, Paris. — *Neuréol*, *Sulfobyl*.
- Lab. Laffort**, Joué-les-Tours (I.-et-L.). — *Aseptol*, *Evobiline*, *Fluokol*, *Polysel*, *Septolan*.
- Lait (Compagnie générale)**, Rumilly (Hte-Savoie). — *Farine Mont Blanc*, *Lait Mont Blanc*, *Tonimall*.
- Lait Guigoz**, 19, r. J.-J.-Rousseau, Paris. — *Babeurre Guigoz*, *Lait en poudre Guigoz*.

- Lab. Lagoutte**, 229, cours Gambetta, Lyon. — *Boldo lactine*, *Calmocardine*, *Dermodulcis*, *Entéro-carbine*, *Iodogastrol*, *Lithinoformine*, *Ovules intima*, *Suppoalgos*, *Suppotionic*, *Sédogrippine*, *Suppocamphryl*.
- Lab. du Dr Lalaurie**, Cuxac-d'Aude. — *Adolol*, *Analgol*, *Catemenyl*, *Gemag*, *Gremasepta*, *Elixir Gelm*, *Grains Gelm*, *Gunose*, *Pastilles Helge*, *Pilules Anna*, *Sirop Helge*, *Stenon du Dr Gelm*, *Udanka*, *Urogène*.
- Lab. Laleuf**, 20, rue du Lac, Paris. — *Adrépatine*, *Golloïdine*, *Créosal*, *Grinocardine*, *Folliovarine*, *Iodatoxine*, *Lobéliane*, *Pancrépatine*, *Paverinol*, *Polyferments*, *Sirop Dubois au créosal*, *Théoverine Laleuf*, *Trinitrine caféinée Dubois*, *Trinitrine-Papavérine Laleuf*, *Urisal du Dr Deschamp*, *Urococcine*.
- Lab. Lamar**, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.). — *Anaural*, *Biliboldo*, *Sirop Escolle*.
- Lab. Lambert**, 6, rue de Longchamp, Vichy. — *Epicral*, *Oxylisine*, *Triseptine*.
- Lab. L. Lambert**, 8, av. de Grammont, Tours. — *Gélopansements gastro-intestinaux*.
- Lab. Lambert**, pl. du Châtelet, Orléans. — *Comprimés Galac*, *Fenucine*.
- Lab. Lambiotte frères**, 20, rue Dumont-d'Urville, Paris. — *Arhine*, *Créosoforme*, *Galform*, *Perles Taphosote*, *Phosole*, *Thiosote*, *Urométine*.
- Lab. des. Prod. Lamo**, 26-28, rue Paul-de-Koch, Paris. — *Toritanane Lamo*, *Toritanol Lamo*, *Tergyl Lamo*, *Torigyre Lamo*.
- Lab. Lancosme**, 19, rue Alain-Chartier et 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris. — *Acolitol*, *Algocratine*, *Anémor*, *Argybil*, *Bain Garré*, *Bismhydral*, *Bismuth Desteaux*, *Carbonate de chaux Lancosme*, *Globules Laincar*, *Hémodrome*, *Inhalation Lancosme*, *Magnésie Storke*, *Spectrol*, *Stasol*.
- Lab. Landrin et Cie**, 12, rue de la République, Puteaux. — *Cipromarol*, *Elixir de Virginie Nyrdalh*.
- Lab. Lang et Cie**, 2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris. — *Capsules Dieu*, *Digestif Capmartin*, *Hémoglobine Star*, *Poudre Cap*, *Savons Mollard*, *Salvanos*, *Sirop Jane et pâte Jane*, *Vermifuge des moines*, *Yohimbine Gilbert*.
- Lab. L. Laroze**, 54, rue de Paris, Charenton (Seine). — *Bigynol*, *Colisel*, *Cylopan*, *Dosotol*, *Kaobrol*.
- Lab. Laryngologique**, 222, faub. St-Martin, Paris. — *Ampoh-tonyl*, *Arsecrinal*, *Hydrorrhéol*, *Inhalation gargarisme*, *Vocaldop*, *Vocaldop*.
- Lab. Latour**, 71, rue Douy-Delcupe, Montreuil-sous-Bois. — *Parlax*.
- Lab. du Dr Laurent-Gérard**, 40, rue de Bellechasse, Paris. — *Evolaxine*, *Radiotétrane*, *Thoroxyl*.
- Lab. Lauriat**, avenue Foch, La Garenne-Colombes (Seine). — *Bronchoseptol Lauriat*, *Héliosthényl*, *Lauriatol*.

- Lab. Lavergne, 5, rue Grande, Cannes (A.-M.).** — *Holaseptine*.
- Lab. Lavire, 46, r. de Rome, Marseille.** — *Arsysérum, Aseptovule, Aseptopoudre, Fluoganèse, Puragar, Salychlore, Scatagar, Triurase*.
- Lab. du Dr Lavoué, Rennes (I.-et-V.).** — *I. A. M., Mangarsenic*.
- Lab. Lebeault et Cie, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.** — *Citrolargol, Germose, Mycolysine, Staphylase du Dr Doyen, Veinosine, Vin de Bugeaud*.
- Lab. Le Blond, 51, rue Gay-Lussac, Paris.** — *Alexime, Ortho-Gastrine. Pyurol*.
- Lab. Leboime, 3, r. Fernand-Widal, Paris.** — *Calcozymase, Prezymase*.
- Lab. Lebreton, 23 Grande Rue, Asnières.** — *Métricine*.
- Lab. Lebrun, 155, bd Magenta, Paris.** — *Dragées toni-cardiaques, Eucalyptine, Pancalcion*.
- Établ. T. Leclerc, 10, rue Vignon, Paris.** — *Bactériophage Leclerc, Cadior, Entérochir, Entéroxin Leclerc, Félicol, Magnétone, Sélamon, Sérum Normet. Solution Normet, Sclérolitique*.
- Lab. Louis Lecocq, 11, r. Eugène-Flachat, Paris (XVII<sup>e</sup>).** — *Tonigène*.
- Lab. Leconte, 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.** — *Choléfluine, Euglyma, Gouttes Leconte, Morsine, Tonigène*.
- Lab. Lecoq et Ferrand, 14, rue Gravel, Levallois-Perret.** — *Antipsorine, Curalues du Dr Lafay, Entéropraxines Abry, Erythrolues du Dr Lafay, Gatran, Helminthyl, Lipaurol, Molène, Solmuth, Tréparsol*.
- Lab. Lees, 127, bd St-Michel, Paris (V<sup>e</sup>).** — *Métritols, Suppogynals*.
- Lab. Legendre et Cie, Houilles (S.-et-O.).** — *Pâte Mireille, Sirop Mireille*.
- Lab. Legoux frères, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes.** — *Salvénaase Legoux*.
- Lab. Legrand, 11, pl. Louis-XII, Blois (L.-et-Ch.).** — *Hépatomanganol*.
- Lab. Leisyn, 1 bis, r. Molitor, Paris.** — *Albuol Leisyn, Ampoules suractivantes Leisyn, Anéo Leisyn, Cerebroil Leisyn, Colloil Leisyn, Comprimés vaginaux Leisyn, Névro-patil Leisyn, Nitroyl Leisyn, Onction Leisyn, Oxyol Leisyn, Phymo-stéryl Leisyn, Prostaphile Leisyn, Rythmos Leisyn, Séotral Leisyn, Stonical Leisyn*.
- Lab. Lejeune, 142, rue de Picpus, Paris.** — *Baume Daynoc, Diachusine, Gouttes Daynoc, Indhaméline simple, Indhaméline Plurial., Paltholysine, Pommade Lenoir, Profensène, Vernis à la Diachusine*.
- Lab. Lematte et Boinot, 52, rue La Bruyère, Paris.** — *Acecolex, Acecolins, (camphre, spartéine, Ye-hymbine),*

*Arsoplasmins, Biocalcose Chevretin, Calcional, Gholestériodine, Hémotonikéine, Hormocline, Hypotan, Jap, Lactozymase B, Lipocérébrine, Océanine, Séroferrine, Tonikéine.*

**Lab. Léonardon**, rue du Casino, Arcachon (Gironde). — *Hemofluidol, Quintheryl, Splenora.*

**Lab. Le Perdiel**, 11, rue Milton, Paris. — *Antipyrine effervescente Le Perdiel, Benzoate de lithine effervescent Le Perdiel, Biosine Le Perdiel, Bromhydrate de lithine effervescent Le Perdiel, Carbonate de lithine effervescent Le Perdiel, Citrate de lithine effervescent Le Perdiel, Coaltar Saponiné Le Beuf (émulsion de goudron de houille), Fucoglycine du D<sup>r</sup> Gressy (sirop bromo-iodo-phosphoré végétal), Glycérophosphate de chaux effervescent Le Perdiel, Glycérophosphate de fer effervescent Le Perdiel, Glycérophosphate de lithine effervescent Le Perdiel, Glycérophosphate de soude effervescent Le Perdiel, Goudron Le Beuf (émulsion de goudron végétal), Salicylate de lithine effervescent Le Perdiel, Taffetas Marinier (à l'arnica, au baume du commandeur ou au collodion), Thapsia Le Perdiel-Reboulleau, Toile vésicante Le Perdiel, Tolu le Beuf.*

**Lab. Leporcq**, 9, rue du Temple, Enghien (S.-et-O.). — *Ardogène.*

**Lab. du D<sup>r</sup> Leprince**, 62, rue de la Tour, Paris. — *Arsycodile. Cascarine Leprince, Eumictine, Ferrocodile et Ferricodile, Freinospasmyl, Guipsine, Néo arsycodile, Néo Rhomnol, Ophtalmine, Pilules du D<sup>r</sup> Séjournet, Rhomnol.*

**Lab. Lersam**, 17, r. St-Saëns, Paris. — *Amphotonyl, Arsécrinol, Ethyl Pneumine.*

**Lab. Lescene**, 58, rue de Vouillé, Paris. — *Anaquinine Lescène, Balsamol, Viosten, Zymatine.*

**Lab. Lesure**, 70, rue du Bac, Paris. — *Arqueritol Lesure.*

**Lab. du D<sup>r</sup> Letanneur**, 87, av. Borriglione, Nice. — *Magnolax, Minerolaxine, Tannurgyl.*

**Lab. Lettry**, 69, rue de Sèvres, Paris. — *Agoxyl, Gouttes de Séru, Pommade de Séru.*

**L. E. V. A.**, 26, rue Pétrele, Paris. — *Leniforme.*

**Lab. Licardy**, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine. — *Fluobyl, Gélogastrine, Hémoductyl, Laxamalt, Sédosine, Stovédrine, Tonudol.*

**Lab. des Lipides**, 14, r. des Minimes, Paris. — *Dermosplénine Liposplénine du D<sup>r</sup> Groc.*

**Lab. de la Liposeptine**, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Fenugrène, Gastrobiase, Marrubène, Liposeptine, Pansolanée, Rhino-Liposeptine, Sonène.*

**Lab. Lobica**, 46, av. des Ternes, Paris. — *Azotyl, Béatol, Garditone, Ochlorobyl, Iodo-trypsine, Lactobyl, Lactochol, Nutréine, Pneumo-calcine, Sérénol, Taxol, Uralysol, Veinotrope, Vin tonique « Efka », Zohol.*

**Lab. Lobru**, 26, r. Vauquelin, Paris (V°). — *Nésal.*



- Lab. Lobry**, 6, r. Parrot, Paris. — *Hemofer*, *Néphryl*, *Urozéa*.
- Lab. Emile Logeais**, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Panxylon*, *Pommade Logeais* (*Rectaméline*), *Suppositoires Logeais*, *Veinhormones Logeais*.
- Lab. J. Logeais**, 22 bis, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Boricine Meissonnier*, *Fluidol*, *Gobules Secretan*, *Iodamélis*, *Naiodine*.
- Lab. M. Logeais**, 24, rue des Plantes et 1, r. Bénard, Paris. — *Choléopectine*.
- Lab. Longuet**, 34, rue Sedaine, Paris. — *Arsi-Strychnal*, *Carbofixine*, *Cholépan*, *Citrosodine*, *Clisemine*, *Facmine*, *Fixine*, *Levure de bière du D<sup>r</sup> Debouzy*, *Narcyl*, *Ortho-Zomine*, *Pilules du D<sup>r</sup> Debouzy*, *Quinuryl*, *Rénalguine*, *Rhinalginol*, *Strychnal*, *Urisanine*, *Zomine*.
- Lab. Lorrain de Produits synthétiques pars**, Etain (Meuse). — *Caparlem*.
- Lab. J. Lorthioir**, 8, rue Pierre-Girard, Paris. — *Biotrignon*.
- Lab. Lucinia**, 154 bis, rue de Breteuil, Marseille. *Formovaccins*, *Fusol*, *nécessaire d'accouchement Lucinia*, *Galabactéine*.
- Lab. Lumière** (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 45, rue Villon, Lyon. — *Allocaïne Lumière*, *Allochrysine Lumière*, *Antipaludique*, *Borosodine Lumière*, *Cryogénine Lumière*, *Cryptargol Lumière*, *Emge Lumière*, *Entérovaccin Lumière*, *Entalva Lumière*, *Gelée Lumière*, *Germosine Lumière*, *Hémo-plase Lumière*, *Hermophényl Lumière*, *Iodure d'amidon Lumière*, *Néokola Lumière*, *Opozones Lumière*, *Persodine Lumière*, *Rhéantine Lumière*, *Tulle gras Lumière*.
- Lab. Lyons**, 30, r. Monge, Paris. — *Arthrillax*, *Neuseda*, *Somnitis*, *Tonax*.
- Lab. Madyi**, 14, rue de Miromesnil, Paris. — *Bromovose*, *Euphytose*, *Tapo*.
- Lab. Maire**, 171, r. de Belleville, Paris. — *Calcisténine*, *Guttoléol*, *Nasargine*.
- Lab. Malmanche**, 101, av. de Paris, Rueil-Malmaison. — *Digestif Harvey*, *Rosalyl*, *Urobuccol*, *Valérinodor*.
- Lab. du Malone** (M. Vincent), Ancenis (Loire-Inf.). — *Gouttes Malone*, *Spasmalome*.
- Lab. Mannet**, Loudun (Vienne). — *Dragées ferro-ergotées Mannet*, *Elixir ferro-ergoté Mannet*, *Elixir tribromure Mannet au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de potassium et au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de sodium et au salol*.

- Lab. Manseau, Margaux (Gironde). — *Fantyl, Pecthionol*.
- Lab. Marceau, (M. Boutroux, pharmacien), 7, av. Marceau, Paris. — *Bismuth Grigaut, Carbargyre, Cholurgyle, Pulmosedor*.
- Lab. Marchand et Leroy, 74, rue des Jacobins, Amiens. — *Péventyl*.
- Lab. Marinier, 52, rue de Flandre, Paris. — *Bi-Citrol*.
- Lab. A. Martin, 24, r. de Charenton, Paris. — *Cytobiase*.
- Lab. du Dr Martinet, 16, rue du Petit-Musc, Paris. — *Granoxyl, Hémopausine, Hygioline, Magnésosules, Néo-colargol, Pangaduine*.
- Lab. Martinie, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Phlebotonine, Tonicalcine, Uvargol*.
- Lab. Mauchant, 14, rue de Birague, Paris. — *Asthmapepton, Bircol Mauchant, Cassitol, Fluveinose Mauchant, Iodonucléol, Lipovita, Maltine Phenix, Minéraline du Dr C. Baud, Myoayne Marchant, Phoscamine, Salubrine Phénix, Solvuric, Surc Durham, Tercolène, Trilactine*.
- Lab. Mayaud, 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ulcérophile Nosan*.
- Lab. Mayoly Spindler, 1, place Victor-Hugo, Paris. — *Baume Aroma, Borostyrol, Dicaliode, Euphon, Fluenzyl, Isolulol, Kalastyl, Perubore, Pipettes nasales M. S. Sanoformine, Stillargol, Valbrol*.
- Lab. de Médecine Expérimentale, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. Tél. : 484. — *Fludiose, Formocarbène, Opochol, Sodothirol*.
- Lab. Médico-Pharmaceutique de France, 6, r. Robert-Estienne, Paris (VIII<sup>e</sup>). — *Lioncyl, Mitigans, Sedopulmine, Sedotensyl, Stomaxines, Stomaton*.
- Lab. Mercier, Fécamp (Seine-Inf.). — *Baume Iki*.
- Lab. J. Messis, 71, av. de la République, Champigny (Seine). — *Agozymase, Guérysipèle, Vicéliase*.
- Lab. du Métacuprol, 5, rue François-Ponsard, Paris. — *Métacuprol*.
- Lab. Métadier, 55, rue Nationale, Tours. — *Méta-vaccin, Méta-titane*.
- Lab. Meunier, 11, bd Davout, Auxerre. — *Anacidase*.
- Lab. Meunier, r. du Commerce, Montmarault (Allier). — *Calmant Meunier, Kalmigraine, Tonucyl*.
- Lab. du Dr Mialhe, 8, rue Favart, Paris. — *Adrénine, Aérocid, Anusol, Aquiptol, Digimialbaine, Digitaline, Elixir Mialhe, Lab-lacto-ferment, Mialbaine, Pulmosirop, Tonucyl*.
- Lab. Michelon, 20, bd Heurteloup, Tours. — *Aesculase, Sonagar, Sonamel*.
- Lab. Michels, 9, rue Castex, Paris. — *Chloro-calcion, Silisods*.

- Lab. de la Microlyse**, 10, r. de Strasbourg, Paris. — *Microlyse*.
- Lab. du Mictasol**, 28-30, rue du Four, Paris. — *Mictasol*.
- Lab. Midy frères**, 4, r. du Colonel-Moll, Paris. — *Antidiabétique Midy*, *Antigastalgique Midy*, *Antigrippine*, *Bétul ol*, *Bi-iodure de mercure indolore Midy*, *Carbolin*, *Cascara*, *Cocaïne*, *Colchi-Sal*, *Panlacto Midy*, *Pipérazine*, *Pommade Midy*, *Proveïnase Midy*, *Suppositoires Midy*.
- Lab. Milan**, 7, rue Bonald, Lyon. — *Cardisédine*.
- Lab. E. Millet**, Rambouillet (S.-et-O.). — *Carbos*, *Formocarbos*, *Gastroplasme*, *Laxoléine*, *Mucicarbos*, *Mucilaxine*, *Mucilose*, *Oléomucilaxine*, *Rectoplasme*.
- Lab. Millet et Guillaumin**, 5, r. Ambroise Thomas, Paris. — *Paxène*, *Kénol*.
- Lab. Millot**, 54, rue de la Bienfaisance, Paris. — *Ampoules Dubé*, *Benzo-bismuth Millot*, *Comprimés néothorium Millot*, *Crayons néothorium Millot*, *Ovules néothorium Millot*, *Pommade néothorium Millot*, *Soluté Gaube du Gers*.
- Lab. Miluc (M. Ragoucy)**, 37, rue Raspail, Ivry-Paris. — *Allergantyl Miluc*.
- Lab. Géo Miquel**, 3, av. Lowendal, Paris. — *Glyco-M*, *Sanos*, *Selunic*, *Witch Hazel*.
- Lab. Monal**, 6, rue Bridaine, Paris. — *Boléase*, *Santal Monal au bleu de méthylène*, *Sulfuryl Monal*, *Taburol Monal*, *Terkal Monal*.
- Lab. Moncour**, 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — *Opothérapie Moncour (sphérulines et néo-sphérulines)*, *Parathyrocalcine Moncour*, *Vitacalcine Moncour*.
- Lab. Mondolan**, 211, r. de la Convention, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Ménovarine*.
- Lab. Monin**, 49, rue de Maubeuge, Paris. — *Dépuratif Rob. Lechaux*, *Elixir Grez*, *Liqueur de l'Etoile anti-asthmatique*, *Pilules anti-névralgiques du D<sup>r</sup> Cronier*, *Poudre Blot laxative*.
- Lab. Montagu**, 49, boul. de Port-Royal, Paris. — *Broméine Montagu*, *Carbocaloïdes*, *Carbatropine*, *Carbosanis*, *Dragées Hecquet*, *Génacide*, *Iodéine Montagu*, *Lac-Ser*, *Savons Michon*.
- Lab. Moser et Cie**, 8, chem. de Montbrillant, Lyon (Rhône). — *Maltea Moser cristallisée*.
- Lab. Moulin**, 50, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Aseptone*, *Bacilactine*, *Baume Dolora*, *Benzothymol*, *Capsules ovigéniques*, *Dépuratine*, *Diabésia*, *Purgemint granulé*, *Poudre Helvetia*, *Rhinodol*, *Sirop Diver*, *Uricine*.
- Lab. Mouneyrat**, 12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — *Arsénomyl*, *Exobol*, *Histogénol*, *Hectine*, *Hectergyr*, *Kinectine*, *Olbis*, *Vioxyol*.

Lab. Mousnier-Delerme, 9, boul. Carnot, Bourg-la-Reine. — *Dragées du D<sup>r</sup> Gélinau, Sirop du D<sup>r</sup> Gélinau.*

Lab. Mouré, 18, r. Favart, Paris. — *Elixir Morlas, Sirop Morlas.*

Lab. du Myoral, 20, r. des Ecoles, Paris (V<sup>e</sup>). — *Myoral.*

Lab. Narodetzki, 19, boul. Bonne-Nouvelle, Paris. — *Elixir Spark, Griponal, Nazophyl Darva, Spyrolides.*

Lab. Nativelle, 27, rue de la Procession, Paris. — *Digitaline Nativelle, Natibaine, Natirose, Ouabaine Arnaud, Quinicardine, Solubaine.*

Lab. Nau, 21, Grande-Rue, Argenteuil (S.-et-O.). — *Néochloral Nau.*

Société Nestlé, 6, av. Portalis, Paris. — *Eledon, Nestogène.*

Lab. du Nestosyl, 72, rue St-Dominique, Paris. — *Nestosyl, Ovules au Nestosyl, Pommade au Nestosyl, Solution huileuse au Nestosyl, Suppositoires au Nestosyl.*

Lab. Neuville, 239, faub. St-Honoré, Paris. — *Urol.*

Lab. R. Niel, 60, rue Auguste-Comte, Lyon (Rhône). — *Bismusodine, Kalmobrol.*

Lab. H. Noé, 14, r. Thiers, St-Amand-les-Eaux (Nord). — *Carbophos, Citrophos.*

Lab. Noelline, Guingamp (C.-du-N.). — *Pommade Noelline, Poudre Noelline.*

Lab. H. Nogues, 7-7 bis, r. Galvani, Paris. — *Baume maternité, Capsules Nogues, Grains de Vals, Néoarsite Poudre Satine, Sirop maternité, Sirop Nogues, Thébail.*

Lab. Novalis, Oullins (Rhône). — *Progaster compr., Lugocalcion, Novolug, Valénal.*

Lab. Nutricia, 142, r. Fransmann, Bruxelles. — *Bacillactine, Sinaqua.*

Lab. Oberlin, 17, rue Cadet, Paris. — *Aliment Tinardon, Analgénine, Biodynamine, Capsules grises Gabanès. Ferropeptone Oberlin, Gastrocalcine, Gouttes D<sup>r</sup> Ludam, Granulé Tinardon, Gynaicéol, Hamaméliode, Iode Oberlin Juvéol, Lactosone, Panbromine, Pectine Oberlin,*

- Potion Bonnet, Rob Gabanès, Rob Oberlin, Santal Oberlin, Santal Salolé Cabanès, Savon iodé Oberlin, Sigma Cones, Sirop Tinardon, Uraséol.
- O. C. P., 108, rue de Piopus, Paris. — Lait de magnésie Phillips, Pâte dentifrice Phillips.
- Lab. Odilia, 42, rue du Mont-Genis, Paris. — Gynopausine, Inolène (simple, vaseliné, thymolé), ovules à l'Inolène, pommade à l'Inolène, poudre à l'Inolène, Nazolène, Sedofoline.
- Lab. Odinot, 21, r. Violet, Paris. — Calciline, Gastrosodine, Néo-calciline, Pluribiase, Sel digestif Bé Me Cé.
- Lab. de l'Olivéol, Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). — Oléol, Olivéol, Vasocones, Vasoconstrictine.
- Lab. des Prod. Ollivier, de Rochefort-sur-Mer, préparés par les Lab. Hardy, 42, boul. St-Marcel, Paris (V°). — Cachets Céli, Cachets Syncal, Dragées Céli, Poudre Syncal, Spécifique Saint-Jean.
- Lab. de l'Opodermyl, 36, rue des Martyrs, Paris. — Opodermyl.
- Lab. moderne d'Opothérapie et Biologie médicale, 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse. — Glandocalcyl, Hépatozyl Caldo, Nucléophorène, Sclérosérol, Veinoposine.
- Lab. Optima, 78-80, Gde-Rue au Bois, Bruxelles. — Alimentine Mory (poudre), Ampoules Optima, Asthmaphédrine, (ampoules), Apyrexine (comprimés), Bismuth 25 (ampoules), Bromure d'éthyle (ampoules), Cardiotonine (liquide); Cataplasme Optima, Chloraseptine (comprimés), Chloroforme (ampoules), Comprimés Garga, Digitalis Purpurea (poudre), Dragées hépatiques, Dragées d'iodurine, Dragées menthol-borax-cocaïne, Eau de Lorraine, Eitreb-embrocation (liniment), Ether pour narcose (ampoules), Formétine (comprimés), Glycéro-bromurine (granulés), Glycéro-iodurine (granulés), Glycéro-ovarine (granulés), Glycéro-thyroïdine (granulés), Glycéro-tribromurine (granulés), Granules d'Aloïne, Granules Boldine, Granules Colchicine, Granules digitale 1/5 de milligramme; Granules Digitaline, 1/10 de milligramme, Granules hydrastinine, Granules hyosciamine, Granules spartéine, Hémoferrine (Elixir), Héparadénine (comprimés), Héparbiline (granulés), Hypophysine (comprimés), Iode liq. lambotte (ampoules), Iodonine (flac. compte-gouttes), Idéolaxine, Jécorine (émulsion), Kola (granulés), Lacto-ferment (comprimés), Laxatine Mory (dragées), Levaïne (granulés), Ligatures chirurgicales, Néo-pituitairine (ampoules), Neurotonine (granulés), Oiothyroïdine (comprimés), Orchidine, (comprimés), Ovarine (comprimés), Ovaro-thyroïdine (comprimés), Oophorine (vin), Pancréadénine (comprimés), Pandigitale (teinture forte), Pâte dentifrice Optima, Pepto-ferrine (flac. compte-gouttes), Peptone Cornélis, Phylogyne (poudre), Phospho-calcine (granulés), Phospho-calcine ferrugineuse (granulés), Pituitairine (voir Néo), Pluri-

**glandine M et F** Pyrocidine (comprimés), Quinovarine (dragees), Quinovarine injectable (ampoules), Salvasérum, Sédarsan (gouttes), Serpoline (sirop), Sérum maternel (gouttes concentrées), Sérum slhénique (flac. compte-gouttes), Sirop Mory, Sirop iodo-noyer Cornélis, Sirop Jackson, Stomachine (comprimés), Stomachine (granulés), Suprarénidine (comprimés), Suprarénidine (ampoules), Tri-zymol (granulés), Toni-cardine (vin), Vin Mory, Vin Oophorine, Trépocidine (ampoules), Poudre Optima, Urdol, Vulco.

**Lab. Orrillard**, 245, rue de Vaugirard, Paris. — Biarsol, Papaveryl, Paxol.

**Lab. Ozothine**, 23, r. Sébastien-Mercier, Paris (XV°). — Ozothine.

**Lab. Pachaut**, 130, boul. Haussmann, Paris. — Bromures Pachaut, Cachets Pachaut Alpha et Gamma, Eupaveryl, Pachaut, Iodures Pachaut, Limonade hypotensive Pachaut, Lotion végétale Pachaut, Suppositoires Pachaut, Tartrate borico-potassique Pachaut, Tubes de Bromure Pachaut, Valériane liquide Pachaut,

**Lab. Paméla**, Forges-les-Eaux (S.-Inf.). — Blagny (Gouttes, Dragées, Sirop).

**Lab. du Professeur Pancier**, 21, rue de Saint-Leu, Amiens. — Energine iodée de Berck, Energine phosphorée de Berck.

**Lab. du Papier Eymonnet**, 139, cours Tolstoï, Lyon-Villeurbanne. — Papier iodogène Eymonnet.

**Lab. Paret**, 22, rue Guibal, Marseille. — Azym, Cellules Paret, Fixase et Fixase irradiée.

**Lab. A. Paris**, 4, rue de la Motte-Picquet, Paris. — Hérophagostyl, Lactolaxine, Oxydothyryne, Oxydovarine, Phagostyl, Phagostyl Mangané.

**Lab. Paris**, 1, rue Lassalle, Lyon (La Boucle). — Cachets du D<sup>r</sup> Boveil, Comprimés de pantolaxine du D<sup>r</sup> Boveil, Ergotine Lamante, Granulés de Pantofort du D<sup>r</sup> Boveil, Kerlactine, Pilules lithuranées du D<sup>r</sup> Boveil.

**Lab. du Parolagar**, 348, r. St-Honoré, Paris. — Parolagar.

**Prod. Passeur**, 11, r. de Clichy, Paris. — Paragélose, Tégéol.

**Lab. des Prod. Paterson** (G. et M. Armingeat), 46, rue de Saintonge, Paris. — Poudre Paterson, Pastilles Paterson.

**Lab. de Pathologie**, 5, rue François-Ponsard, Paris. — Néopancarpine, Rhinofluine, Vaso-neurine.

- Lab. Pautauberge**, 10, rue de Constantinople, Paris. — *Capsules Pautauberge*, *Dragées Pautauberge*, *Gaiacol Pautauberge*, *Solution Pautauberge*.
- Lab. Pavy**, pl. du Marché, La Rochelle. — *Pyodermase*, *Solution Cunaud*.
- Lab. Pellissier**, 33, av. de Villiers, Paris. — *Hepagastrol*, *Héparfer*, *Opothérapiques Pellissier*, *Opositoires opothérapiques Pellissier*, *Silicate de soude Pellissier*.
- Lab. Pépin et Leboucq**, 30, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie. — *Bromogénol*, *Gaurol*, *Guethural*, *Iodogénol*.
- Lab. Perichon**, 11, r. Lepic, Paris. — *Avistyl*, *Gollubleu*, *Thermocédone*.
- Lab. H. Perignon**, 6, rue de Paris, Joinville-le-Pont. — *Elixir Godfrin*.
- Lab. des Peroxydes médicaux**, 12-18, r. Lamartine, Paris. — *Ektogan Boquillon*, *Hopogan Boquillon*.
- Lab. Perrier**, 17 bis, bd Rochechouart, Paris. — *Scillitrine*, *Théocalciodé*.
- Lab. Perrin et Bruno**, 4, r. Desirée, Lyon. — *Guitose*, *Hémoantitoxine Sofos*, *Sulfarsiodé*.
- Lab. Perrochon**, 57, rue Origet, Tours (I.-et-L.). — *Eurectol*, *Grains d'Evian*, *Pulmocardine*, *Renocardine*.
- Lab. Perroud**, 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon. — *Carbonate de bismuth*, *Tablettes Perroud*.
- Lab. E. Petit**, pl. de l'Eglise, Argenteuil (S.-et-O.). — *Hémagénine*.
- Pharmacie anglaise des Champs-Élysées**, 62, av. des Champs-Élysées, Paris. — *Emerson's Bromo Seltzer*, *Maté Douglas*.
- Pharmacie Biologique G. Combastel**, F. Rischshoffer Sr, 57, r. Mathurin-Regnier, Paris. — *Panostyl*.
- Pharmacie Centrale de Belgique**, 12, rue du Téléphone, Bruxelles. — *Digistabiline*, *Hypersan*, *Iophénol*, *Névrosan*, *Scialine*, *Vitamorrhaine*, *Vitergomine*.
- Pharmacie Centrale de France**, 21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris. — *Adrénaline Invar*, *Caféine Invar*, *Crêpe Velpeau*, *Digitaline Invar*, *Pyroléol Edet*, *Théobromine Invar*, *Végéphos*, *Pelvisédol*, *Pyroclase*, *Quinobrome-Séroquinol*.
- Pharmacie de la Place Royale, Reims** (voir Christiaens).
- Pharmacie Rationnelle**, 20, fg Poissonnière, Paris. — *Cuscutine Foulon*.
- Lab. de Pharmacologie générale**, 8, rue Vivienne, Paris. — *Boldorhéine*, *Capsules d'apioline Chapoteaut*, *Capsules de boldo-glucine Chapoteaut*, *Capsules de Colchiflor*, *Capsules à l'éther valérianique de Vial*, *Capsules d'eucalyptéol Antoine*, *Capsules à l'huile de génévrier de Vial*, *Capsules de lécithine Vial*, *Capsules de morrhuel Chapoteaut*, *Capsules de Morrhuel créosoté Chapoteaut*, *Gardiosthénine*, *Cérévisine*, *Cigarettes*

indiennes de Grimault et Cie, Crystol, Cypridol, Delbiase, Delbosel, Dusart, Elixir polybromuré de Baudry, Elixir digestif de pepsine de Grimault et Cie, Farine maltée Vial, Fer Girard, Fer Leras, Gélodcalcase, Gélodelbiase, Glycogène! Guarana purifié de Grimault et Cie, Matico de Grimaul, et Cie, Morrhuel, Oxygénase, Pastilles Palangié, Peptone de Chapoteaul, Pharynxoil, Phosphoglycérate de chaux Chapoteaul, Pnéoline, Poudre ferromanganique de Burin du Buisson, Quinine Rhubarbe comprimée de Baudry, Santal Midy, Sirop du Dr Dusourd, Sirop d'hémoglobine de Grimault et Cie, Sirop d'hypophosph. de chaux de Grimault, Sirop Lagasse, Sirop phénique Vial, Sirop polyformiate du Dr Ph. Chapelle, Sirop de Raifort iodé de Grimault et Cie, Strontium paraf Javal, Sulfodelbiase (cachets), Terpinets, Vial. Sirop phénique, Vitamina.

**Lab. Phosma**, 68, r. de la Chaussée-d'Antin, Paris. — Entérgargol, Phosma.

**Lab. du Phosphopinal Juin**, 10, imp. Milord, Paris. — Phosphopinal Juin, Pulvéol, Pulmodion.

**Lab. de Physiologie du Puits-d'Angle**, Le Chesnay (S.-et-O.) — Dyspeptine Hepp.

**Lab. Phytalia**, 47, bd St-Michel, Paris. — Hamacitro.

**Lab. de Phytothérapie de Paris**, 113, boul. Voltaire, Paris. — Amipyrine, Ballotyl, Polycine.

**Lab. Pisloux**, 55, rue de Chabrol, Paris. — Airoglyce, Cédrométhyle, Chlorurol, Dynamoférol, Iodoptume.

**Maison du Dr Pillet**, 5, av. Victoria, Paris. — Anti-urique de Contrexéville, Reef Lavoix (ou Vin Lavoix), Hygiédine Pastilles Brachat, Sadiesalyne.

**Lab. du Dr Pinard**, 90, bd l. St-Denis Courbevoie. — Phosphates du Dr Pinard, Calcigénol.

**Lab. Plagnol**, 18, r. du Maréchal-Foch, Versailles. — Cachets Van Sol, Gaïacamphre.

**Lab. Planche**, 2, rue Volney, Paris. — Amidon Planche, Eau Sova, Hémophiline Planche, Pilules Stibiées, Sirop Thomas.

**Lab. Planche**, 1, boul. de la Madeleine, Marseille. — Térébine.

**Lab. du Dr Plantier**, Annonay (Ardèche). — Hemopanbiline; Panbiline, Rectopanbiline.

**Lab. J. Plé**, 111 bis, rue de Turenne, Paris. — Antiphymique Vadam, Phytosplénol Plé, Thalassotonine Vadam, Synergyl Vadam.

**Lab. Pointet et Girard**, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — Goudroline, Novismuth, Soporalose, Vitargyl.

**Lab. Pompanon**, 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris. — Figadol Vivien, Sulfureux Pouillet.

**Lab. Porcher**, 35, rue des Blancs-Manteaux, Paris. — Dermacide Porcher, Eczéda, Eczosec.



- Lab. Probios, 1, av. Pasteur, Paris. — *Crème Probios anti-pyogène, Probios vaccins*
- Lab. Prochimal, 10, r. de Florence, Paris. — *Actiphos. Ergoline Bonjean, Sirop de digitale Labelonye, Hypneural Cos, Dragées de lactate de fer Gelis et Conté, Granule et sirop d'hydro-cotyle, Cicatryl, Sel de Carabana, Pastilles de Pougues.*
- Prod. chimiques du Maine, 7, r. St-André-le-Mans (Sarthe) — *Cinéyl, Sylcase, Sylcase injectable.*
- Sté Progil, 77, r. de Miromesnil, Paris. — *Diasés, Galactolgil, Malt Pailleté, Minergil, Peptogil, Phytolecithine.*
- Lab. Prothérapie, 132, r. de Turenne, Paris. — *Antifébra, Carboiodine, Embrocation Salas, Ferrocol. Flusan, Fuciodine, Helminthose, Laminarol, Nertose, Neurolipase, Onguent Salas, Opochlorine, Opocrinases, Oposynergines, Pilules oporénales, Phytomarine, Propeptase, Rhino-Salas, Rhino-Socoll, Salasényl, Sigma — Sérum, Sirop Gécé, Stenovarine, Sérocalcium.*
- Lab. L. Prothière, 55, rue Auguste-Comte, Lyon. — *Fucosine, Fucobiline.*
- Lab. Georges Prunier et Cie, 4, rue de la Coutellerie, Paris. — *Comprimés Vichy-Etat.*
- Lab. du Pulvéol, 10, impasse Milord, Paris. — *Pulvéol.*
- Sté Purgos, 7-7 bis, r. Galvani, Paris. — *Limonade Citrose Vichy, Vichy purgatif, Purgos.*
- Lab. Py, 58, boul. Richard-Wallace, Puteaux. — *Baume Py, Phostyl, Sédatif Py, Stomal, Toussyl Py.*
- Sté Pyné (M. Lafitte, Pharmacien, Caunterets (Htes-Pyr.) — *Sulfr.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Quesneville, 12, rue de Bucl, Paris. — *Crème de Bismuth, Crème de Bismuth Chl. magnésienne, Cupro-Salyl.*
- Lab. Quinet, 143, r. du Temple, Paris. — *Phosol.*
- Lab. du Quinsal (M. Leuner), 34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône). — *Quinsal, Poudre Stear.*
- Lab. Raby et Cie, pl. de la Comète, Asnières. — *Biliase Raby.*
- Lab. de Radiumthérapie, 25, rue Vaneau, Paris. — *Arto-radine, Radiocrémeline, Radiole.*

- Lab. Raimoa**, 264, boul. Voltaire, Paris. — *Pastilles des Eaux-Bonnes*, *Pommade Raimoa*, *Vin Raimoa Tonic*, *Oxydents G. R. S.*, *Pruritol Raimoa*.
- Lab. Ranque et Senez**, 16, rue du Dragon, Marseille. — *Vaccins bacériens I. O. D.*
- Lab. Ranson**, 121, av. Gambetta, Paris. — *Anacrasine*, *Leuco-septyl*, *Opocalcium*, *Opocalcium irradié*, *Oposerrine vitaminée*.
- Lab. Ravaud**, 6, pl. de Breteuil, Paris. — *Arsenogyl*, *Baume merveilleux*, *Bismutartrol*.
- Lab. Reaumont**, 2, rue Boucleaut, Paris. — *Agarase*, *Passi-carbone*, *Passiflorine*, *Silguine*.
- Lab. Reboul**, Pont-Ste-Maxence. — *Cardio bromine*, *Cholagol*, *Créo-suppo-camphre*, *Sanocure*, *Tanode*, *Toni-bronchique*, *Uribiline*, *Vitalogène*.
- Etab. Redeuil**, 7, r. Couche, Paris. — *Pain Redeuil*.
- Lab. Regagnon et Cie**, 276, rue Lecourbe, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Amborhinol*, *Sedorhinol*.
- Lab. du Regyl**, 8, rue Richer, Paris. — *Regyl*.
- Lab. du Reipar**, Lucquy (Ardennes). — *Ampoules Reipar*, *Ostéo-peptine*.
- Lab. Remeaud**, 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine. — *Kluchol Remeaud*.
- Lab. Renard**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Atural*, *Crypthiol*, *Pneumogéine*.
- Lab. Renard et Cie**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Gaduamine*.
- M. Renaud**, 2, rue Pierre-Demours, Paris. — *Lachesine*.
- Lab. Renault**, 24, pl. des Vosges, Paris. — *Corizol*.
- Lab. du Renovol**, 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.). — *Rénovol*, *Peptocalcine*.
- Lab. du Réparateur Thuau**, 22, faub. St-Michel, Angers. — *Réparateur Thuau*.
- Lab. Revel**, 34, rue St-Lazare, Paris. — *Iodonesyl*, *Philo-gastrine*.
- Sté des Révulsifs**, 4, rue Levert, Paris. — *Revulsoplasme*, *Revulsif liquide S. R.*
- Lab. Rey**, 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or). — *Ludin*, *Seroma Rey*.
- Lab. Rhemda**, 17, rue d'Hauteville, Paris. — *Boues radio-actives Rhemda*, *Bougies radioactives Rhemda*, *Dermathorium*, *Mésolthorium Rhemda*, *Mésolthine*, *Ovulés Rhemda Radio Magnésium*, *Thorix*.
- Lab. du Rhinophta**, 82, rue de la Croix-Verte, Albi (Tarn). — *Produits Rhino*, *Tubes Ferlux*.
- Lab. Ricardou et Cie**, 46, rue Pierre-Charron, Paris. — *Bolène*, *Dentoline*, *Inneclean*, *Phospharsol*, *Prises Delqué*, *Soporigène*, *Sylvol*.

- Lab. Richer**, 45, faub. St-Denis, Paris. — *Comprimés Salvé*, *Embrocation Richer*, *Euskine*, *Florhépatine*, *Kolarsan*, *Lactodiasal*, *Mictophile*, *Néopulmine*, *Novaiodal*, *Oxmol*, *Salvébyl*, *Slovafer*.
- Lab. Rissa**, 46, rue Claude-Lorrain, Lille. — *Iodex*.
- Lab. H. Rivier**, 26-28, rue St-Claude, Paris. — *Anégrine*, *Ascoléine Rivier*, *Séro-sérum Rivier*, *Valérianale Pierlot*.
- Pharmacie J. Robert (J. Boudier, succ.)**, 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Hémocalciopectine*, *Sédo-Gaz*.
- Lab. Robert et Carrière**, 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Adral*, *Ampoules Pinceaux*, *Anacamphre*, *Bacté-intesti-phage*, *Bacté-coli-phage*, *Bacté-pyo-phage*, *Bacté-staphy-phage*, *Bacté-rhino-phage*, *Bacté-dysentéri-phage*, *Benzylanil*, *Biocholine*, *Biomucine*, *Chlorakin*, *Comprimés Aqua-pura*, *Cyanure maolore Ercé*, *Néo-dispositif Ravaut*, *Dysurol*, *Endoxène*, *Enneco*, *Entéromucine*, *Ercerlinol*, *Fibrinine*, *Goméler*, *Gométyle*, *Huile grise Ercé*, *Iodo-bismuth Ercé*, *Lipo-bismuth Ercé*, *Lobuline*, *Lysaxins L. M. L.*, *Lysacrème L. M. L.*, *Panphylase*, *Novarsénobenzol*, *Opsomyl « A » et « B »*, *Ossical*, *Péraziodol*, *Phlyctol*, *Pommade Forgue*, *Rectanol*, *Séro-Citral*, *Stannoxyol*, *Supparsol*, *Taenifuge Ercé*, *Tinctiode*, *Tri-iode-Ercé*, *Vaccin pneumo-entéro-staphylococcique de Weil et Dufour*, *Vaccins Renard*, *Xanthocol*.
- Lab. Roberts et Cie**, 5, rue de la Paix, Paris. — *Allcok*, *Porous Plaster*, *Antikamnia*, *Bemax*, *Bromidia*, *Caloxs Coluval*, *Embrocation Roche*, *Lansoyl*, *Listerine*, *Livérine*, *Magnésie Henry*, *Panopepton*, *Pepsencia*, *Pinéoléum*, *Pinolac*, *Quinacinas*, *Quinolax*, *Ricigel*, *Salsanos*, *Sudyl*.
- Lab. Robin**, 13, rue de Poissy, Paris. — *Bismuthoidol Robin*, *Bromone Robin*, *Camphydryl Robin*, *Glycérophosphate Robin*, *Glykolaïne Robin*, *Iodone Robin*, *Nucléarsitol*, *Nucléatol*, *Peptonate de fer Robin*, *Peptokola Robin*, *Strychnarsitol Robin*, *Sulfoïdol Robin*.
- Lab. Robineau**, 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine). — *Ormatol*, *Phusasmine*.
- Lab. Robinet**, Moret-sur-Loing (S.-et-M.). — *Magnésio tubes Robinet*.
- Lab. Rochereau**, Salbris (L.-et-C.). — *Dolysine*.
- Pharmacie Rogé Cavaillès**, 116, boul. Haussmann, Paris. — *Anoïde*, *Elixir iodépuratif Pépin*, *Suppositoires Rocav*.
- Lab. Henry Rogier**, 56, boul. Péreire, Paris. — *Baume Delacour*, *Insuline*, *Kymosine Rogier*, *Levulose Rogier*, *Suppositoires Pepet*, *Uraseptine*, *Valbornine Rogier*, *Vilamine Rogier*.
- Lab. Albert Rolland**, 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Hepaphos*, *Hépatrol*, *Micelliode*, *Stomarol*.
- Lab. Pierre Rolland**, 127, bd St-Michel, Paris. — *Balm iga Hypalène*, *Natrosyl*.

- Lab. Romon**, 6, rue Bridaine, Paris. — *Ampoules Romon*, *Forcival*, *Globules Romon*, *Limital*, *Magnogène*, *Tranquital*.
- Établ. Roques**, 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. — *Delcaine Roques*.
- Lab. Rosa**, 1, pl. Champerret, Paris. — *Chophytol Rosa*, *Cynurol Rosa*.
- Lab. Rousseau**, 71, av. de Villiers, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Rhagadine Bracquemond*.
- Pharmacie Roussel**, 10, rue Washington, Paris. — *Tetranitrol Roussel*, *Trinitrine Roussel*.
- Lab. du Dr Roussel**, 97, r. de Vaugirard, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Angioxyl*, *Disonyl*, *Gravidostyl*, *Hémostyl*, *Insulanol*, *Insulyl*, *Proxylol*, *Trephonyl*.
- Lab. du Docteur Roussel**, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Bivatol*, *Casaldyl*, *Folliculine*, *Gynœstryl*, *Isonal*, *Lysarthrol*, *Pyoformine*, *Sterogyl*, *Uroformine Gobey*.
- Lab. Routier**, 20, rue St-Lazare, Paris. — *Baume Durel*.
- Lab. Roux**, 58 rue de Maubeuge, Paris. — *Armosine*, *Arsallyl R. X.*, *Gastronaldine*, *Glandex phoscalcique*, *Glucalcium R. X.*, *Magnétol Roux*, *Purgelettes Roux*, *Totaliode*, *Ur-Clar Blanc Bleu*, *Uri-magnétol*.
- Lab. Roy**, 29, av. Charras, Clermont-Ferrand. — *Ferydal*.
- Lab. du Rozoderme**, 11, rue des Deux-Ponts, Paris. — *Rozoderme*.
- Lab. Sabatier**, 10, rue Pierre-Ducreux, Paris. — *Fluodyle*, *Ouataplasme Dr Langlebert*.
- Lab. Salantale**, 42, rue Grandes-Arcades, Strasbourg. — *Ophthalmo-vaccin Salantale*, *Oto-vaccin Salantale*, *Ovules vaccin Salantale*, *Pommade-Vaccin Salantale*, *Recto-Vaccin Salantale*, *Rhino-Vaccin Salantale*, *Salantale*, *Suppo-Vaccin Salantale*, *Tracho-vaccin Salantale*, *Tubes Strana*.
- Lab. Salavert**, Ste-Foy-la-Grande (Gironde). — *Antinéase*, *Sulf-Y*.
- Lab. H. Salle**, 4, rue Elzévir, Paris. — *Agomatol*, *Bronchitol*, *Conjonctol*, *Elzévir dentition*, *Heracéol*, *Iodo-vitasine*, *Passival*, *Phleboguil*.
- Lab. du Salvoxy**, 237, rue Lafayette, Paris. — *Noviode*.
- Lab. du Sambul**, 22, rue St-Pierre, Evreux (Eure). — *Dermopode*, *Sambul*.
- Sté des Produits « Sana »**, Gaillac (Tarn). — *Pain massé Sana*, *Pâtes Sana*.

- Prod. Sandoz**, 20, r. Vernier, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Allisatine Sandoz*, *Belladénal Sandoz*, *Bellafoline Sandoz*, *Calcibronal*, *Calcium Sandoz*, *Félamine Sandoz*, *Gynergène Sandoz*, *Lobéline Sandoz*, *Optalidon Sandoz*, *Panthésine Sandoz*, *Sandoptal Sandoz*, *Scillarène Sandoz*.
- Lab. de la Santhéose**, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris. — *Santhéose*.
- Lab. Sauba**, Montreuil, Paris. — *Anthracalcine*, *Boldobyl*, *Cafédrine*, *Codobromyl*, *Gouilles Narkay*, *Neuridor*, *Olisol*, *Saubarsinol*.
- Lab. Sauze**, 60, r. Nationale, Firminy (Loire). — *Ultraformine B et S*.
- Lab. Schmit**, 71, rue Ste-Anne, Paris. — *Aseptobiline*, *Galliodine*, *Mangaine*, *Prélase*.
- Lab. des Prod. Scientia** (D<sup>r</sup> E. Perraudin, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe), 21, rue Chaptal, Paris. — *Calcoléol*, *Diabétifuge*, *Digestonic*, *Globexine*, *Huile iodée Finikoff*, *Oxymenthol Perraudin*, *Peptalmine*, *Peptalmine magnésinée*, *Quinéine*, *Staphylococcine Fraquet*, *Tricalcine*.
- Lab. Seguin**, 165, rue St-Honoré, Paris. — *Capsules Joret et Homolle*, *Phosphofluor Beynet*.
- Sels du Jura**, 11, av. de l'Opéra, Paris. — *Sels du Jura*.
- Lab. Sephyda**, Chabeuil (Drôme). — *Sephydine*.
- Lab. Serindat**, 22, rue Poncelet, Paris. — *Phosphobrom*, *Phosphomagnésium*.
- Lab. J.-M. Serre**, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Olhalan*, *Vermifuge Cornet*.
- Lab. Servier**, 25, rue Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Gaduase*, *Muxol*, *Ozodor*, *Pyri-pyridium*, *Spiralgine*.
- Lab. Sevenet**, 10, rue Le Chapelais, Paris. — *Hemagène Tailleur*.
- Lab. Sévigné**, 76, rue des Rondeaux, Paris (III<sup>e</sup>). — *Bigara-Fortal*, *Ulcéobalnéine*, *Ulcéoplaque-Ulcéobande*, *Ulcéosine*, *Ulcéosol*.
- Lab. S. F. E. A. T.**, 15, r. Catulienne, St-Denis. — *C. B. K. Gamétoxyl*, *Gastrolues*, *Huile grise argentique SFEAT* (SFEOL), *Oléovules*, *Pantalues*, *Progone*, *Sirop Viano*, *Suppositoires SFEAT*, *Stérobi*, *Trépobiur*, *Trilues*, *Tripyoril*, *Tséamine*.
- Lab. S. I. C. A.**, 15, r. Beudant, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Tra-pheine*.
- Etabl. Silbert et Ripert**, 30, rue Bénédict, Marseille. — *Murones du D<sup>r</sup> Robert Jacques*.
- Lab. Guy Simon**, 44, r. d'Inkermann, Lille. — *Ephargol*, *Essoforme*, *Carsédol*.
- Lab. Soudan**, 48, r. d'Alésia, Paris. — *Bromo-maisine*, *Euonymine Thibault*, *Iodo-maisine*, *Lactagol*, *Laxatifs Miraton*, *Oléocidase*, *Valérium Paul Thibault*, *Vasogènes Pearson*.

- Lab. Soulié**, 333, r. Vaugirard, Paris. — *Gernal*.
- Lab. du Spasmonéural**, 239, cours de l'Yser, Bordeaux. — *Spasmonéural*.
- « **Specia** » (Sté Parisienne d'Expansion chimique), 21, rue Jean-Goujon, Paris. — *Acétylarsan, Alunozal, Anthéma, Asciatine, Balsoforme, Baume Rhodia, Cardyl, Coryphédrine, Crisalbine, Diagnothorine, Dmelcos, Ergorone, Foriod, Gardenal, Gelobarine, Gonacrine, Hérocène, Huile de foie de morue médicinale suractivée Rhône-Poulenc Hyrganol, Moranyl, Néocardyl, Néo Dmegon, Néo Dmetys, Neptal, Novarsénobenzol, Ovolecithine, Pâte Spécia, Pragmoline, Propidex, Propidon, Quinio- Storvasol, Rénaleptine, Rhodarsan, Rhodazil, Rhoféine, Rubyl, Rutonal, Sanedrine, Sanluol, Scurocaine, Scuroforme, Soneryl, Stovaïne, Stovarsol, Tabedo, Tecarine, Tochlorine, Tryparsamide, Urazine, Vaccins atoxiques stabilisés.*
- Lab. Spès Guiraud**, 10, impasse Milord, Paris. — *Elixir Spès du Dr Guiraud, Tubes du Dr Guiraud*.
- Prod. Stalys**, 64, rue La Boétie, Paris. — *Dermo Stalys, Dento Stalys*.
- Lab. de la Star Monopole**, route du Moulleau, Arcachon. — *Kodos, Seignet' Fruits*.
- Lab. Stelvia**, 59, r. Boissière, Paris (XVI<sup>e</sup>). — *Combrosmol, Granules Edges, Phytomensyl*.
- Sté des Lab. Sténé**, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Bilifluine, Bouillon vaccin opératoire Sténé, Crésopirine, Flavurool, Hémato-iodine, Hypocholate, Urifluine, Vaccin anti-pyogène Sténé, Vaccin anti-staphylococcique Sténé, Vaccin du professeur Minet, Vaccin opératoire Sténé, Vaccins Sténé, Vaccins (anti-asthmatisque, anti-pneumonique, antigrippal)*.
- Lab. H. Stouls**, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — *Pangastrol*.
- Lab. Substantia**, 13, rue Pagès, Suresnes. — *Calmag-Na, Loraga, Véganine*.
- Lab. Substantia (S. A.)**, 53, r. du Poinçon, Bruxelles. — *Agarol, Arcinol, Véganine*.
- Lab. Sulfo-Thiorine**, 39, r. Fondaudège, Bordeaux. — *Sulfo-Thiorine, Thiorine*.
- Lab. de la Tamarine**, 4, rte de Medoc, Le Bouscat. — *Tamarine*.
- Lab. H. Tavernier**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Cinalose, Inhalo-bol, Inhalo-sel, Mancobène, Miroxyl, Phospho-Gaiacol Mary, Reconstituant Mary*.

- Lab. Teyssèdre, 34, faub. d'Angoulême, Limoges. — *Sirop Teyssèdre*.
- Lab. A. Thepenier, 12, rue Clapeyron, Paris. — *Amylodiastase, Bulgarine Thepenier*.
- Lab. de Thérapeutique, 74, faub. d'Ambrail, Epinal. — *Pneumogénol, Anxiosédine*.
- Lab. de Thérapeutique expérimentale médico-pharmaceutique, 366, av. Thiers, Bordeaux — *Hémostérine irradiée*.
- Lab. de Thérapeutique générale, 48, rue de la Procession, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Endopancrine, Holovarine, Insuline* (Voir *Endopancrine*), *insuline Phytoze* (poudre et pommade).
- Lab. Thévenot, 21, rue des Roses, Dijon. — *Azigol, Borocalcyl, Catalysine, Cholébaldine, Cosmargyre, Eupnéol, Juniodyl, Lactofermentine, Phoshémoquinol, Santurol, Sirop Becal, Thiocitran*.
- Lab. Thiriet et Cie, 26-28, rue des Ponts, Nancy. — *Paroxyl*.
- Lab. Thorat, Le Mont-Dore, Puy-de-Dôme. — *Asm, Bronchasmine, Catarasmine, Diuréphédrine, Ephédrasmine, Gardephébrine, Spécifique Thorat*.
- Lab. G. Tinard 134, boul. Péreire, Paris. — *Dulcilax, Pangestyl, Salyptol*.
- Lab. du Dr G. Tissot, 34, boul. de Clichy, Paris. — *Broncho-dermine, Charbon Tissot, Diasto-pepsine, Magnecythine, Nervocithine (Hépatocithine), Suppargyre*.
- Lab. Tixier, 55, r. du Centre, Pantin. — *Bain Bagnor radio-actif*.
- Lab. Torade, 22, rue de la Sorbonne, Paris. — *Diumnal, Emapiarine, Flévar, Fruxatyl, Hemo-serosan, Hépayl, Hyposulfène, Jabosulfène, Lactobactyl, Leucagine, Leucaginol, Levure B. 17, Néo-serosan, Néo-trépol, Précikase, Quinarsan, Quinobromine, Reclagine, Réthragine, Ricéyl Billault, Sérosan, Somnofan, Sornyal, Spirochtan, Staprolysat, Stomarine Billault, Trépol, Trépoquinol, Ultra-Levure*.
- Lab. Trouette-Perret, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris. — *Aphloïne, Gouttes livoniennes, Ispaghul, Nisaméline, Oponucyl, Papaïne, Romarantyl*.
- Lab. Tulivet, 52, rue de Poissy, St-Germain-en-Laye (S.-et-O.). — *Céréatine, Cigarettes Zani, Chlorobaciline, Lacticholéine, Laxocholéine, Laxogélose, Paralaxol, Poudre Zani*.
- Lab. du l'Ulmacetyl et du Spicanol, 54, r. de Sablonville, Neuilly, Paris. — *Hemoviris (Cachets, Elixir), Spicanol, Ulmacétyl*.

- Lab. Unis-Spes**, 14, rue Dëmarquay, Paris. — *Algophagine, Algorol, Députarif Nox, Gastéose, Gastiase, Hénotal, Hépatodiase. Nox Nuclergol, Sel Marva, Vacciderm. Tercodal, Veinogène.*
- Lab. de l'Uroiodine**, 7, r. Jules-César, Paris (XII<sup>e</sup>). — *Urotodine.*
- Lab. Uromil** (M. Belières, D<sup>r</sup> en Ph<sup>ie</sup>). 19, r. Drouot, Paris. — *Uromil.*
- Usine du Blosset**, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Cachet Merveilleux, Carnéose du D<sup>r</sup> Spès, Dépurgatif Berry, Elixir supertonique Stella, Gargarinal, Iasthol, Manganéol, Neurogénéol, Potion du D<sup>r</sup> Henry, Radiobiogyl, Vin de Beef Lavoisier, Vin de Carnéose, Vin surtonique du Val Notre-Dame, Vitaphorine.*
- Usines Chimiques des Laboratoires Français**, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Myovarsyl, Oxymuth S. A. G. A., Quinimuthol S. A. C. A., Prévarsyl, Uclarsyl.*
- Lab. de l'Uvé-Crinex**, 18, rue St-Amand, Paris. — *Cri-nex, Folliculine Crinex, Orex, Sistex, Uvé, Uvestérol.*
- Lab. de l'Uvéoline** (M. Ambard, Pharmacien), Carces (Var). — *Uvéoline. Uvéovules.*
- Lab. Vaillant**, 19, r. Jacob, Paris. — *Audigénine, Ifranol.*
- Valentin Aage Moller**, 149, r. du Palais-Gallien, Bordeaux. — *Exhepa, Insuline Léo, Léotamine, Métallosol, Sano-crysiène de Mollgaard, Seringues, Sulfosine Léo.*
- Lab. du Valéromenthol**, 10, rue Poncelet, Paris. — *Caogland's Pancréanne, Valéromenthol.*
- Lab. de la Valthène** (A. Valat), 51, rue de Tourtille, Paris. — *Valthène.*
- Lab. Van Lier**, 30, r. St-Jacques, Namur (Belgique). — *Asep-urine, Ferment lactique, Hémoplasmine, Nuclogénéol.*
- Lab. de la Varilaxine**, Surgères (Ch.-Inf.). — *Rectoline, Rectosol, Sédacrine, Varibaxine.*
- Lab. J. Variot**, 151 bis, Grande-Rue, Villemomble (Seine). — *Linadeline.*
- Lab. des Vaso-Rhinol.** — *Voir Calmel-Domergue.*
- Lab. Vaudin et Guillaumin**, 12, rue Charles-V, Paris. — *Elixir eupeptique Tisy, Prodynase, Quinolane Valguy, Vin de Baudon antiminio-phosphaté, Vitène.*
- Lab. du Végétol**, 8, rue des Quatre-Fils, Paris. — *Végétol Fournier.*
- Lab. F. Vellay**, 116, av. Berthelot, Vienne. — *Biophylactine M. G., Eupnogénéol.*



- Lab. des Prod. Vely**, 132, av. Victor-Hugo, Paris. — *Amphos-thène*, *Disoluratre*, *Eufosyl*, *Hypnovel*, *Kalmogastrol*, *Lipex*, *Néospasmodyl*, *Neuvaritol*, *Pansomnine*, *Phénacodine*, *Phosfodéine*, *Plexorine*, *Septométrol*, *Sodotétrane*, *Wismuthane*.
- Lab. Venot**, 139, av. Emile-zola, Paris. — *Bain Salvia*, *Pilules Salvia*.
- Lab. opothérapique E. Vergelot**, 163, rue de Flandre, Paris. — *Ampolases*, *Amyliodine*, *Déméteros*, *Henrick's bill*, *Opolases*, *Mangratines*, *Matéine Dufert*, *Morrhuxine*. *Paquets P. C. L. Nucléasine*, *Pastilles Saint-Christau*. *Sédo Viette*, *Siforcia*. *Sirof Vielte*, *Splénose*, *Zislazine*.
- Lab. Verne**, 13, rue du Dr-Mazets, Grenoble (Isère). — *Boldo Verne*, *Pulmoverne*.
- La Verrerie scientifique**, 12, av. du Maine, Paris. — *Chromothermo-thérapie*, *Diathermie*, *Infra-rouges*, *Ultra-violets*.
- Lab. Vial**, 36, pl. Bellecour, Lyon. — *Vin de Vial*.
- Lab. Vicario**, 17, boul. Haussmann, Paris. — *Adonal Vicario*, *Andryl Vicario*, *Bibromure de Hg Vicario*, *Bromadyl Vicario*, *Collyre des Alpes Vicario*, *Calomel Vicario*, *Dimétol Vicario*, *Héroïne Vicario*, *Listose Vicario*, *Nopirine Vicario*, *Penghaivar Vicario*, *Plasmodine Vicario*, *Rhésal Vicario*, *Trinitrine Vicario*, *Yohimbine Vicario*.
- Lab. Vidal**, 46, rue de Grenelle, Paris. — *Isorhinol*, *Kitine*, *Phosorine*.
- Lab. F. Vigier et Cie** (Voir : Lab. Jean Huerre et Cie).
- Lab. Vincardi**, 14, av. G.-Clemenceau. Nice. — *Artérion Vincardi*, *Cardion Vincardi*, *Renion Vincardi*.
- Lab. Vincent**, 14, av. Mac-Mahon, Paris. — *Adréna Vincent*, *Angitan*, *Cholecystine*, *Nigérine*, *Stérinase*.
- Lab. du Viophan**, 81-83, rue de Lille, Roubaix. — *Viophan*. *Organi-calcion simple*, *Organi-calcion endocrinien polyvitaminé*.
- Lab. Virultra**, Launay-Serquigny (Eure). — *Vaccins injectables et Vaccins-pansements Virultra*.
- Lab. Visconti**, 64, boul. Barbès, Paris. — *Garbocitrol*. *Spas-neurol*, *Veinalgol*.
- Lab. du Vitastérol**, 10, rue du Collège, Arras. — *Vitastérol*.

**Sté anon. des Etabl. Wander**, 151, bis, route de Joinville Champigny (Seine). — *Alcacyl*, *Alucol*, *Carottase*, *Christolax*, *Formitrol*, *Gloma pur* (*Calcio Gloma*, *Ferro*

*Gloma, Gaya Gloma, Glycéro Gloma, Hémé Gloma, Iodo Gloma, Pepso Gloma, Jemalt, Maltosan, Malt Wander (Gloma), Nutromalt, Ovomaltine, Pneuma, Veguva.*

**Lab. Warin, 4, chaussée de la Muette, Paris.** — *Bucmine, Buc-Vac, Cachets Rava, Citrocarbine, Citrofluyl, Fidulax, Hermostyrum, Hépatogastrine. Hydrogemmine Lagasse, Inhaloxyl, Iodassium, Juglamarine, Panfortan Pastilles Irsi, Vaccin-Irsi, Staphydex.*

**Lab. Weber, 5 bis, rue des Haudriettes, Paris.** — *Glycethymoline.*

**Lab. A. Welcker et Cie, 72, rue du Commerce, Paris.** — *Sanas.*

**Lab. de la Yaourtine (L. J. Mounier), 18, pl. Laborde, Paris.** — *Yaourtine.*

**Lab. Yvrard, 17, rue Soufflot, Paris.** — *Cérébro-lipase. Pneumolipase, Poudre Mass plastique.*

**Lab. du Dr Zizine, 24, rue de Fécamp, Paris.** — *Agocholine, Gastropansement, Peptodiase, Vivoléol, Sédogastrine.*

**Lab. Zyma, 4, rue Bellart, Paris.** — *Comprimés Mycéta, Hémosamine (utéramine), Hova (Tablettes), Levure fraîche Mycéta, Lipodéterpenol, Pilka (Gouttes). Themsaline, Viscum Zyma.*





